발 간 사

『2010 국민건강통계』는 국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 자료를 바탕으로 보건복지부(질병관리본부)가 발간하는 통계집입니다. 2010년 1월부터 12월까지 실시된 제5기 1차년도(2010) 국민건강영양조사 자료를 분석하여 건강행태, 영양, 만성질환, 삶의 질 등의 현황과 추이를 500여개의 지표로 정리하여 제시하고 있습니다.

국민건강영양조사는 국민건강증진법(제16조)에 근거한 법정조사로서,「국민건강증진종합계획」등 보건정책 수립 및 평가에 필요한 통계생산을 일차적인 목적으로 하고 있습니다. 특히 성별, 연령별, 사회경제적 위치별 건강통계는 정책적 우선순위를 두어야 할 건강취약집단을 선별하고, 현재의 보건 정책과 사업이 효과적으로 전달되고 있는지를 평가하는 지표로서 활용됩니다. 나아가 인류의 건강을 위협하는 공통의 위험요인인 흡연, 음주, 신체활동 부족, 비만 등의 통계자료를 세계보건기구(WHO)와 경제협력개발기구(OECD)에 제공하고 있습니다.

지금까지 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005), 제4기(2007-2009) 조사가 실시되었으며, 현재 제5기(2010-2012) 조사가 진행 중입니다. 제1~3기까지는 3년의 간격을 두고 당해 연도에 2~3개월 동안 실시된 단기조사로 운영하였으나, 건강에 대한 국민의 관심이 날로 증가하면서 3년 단위로 생산되는 통계로는 정책적 수요와 시급성을 충분히 뒷받침하기 어렵다는 판단에 따라 제4기부터 매년 통계생산이 가능한 연중조사로 개편하였습니다. 아울러 전문조사 수행팀을 구성하여 직접 수행하는 형태로 전환하고, 전문 학회와 공동조사체계를 구축하여 구강검사, 폐기능검사, 안검사, 이비인후검사, 체지방 및 골밀도검사, 흉부X-선검사, 골관절염검사 등 검진조사 항목을 확대하고 자료의 질을 선진국 수준으로 향상시켰습니다.

제5기(2010-2012) 조사에서는 그간 구축된 조사체계와 경험을 바탕으로 자료의 정확성을 제고하고, 정책적 활용도를 높이기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 특히, 지난 6월 확정·발표된「국민건강증진종합계획 2020」에 새로이 추가된 다문화가정·장애인 관련 지표를 반영하기 위한 준비에 착수하였으며, 최근 증가가 주목되는 C형간염을 검진조사에 추가하였습니다. 영양조사의 경우 식품안정성 및 식품섭취빈도조사 항목을 개선하였습니다.

본 통계집이 중앙의 각 부처 및 지방자치단체에서 정책개발과 평가의 기반이 되고, 관련 분야의 연구 활성화를 위한 의미있는 자료가 되기를 기대합니다.

2011. 12.

보건복지부장관 임 채 민

이용자를 위하여

국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 근거하여 실시하는 국민의 건강행태, 만성질환 유병현황, 식품 및 영양섭취실태에 관한 법정 조사이며, 통계법 제17조에 근거한 정부 지정 통계(승인번호 11702호)입니다. 본 조사는 질병관리본부 연구윤리심의위원회 승인을 받아 수행하였으며, 현재까지 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005), 제4기(2007-2009), 제5기 1차년도(2010), 2차년도(2011) 조사를 완료하였습니다.

본 통계집은 2010년 1월부터 12월까지 실시한 제5기 1차년도(2010) 조사의 주요 결과를 담고 있습니다. 모든 결과는 가중치를 적용한 가중표본평균 또는 가중분율로 제시하였으며, 가중치는 추출률, 응답률, 해당연도 모집단 인구구성비를 반영하여 산출하였습니다. 연도별 또는 사회경제적위치지표별 결과를 제시하는 경우, 표본집단간 연령구조에 따른 결과 차이를 보정하기 위해 2005년 추계인구로 조정한 표준화 결과를 함께 제시하였습니다. 표준화 결과는 연령별 자료수가 20명 이상인 경우에 결과를 제시하였습니다. 일부 지표의 경우 충분한 자료수 확보를 통해 보다 안정적 통계를 산출하기 위해 3개년도(2008-2010) 자료를 통합한 결과를 제시하였습니다.

본 보고서의 제1기(1998)~제4기(2007-2009)의 결과는 가중치 조정, 분산추정층 통합, 오류수정, 추정방법 변경 사항 등을 반영하여 기발간된 보고서 수치와 다를 수 있습니다.

표본설계 관련 상세 내용은「국민건강영양조사 제4기(2007-2009) 가중치 산출 및 제5기(2010-2012) 표본설계」보고서를 참고하시기 바라며, 본 통계집 및 제4기(2007-2009) 이후 추가 조사항목에 대한 조사지침서, 기타 국민건강영양조사 관련 보고서는 국민건강영양조사 홈페이지(http://knhanes.cdc.go.kr/)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

본 보고서의 영문명은「Korea Health Statistics 2010 : Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES V-1)」입니다. 수록된 자료에 대한 문의는 질병관리본부 건강영양조사과(☎ 043-719-7465~9) 또는 보건복지부 건강정책과(☎ 02-2023-7498)로 해주시기 바랍니다.

차 례

발 간 사 ····· i
이용자를 위하여 ····· iii

제1부 조사개요 ····· 1

Ⅰ. 개요 ····· 3
Ⅱ. 자료분석 ····· 8
Ⅲ. 참여현황 ····· 15

제2부 주요 건강통계 ····· 19

제1장 건강행태 ····· 21
Ⅰ. 흡연 ····· 22
Ⅱ. 음주 ····· 24
Ⅲ. 신체활동 ····· 26
Ⅳ. 우울 및 스트레스 ····· 28
Ⅴ. 손상 및 안전의식 ····· 30
Ⅵ. 건강검진 ····· 32
Ⅶ. 의료이용 ····· 34

제2장 영양 ····· 37
Ⅰ. 식품 섭취 ····· 38
Ⅱ. 에너지 및 영양소 섭취 ····· 42
Ⅲ. 식생활 행태 ····· 46
Ⅳ. 수유 및 이유 현황 ····· 49

제3장 만성질환 ····· 51
Ⅰ. 비만 ····· 52
Ⅱ. 고혈압 ····· 54
Ⅲ. 당뇨병 ····· 56
Ⅳ. 이상지혈증 ····· 58
Ⅴ. 폐쇄성폐질환 ····· 60
Ⅵ. 구강질환 ····· 62
Ⅶ. B형간염 ····· 64
Ⅷ. 빈혈 ····· 65
Ⅸ. 안질환 ····· 66
Ⅹ. 이비인후질환 ····· 67
Ⅺ. 골다공증 ····· 68
Ⅻ. 골관절염 ····· 70
ⅩⅢ. 중금속 ····· 71

제4장 삶의 질 ····· 73

제3부 통계표 ····· 77

제1장 건강행태 ····· 79
제2장 영양 ····· 281
제3장 만성질환 ····· 427
제4장 삶의 질 ····· 547

제4부 부록 ····· 573

제1장 지표정의 ····· 575
제2장 조사표 ····· 617
제3장 참여진 ····· 727

그림차례

제1장 건강행태

그림 1-1. 현재흡연율 추이 ····· 23
그림 1-2. 연령별 현재흡연율 ····· 23
그림 1-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이 ····· 23
그림 1-4. 현재비흡연자의 간접흡연노출률 추이 ····· 23
그림 1-5. 월간음주율 추이 ····· 25
그림 1-6. 연간음주자의 고위험음주율 추이 ····· 25
그림 1-7. 연령별 연간음주자의 고위험음주율 ····· 25
그림 1-8. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이 ····· 25
그림 1-9. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율 추이 ····· 27
그림 1-10. 격렬한 신체활동실천율 추이 ····· 27
그림 1-11. 중등도 신체활동실천율 추이 ····· 27
그림 1-12. 걷기실천율 추이 ····· 27
그림 1-13. 우울증상경험률 추이 ····· 29
그림 1-14. 연령별 우울증상경험률 ····· 29
그림 1-15. 자살생각률 추이 ····· 29
그림 1-16. 연령별 자살생각률 ····· 29
그림 1-17. 연간손상경험률 추이 ····· 31
그림 1-18. 연간손상원인 ····· 31
그림 1-19. 운전자의 안전벨트착용률 추이 ····· 31
그림 1-20. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 ····· 31
그림 1-21. 건강검진수진율 추이 ····· 33
그림 1-22. 연령별 건강검진수진율 ····· 33
그림 1-23. 인플루엔자예방접종률 추이 ····· 33
그림 1-24. 연령별 인플루엔자예방접종률 ····· 33
그림 1-25. 연간미치료율(병의원) 추이 ····· 35
그림 1-26. 연령별 연간미치료율(병의원) ····· 35
그림 1-27. 연간미치료율(치과) 추이 ····· 35
그림 1-28. 연령별 연간미치료율(치과) ····· 35

제2장 영양

그림 2-1. 식물성 식품군별 섭취량 추이 ····· 39
그림 2-2. 동물성 식품군별 섭취량 추이 ····· 39
그림 2-3. 식품섭취빈도 ····· 41
그림 2-4. 에너지 섭취량 추이 ····· 43

그림 2-5. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 ····· 43
그림 2-6. 영양소별 에너지섭취분율 추이 ····· 43
그림 2-7. 영양섭취기준에 대한 섭취비율 ····· 43
그림 2-8. 영양섭취부족자 및 에너지/지방과잉섭취자 분율 ····· 45
그림 2-9. 아침식사 결식률 ····· 47
그림 2-10. 하루 1회 이상 외식률 ····· 47
그림 2-11. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 ····· 47
그림 2-12. 영양교육 및 상담수혜율 추이 ····· 48
그림 2-13. 식이보충제 복용경험률 추이 ····· 48

제3장 만성질환

그림 3-1. 비만 유병률 추이(체질량지수 기준) ····· 53
그림 3-2. 연령별 비만 유병률(체질량지수 기준) ····· 53
그림 3-3. 비만 유병률 추이(허리둘레 기준) ····· 53
그림 3-4. 연령별 비만 유병률(허리둘레 기준) ····· 53
그림 3-5. 고혈압 유병률 추이 ····· 55
그림 3-6. 연령별 고혈압 유병률 ····· 55
그림 3-7. 연령별 고혈압 관리현황 ····· 55
그림 3-8. 당뇨병유병률 추이 ····· 57
그림 3-9. 연령별 당뇨병유병률 ····· 57
그림 3-10. 연령별 당뇨병 관리현황 ····· 57
그림 3-11. 이상지혈증 유병률 추이 ····· 59
그림 3-12. 연령별 고콜레스테롤혈증 유병률 ····· 59
그림 3-13. 연령별 저HDL콜레스테롤혈증 유병률 ····· 59
그림 3-14. 연령별 고중성지방혈증 유병률 ····· 59
그림 3-15. 폐쇄성폐질환 유병률 추이 ····· 61
그림 3-16. 연령별 폐쇄성폐질환 유병률 ····· 61
그림 3-17. 흡연여부별 폐쇄성폐질환 유병률(남자) ····· 61
그림 3-18. 흡연갑년별 폐쇄성폐질환 유병률(남자) ····· 61
그림 3-19. 구강질환 유병률 추이 ····· 63
그림 3-20. 연령별 영구치우식 유병률 ····· 63
그림 3-21. 연령별 저작불편호소율 ····· 63
그림 3-22. 연령별 치주질환 유병률 ····· 63
그림 3-23. B형간염 표면항원 양성률 추이 ····· 64
그림 3-24. 연령별 B형간염 표면항원 양성률 ····· 64

그림 3-25. 빈혈 유병률 추이 ····· 65
그림 3-26. 연령별 빈혈 유병률 ····· 65
그림 3-27. 연령별 백내장 유병률(교정시력0.8미만) ····· 66
그림 3-28. 연령별 나이관련황반변성 유병률 ····· 66
그림 3-29. 연령별 양측성 난청 유병률 ····· 67
그림 3-30. 연령별 평형기관이상 유병률 ····· 67
그림 3-31. 연령별 골다공증 유병률 ····· 69
그림 3-32. 연령별 요추 골밀도 ····· 69
그림 3-33. 연령별 대퇴경부 골밀도 ····· 69
그림 3-34. 연령별 대퇴골 골밀도 ····· 69
그림 3-35. 연령별 골관절염 유병률 ····· 70
그림 3-36. 연령별 혈중 납 수준 ····· 71
그림 3-37. 연령별 혈중 수은 수준 ····· 71
그림 3-38. 연령별 혈중 카드뮴 수준 ····· 71

제4장 삶의 질

그림 4-1. 주관적건강인지율 ····· 75
그림 4-2. 연령별 주관적건강인지율 ····· 75
그림 4-3. 활동제한율 ····· 75
그림 4-4. 연령별 활동제한율 ····· 75

표 차 례

제1부 조사개요

표 Ⅰ. 제4기(2007-2009) 및 제5기 1차년도(2010) 표본 조사구수 ····· 4
표 Ⅱ. 제5기 1차년도(2010) 조사항목 ····· 5
표 Ⅲ. 제5기(2010-2012) 조사 변경사항 ····· 6
표 Ⅳ. 분야별 가중치 분포 ····· 10
표 Ⅴ. 조사부문별 무응답률 ····· 11
표 Ⅵ. 2005년 추계인구 ····· 11
표 Ⅶ. 식품섭취조사 자료처리용 DB 현황 ····· 12
표 Ⅷ. 제5기 1차년도(2010) 참여율 ····· 15
표 Ⅸ. 제5기 1차년도(2010) 표본가구 특성 ····· 16
표 Ⅹ. 제5기 1차년도(2010) 표본인구 특성 ····· 17

제3부 통계표

제1장 건강행태

표 1-I-1. 현재흡연율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 80
표 1-I-2. 평생흡연자의 흡연시작연령 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 82
표 1-I-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 84
표 1-I-4. 현재흡연자의 금연시도율 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2010 ····· 86
표 1-I-5. 현재흡연자의 1개월내금연계획률 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2010 ····· 88
표 1-I-6. 현재비흡연자의 간접흡연노출률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 90
표 1-I-7. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 92
표 1-I-8. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 94
표 1-I-9. 흡연예방 또는 금연교육 경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 96
표 1-I-10. 평생흡연율, 현재흡연율, 과거흡연율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 98
표 1-I-11. 평생흡연자의 흡연시작연령 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 99
표 1-I-12. 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 100
표 1-I-13. 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 101
표 1-I-14. 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 102
표 1-I-15. 현재흡연자의 금연시도율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 103
표 1-I-16. 현재흡연자의 금연계획 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 104
표 1-I-17. 현재흡연자의 금연계획 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 105
표 1-I-18. 현재흡연자의 금연계획 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 106
표 1-I-19. 과거흡연자의 금연방법 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 107
표 1-I-20. 과거흡연자의 금연방법 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 108
표 1-I-21. 과거흡연자의 금연방법 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 109

표 1-I-22. 현재비흡연자의 간접흡연노출률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 110
표 1-I-23. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 111
표 1-I-24. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 112
표 1-I-25. 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 113
표 1-II-1. 연간음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 114
표 1-II-2. 월간음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 116
표 1-II-3. 평생음주자의 음주시작연령 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 118
표 1-II-4. 연간음주자의 고위험음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 120
표 1-II-5. 자동차 또는 오토바이 운전자의 음주운전경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 122
표 1-II-6. 연간음주운전차량동승률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 124
표 1-II-7. 평생음주율, 연간음주율, 월간음주율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 126
표 1-II-8. 평생음주자의 음주시작연령 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 127
표 1-II-9. 평생음주자의 연간음주빈도 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 128
표 1-II-10. 평생음주자의 연간음주빈도 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 129
표 1-II-11. 평생음주자의 연간음주빈도 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 130
표 1-II-12. 연간음주자의 일회음주량 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 131
표 1-II-13. 연간음주자의 일회음주량 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 132
표 1-II-14. 연간음주자의 일회음주량 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 133
표 1-II-15. 연간음주자의 고위험음주율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 134
표 1-II-16. 연간음주자의 연간폭음빈도 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 135
표 1-II-17. 연간음주자의 연간폭음빈도 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 136
표 1-II-18. 연간음주자의 연간폭음빈도 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 137
표 1-II-19. 평생음주자의 문제음주율, 알코올남용률, 알코올의존율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ··· 138
표 1-II-20. 평생음주자의 연간음주문제상담경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 139
표 1-II-21. 연간음주운전경험률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 140
표 1-II-22. 연간음주운전경험률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 141
표 1-II-23. 연간음주운전경험률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 142
표 1-II-24. 연간음주운전차량동승률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 143
표 1-III-1. 중등도이상 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 144
표 1-III-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 146
표 1-III-3. 격렬한 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 148
표 1-III-4. 중등도 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 150
표 1-III-5. 걷기실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 152
표 1-III-6. 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 154
표 1-III-7. 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 155

표 1-III-8. 청소년 신체활동실천율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 156
표 1-III-9. 걷기실천율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 157
표 1-III-10. 근력운동실천율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 158
표 1-III-11. 청소년 근력운동실천율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 159
표 1-IV-1. 스트레스인지율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 160
표 1-IV-2. 우울증상경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 162
표 1-IV-3. 자살생각률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 164
표 1-IV-4. 자살생각자의 자살시도율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 166
표 1-IV-5. 하루수면시간 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 168
표 1-IV-6. 하루수면시간 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 169
표 1-IV-7. 하루수면시간 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 170
표 1-IV-8. 청소년 하루수면시간 : 전체, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 171
표 1-IV-9. 스트레스인지율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 172
표 1-IV-10. 청소년 스트레스인지율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 173
표 1-IV-11. 스트레스인지정도 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 174
표 1-IV-12. 스트레스인지정도 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 175
표 1-IV-13. 스트레스인지정도 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 176
표 1-IV-14. 청소년 스트레스인지정도 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 177
표 1-IV-15. 우울증상경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 178
표 1-IV-16. 청소년 우울증상경험률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 179
표 1-IV-17. 자살생각률, 자살생각자의 자살시도율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 180
표 1-IV-18. 청소년 자살생각률, 자살생각자의 자살시도율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 181
표 1-IV-19. 정신문제상담경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 182
표 1-V-1. 연간손상경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 183
표 1-V-2. 소아청소년 연간손상경험률 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2010 ····· 185
표 1-V-3. 운전자의 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 186
표 1-V-4. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 188
표 1-V-5. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만12-18세, 1998-2010 ····· 190
표 1-V-6. 자동차 탑승 경험 소아의 자동차보호장구이용률 추이 : 성별, 만1-5세, 2005-2010 ····· 191
표 1-V-7. 자전거 탑승 소아의 헬멧착용률 추이 : 성별, 만3-11세, 2005-2010 ····· 191
표 1-V-8. 연간손상경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 192
표 1-V-9. 소아청소년 연간손상경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 193
표 1-V-10. 계절별손상경험률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 194
표 1-V-11. 계절별손상경험률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 195
표 1-V-12. 계절별손상경험률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 196

표 1-V-13. 소아청소년 계절별손상경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 197
표 1-V-14. 연간손상원인 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 198
표 1-V-15. 연간손상원인 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 199
표 1-V-16. 연간손상원인 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 200
표 1-V-17. 소아청소년 연간손상원인 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 201
표 1-V-18. 연간의도성손상 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 202
표 1-V-19. 연간손상치료처 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 203
표 1-V-20. 연간손상 와병경험률, 결근결석경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010 ····· 204
표 1-V-21. 소아청소년 연간의도성손상 : 성별, 만1-18세, 2008-2010 ····· 205
표 1-V-22. 소아청소년 연간손상치료처 : 성별, 만1-18세, 2008-2010 ····· 205
표 1-V-23. 소아청소년 연간손상 와병경험률, 결근결석경험률 : 성별, 만1-18세, 2008-2010 ····· 205
표 1-V-24. 운전자의 안전벨트착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 206
표 1-V-25. 운전자의 안전벨트착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 207
표 1-V-26. 운전자의 안전벨트착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 208
표 1-V-27. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 209
표 1-V-28. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 210
표 1-V-29. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 211
표 1-V-30. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 212
표 1-V-31. 자전거 헬멧착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 213
표 1-V-32. 자전거 헬멧착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 214
표 1-V-33. 자전거 헬멧착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 215
표 1-V-34. 청소년 자전거 헬멧착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 216
표 1-V-35. 소아 자동차보호장구이용률, 자전거헬멧착용률 : 성별, 2010 ····· 217
표 1-VI-1. 건강검진수진율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 218
표 1-VI-2. 암검진수진율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 220
표 1-VI-3. 인플루엔자예방접종률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 222
표 1-VI-4. 소아청소년 인플루엔자예방접종률 추이 : 성별, 만1-18세, 2007-2010 ····· 224
표 1-VI-5. 건강검진수진율, 암검진수진율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 225
표 1-VI-6. 건강검진 종류 : 전체, 만19세이상, 2010 ····· 226
표 1-VI-7. 건강검진 종류 : 남자, 만19세이상, 2010 ····· 227
표 1-VI-8. 건강검진 종류 : 여자, 만19세이상, 2010 ····· 228
표 1-VI-9. 암검진 종류 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 229
표 1-VI-10. 암검진 종류 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 230
표 1-VI-11. 암검진 종류 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 231
표 1-VI-12. 위암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 232

표 1-VI-13. 유방암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2010 ····· 232
표 1-VI-14. 자궁경부암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2010 ····· 233
표 1-VI-15. 대장암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 233
표 1-VI-16. 간암검사수진율(고위험군) : 성별, 만19세이상, 2008-2010 ····· 234
표 1-VI-17. 인플루엔자예방접종률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 235
표 1-VI-18. 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 236
표 1-VI-19. 소아선천성대사이상검사 수진율 : 성별, 만1-11세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 237
표 1-VII-1. 연간미치료율(병의원) 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 238
표 1-VII-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 240
표 1-VII-3. 연간미치료율(치과) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 242
표 1-VII-4. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 244
표 1-VII-5. 연간입원율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 246
표 1-VII-6. 2주간 외래이용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 248
표 1-VII-7. 2주간 약국이용률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 250
표 1-VII-8. 연간미치료율(병의원, 치과) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 252
표 1-VII-9. 소아청소년 연간미치료율(병의원, 치과) : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 253
표 1-VII-10. 연간미치료이유(병의원) : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 254
표 1-VII-11. 연간미치료이유(병의원) : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 255
표 1-VII-12. 연간미치료이유(병의원) : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 256
표 1-VII-13. 소아청소년 미치료이유(병의원) : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 257
표 1-VII-14. 연간미치료이유(치과) : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 258
표 1-VII-15. 연간미치료이유(치과) : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 259
표 1-VII-16. 연간미치료이유(치과) : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 260
표 1-VII-17. 소아청소년 연간미치료이유(치과) : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 261
표 1-VII-18. 연간입원율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 262
표 1-VII-19. 소아청소년 연간입원율 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 263
표 1-VII-20. 입원건당 평균 입원기간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 264
표 1-VII-21. 입원건당 의료비재원 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 265
표 1-VII-22. 입원건당 의료비재원 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 266
표 1-VII-23. 입원건당 의료비재원 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 267
표 1-VII-24. 입원건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 268
표 1-VII-25. 2주간 외래이용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 269
표 1-VII-26. 소아청소년 2주간 외래이용률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 270
표 1-VII-27. 외래이용건당 의료비재원 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 271
표 1-VII-28. 외래이용건당 의료비재원 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 272

표 1-VII-29. 외래이용건당 의료비재원 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 273
표 1-VII-30. 2주간외래이용건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 274
표 1-VII-31. 2주간 약국이용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 275
표 1-VII-32. 소아청소년 2주간 약국이용률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 276
표 1-VII-33. 2주간 약국이용목적 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 277
표 1-VII-34. 2주간 약국이용목적 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 278
표 1-VII-35. 2주간 약국이용목적 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 279

제2장 영양

표 2-I-1. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 전체, 만1세이상, 1969-2010 ····· 282
표 2-I-2. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 전체, 만1세이상, 1998-2010 ····· 285
표 2-I-3. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 286
표 2-I-4. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 남자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 287
표 2-I-5. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 288
표 2-I-6. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 여자, 만1세이상, 표준화, 1998-2010 ····· 289
표 2-I-7. 식품군별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 290
표 2-I-8. 식품군별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 291
표 2-I-9. 식품군별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 294
표 2-I-10. 식품군별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 297
표 2-I-11. 다소비식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 300
표 2-I-12. 식품별 주당 평균 섭취빈도 추이 : 전체, 만12세이상, 2005-2010 ····· 301
표 2-I-13. 식품섭취빈도 : 전체, 만12세이상, 2010 ····· 303
표 2-I-14. 식품섭취빈도 : 남자, 만12세이상, 2010 ····· 306
표 2-I-15. 식품섭취빈도 : 여자, 만12세이상, 2010 ····· 309
표 2-I-16. 식품섭취빈도 : 전체, 만12-18세, 2010 ····· 312
표 2-I-17. 식품섭취빈도 : 전체, 만19-64세, 2010 ····· 315
표 2-I-18. 식품섭취빈도 : 전체, 만65세이상, 2010 ····· 318
표 2-II-1. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 전체, 만1세이상, 1969-2010 ····· 321
표 2-II-2. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 전체, 만1세이상, 1998-2010 ····· 322
표 2-II-3. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 323
표 2-II-4. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 남자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 324
표 2-II-5. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 325
표 2-II-6. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 여자, 만1세이상, 1998-2010 ····· 326
표 2-II-7. 영양소별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 327
표 2-II-8. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 전체, 만1세이상, 2010 ····· 328

표 2-II-9. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 남자, 만1세이상, 2010 ····· 330
표 2-II-10. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 여자, 만1세이상, 2010 ····· 332
표 2-II-11. 영양소별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 334
표 2-II-12. 영양소별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 337
표 2-II-13. 영양소별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 340
표 2-II-14. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 343
표 2-II-15. 단백질 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 344
표 2-II-16. 지방 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 345
표 2-II-17. 탄수화물 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 346
표 2-II-18. 조섬유 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 347
표 2-II-19. 칼슘 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 348
표 2-II-20. 인 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 349
표 2-II-21. 나트륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 350
표 2-II-22. 칼륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 351
표 2-II-23. 철 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 352
표 2-II-24. 비타민 A 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 353
표 2-II-25. 티아민 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 354
표 2-II-26. 리보플라빈 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 355
표 2-II-27. 나이아신 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 356
표 2-II-28. 비타민 C 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010 ····· 357
표 2-II-29. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 358
표 2-II-30. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 359
표 2-II-31. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 360
표 2-II-32. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 362
표 2-II-33. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 364
표 2-II-34. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 366
표 2-II-35. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 367
표 2-II-36. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 368
표 2-II-37. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 370
표 2-II-38. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 372
표 2-II-39. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 374
표 2-II-40. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 375
표 2-II-41. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 376
표 2-II-42. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 378
표 2-II-43. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 380

표 2-II-44. 영양섭취부족자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010 ····· 382
표 2-II-45. 영양섭취부족자 분율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 384
표 2-II-46. 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함) : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 385
표 2-II-47. 에너지/지방과잉섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 386
표 2-II-48. 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 388
표 2-III-1. 아침식사 결식률 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 389
표 2-III-2. 점심식사 결식률 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 391
표 2-III-3. 저녁식사 결식률 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 393
표 2-III-4. 아침식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 395
표 2-III-5. 점심식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 396
표 2-III-6. 저녁식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 397
표 2-III-7. 아침식사 가족동반식사율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 398
표 2-III-8. 점심식사 가족동반식사율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 400
표 2-III-9. 저녁식사 가족동반식사율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 402
표 2-III-10. 아침식사 가족동반식사율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 404
표 2-III-11. 점심식사 가족동반식사율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 405
표 2-III-12. 저녁식사 가족동반식사율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 406
표 2-III-13. 하루 1회 이상 외식률 추이 : 성별, 만1세이상, 2008-2010 ····· 407
표 2-III-14. 외식 섭취빈도 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 409
표 2-III-15. 영양표시 이용률 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2010 ····· 410
표 2-III-16. 가공식품 선택 시 영양표시 이용 여부 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 412
표 2-III-17. 영양표시 중 관심항목 : 전체, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 413
표 2-III-18. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 414
표 2-III-19. 영양교육 및 상담 수혜율 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2010 ····· 415
표 2-III-20. 영양교육 및 상담 수혜율 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 417
표 2-III-21. 식이보충제 복용경험률 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010 ····· 418
표 2-III-22. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 420
표 2-III-23. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 421
표 2-III-24. 식품안정성 확보가구분율 추이, 2005-2010 ····· 422
표 2-III-25. 식품안정성 확보가구분율, 2010 ····· 422
표 2-IV-1. 출생 시 체중 분포 : 전체, 만1-3세, 2008-2010 ····· 423
표 2-IV-2. 수유현황 : 전체, 만1-3세, 2008-2010 ····· 423
표 2-IV-3. 월령별 수유형태 : 전체, 만1-3세, 2008-2010 ····· 424
표 2-IV-4. 조제분유, 시판우유, 이유보충식 시작 시기 : 전체, 만1-3세, 2008-2010 ····· 425

제3장 만성질환

표 3-I-1. 비만 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 428
표 3-I-2. 신장 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 430
표 3-I-3. 체중 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 431
표 3-I-4. 허리둘레 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 432
표 3-I-5. 체질량지수 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 433
표 3-I-6. 체지방률 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 434
표 3-I-7. 비만 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 435
표 3-I-8. 비만 유병률(허리둘레기준) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 436
표 3-I-9. 소아청소년 비만 유병률 : 성별, 만2-18세, 2010 ····· 437
표 3-II-1. 고혈압 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010 ····· 438
표 3-II-2. 수축기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 440
표 3-II-3. 이완기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2010 ····· 441
표 3-II-4. 고혈압 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 442
표 3-II-5. 고혈압 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010 ····· 443
표 3-III-1. 당뇨병 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010 ····· 444
표 3-III-2. 혈당 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 446
표 3-III-3. 인슐린 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 447
표 3-III-4. 당뇨병 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 448
표 3-III-5. 당뇨병 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010 ····· 449
표 3-IV-1. 고콜레스테롤혈증 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010 ····· 450
표 3-IV-2. 혈중 총콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 452
표 3-IV-3. 고콜레스테롤혈증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 453
표 3-IV-4. 고콜레스테롤혈증 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010 ····· 454
표 3-IV-5. 저HDL콜레스테롤혈증 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 2008-2010 ····· 455
표 3-IV-6. 혈중 HDL콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 457
표 3-IV-7. 저HLD콜레스테롤혈증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 458
표 3-IV-8. 고중성지방혈증 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010 ····· 459
표 3-IV-9. 혈중 중성지방 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 461
표 3-IV-10. 고중성지방혈증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 462
표 3-V-1. 폐쇄성폐질환 유병률 추이 : 성별, 만40세이상, 2007-2010 ····· 463
표 3-V-2. 폐쇄성폐질환 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 465
표 3-VI-1. 영구치우식 경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 466
표 3-VI-2. 우식경험영구치지수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 467
표 3-VI-3. 영구치우식 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 468

표 3-VI-4. 영구치우식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 470
표 3-VI-5. 치면세마필요자율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 471
표 3-VI-6. 치주질환 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 472
표 3-VI-7. 치주질환 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 474
표 3-VI-8. 현존 자연치아 수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 475
표 3-VI-9. 20개이상 치아보유율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 476
표 3-VI-10. 의치필요자율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 477
표 3-VI-11. 저작불편호소율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 478
표 3-VI-12. 저작불편호소율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 480
표 3-VI-13. 구강검진율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 481
표 3-VI-14. 칫솔질 실천율 : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 482
표 3-VII-1. B형간염 표면항원 양성률 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2010 ····· 483
표 3-VII-2. B형간염 표면항원 양성률 : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 485
표 3-VIII-1. 빈혈 유병률 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2010 ····· 486
표 3-VIII-2. 헤모글로빈 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 488
표 3-VIII-3. 빈혈 유병률 : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 489
표 3-IX-1. 시력장애 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 490
표 3-IX-2. 근시 분포 : 성별, 만5세이상, 2010 ····· 491
표 3-IX-3. 근시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 492
표 3-IX-4. 원시 분포 : 성별, 만5세이상, 2010 ····· 493
표 3-IX-5. 원시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 494
표 3-IX-6. 난시 분포 : 성별, 만5세이상, 2010 ····· 495
표 3-IX-7. 난시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 496
표 3-IX-8. 사시 유병률 : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 497
표 3-IX-9. MRD1 분포 : 성별, 만3세이상, 2010 ····· 498
표 3-IX-10. 안검하수 유병률 : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 499
표 3-IX-11. 백내장 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 500
표 3-IX-12. 군날개 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 501
표 3-IX-13. 당뇨망막병증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 502
표 3-IX-14. 나이관련황반변성 유병률 : 성별, 만40세이상, 2010 ····· 503
표 3-X-1. 만성중이염 유병률 : 성별, 만4세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 504
표 3-X-2. 일측성 난청유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 505
표 3-X-3. 양측성 난청유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 506
표 3-X-4. 평형기관 이상 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 507
표 3-X-5. 비염 유병률 : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 508

표 3-X-6. 만성 비부비동염 유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 509
표 3-X-7. 비중격 만곡증 유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 510
표 3-X-8. 후각장애 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 511
표 3-X-9. 후두양성점막질환 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 512
표 3-X-10. 본인인지 음성장애 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 513
표 3-XI-1. 혈중 비타민D 분포 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 514
표 3-XI-2. 혈중 부갑상선호르몬 분포 : 성별, 만50세이상, 2010 ····· 515
표 3-XI-3. 골밀도 분포(대퇴골) : 성별, 만10세이상, 2008-2010 ····· 516
표 3-XI-4. 골밀도 분포(대퇴경부) : 성별, 만10세이상, 2008-2010 ····· 517
표 3-XI-5. 골밀도 분포(요추) : 성별, 만10세이상 , 2008-2010 ····· 518
표 3-XI-6. 골다공증 유병률 : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 519
표 3-XI-7. 골감소증 유병률 : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 520
표 3-XII-1. 골관절염 유병률 : 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 521
표 3-XIII-1. 혈중 납 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 522
표 3-XIII-2. 혈중 수은 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 523
표 3-XIII-3. 혈중 카드뮴 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 524
표 3-XIV-1. 혈중 총 IgE 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 525
표 3-XIV-2. 혈중 집먼지진드기(미국형) 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 526
표 3-XIV-3. 혈중 바퀴 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 527
표 3-XIV-4. 혈중 개털 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010 ····· 528
표 3-XV-1. 뇌졸중 유병률 추이 : 성별, 만50세이상, 1998-2010 ····· 529
표 3-XV-2. 천식 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 531
표 3-XV-3. 아토피피부염 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 533
표 3-XV-4. 뇌졸중 유병률 : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 535
표 3-XV-5. 협심증 또는 심근경색증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 536
표 3-XV-6. 암 유병률 : 성별, 만30세이상, 2010 ····· 537
표 3-XV-7. 천식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 538
표 3-XV-8. 운동유발성천식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 539
표 3-XV-9. 소아청소년 천식 유병률, 운동유발성천식 유병률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ···· 540
표 3-XV-10. 아토피피부염 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 541
표 3-XV-11. 류마티스성관절염 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 542
표 3-XV-12. 우울증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 543
표 3-XV-13. 갑상샘질환 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 544
표 3-XV-14. C형간염, 간경변증 유병률 : 성별, 만30세이상, 2010 ····· 545
표 3-XV-15. 소아청소년 질환별 유병률 : 성별, 만1-18세, 2010 ····· 546

제4장 삶의 질

표 4-1. 주관적건강인지율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010 ····· 548
표 4-2. 소아청소년 주관적건강인지율 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2010 ····· 550
표 4-3. EQ-5D 지수 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 551
표 4-4. EQ-VAS 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 553
표 4-5. 활동제한율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010 ····· 555
표 4-6. 2주간 이환율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010 ····· 557
표 4-7. 주관적건강인지율 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 559
표 4-8. 주관적건강인지율 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 560
표 4-9. 주관적건강인지율 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 561
표 4-10. 소아청소년 주관적건강인지율 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 562
표 4-11. EQ-5D 지수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 563
표 4-12. EQ-VAS : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 564
표 4-13. 만성질환별 EQ-5D 지수 : 전체, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 565
표 4-14. 만성질환별 EQ-5D 지수 : 남자, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 566
표 4-15. 만성질환별 EQ-5D 지수 : 여자, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 567
표 4-16. 활동제한율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 568
표 4-17. 월간와병경험률, 월간결근결석경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 569
표 4-18. 소아청소년 월간와병경험률, 월간결근결석경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 570
표 4-19. 2주간 이환율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 571
표 4-20. 2주간 이환일수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010 ····· 572

제1부 조사개요

Ⅰ. 개요

조사목적

국민건강영양조사는 1995년에 공표된 국민건강증진법 제16조에 근거하여 1998년부터 3년주기로 시행하다가 2007년부터 매년 시행하고 있는 전국 규모의 건강 및 영양조사이다.

본 조사의 목적은 국민의 건강수준, 건강관련 의식 및 행태, 식품 및 영양섭취 실태에 대한 국가 및 시도 단위의 대표성과 신뢰성을 갖춘 통계를 산출하는 것이며, 통계 자료는 국민건강증진종합계획의 목표 설정 및 평가, 건강증진 프로그램 개발 등 보건정책 수립 및 평가에 필요한 기초자료로 활용되고 있다.

조사대상

제5기 1차년도(2010) 조사는 전국 약 3,840가구, 만1세이상 가구원 전체를 조사대상으로 2010년 1월부터 12월까지 실시하였다.

국민건강영양조사의 목표모집단은 대한민국에 거주하는 국민으로 양로원, 군대, 교도소 등에 입소한 자와 외국인 등은 제외되었다. 제5기(2010-2012) 표본추출틀은 2009년 주민등록인구자료와 2008년 아파트시세자료를 이용하였다. 제1기(1998)~제4기(2007-2009)는 통계청 인구주택총조사 조사구와 신축아파트 조사구를 표본추출틀로 사용하였으나 제5기(2010-2012)의 경우 2005년 인구주택총조사 이후의 조사구 및 가구 변동을 반영하기 위해 최신의 추출틀로 변경하였다.

제5기(2010-2012)의 일반주택 표본조사구는 2009년 주민등록인구의 통반리조사구에서, 아파트 표본조사구는 아파트시세자료의 아파트 단지조사구에서 추출하였다. 표본조사구는 시도별(서울, 6대 광역시, 경기, 경상·강원, 충청, 전라·제주)로 1차 층화하고, 일반지역은 성별, 연령대별 인구비율 기준 26개 층, 아파트 지역은 단지별 평당가격, 평균평수 등 기준 24개 층으로 2차 층화한 후 추출하였다. 추출된 표본조사구 내에서는 계통추출방법으로 조사구당 20개의 최종 조사대상 가구를 추출하였다.

조사내용

국민건강영양조사는 건강설문조사, 영양조사, 검진조사로 구성하였다(표Ⅱ).

건강설문조사의 만1세이상 공통조사영역으로는 이환, 손상, 활동제한, 의료이용, 교육, 비만 및 체중조절, 안전의식 등이 있으며, 성인(만19세이상)과 청소년(만12~18세)의 경우 경제활동, 흡연, 음주, 정신건강 등을 추가로 조사하였다. 삶의 질은 성인을 대상으로 조사하였으며 가구 당 성인 1인에게 세대유형, 주택소유여부, 주택형태, 월평균소득, 결혼여부 등 가구조사를 실시하였다.

영양조사는 식행태, 식이보충제, 영양지식, 식품안정성 등에 관한 현황(식생활조사)과 조사1일전 식품섭취내용(24시간 회상법) 등으로 구성하였으며, 만12세이상을 대상으로 63항목의 식품에 대한 식품섭취빈도조사를 추가로 실시하였다. 제5기(2010-2012) 조사 항목은 대체로 제4기(2007-2009) 조사와 유사하나 일부 응답보기로 응답이 편중되거나 대상자의 주관적 인지에 크게 좌우되는 문항은 삭제하였다(표Ⅲ). 식생활 지침은 항목별 내용에 대한 대상자의 이해도가 낮아 이를 이해시키기 위한 부연설명이 불가피하였고, 부연 설명의 양, 순서 등

에 의해 결과가 좌우되기도 하였다. 또한 각 항목별 실천율이 최저 70.9%(짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자)에서 최고 97.7%(밥을 주식으로 하는 우리 식생활을 즐기자)로 전반적으로 높아 지속적인 모니터링의 의의가 낮다고 판단하여 삭제하였다.

검진조사는 신체계측, 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 구강검사, 폐기능검사, 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사, 골관절염검사로 구성하였다. 검사항목은 연령에 따라 차이가 있어, 만10세미만 조사항목으로는 신체계측과 구강검사, 안검사, 이비인후검사 등이 있으며, 만10세이상의 경우 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 골밀도 및 체지방검사를 실시하였다. 흉부X-선검사는 만15세이상, 폐기능검사는 만40세이상 대상자에게 실시하였으며, 폐쇄성폐질환 의심자에게는 기관지확장제검사를 실시하였다. 골관절염검사는 만50세이상을 대상으로 실시하였다.

조사방법

건강설문조사와 검진조사는 이동검진센터에서 실시하였으며 영양조사는 대상 가구를 직접 방문하여 실시하였다.

건강설문조사의 교육 및 경제활동, 이환, 의료이용 항목, 영양조사의 전체 항목은 면접방법으로 조사하였으며, 건강설문조사 항목 중 흡연, 음주 등 건강행태영역은 자기기입식으로 조사하였다. 검진조사는 직접 계측, 관찰, 검체분석 등의 방법으로 수행하였으며, 각 항목별 구체적인 조사방법에 대해서는 제4기 1차년도(2007) 진행보고서에 자세히 기술하였고, 이후 추가된 항목은 각 세부 지침서에 기술하였다. 제5기 1차년도(2010)에 추가된 임상검사항목에 대한 분석기기, 방법 및 시약에 대해서는 “국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 진단의학검사” 결과보고서에 기술하였다.

보고서 및 지침서는 국민건강영양조사 홈페이지(http://knhanes.cdc.go.kr/)에 게재하였다.

표 Ⅰ. 제4기(2007-2009) 및 제5기 1차년도(2010) 표본 조사구수

시도	제4기 1차년도(2007)					제4기 2차년도(2008)					제4기 3차년도(2009)					제5기 1차년도(2010)				
	계	일반		아파트		계	일반		아파트		계	일반		아파트		계	일반		아파트	
		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면
전국	100	42	19	32	7	200	81	40	70	9	200	82	39	70	9	192	77	32	76	7
시도별																				
서울	19	13	-	6	-	34	23	-	11	-	34	23	-	11	-	41	25	-	16	-
부산	7	4	-	3	-	15	8	-	6	1	15	8	-	6	1	13	7	-	6	-
대구	5	2	-	3	-	9	5	-	3	1	9	5	-	3	1	9	4	1	3	1
인천	5	2	1	2	-	12	5	2	5	-	12	5	2	5	-	11	5	1	5	-
광주	3	1	-	2	-	7	3	-	4	-	7	3	-	4	-	5	2	-	3	-
대전	4	3	-	1	-	7	3	-	4	-	7	3	-	4	-	6	3	-	3	-
울산	2	1	-	1	-	5	1	1	3	-	5	2	-	2	1	4	1	1	2	-
경기	19	7	2	8	2	39	17	4	15	3	39	16	5	16	2	43	16	5	19	3
강원	3	1	1	1	-	7	2	3	2	-	7	2	3	2	-	6	1	3	2	-
충북	3	1	2	-	-	7	1	4	2	-	7	2	3	2	-	5	1	2	2	-
충남	5	1	2	-	2	10	1	6	2	1	10	-	7	3	-	8	1	4	2	1
전북	3	1	1	1	-	8	3	2	3	-	8	2	3	3	-	7	2	2	3	-
전남	6	-	4	2	-	10	2	5	2	1	10	2	5	2	1	8	2	4	2	-
경북	7	2	3	1	1	13	3	6	3	1	13	3	6	3	1	11	3	4	4	-
경남	7	2	2	1	2	13	3	5	4	1	13	4	4	3	2	12	3	4	3	2
제주	2	1	1	-	-	4	1	2	1	-	4	2	1	1	-	3	1	1	1	-

표 II. 제5기 1차년도(2010) 조사항목

조사부문	조사구분	해당연령	조사항목
건강설문	가구조사	만19세이상	성, 연령, 결혼상태, 가구원수, 세대유형, 가구소득, 건강보험 가입, 민간보험 가입
	교육	만1세이상	학력, 수학여부
	경제활동	만15세이상	경제활동여부, 미취업사유, 취업형태, 종사상지위, 근로시간형태, 직업, 직장내 지위, 최장 직업, 부모 직업
	이환	만1세이상	최근 2주간 이환, 천식증상 경험, 만성질환별(18개) 이환
	의료이용	만1세이상	외래이용, 입원이용, 약국이용
	건강검진	만19세이상	건강검진 수진, 암검진 수진
	예방접종	만1세이상	인플루엔자 예방접종
	활동제한	만1세이상	활동제한여부, 활동제한이유, 와병경험, 결근결석
	삶의 질	만19세이상	주관적 건강인지, EQ-5D(운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증/불편, 불안/우울)
	손상	만1세이상	손상경험, 사고중독발생기전, 손상치료처, 손상으로 인한 와병, 손상으로 인한 결근결석
	흡연	만12세이상	평생흡연, 현재흡연, 과거흡연, 금연, 간접흡연
	음주	만12세이상	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 폭음빈도
	신체활동	만12세이상	격렬한신체활동, 중등도신체활동, 걷기실천, 근력운동, 유연성운동
	정신건강	만12세이상	수면시간, 스트레스인지, 우울증상, 자살, 정신문제상담
	안전의식	만1-11세	자동차보호장구 착용, 자전거헬멧 착용
		만12세이상	안전벨트 착용, 자전거헬멧 착용
	비만 및 체중조절	만6세이상	주관적 체형인지, 체중변화, 체중조절
	여성건강	만10세이상	현재월경여부, 초경연령
		만15세이상	임신경험, 출산경험
		만19세이상	모유수유 경험, 모유수유 자녀수 및 기간, 폐경연령, 경구피임약 복용경험 및 기간, 여성호르몬제 복용경험 및 기간
영양	식생활조사	만1세이상	결식, 외식 빈도, 가족동반식사여부, 식이보충제 복용경험, 식품지원프로그램 수혜, 식품안정성(가구조사)
		초등학생이상	영양표시 이용현황, 영양교육 및 상담 수혜
		만1~3세	출생정보, 수유 방법 및 기간, 이유식 및 영아기 식이보충제 섭취 정보
	식품섭취빈도조사	만12세이상	에너지 및 영양소 주요 급원식품(63항목)에 대한 섭취빈도
	식품섭취조사	조리자	조사1일전 가구에서 섭취한 음식에 대한 조리 내용
		만1세이상	조사1일전 섭취 음식(식이보충제 포함)의 종류 및 섭취량(24시간 회상법)
검진	신체계측	만1세이상	신장, 체중, 허리둘레
	혈압 및 맥박	만10세이상	수축기혈압, 이완기혈압, 맥박수
	혈액검사	만10세이상	총콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 혈중요소질소, 크레아티닌, 공복 혈당, 인슐린, B형간염표면항원, 지오티, 지피티, 헤모글로빈, 헤마토크릿, 페리틴, 비타민D, 알칼라인 포스파테이즈
		만10세이상	당화혈색소(당뇨병 유병자)
		만10세이상	수은, 납, 카드뮴, 아연(매년 2,400명)
		만50세이상	부갑상선 호르몬
	소변검사	만10세이상	요단백, 요당, 요잠혈, 요비중, 요산도, 요크레아티닌, 요나트륨, 코티닌(매년 2,400명), 유로빌리노겐, 케톤, 빌리루빈, 아질산염
	구강검사	만1세이상	치아상태, 보철물 상태, 치주조직 상태, 저작불편경험, 구강검진수진, 칫솔질 실천 등
	폐기능검사	만40세이상	FVC(Forced Vital Capacity), FEV_1(Forced Expiratory Volume)
	흉부X-선검사	만15세이상	결핵, 폐기종, 기흉
	안검사	만3세이상	시력 및 굴절이상, 사시, 안검하수, 세극등검사, 안압검사, 무산동안저촬영검사 ※ 필요시 산동후 안저촬영, 시야검사
	이비인후검사	만1세이상	안면신경마비, 전이개누공, 외이기형, 고막검사, 수축전비강검사, 수축후비강검사, 후두내시경, 어지럼증검사, 청력검사
	골밀도 및 체지방검사	만10세이상	골밀도, 체지방
	골관절염검사	만50세이상	무릎관절, 엉덩관절

표 III. 제5기(2010-2012) 조사 변경사항

항목	내 용	사 유
<건강설문조사>		
가구공통설문	○응답자와의 관계 문항을 가구주와의 관계 문항으로 수정	○가구조사 응답자와 가구원(들)과의 관계는 응답자에 따라 달라지므로, 전체 가구에 대해 동일기준(가구주)에 의한 가구원과의 관계로 수정 ※가구조사는 성인 가구원 1인이 전체 가구원에 대해 응답
	○주된 생계부양자 문항 삭제	○가구조사 응답자와 주된 생계부양자와의 관계는 응답자에 따라 달라지고, 사회경제적위치지표로서 활용도 미흡하여 문항삭제
	○소유 주택 시가 문항 삭제	○주택시가는 주관적 판단으로 실주택 시가와 차이가 있거나 시가측정이 어려운 경우가 있으며 자산측정에 무리가 있어 문항 삭제
	○현재 거주지 거주기간, 이전 거주지 거주기간(현재 거주지 10년미만 거주한 경우) 문항 삭제	○유해환경 노출여부 파악이 어려워 건강과의 관련성 분석을 위한 사회경제적위치지표로의 활용도 미흡
	○범주형 소득금액 문항 삭제	○범주형, 연속형 소득금액 2개 문항으로 조사하였으나, 연속형 소득으로 범주형 소득 산출 가능하므로 범주형 문항 삭제
이환	○최근3개월간 30일이상 골관절염 증상 문항 추가 -무릎관절통 여부 및 평균점수, 아침기상후 무릎강직 여부 및 시간, 엉덩관절통 여부 및 평균점수, 요통 여부	○2009년 8월부터 검진조사에 골관절염검사 항목이 추가됨에 따라 유병률 및 보조지표 산출을 위해 40세이상을 대상으로 설문 문항 추가
	○고혈압, 당뇨병, 관절염 예방·관리방법 교육경험 조사대상자를 해당질환자에서 전체대상자로 확대 ○천식 예방·관리방법 교육경험 문항 추가	○전체 대상자 또는 질환자의 만성질환 예방·관리 교육경험률 산출을 위해 조사대상자를 해당질환자에서 전체로 확대하고, 천식의 예방 및 관리교육 문항 추가
	○성인 7개 질환(치질(치핵), 요통, 폐외결핵, 기관지확장증, 빈혈, 요실금, 위십이지장궤양) 및 소아청소년 4개 질환(설사, 수두, 빈혈, 결핵) 문항 삭제 -성인: 유병여부, 의사진단여부 및 연령, 치료여부, 입원여부, 외래여부, 와병일수, 결근일수 -소아청소년: 의사진단여부 및 연령	○해당 항목의 경우 설문조사를 통한 지표 산출에 한계가 있으므로 문항 삭제
	○성인 8개 질환(만성폐쇄성폐질환, 골다공증, 부비동염, 알레르기비염, 중이염, 백내장, 녹내장, 악관절증상) 및 소아청소년 2개 질환(부비동염, 중이염)에 대한 의사진단여부 및 연령, 치료여부 문항 조사부문 변경 ※만성폐쇄성폐질환(1년간 3개월이상 매일 기침·가래 여부 및 기간 포함), 골다공증(골절 의사진단 여부 및 부위 포함)	○검진조사 항목의 보조지표 산출을 위해 건강설문조사에서 검진조사로 조사부문 변경
교육 및 경제활동	○최근1년간 주된 직장(일)의 주당 평균 근로시간 문항을 주당 총 근로시간 문항으로 수정	○다수직업종사자의 경우 주된 직장의 근로시간만 조사되어 실제보다 과소추정되므로 총근로시간으로 수정
	○한국표준산업분류 문항 삭제	○조사대상자가 종사하는 산업분야에 대한 한국표준산업분류 대분류 결정을 위해서는 사실상 해당 산업체의 산업활동, 산출물 등에 대한 상세정보를 통해 조사자료의 질관리 가능하므로 문항 삭제
	○유년기 부모의 직업 문항 삭제	○직업의 현재 직능수준 및 직무유형 기준에 따라 개정된 표준직업분류를 이용하여 각기 다른 과거시점의 직업을 분류하는데 한계가 있으므로 문항 삭제
	○최근1년간 주된 직장의 작업내용·물질·환경 및 직무 스트레스 관련 14개 문항 삭제	○표준직업분류 대분류로는 특정유해산업의 분류가 어렵고, 대부분의 일반 사업장에 대한 유해환경 문항은 지표로서 활용도 미흡 ○직무 스트레스 문항은 한국형직무스트레스 도구의 일부 문항만 조사되어 자료 활용이 제한적이므로 해당 문항 삭제

(계속 : 제5기(2010-2012) 조사 변경사항)

항목	내 용	사 유
손상	○ 손상발생 부위, 장소, 발생당시활동, 치료기관 문항 삭제	○ 손상경험률 및 발생횟수가 작아, 세부조사결과에 대한 자료 활용도가 미흡하여 문항 삭제
구강건강	○ 구강건강 6개 문항 조사부문 변경 -주관적 구강건강상태, 칫솔질시기, 저작불편여부, 말하기 불편여부, 사용하는 구강건강용품 종류, 최근 2주간 치과진료 여부 및 종류	○ 검진조사 항목의 보조지표 산출을 위해 건강설문조사에서 검진조사로 조사부문 변경 ※2012년부터는 자기기입식 방법으로 변경
여성건강	○ 여성건강 조사부문 변경 -월경력, 피임약 및 여성호르몬제 복용, 출산력 ○ 무월경 이유, 월경 규칙성, 유산경험 및 횟수, 분만방법 및 횟수, 여성질환 수술력, 모유수유 경험 및 기간 추가	○ 조사내용의 특성상 면접보다는 자기기입 방법이 타당하여 영양조사에서 면접으로 실시하던 것을 건강설문조사의 자기기입 항목으로 변경 ○ 여성 건강 및 질환과 관련된 요인과 모자보건 영역 지표 산출을 위해 추가
<영양부문>		
조사표 통합	○ 영유아식생활조사표의 조사 항목을 식생활조사표로 옮겨 1개 조사표로 통합	○ 조사표 관리상의 편리 고려
식생활 행태	○ 결식 및 조제분유 공급 사유, 이유보충식 공급방법 문항 등 삭제	○ '05년 이래 결과가 유사하고 일부 보기로 응답 편향
	○ 간식섭취빈도 문항 삭제	○ 식품섭취조사 자료로부터 산출 가능
	○ 외식섭취빈도 '주1~6회' 응답보기 세분화 ※주1~2회, 주3~4회, 주5~6회	○ '07, '08년 결과, '주1~6회' 응답자 분율 증가
식이보충제	○ 최근 1년간 비타민/무기질제 복용경험 및 최근 1년간 건강기능식품 복용경험 등 2개 문항을 1개 문항으로 통합	○ 식이보충제의 복용경험을 조사하기 위한 문항이나 비타민/무기질제, 건강기능식품 간 구분 모호, 이외의 식이보충제 존재
	○ 최근 1개월 내 식이보충제 복용경험 문항 추가	○ 미국, 캐나다 등 국제 비교 가능하도록 준거기간 통일
	○ 식이보충제 복용동기 문항 삭제	○ 일부 보기로 응답 편향
	○ 식이보충제 복용 현황 상세 문항 식품섭취조사에 포함하여 조사하는 것으로 이동	○ 조사결과의 정확도 제고를 위해 조사1일 전 섭취내용에 한해 조사
식생활 지침	○ 문항 삭제	○ 대상자의 주관적 판단이 크게 개입하여 결과의 신뢰성 저하
출생 정보	○ 출생 시 신장, 예정일과의 차이, 분만방법 문항 삭제	○ 일부 보기로 응답 편향 ○ 출생 시 신장을 기억하지 못하는 대상자(보호자)가 다수
영아기 영양제	○ 영아기 영양제 종류 문항 응답보기 조정(10개 문항 → 7개 문항) ※'감마리놀렌산', '해양조류오일', '기타' 삭제	○ 응답 건수 미흡
<검진조사>		
혈액검사 – 빈혈검사	○ 철, 철결합능 항목 추가	○ 빈혈의 분류에 필요한 근거 지표 필요 ○ 철 결핍상태를 판정하는데 유용한 트랜스페린 포화도 산출을 위해 혈중 철 및 철결합능 농도 필요 ※트랜스페린포화율=[철(umol/L)/철결합능(umol/L)]X100%
혈액검사 – 간기능검사	○ 감마지티피 항목 추가	○ 간질환, 특히 알코올성간질환 여부 감별
혈액검사 – 중금속검사	○ 아연 항목 추가 ○ 망간, 비소 항목 삭제	○ 아연은 섭취부족 가능성이 높을 것으로 추정되나 영양성분DB 미비로 섭취량 산출이 불가하므로, 혈청 아연을 통해 아연 영양상태를 간접적으로 판정 ○ 망간, 비소는 참고치 제시가 주목적이므로 누적된 자료(2007-2009)만으로 활용 가능
혈액검사 – 알레르기검사	○ 총IgE, 특이IgE(집먼지진드기(미국형), 바퀴, 개털) 항목 추가	○ 참고치 제시를 위해 알레르기검사 항목 추가

Ⅱ. 자료분석

가중치

본 통계집의 모든 결과는 국민건강영양조사의 표본이 우리나라 국민을 대표하도록 가중치를 사용하여 산출하였다. 즉, 관심변수(x)의 모집단 추정치($\hat{X}$) 산출시 i번째 조사 참여자(가구)의 관심변수값 x_i에 모집단에 대한 표본의 대표성을 부여해주는 가중치 w_i를 반영하여 다음과 같이 가중표본평균으로 계산하였다.

$$\hat{X} = \sum_i w_i x_i / \sum_i w_i$$

가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하고, 가구가중치는 조사 참여가구가 우리나라 전체 가구를, 개인가중치는 조사 참여개인이 우리나라 전체 인구를 대표할 수 있도록 부여하였다.

제5기 1차년도(2010) 기본 가중치는 가구조사 가중치, 건강설문조사와 검진조사를 통합하여 산출한 건강설문・검진가중치, 영양조사 가중치로 구성하였다(표Ⅳ). 제1~3기(1998, 2001, 2005)에는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사, 검진조사, 식품섭취조사, 식품섭취빈도조사, 식생활조사, 영아기식생활조사에 대해 각각 기본 가중치를 산출하였고, 제4기(2007-2009)에는 건강면접조사와 건강행태조사를 통합하여 건강설문조사 가중치, 검진조사 가중치, 식품섭취조사・식품섭취빈도조사・식생활조사를 통합하여 영양조사 가중치로 기본 가중치를 구성하였다.

제4기(2007-2009) 중금속검사는 만20세이상 표본 중 일부(연간 2,000명)를 선정하여 조사하였고, 폐기능검사는 만19세이상 전체에 대해 조사하였으나 검사결과의 판독불능 비율이 높아 각각 별도의 가중치를 부여한 바 있다. 제5기 1차년도(2010) 조사부터 중금속검사와 폐기능검사 대상자의 연령대가 각각 만10세이상, 만40세이상으로 조정됨에 따라, 중금속검사 가중치와 폐기능검사 가중치에 해당 조정사항을 반영하였다.

제4기 2차년도(2008) 7월부터 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사, 제4기 3차년도(2009) 8월부터 골관절염검사를 신규 도입하였고, 이들 추가항목에 대한 하반기 검진조사 가중치를 별도 산출하였다. 또한 제4기 3차년도(2009)에는 총200개 조사구 중 199개 조사구에서 조사 완료된 체지방검사 및 50개 조사구에서 실시한 식품섭취조사 추가조사 가중치도 별도로 구성한 바 있다.

제5기 1차년도(2010) 가중치는 표본 추출률을 반영한 설계가중치 계산, 무응답률 조정, 사후층화, 극단가중치 처리 단계를 거쳐 최종 산출되었다.

모집단 조사구로부터 총 192개 표본 조사구를 추출하고 추출된 조사구내 적절가구로부터 20개 표본 가구를 추출한 후, 추출된 가구에서 부적절가구원(만1세미만, 타지역거주 등)을 제외한 모든 가구원을 조사대상으로 선정하였다. 따라서 추출률은 조사구 추출률과 가구 추출률의 곱으로 나타낼 수 있으며, 추출률의 역수를 가중치에 반영함으로써 추출편향이 보정된 모수추정이 가능하도록 하였다.

$$\text{설계가중치 (추출률 역수)} = \frac{\text{모집단 조사구수}}{\text{표본 조사구수}} \times \frac{\text{조사구내 적절가구수}}{\text{표본 가구수}}$$

응답률은 가구 응답률과 개인 응답률로 구분하고, 가구 응답률은 표본조사구내 적절가구 중 조사에 참여한 가구의 비율로, 개인 응답률은 표본가구내 적절가구원 중 조사에 참여한 가구원의 비율로 정의된다. 응답률의 역수를 가중치에 반영함으로써 무응답 편향을 보정하였다.

$$\text{무응답조정가중치 (응답률 역수)} = \frac{\text{조사대상 가구수}}{\text{참여 가구수}} \times \frac{\text{조사대상 가구원수}}{\text{참여 가구원수}}$$

따라서 추출률 및 응답률을 고려한 가중치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{기본 가중치} = \text{추출률 역수} \times \text{응답률 역수}$$

기본 가중치는 2010년 우리나라 전체 인구수 및 가구수에 따라 사후보정 하였다. 가구가중치는 조사 참여가구의 가중치 합이 우리나라 전체 가구수와 같도록, 건강설문・검진조사, 영양조사 등의 부문별 개인가중치는 조사 참여자수의 가중치 합이 우리나라 전체 인구수와 같도록 보정하였다. 가중치 보정 기준은 2010년 시도별, 성별, 5세단위 연령대별 추계인구수 또는 시도별 추계가구수를 사용하였다. 단, 해당 가중치의 조사 완료자수를 16개 시도별, 성별, 연령별로 구분했을 때 완료자수가 매우 적은 경우에는 16개 시도를 9개 통합시도(서울, 부산, 대구, 인천, 경기, 강원・경북, 대전・충청, 광주・전라・제주, 경남・울산)로 재분류하고, 연령도 5세 간격(1-4, 5-9, …, 70-74, 75+) 16개 연령대에서 70세이상을 통합한 15개 연령대 또는 전체 통합 연령으로 재분류한 층별로 가중치를 보정하였다.

$$\text{사후보정가중치} = \text{기본 가중치} \times \frac{\text{시도・성별・연령별 추계인구수}}{\text{시도・성별・연령별 가중치 합}}$$

가중치 사후보정 후 극단가중치 검토를 위해 해당 가중치의 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 사분위수범위(IQR=Q3-Q1) 값을 이용하여(Q1-2×IQR, Q3+2×IQR) 범위를 벗어나는 값이 존재하는 경우 극단가중치로 분류하고, 극단가중치를 상한(Q3+2×IQR) 또는 하한(Q1-2×IQR) 값으로 대체하는 가중치 절사를 실시하였다.

극단가중치 절사 후에는 가중치 합이 우리나라 전체 인구(가구)수가 되도록 가중치를 다시 사후보정하여 최종가중치를 산출하였다.

통합가중치

제4기(2007-2009) 순환표본조사방법 도입 이후, 제5기(2010-2012)에도 이를 유지하여 표본설계함에 따라 각 기수 내 3개년도가 동일한 특성을 갖는 표본을 추출함으로써 매년 전국통계, 2~3년주기 시도통계를 산출할 수 있도록 하였다. 세부집단별 분석을 위한 표본수 확보를 위해 기수(제4기, 제5기)와 상관없이 연도별 자료를 통합하여 분석할 수 있는데, 이 경우 조사대상기간(2007년 7~12월, 2008~2010년)이 각 연도를 대표한다고 간주하고, 통합가중치를 산출하여 적용하였다. 그러나 2007년은 하반기(7월~12월)만 조사한 점을 고려하여 2007년과 다른 연도와의 자료통합 시 통합가중치 반영비율을 1/2로 적용하고, 다른 연도는 1로 적용하였다. 즉, 2007년에서 2010년 자료통합 시 2007, 2008, 2009, 2010년의 통합반영 비율은 각각 1/2, 1, 1, 1을 적용하여 통합가중치를 산출하였다.

통합예시	통합가중치 산출
제4기(2007-2009) 통합	'07년 : $w_{07-09} = w_{07} \times 1/5$
	'08년 : $w_{07-09} = w_{08} \times 2/5$
	'09년 : $w_{07-09} = w_{09} \times 2/5$
제4기(2007-2009)~제5기1차년도(2010) 통합	'07년 : $w_{07-10} = w_{07} \times 1/7$
	'08년 : $w_{07-10} = w_{08} \times 2/7$
	'09년 : $w_{07-10} = w_{09} \times 2/7$
	'10년 : $w_{07-10} = w_{10} \times 2/7$
제4기(2008-2009)~제5기1차년도(2010) 통합	'08년 : $w_{08-10} = w_{08} \times 1/3$
	'09년 : $w_{08-10} = w_{09} \times 1/3$
	'10년 : $w_{08-10} = w_{10} \times 1/3$

여기서 w_{07}, w_{08}, w_{09}, w_{10}은 해당 조사연도 가중치, w_{07-09}, w_{07-10}, w_{08-10}는 각각 2007~2009년, 2007~2010년, 2008~2010년 통합 가중치이다.

본 통계집에서는 고혈압, 당뇨병의 관리지표, 영유아기 수유 및 이유식 섭취현황의 경우 2010년 자료수가 적어서 2008년에서 2010년의 3개년도 자료를 통합하여 결과를 산출하였다.

표 IV. 분야별 가중치 분포

가중치		가중치변수	대상(명)	모집단(명)	평균	표준편차	최소값	최대값
제4기 1차년도 (2007)	가구	wt_hs	1,739(가구)	16,417,423(가구)	9,441	4,157	1,886	21,799
	건강설문조사	wt_itv	4,148	48,007,342	11,574	7,922	1,155	39,215
	영양조사	wt_ntr	4,099	48,007,342	11,712	8,015	1,157	40,413
	검진조사	wt_ex	4,246	48,007,342	11,306	7,642	1,091	38,339
	폐기능검사	wt_pft	1,597	37,135,589	23,253	19,497	1,514	98,759
제4기 2차년도 (2008)	가구	wt_hs	3,689(가구)	16,673,162(가구)	4,520	1,743	1,470	11,147
	건강설문조사	wt_itv	9,281	48,160,049	5,189	3,197	721	25,730
	영양조사	wt_ntr	8,641	48,160,049	5,573	3,838	656	32,164
	검진조사	wt_ex	9,307	48,160,049	5,175	3,176	691	25,851
	검진조사 하반기신규도입[1]	wt_ex1	5,040	48,160,049	9,556	5,814	1,579	28,312
	폐기능검사	wt_pft	3,435	37,486,893	10,913	9,030	915	45,206
	중금속검사	wt_hm	2,005	36,872,028	18,390	10,125	2,570	54,648
제4기 3차년도 (2009)	가구	wt_hs	3,975(가구)	16,916,966(가구)	4,271	1,483	446	9,188
	건강설문조사	wt_itv	10,051	48,303,676	4,806	2,734	237	19,191
	영양조사	wt_ntr	9,397	48,303,676	5,140	3,222	248	28,228
	식품섭취조사 추가조사	wt_ntr_add	2,029	48,303,676	23,807	18,433	1,948	95,580
	검진조사	wt_ex	10,078	48,303,676	4,793	2,725	241	19,191
	검진조사 하반기신규도입[2]	wt_ex1	2,866	37,844,232	13,205	9,173	1,578	43,693
	체지방검사[3]	wt_dw	7,739	43,838,503	5,665	3,719	247	28,787
	폐기능검사	wt_pft	4,419	37,844,232	8,564	7,014	475	38,086
	중금속검사	wt_hm	1,991	37,215,961	18,692	10,522	931	53,801
제5기 1차년도 (2010)	가구	wt_hs	3,278(가구)	17,152,277(가구)	5,233	3,161	409	14,854
	건강설문・검진조사	wt_itvex	8,473	48,436,370	5,717	4,308	164	33,018
	영양조사	wt_ntr	8,027	48,436,370	6,034	4,672	192	32,113
	폐기능검사	wt_pft	2,855	22,632,896	7,927	5,867	320	29,100
	중금속검사	wt_hm	2,355	44,155,776	18,750	14,676	567	88,238

1) 2008년 7월에 도입된 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사의 가중치
2) 2009년 8월에 도입된 골관절염검사의 가중치
3) 체지방검사 가중치(199개 조사구)

무응답 처리

무응답은 개체무응답(조사 미참여로 모든 문항값 결측)과 항목무응답(조사참여자이나 일부 문항값 결측)으로 구분되는데, 개체무응답은 가중치 산출시 보정하였고 항목무응답은 검토결과 무응답률이 낮아 대체하지 않았다. 각 부문별로 무응답률이 높은 문항을 검토하였으며(표Ⅴ), 대부분 지표에서 무응답률이 2~3%내외였으나 65세이상 대상자에서 채혈거부가 많아서 혈액검사의 무응답률이 증가하였다.

표 Ⅴ. 조사부문별 무응답률

조사부문		조사 항목	무응답률(%)			
			'07	'08	'09	'10
건강설문조사[1]	흡연	흡연시작연령	3.54	0.67	0.19	0.30
		직장실내 간접흡연 노출	5.10	1.39	0.41	0.27
	음주	음주시작연령	5.13	0.90	0.03	0.38
		1년간 음주운전- 오토바이	0.50	0.12	0.40	0.24
	신체활동	격렬한신체활동 시간	3.61	0.89	0.00	0.35
		걷기 시간	2.74	0.40	0.02	0.40
	정신건강	하루수면시간	3.79	0.10	0.41	0.30
		자살생각여부	0.34	0.12	0.44	0.32
	삶의 질	1달간 결근결석여부	0.80	0.25	0.53	0.41
	이환	1년간 숨쉴때 가슴에서 소리여부	1.34	0.47	0.57	0.29
	손상	지난1년간 손상발생 여부	0.13	0.25	0.53	0.37
	의료이용	병의원 미검진 여부	0.13	0.22	0.52	0.33
	가구조사	가구총소득(개인단위)	4.66	3.11	1.12	1.42
	교육 및 경제활동	교육수준	0.17	0.26	0.04	0.41
		직업분류	1.35	0.12	0.07	0.41
검진조사	신체계측	신장, 체중	0.78	0.77	0.34	0.78
		허리둘레	0.80	1.02	0.33	1.35
	혈압	혈압	0.53	0.09	0.20	0.41
	구강검사	치아우식, 자연치아, 보철물	4.12	2.20	1.58	2.23
		치주질환	8.56	2.50	1.65	2.29
	임상검사	헤모글로빈, 헤마토크릿	3.54	5.05	6.41	8.17
		혈당	3.20	4.68	6.04	7.72
		지질, 크레아티닌	3.14	4.27	5.79	7.14
	안검사		-	0.74	0.41	0.97
	이비인후검사		-	1.73	0.13	1.89
	골밀도 및 체지방검사		-	3.14	3.36	4.44
영양조사	식품섭취 빈도조사	보리/잡곡	0.12	0.04	0.05	0.04
		토마토	0.12	0.07	0.04	0.04
	식생활조사	비타민 및 무기질제 섭취경험	2.27	1.84	1.56	0.00
	영유아 식생활조사	출생시 체중	0.00	0.53	0.50	1.17
		일반우유 시작시기	1.64	0.80	0.50	0.09

1) 건강설문 무응답률 : 성인(만19세이상) 기준

연령표준화

사회경제적위치지표별 또는 연도별 결과 비교시 연령구조의 차이를 보정하기 위해 직접표준화법으로 계산된 연령표준화방법을 사용하였다. 연령표준화율은 연령별 유병률(평균)에 연령별 표준인구 비율을 곱하여 계산된 표준인구가중 유병률로, 본 통계집에서는 2005년 추계인구를 표준인구로 사용하였으며, 연령은 1~9세, 10~18세, 19~29세, 30~39세, …, 60~69세, 70세 이상으로 구분하였다(표Ⅵ). 단 일부지표에서 시작연령이 해당구분과 다르고 해당구간의 연령이 5세미만인 경우에는 다음 연령구분과 통합하여 연령표준화율을 산출하였다. 예를 들어 6세이상의 유병률 산출시 6-9세를 10-18세와 통합하여 6-18세 유병률과 해당 표준인구비율을 반영하여 연령표준화하였다.

연령표준화율

$$= \sum_{k=1}^{K} \text{연령별 유병률} \times \text{연령별 표준인구비율}$$

$$= \sum_{k=1}^{K} \frac{\text{연령별 유병률} \times \text{연령별 표준인구}}{\text{표준인구 합}}$$

표 Ⅵ. 2005년 추계인구

연령(세)	인구수	인구비율
계	47,684,299	1.000
01-09	5,324,577	0.112
10-18	5,950,569	0.125
19-29	8,235,399	0.173
30-39	8,534,411	0.179
40-49	8,208,764	0.172
50-59	5,137,425	0.108
60-69	3,609,022	0.076
70이상	2,684,132	0.056

본 통계집에서는 연도별, 거주지역 및 소득수준별 비교를 위해 조율과 함께 연령표준화율을 제시하였다. 세부집단의 연령대별 자료수가 20미만인 경우에는 연령별 결과의 신뢰성이

낮을 수 있으므로 연령표준화율을 제시하지 않았다. 특히 지표의 분모가 전체가 아닌 해당자인 경우에는 해당 자료수가 적어 연령표준화율을 제시하지 않았다. 예를 들어 음주운전경험률에서는 70세이상의 여자 운전자수가 20명 미만으로 여자의 음주운전경험률 연령표준화결과를 제시하지 않았다.

당해연도 또는 해당집단의 현황을 파악하기 위해서는 조율을 이용할 수 있으나 연도별 또는 집단간 비교시 연령구조의 차이를 보정하여 비교하기 위해서는 연령표준화 결과를 이용하기를 권고하고 있다. 단 자료수 부족으로 연령표준화 결과가 없는 경우에는 집단간 비교시 조율을 사용하여 연령이 보정되지 않은 현황으로 제시하였다.

유의사항

식품 및 영양소 섭취현황

식품 및 영양소 섭취 수준은 개인별 24시간 회상법을 이용하여 조사한 결과이며, 대상자가 조사 전 하루 동안 섭취한 모든 음식의 종류와 양, 가정에서 조리한 음식의 레시피를 조사하여 산출하였다. 가정에서 조리한 음식이라도 레시피 조사가 불가한 경우 가정식 대체 레시피 데이터베이스(DB)를 활용하여 자료처리하고 음식업소 음식, 혹은 직장, 학교 등의 단체급식의 경우에는 이에 따른 레시피 DB를 사용하였다.[1)] 또한 부피로 조사한 섭취량은 중량정보로 환산하기 위해 눈대중량 DB를 사용하였다. 국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 식품섭취조사 자료처리에 사용된 DB는 표Ⅶ과 같다.

식품섭취조사용 DB는 우리나라의 식생활 변화, 식품유통현황 등을 반영할 수 있도록 현 상태에서 확보 가능한 최신의 자료를 활용하도록 하고 있다. 질병관리본부에서는 2010년부터 기초영양DB 구축을 위한 외식레시피 및 관련 자료 조사사업을 실시하고 있으며, 이와 관련하여 음식 레시피 DB 갱신 작업을 진행 중이다. 제5기 2차년도(2011) 이후 조사 자료는 갱신 DB를 이용하여 처리할 예정이며, 제5기(2010-2012) 3개년 자료의 통합 활용 가능성과 시계열적 비교를 위해서 제5기 3차년도(2012) 자료처리 시점에 맞춰 제5기 1, 2차년도(2010, 2011) 자료의 식품 및 영양소 섭취량을 재산출할 계획이다.

표 Ⅶ. 식품섭취조사 자료처리용 DB 현황

DB 종류	내용	구축 시기	비고
부피/중량 환산 DB	'00년[1)], '07년[2)] 구축자료를 기반으로 통합 DB 구축	2009.5.	제4기 3차년도(2009) 자료부터 적용
음식 레시피 DB	'00년[1)] 구축 자료에 '06년 학교급식[3)] 등 일부 추가 주요재료, 양념 위주의 내부 수정 보완	2009.2.	제4기 2차년도(2008) 자료부터 적용
영양성분 DB	식품성분표 제7개정판[4)] '00년[1)] 가공식품, 패스트푸드 등에 대한 성분표 추가 활용	2007.8.	제4기 1차년도(2007) 자료부터 적용

영양소 섭취량 산출 DB

에너지 및 영양소 섭취량은 농촌자원개발연구소에서 발행하는 식품성분표[4]에 포함된 항목, 에너지와 총 15종의 영양소를 기준으로 한 것이며, 일부 식품에 한해서만 함량 정보를 구할 수 있는 항목(예 : 식이섬유소 등)은 실제 섭취량에 비해 낮게 산출될 가능성이 있어 산출 항목에서 제외하였다. 일부 가공식품 및 수입식품에 대해서는 한국보건산업진흥원에서 구축한 DB[1]를 활용하였다. 본 보고서에서 산출하고 있는 섬유소 값은 조섬유로서, 식이섬유 섭취량을 산출하기에는 DB가 충분치 않아 보완적으로나마 조섬유 값을 제시하였다.

영양섭취기준

영양섭취수준을 비교하는 기준 자료로는 2010년에 개정된 한국인 영양섭취기준을 사용하였다.[5] 에너지는 필요추정량을, 대부분의 영양소는 권장섭취량을 활용하였으며, 권장섭취량이 미비한 영양소(나트륨, 칼륨)는 충분섭취량을 활용하였다. 본 조사 자료는 개인별 1일의 섭취내용만을 조사한 결과로서 일상섭취수준이 아니므로 개인의 평가자료로는 부족하나 문제 영양소, 혹은 영양위험집단을 추정하기 위해서 섭취부족분율, 섭취과잉분율 등을 산출하였다. 섭취부족분율을 가늠하는 기준으로 평균필요량을 사용하였으며, 에너지의 경우 필요추정량의 75%값을 사용하였다. 섭취과잉분율은 상한섭취량을 기준으로 산출하였으며 에너지는 필요추정량의 125%를, 나트륨은 목표섭취량인 2,000mg를 기준으로 사용하였다.

혈압조사

이동검진차량이 도입된 제4기 2차년도(2008) 7월부터 2010년까지 혈압측정치에 대해 현장 질관리 자료를 검토한 결과 남자에서 1~5cm, 여자에서 1~3cm의 팔높이 오차가 발견되었다.

미국심장협회(1967)[6]에 따르면 혈압 측정시의 팔높이가 심장높이보다 높거나 낮았을 경우, 측정치에서 심장 높이를 기준으로 수축기와 이완기혈압 모두 1cm당 0.7mmHg를 더하거나 빼줄 것을 권고하였다. 이에 따라 대한고혈압학회 및 조정자문위원회의 검토를 거쳐 심장높이에 해당하는 평균 팔높이(남자 83cm, 여자 81cm)를 근거로 2008년 7월 이후의 자료를 보정하여 고혈압 유병률을 산출하였다(2011년 혈압조사에서 4cm 높이의 팔받침을 사용하여 대상자 팔높이를 심장높이에 맞추었으며, 팔받침을 이용하여 관측한 평균 팔높이는 남자 83cm, 여자 81cm이었다). 그러나 2008년~2010년 보정혈압치는 2011년에 관측된 남녀의 평균 심장높이(팔높이)를 기준으로 일괄 보정한 자료임을 고려하여 연구자가 연구목적에 따라 보정혈압치 또는 측정혈압치를 선택하여 활용할 것을 권고한다.

향후 혈압측정에 대한 질관리를 더욱 강화하여 혈압측정조사원 인증제를 도입하고 혈압측정환경 및 측정자세(팔자세)에 대한 표준화를 지속적으로 수행할 계획이다.

임상검사(HDL콜레스테롤)

2009년부터 미국 질병통제센터(CDC)에서 운영중인 지질 표준화 프로그램(Lipid Standardization Program)에 참여하고 있으며, 여기서 도출된 HDL 전환식[(원자료 × 0.86)+ 2.98]을 적용하여

보정된 값으로 저HDL콜레스테롤 유병률을 산출하고 있다.

2010년에는 질관리용 보관 검체를 재분석(2009년 검체, n=800)하여 재현성을 평가하는 이중검사를 실시하였고, 그 결과 평균 2.2 mg/dL 증가되었으나 NCEP(National Cholesterol Education Program) 지침 기준에 따른 허용오차(allowable bias) 5% 이내(계산값 차이에 대한 95% 신뢰구간 : 2.0~2.4)를 만족하여 연도간 유의한 값의 차이가 없는 것으로 판단, 기 산출한 전환식을 적용하여 저HDL콜레스테롤 유병률을 산출하였다.

향후 전환식 미적용을 위해 지질 표준화 프로그램에 지속적으로 참여하고, 질병관리본부에서 구축중인 표준검사실과 연계하여 임상검사 표준화를 수행할 계획이다.

구강검사

치주조직상태 검사의 조사자 측정압에 따른 치주낭 측정 깊이의 오차를 줄이기 위해 2010년 5월 구강검사 전문조사원(공중보건치과의) 교육훈련 시 치주탐침가압훈련을 실시하였다. 치주낭 안으로 치주탐침 삽입이 가능한 구강모형과 전자저울을 이용하여 치주탐침 적정압력 20g 내외 수준을 유지하도록 교육하였고, 조사자의 적정 치주탐침 압력 수준을 확보하였다.

치주탐침가압훈련 실시 전후의 결과 비교 시 치주질환 유병률 산출에 영향을 미치는 치주낭 측정압의 차이가 있었다. 이에 따라 제4기(2007-2009)와 제5기(2010-2012) 조사의 치주질환 유병 비교 시에는 이를 고려할 필요가 있다.

골관절염조사

골관절염조사는 제4기 3차년도(2009) 8월부터 디지털 X선 촬영기를 이용한 영상촬영(만 50세이상) 및 설문조사(2009년 만19세이상, 2010년 만40세이상)로 수행되고 있다.

제4기 3차년도(2009) 골관절염 설문은「지난 30일 동안 (무릎, 엉덩)관절 통증이 있었습니까?」로 이루어졌으나, 일시적인 관절통과 구분하기 위해 제5기(2010-2012)에는 「최근 3개월 동안 30일이상 (무릎, 엉덩)관절통이 있었습니까?」로 문구가 변경되었다.

본 통계집의 골관절염 유병률은 관절영상의 Kellgren Lawrence 등급이 2이상[7-9]이고 설문조사에서 관절통증이 있었다고 응답한 대상자의 분율로 산출하고 있으므로, 제4기 3차년도(2009)와 제5기(2010-2012)조사의 골관절염 유병 비교 시에는 설문 문구 변경에 따른 응답률의 변화를 고려하여 해석하여야 한다.

참고문헌

1. 보건복지부. 식품별 영양성분 분석자료의 데이터베이스 추가구축사업 결과보고서. 2000.
2. 보건복지부, 한국보건산업진흥원. 식품별 영양성분 DB 구축사업 눈대중량의 부피 및 중량 환산 DB 자료집. 2007.
3. 보건복지부, 한국보건산업진흥원. 식품별 영양성분 DB 구축사업 단체급식 레시피. 2006.
4. 농촌자원개발연구소. 식품성분표 제7개정판. 2006.
5. 한국영양학회. 한국인 영양섭취기준 개정판. 2010.
6. Kirkendall WM et al. Report of a subcommittee of the postgraduate education committee, American Heart Association : Recommendations for Human Blood Pressure Determination by Sphygmomanometers. Circulation. 1967;36:980-988.
7. Altman R et al. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis : classification osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1986;29:1039-1049.
8. Toivanen AT et al. Agreement between clinical and radiological methods of diagnosing knee osteoarthritis. Sand J Rheumatol 2007;36:58-63.
9. Theis KA et al. Arthritis burden and impact are greater among US women than men : intervention opportunities. J Women Health 2007;16:441-453.

Ⅲ. 참여현황

참여율

제5기 1차년도(2010)에는 조사대상자 10,938명, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개이상 참여자는 8,958명, 전체조사 참여율은 81.9%로, 제4기(2007-2009) 전체참여율 78.4%보다는 3.5%p 상승하였으나 제4기 3차년도(2009) 82.8%보다는 0.9%p 감소하였다. 시도별로는 강원도가 92.8%로 가장 높고 광주가 75.5%로 가장 낮았다(표Ⅷ).

검진 및 건강설문조사의 경우 대상자 10,938명, 참여자 8,473명으로 참여율은 77.5%였다.

영양조사는 이동검진센터 조사완료 1주일 후 가정방문을 통해 조사하며 검진 및 건강설문조사에 가구원 중 1인이상 참여한 가구에 한하여 해당 가구원 전체를 대상으로 하므로, 검진 및 건강설문조사에 비해 참여율이 상대적으로 높은 82.8%로 나타났다(표Ⅷ).

표본가구 및 인구 특성

제5기 1차년도(2010)는 192개 조사구에 대해 조사완료하여, 제4기(2007-2009) 각 연도 200개 조사구 대비 표본규모가 일부 감소하였으나 표본오차 변동은 매우 작았다. 표본규모 감소는 전문조사수행팀 교육 확대 및 이동검진차량, 검사장비의 유지·보수 등 원활한 연중조사 수행을 위해 조사기간이 연간 50주에서 48주로 단축된 데에 따른 것이다.

표 Ⅷ. 제5기 1차년도(2010) 참여율

(단위 : 명, %)

구분	전체			검진 및 건강설문조사			영양조사		
	대상자	참여자	참여율[1]	대상자	참여자	참여율	대상자[2]	참여자	참여율
전국	10,938	8,958	81.9	10,938	8,473	77.5	9,691	8,027	82.8
시도별									
서울	2,303	1,800	78.2	2,303	1,705	74.0	1,971	1,588	80.6
부산	707	542	76.7	707	482	68.2	616	475	77.1
대구	525	437	83.2	525	408	77.7	468	395	84.4
인천	633	495	78.2	633	483	76.3	547	432	79.0
광주	326	246	75.5	326	234	71.8	269	219	81.4
대전	358	287	80.2	358	277	77.4	309	270	87.4
울산	265	208	78.5	265	198	74.7	226	176	77.9
경기	2,490	2,089	83.9	2,490	2,003	80.4	2,257	1,849	81.9
강원	291	270	92.8	291	257	88.3	282	242	85.8
충북	294	250	85.0	294	236	80.3	276	239	86.6
충남	468	392	83.8	468	368	78.6	421	349	82.9
전북	416	360	86.5	416	328	78.8	379	343	90.5
전남	393	337	85.8	393	321	81.7	355	312	87.9
경북	612	533	87.1	612	518	84.6	562	500	89.0
경남	640	516	80.6	640	475	74.2	549	463	84.3
제주	217	196	90.3	217	180	82.9	204	175	85.8

1) 전체조사 참여율 : 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개이상 참여한 분율
2) 영양조사 대상자 : 검진조사 또는 건강설문조사에 1인이상 참여한 가구의 가구원 전체

제5기 1차년도(2010) 표본가구는 3,278가구로 가구당 평균가구원수는 3.0명으로 이전과 차이가 없으나 월평균가구소득은 358.1만원, 기초생활수급 가구분율은 3.9%로 이전에 비해 가구생활수준이 높은 경향을 보였다(표IX).

표본인구는 8,958명이며 남자 4,115명(45.9%), 여자 4,843명(54.1%)으로 여자 비율이 8.2%p 더 높았다. 연령별로는 30대 1,342명(15.0%), 40대 1,279명(14.3%), 50대 1,245명(13.9%) 순으로 많은 분포를 보였다. 거주지역별로는 동지역 7,139명(79.7%), 읍면지역 1,819명(20.3%)으로 동지역 거주비율이 높았다.

만30세이상 대상자에 대한 결혼상태별 분포는 유배우 기혼자 81.6%, 사별·이혼·별거 기혼자 13.8%, 미혼자 4.7% 순이었고, 교육수준별 분포는 고졸 30.6%, 초졸이하 29.1%, 대졸이상 28.1%, 중졸 12.2% 순으로, 제4기(2007-2009)에 비해 상대적으로 초졸이하 분율이 낮고 대졸이상 분율이 높은 경향을 보였다. 건강보험종류는 직장(사업장) 가입률(62.9%)이 가장 높고 다음으로 지역 가입률(34.0%)이 높았으며, 의료급여 1종(1.7%) 및 의료급여 2종(1.3%) 분율은 큰 차이가 없었다(표X).

표 IX. 제5기 1차년도(2010) 표본가구[1] 특성

(단위 : 가구, %)

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005)	제4기(2007-2009)	제5기 1차년도(2010)
총가구수	12,191 (100.0)	12,209 (100.0)	12,001 (100.0)	9,421 (100.0)	3,278 (100.0)
거주지역					
동	7,807 (64.0)	9,498 (77.8)	9,591 (79.9)	6,906 (73.3)	2,552 (77.9)
읍면	4,384 (36.0)	2,711 (22.2)	2,410 (20.1)	2,515 (26.7)	726 (22.2)
주택유형					
일반	- -	7,547 (61.8)	7,430 (61.9)	5,673 (60.2)	1,829 (55.8)
아파트	- -	4,662 (38.2)	4,571 (38.1)	3,748 (39.8)	1,449 (44.2)
가구원수(명)					
1명	1,576 (12.9)	1,779 (14.6)	2,177 (18.1)	1,290 (13.8)	393 (14.2)
2명	2,532 (20.8)	2,519 (20.7)	3,064 (25.5)	2,426 (25.9)	922 (29.8)
3명	2,557 (21.0)	2,590 (21.3)	2,628 (21.9)	2,040 (21.8)	706 (20.8)
4명	3,640 (29.9)	3,799 (31.2)	3,028 (25.2)	2,461 (26.3)	872 (23.7)
5명	1,298 (10.6)	1,102 (9.0)	825 (6.9)	817 (8.7)	285 (8.3)
6명	410 (3.4)	302 (2.5)	208 (1.7)	229 (2.4)	82 (2.5)
7명+	178 (1.5)	88 (0.7)	71 (0.6)	98 (1.0)	16 (0.6)
(평균, 명)	3.2 -	3.1 -	2.8 -	3.0 -	3.0
가구소득(만원)					
100만원이하	6,907 (56.7)	4,269 (37.1)	3,799 (32.1)	3,069 (33.7)	733 (22.7)
100만원초과~200만원이하	3,907 (32.0)	4,531 (39.3)	3,443 (29.1)	1,946 (21.4)	574 (17.8)
200만원초과~300만원이하	995 (8.2)	1,833 (15.9)	2,436 (20.6)	1,682 (18.5)	612 (19.0)
300만원초과	382 (3.1)	882 (7.7)	2,172 (18.3)	2,414 (26.5)	1,310 (40.6)
(평균, 만원)	121.5 -	167.2 -	209.8 -	256.6 -	358.1 -
기초생활수급					
현재수급	- -	- -	- -	530 (5.7)	127 (3.9)
과거수급	- -	- -	- -	297 (3.2)	90 (2.8)
비수급	- -	- -	- -	8,526 (91.2)	3,056 (93.4)

1) 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개 조사 이상 참여한 가구 기준

표 X. 제5기 1차년도(2010) 표본인구[1] 특성

(단위 : 명, %)

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005)	제4기(2007-2009)	제5기 1차년도(2010)
만1세이상	38,551 (100.0)	37,434 (100.0)	33,805 (100.0)	24,871 (100.0)	8,958 (100.0)
성별					
남자	18,770 (48.7)	18,241 (48.7)	16,167 (47.8)	11,310 (45.5)	4,115 (45.9)
여자	19,781 (51.3)	19,193 (51.3)	17,638 (52.2)	13,561 (54.5)	4,843 (54.1)
연령(세)					
1-9	5,178 (13.4)	5,079 (13.6)	3,943 (11.7)	3,297 (13.3)	1,142 (12.8)
10-18	5,628 (14.6)	4,955 (13.2)	4,375 (12.9)	3,168 (12.7)	1,076 (12.0)
19-29	6,138 (15.9)	5,791 (15.5)	4,641 (13.7)	2,500 (10.1)	846 (9.4)
30-39	6,808 (17.7)	6,673 (17.8)	5,582 (16.5)	3,748 (15.1)	1,342 (15.0)
40-49	5,549 (14.4)	6,243 (16.7)	5,868 (17.4)	3,616 (14.5)	1,279 (14.3)
50-59	4,017 (10.4)	3,728 (10.0)	3,975 (11.8)	3,052 (12.3)	1,245 (13.9)
60-69	3,212 (8.3)	3,032 (8.1)	3,217 (9.5)	2,897 (11.6)	1,081 (12.1)
70+	2,021 (5.2)	1,933 (5.2)	2,204 (6.5)	2,593 (10.4)	947 (10.6)
거주지역					
동	25,511 (66.2)	30,105 (80.4)	27,621 (81.7)	18,858 (75.8)	7,139 (79.7)
읍면	13,040 (33.8)	7,329 (19.6)	6,184 (18.3)	6,013 (24.2)	1,819 (20.3)
주택유형					
일반	- -	21,995 (58.8)	19,679 (58.2)	13,862 (55.7)	4,483 (50.0)
아파트	- -	15,439 (41.2)	14,126 (41.8)	11,009 (44.3)	4,475 (50.0)
결혼상태(만30세이상)[2]					
미혼	782 (3.6)	1,056 (4.9)	1,278 (6.1)	630 (4.1)	274 (4.7)
기혼(유배우)	17,793 (82.3)	17,473 (81.1)	16,315 (78.3)	12,291 (79.1)	4,802 (81.6)
기혼(사별, 이혼, 별거)	3,032 (14.0)	3,008 (14.0)	3,240 (15.6)	2,618 (16.8)	810 (13.8)
교육수준(만30세이상)					
초졸이하	7,656 (35.4)	5,822 (27.0)	5,549 (26.6)	5,023 (33.6)	1,594 (29.1)
중졸	3,523 (16.3)	3,176 (14.7)	2,813 (13.5)	1,885 (12.6)	666 (12.2)
고졸	6,844 (31.7)	7,748 (35.9)	7,405 (35.6)	4,591 (30.7)	1,678 (30.6)
대졸이상	3,584 (16.6)	4,814 (22.3)	5,062 (24.3)	3,467 (23.2)	1,541 (28.1)
건강보험종류					
지역 가입	- -	17,848 (47.8)	13,725 (40.6)	8,969 (37.1)	3,023 (34.0)
사업장(직장) 가입	- -	18,088 (48.5)	18,624 (55.2)	14,171 (58.6)	5,603 (62.9)
의료급여 1종	- -	572 (1.5)	726 (2.1)	531 (2.2)	155 (1.7)
의료급여 2종	- -	592 (1.6)	620 (1.8)	487 (2.0)	117 (1.3)
미가입	- -	224 (0.6)	73 (0.2)	30 (0.1)	6 (0.1)

1) 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 사람 기준

2) 결혼상태, 교육수준은 만30세이상에 대해 제시
교육수준은 수료, 중퇴, 재학, 휴학인 경우 이전 학력(예 : 고등학교 중퇴 → 중졸), 졸업인 경우 해당 학력으로 분류

제2부 주요 건강통계

제 1 장 건 강 행 태

Ⅰ. 흡연
Ⅱ. 음주
Ⅲ. 신체활동
Ⅳ. 우울 및 스트레스
Ⅴ. 손상 및 안전의식
Ⅵ. 건강검진
Ⅶ. 의료이용

Ⅰ. 흡연

현재흡연율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 48.3%로, 1998년 이후 감소 경향이었으나 2008년 이후 답보상태를 유지하였다. 여자의 경우, 6.3%로 연도별 큰 차이는 없었다(그림 1-1, 표1-Ⅰ-1). 연령별로는 남녀 모두 30대에서 가장 높았고, 연령이 낮을수록, 소득수준이 낮을수록 흡연율이 높았다(그림1-2, 표1-Ⅰ-10). 미국의 경우 2010년 현재흡연율(18세이상)은 남자 21.2%, 여자 17.5%로 미국에 비해 우리나라 남자는 2배 정도 높았고, 여자는 약 1/3 수준이었다.[1)]

평생흡연자의 흡연시작연령(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 19.3세, 여자 25.5세이었고, 2007년 이후 비슷한 수준이었다(표1-Ⅰ-2). 현재흡연자의 하루평균흡연량(만19세이상)은 남자 16.2개비, 여자 9.1개비로 2001년 이후 유사한 수준이었다(그림1-3, 표1-Ⅰ-3).

현재흡연자의 금연시도율(만19세이상, 표준화)은 54.4%, 현재흡연자의 1개월내금연계획률(만19세이상, 표준화)은 21.0%이었으며(표1-Ⅰ-4,5), 여자가 남자보다 금연시도 및 계획률이 더 높았다(표1-Ⅰ-15,16).


현재비흡연자의 간접흡연노출률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 48.9%, 여자 35.1%로 2009년에 비해 다소 증가하였다(그림1-4, 표1-Ⅰ-6). 특히 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률(만19세이상, 표준화)은 남자 58.6%로 여자 41.8%에 비해 높은 반면, 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률(만19세이상, 표준화)은 남자 5.8%로 여자 19.8%보다 낮았다(표1-Ⅰ-7,8).

흡연예방 또는 금연교육 경험률(만19세이상, 표준화)은 남자 11.2%로 여자 3.7%보다 높았고, 연령별로는 20대에서 가장 높았다(표1-Ⅰ-9).

참고문헌


1. National Center for Health Statistics. Summary health statistics for the U.S. adult : National Health Interview Survey 2009. Vital Health Stat 10(248). 2010.

그림 1-1. 현재흡연율 추이




※현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율, 만19세이상
※'98년 만20세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-2. 연령별 현재흡연율




※현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율, 만19세이상

그림 1-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이



※현재흡연자의 하루평균흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수, 만19세이상
※'98년 만20세이상
※일부연령의 현재흡연자 수가 20미만이여서 조율로 제시

그림 1-4. 현재비흡연자의 간접흡연노출률 추이



※현재비흡연자의 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 또는 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율, 만19세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

Ⅱ. 음주

월간음주율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 77.8%, 여자 43.3%로 2009년과 유사한 수준이었고, 연령이 낮을수록, 소득수준이 높을수록 높았다(그림1-5, 표1-Ⅱ-2). 미국의 경우(18세이상) 2010년 월간음주율은 남자 59.2%, 여자 43.4%로 미국에 비해 우리나라 남자는 높고, 여자는 유사한 수준이었다.[1)]

연간음주자의 고위험음주율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 24.9%, 여자 7.4%로 2009년과 유사한 수준이었다(그림1-6, 표1-Ⅱ-4). 연령별로는 남자는 30-50대, 여자는 20-40대에서 높았으며, 소득수준이 낮을수록 고위험음주율이 높았다(그림1-7, 표1-Ⅱ-15).

연간음주자의 월1회 이상 폭음률(만19세이상)은 2010년 남자 65.5%, 여자 29.4%이었다. 거의 매일 폭음하는 경우는 남자 12.5%, 여자 2.5%이며, 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-Ⅱ-17,18).


평생음주자의 문제음주율(만19세이상, AUDIT 8-15점)은 2010년 남자 34.1%, 여자 13.6%이었고, 알코올남용(AUDIT 16-19점)은 남자 11.7%, 여자 2.0%, 알코올의존(AUDIT 20점 이상)은 남자 11.1%, 여자 2.1%이었다(표1-Ⅱ-19). 알코올의존율은 소득수준이 낮을수록 높았다.

자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률(만19세이상)은 2010년 남자 23.8%, 여자 7.8%이었고, 읍면지역이 동지역보다 높았다(그림1-8, 표1-Ⅱ-22,23). 연간음주운전차량동승률(만19세이상)은 남자 21.6%, 여자 12.9%이었으며, 남자의 경우 연간음주운전경험률과 연간음주운전차량동승률이 유사한 반면, 여자는 연간음주운전차량동승률이 연간음주운전경험률보다 높았다(표1-Ⅱ-24).

참고문헌

1. National Center for Health Statistics. Summary health statistics for the U.S. adult : National Health Interview Survey 2010. Vital Health Stat 10(252). 2011.


그림 1-5. 월간음주율 추이



※월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-6. 연간음주자의 고위험음주율 추이



※연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔 이상(여자 5잔)이며 주 2회 이상 음주하는 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-7. 연령별 연간음주자의 고위험음주율



※연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔 이상(여자 5잔)이며 주 2회 이상 음주하는 분율, 만19세이상

그림 1-8. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이



※자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율, 만19세이상

※'98년 : 만 20세이상

※일부연령의 운전자(자동차 또는 오토바이) 수가 20미만이여서 조율로 제시

Ⅲ. 신체활동


격렬한 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 19.7%로 여자 12.3%보다 높았고, 남자는 2009년과 비슷한 수준이었으나 여자는 감소하였다(그림1-10, 표1-Ⅲ-3). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 40대에서 가장 높았다(표1-Ⅲ-7).

중등도 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 11.5%, 여자 10.3%로 남녀 모두 감소하는 경향이었다(그림1-11, 표1-Ⅲ-4). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 50대에서 가장 높았고, 거주지별(만19세이상, 표준화)로 동지역은 9.1%, 읍면지역은 17.4%로 남녀 모두 동지역보다 읍면지역에서 약 2배 정도 높았다(표1-Ⅲ-7).

걷기 실천율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 42.8%, 여자 39.6%로 2005년 이후 감소 경향이었다(그림1-12, 표1-Ⅲ-5). 성별에 따라 연령별, 거주지역별로 차이가 있었는데, 남자는 40대, 여자는 70대에서 가장 낮았고, 남자는 읍면지역에서, 여자는 동지역에서 높았다(표1-Ⅲ-9).

근력운동 실천율(만19세이상)은 2010년 남자는 30.1%로 여자 11.5%보다 약 3배 정도 높았다(표1-Ⅲ-10). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 40대에서 가장 높았고, 19-64세에 비해 65세 이상이 현저히 낮았다. 소득수준은 '상'에서 가장 높았으며, 여자보다 남자에서 그 차이가 컸다.


그림 1-9. 중등도이상(걷기포함) 신체활동 실천율 추이



※중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-10. 격렬한 신체활동실천율 추이



※격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-11. 중등도 신체활동실천율 추이



※중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-12. 걷기실천율 추이



※걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

Ⅳ. 우울 및 스트레스

스트레스인지율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자는 25.2%로 여자 31.7%보다 낮았고, 2009년에 비해 감소하였다(표1-Ⅳ-1). 연령별로는 남자 30대와 여자 20대, 소득수준은 남자 '상', 여자 '하'에서 가장 높았다(표1-Ⅳ-9).


우울증상경험률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자는 7.9%로 여자 16.9%보다 낮았고, 2009년에 비해 감소하였다(그림1-13, 표1-Ⅳ-2). 연령별로는 50대이상에서 높았고, 소득수준은 '하'에서 가장 높았다(그림1-14, 표1-Ⅳ-15).

자살생각률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자는 9.4%로 여자 19.7%보다 낮았고, 2009년에 비해 감소하였다(그림1-15, 표1-Ⅳ-3). 연령별로는 70대이상에서 가장 높았고, 소득수준이 낮을수록 높았다(그림1-16,표1-Ⅳ-17).

자살생각자의 자살시도율(만19세이상)은 2010년 남자는 8.3%로 여자 4.4%보다 높았고, 2009년에 비해 남자는 증가, 여자는 감소하였다(표1-Ⅳ-4). 연령별로는 남자는 70대이상에서, 여자는 50대에서 가장 높았고, 소득수준 '하'에서 높았다(표1-Ⅳ-17).

정신문제상담경험률(만19세이상)은 2010년 남자 1.3%, 여자 3.0%로, 여자가 남자보다 2배 이상 높았고, 특히 여자는 20대에서 가장 높았다(표1-Ⅳ-19).


그림 1-13. 우울증상경험률 추이



※우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-14. 연령별 우울증상경험률



※우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율, 만19세이상


그림 1-15. 자살생각률 추이



※자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-16. 연령별 자살생각률



※자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율, 만19세이상

Ⅴ. 손상 및 안전의식


연간손상경험률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자는 8.3%로 여자 6.5%보다 높았고, 2005년 이후 비슷한 수준이었다(그림1-17, 표1-Ⅴ-1). 연령별로 남자는 30대, 여자는 70대이상에서 가장 높았다(표1-Ⅴ-1).

2008-2010년 자료를 통합하여 분석한 결과, 연간손상경험률은 만19-64세의 경우 남자는 8.4%로 여자 5.9%보다 높았던 반면, 만65세이상에서는 남자 6.6%로 여자 7.5%보다 낮았다(표1-Ⅴ-8). 만1-18세의 경우 남자는 10.0%로 여자 5.5%보다 약 2배가량 높았다(표1-Ⅴ-9). 연간손상원인은 만19세이상의 경우 남자는 '운수사고' 34.5%, '추락/미끄러짐' 26.1%, '부딪힘' 16.8% 순으로 높은 반면 여자는 '추락/미끄러짐' 36.3%, '운수사고' 30.7%, '부딪힘' 14.9% 순으로 높았다. 만1-18세의 경우 남자는 '부딪힘' 39.5%, '추락/미끄러짐' 32.7%, '운수사고' 13.2% 순으로 높은 반면 여자는 '추락/미끄러짐' 33.0%, '부딪힘' 29.2%, '운수사고' 18.5% 순으로 높았다(그림1-18, 표1-Ⅴ-15~17).

안전벨트착용률은 1998년에는 매우 낮았으나 2001-2002년 안전띠매기 범국민 캠페인 후 대폭 증가하였고 이후 점차 감소하는 경향이었다. 2010년 운전자의 안전벨트착용률(만19세이상)은 남자 69.9%로 여자 78.6%보다 낮았고(그림1-19, 표1-Ⅴ-3), 동승차량앞좌석 안전벨트착용률(만19세이상, 표준화)은 남자 57.0%로 여자 67.7%보다 낮았다(그림1-20, 표1-Ⅴ-4).


자전거 헬멧착용률은 2010년 만19세이상 5.7%, 만3-11세 2.8%, 만12-18세 0.2% 순으로 높았다(표1-Ⅴ-31,34,35). 소아의 자동차보호장구이용률(만1-5세)은 21.8%로 2005년 이후 증가하는 경향이었다(표1-Ⅴ-6).

그림 1-17. 연간손상경험률 추이




※연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율, 만1세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화, 성인(만19세이상)

그림 1-18. 연간손상원인




※2005년 추계인구로 연령표준화
※기타: 열상/자상/절단/관통상, 중독, 신체의 과도한 사용 포함

그림 1-19. 운전자의 안전벨트착용률 추이



※운전자의 안전벨트착용률 : 운전자 중 운전시 안전벨트를 항상 착용하는 분율, 만19세이상
※'98년 만20세이상
※일부연령의 운전자수가 20미만이여서 조율로 제시

그림 1-20. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이



※동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율, 만19세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

Ⅵ. 건강검진


건강검진수진율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 57.0%, 여자 48.5%로, 2009년에 비해 증가하였다(그림1-21, 표1-Ⅵ-1). 연령별로는 남자는 60대, 여자는 50대에서 가장 높았고, 소득수준이 높을수록 높았다(그림1-22, 표1-Ⅵ-5).

암검진수진율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 35.8%, 여자 53.9%로, 2009년과 비슷한 수준이었다(표1-Ⅵ-2). 연령별로는 남자 60대, 여자 50대가 가장 높았고, 소득수준이 높을수록 높았다(표1-Ⅵ-5).

인플루엔자예방접종률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 25.3%, 여자 31.3%로, 2009년에 비해 소폭 증가하였다(그림1-23, 표1-Ⅵ-3). 연령별로는 70대이상, 만1-5세 순으로 높았다(그림1-24, 표1-Ⅵ-17,18).


소아선천성대사이상검사 수진율(만1-11세)은 2010년 남자 90.9%로 여자 94.4%보다 낮았다(표1-Ⅵ-19).

그림 1-21. 건강검진수진율 추이




※건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율, 만19세이상
※'98년 만20세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-22. 연령별 건강검진수진율




※건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율, 만19세이상

그림 1-23. 인플루엔자예방접종률 추이



※인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율, 만1세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화, 성인(만19세이상)

그림 1-24. 연령별 인플루엔자예방접종률



※인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율, 만1세이상

Ⅶ. 의료이용

연간미치료율(병의원)(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 16.3%, 여자 24.1%로, 최근 5년 동안 증가추세였으나 2009년에 비해 감소하였다(그림1-25, 표1-Ⅶ-1). 연령별로는 남자 40대, 여자 70대이상에서 높았고, 거주지역은 읍면지역이 동지역보다 높았다(그림1-26, 표1-Ⅶ-8).

연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 12.8%, 여자 17.9%로, 2009년에 비해 감소하였고, 연령이 높을수록 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-Ⅶ-2). 연간미치료자의 연간미치료이유(병의원)(만19세이상)는 만19-64세는 '이용시간이 없음'이 43.8%, 만65세이상은 '경제적문제'가 35.7%로 가장 높았다(표1-Ⅶ-10~12).

연간미치료율(치과)(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 38.6%, 여자 41.4%로, 2009년에 비해 감소하였다(그림1-27, 표1-Ⅶ-3). 연령별로는 남자 30-40대, 여자 20대에서 높았고, 소득수준은 낮을수록 높았다(그림1-28, 표1-Ⅶ-8).


연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과)(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 31.8%, 여자 34.3%로, 2009년에 비해 감소하였고, 연령이 높을수록 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-Ⅶ-4). 연간미치료자의 연간미치료이유(치과)(만19세이상)는 남자의 경우 '직장, 학교 때문' 32.2% , '경제적 이유' 31.3% 순으로 높았던 반면 여자는 '경제적 이유' 34.6%, '직장, 학교 때문' 18.9% 순으로 높았다(표1-Ⅶ-14~16).

연간입원율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 9.2%, 여자 12.8%로 2009년과 유사한 수준이었고(표1-Ⅶ-5), 연령별로는 남녀 모두 70대에서 가장 높았다(표1-Ⅶ-18). 입원건당 평균 입원기간(만19세이상)은 남자 15.5일로, 여자 9.0일보다 길었다(표1-Ⅶ-20).

2주간 외래이용률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 25.1%, 여자 35.8%로, 2009년에 비해 증가하였다(표1-Ⅶ-6).

2주간 약국이용률(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 28.1%, 여자 36.1%로, 2009년에 비해 증가하였다(표1-Ⅶ-7).


그림 1-25. 연간미치료율(병의원) 추이



※연간미치료율(병의원) : 최근 1년동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-26. 연령별 연간미치료율(병의원)



※연간미치료율(병의원) : 최근 1년동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율, 만19세이상


그림 1-27. 연간미치료율(치과) 추이



※연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지못한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-28. 연령별 연간미치료율(치과)



※연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지못한 분율, 만19세이상

제 2 장 영 양

Ⅰ. 식품 섭취
Ⅱ. 에너지 및 영양소 섭취
Ⅲ. 식생활 행태
Ⅳ. 수유 및 이유 현황

Ⅰ. 식품 섭취

제5기 1차년도(2010) 결과, 1일 총 식품섭취량(표준화)은 1,505g으로 2009년에 비해 161g이 증가하였으며, 남자(1,727g)가 여자(1,289g)보다 438g 더 많이 섭취하였다(표2-I-2,4,6). 전체 총 식품섭취량(표준화)은 개인별 섭취량 조사가 시작된 1998년 이래 1,200~1,500g 수준이었다. 남자의 경우 1998년 1,388g에서 2010년 1,727g으로 꾸준히 증가하여 10년 사이 300g 이상 차이를 보였고, 여자의 섭취량은 1998년 1,167g에 비해 2010년 1,289g으로 100g 이상 증가했다.

식품군별 섭취량

식물성 식품 섭취량(표준화)은 12년 간 1.15배 증가한 데 비해 동물성 식품 섭취량(표준화)은 1.3배 증가하였다. 곡류 섭취량(표준화)은 지난 10여 년간 337.2g에서 311.0g으로 감소한 반면, 음료류, 주류 섭취량(표준화)은 각각 45.3g, 48.9g에서 130.2g, 138.6g으로, 우유류 역시 79.7g에서 121.5g으로 크게 증가하였다(그림 2-1,2).


과일류 섭취량(표준화)은 2009년 결과(169.1g)보다 약 11g 증가한 180.3g이었고 육류 섭취량은 104.0g으로 1998년 67.8g의 1.5배 수준으로 1998년 이후 조사된 결과 중 가장 높았다. 2010년의 식품군별 섭취량(표준화)은 2009년 결과에 비해 감자·전분류, 해조류를 제외하고 모든 식품군에서 증가하였다.

제5기 1차년도(2010) 결과에서도 제4기 3차년도(2009)와 마찬가지로 섭취량이 가장 높은 식품군은 곡류(312.9g)와 채소류(301.7g)였으며, 과일류(181.5g) 섭취량이 상대적으로 높았다(표2-Ⅰ-7). 동물성식품 중에서는 우유류 섭취량이 가장 높아 115.2g이었으며, 육류(102.1g), 어패류(56.9g) 등이 그 다음이었다. 총 섭취량과 마찬가지로 식품군별 섭취량 역시 남자의 섭취량이 여자보다 높았으나 감자·전분류, 과일류, 우유류는 여자의 섭취량이 더 높았다. 제5기 1차년도(2010) 조사부터는 음료류와 주류 결과를 분리하여 산출하였는데, 특히 주류 섭취량의 경우 남자 섭취량은 229.3g으로 여자 섭취량(50.3g)의 4.6배 수준이며, 남자의 음료류 섭취량은 여자의 1.4배, 육류 섭취량은 1.7배 수준이었다. 전반적으로 소득수준(표준화)이 높을수록 식품군별 섭취량이 높은 경향을 보였으며, 과일류, 어패류, 우유류 등의 섭취량이 소득수준에 따라 차이가 있었다.

다소비 식품


식품별 평균 섭취량이 가장 높은 식품은 백미였으며(1일 평균 섭취량 181.0g), 우유, 배추김치가 2, 3위였다(표2-Ⅰ-11). 다소비 식품 순위는 조사 연도와 상관없이 대체로 유사했으나 막걸리와 과일음료는 순위가 큰 폭으로 상승하였다. 남자의 경우, 맥주, 소주, 막걸리 섭취량이 높아 10위 안에 들었으나, 여자는 맥주가 6위, 소주는 30위 밖의 순위였다. 반면, 여자는 남자보다 다양한 종류의 과일류를 더 많이 섭취하였으며, 떡(여자 14위), 고구마(여자 23위) 등이 상대적으로 높은 순위를 차지하였다. 남자의 라면 섭취량은 1일 평균 18.0g으로(23위), 주당 약 1개의 라면을 섭취하는 것으로 조사되었다.

그림 2-1. 식물성 식품군별 섭취량 추이



※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상

그림 2-2. 동물성 식품군별 섭취량 추이



※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상


식품섭취빈도

최근 1년간 식품의 섭취빈도는 쌀이 주당 평균 17.4회(하루 2.5회)로 가장 높았으며, 배추김치를 포함한 배추 13.8회, 보리/잡곡 9.8회, 커피 8.4회 등이 상위에 속하였다(그림2-3, 표2-Ⅰ-13). 우유는 주당 평균 2.8회 섭취하였는데, 대상자의 18.3%가 '거의안먹음'이었고, 하루 1회 이상(1일 1~3회 섭취 분율의 합) 섭취자는 20.5%에 불과했다.

전반적으로 남자의 식품섭취빈도는 여자보다 높았으며, 특히 라면, 젓갈, 탄산음료, 주류의 섭취빈도가 높았다. 여자는 보리/잡곡, 떡, 콩류, 고구마, 과일류의 섭취빈도가 남자보다 높았다(표2-Ⅰ-14,15). 만12~18세는 라면, 빵류, 떡류, 과자류, 육류, 어묵류, 우유, 아이스크림, 햄버거, 피자, 튀긴 음식을 다른 연령군에 비해 자주 섭취하였고(표2-Ⅰ-16), 커피, 녹차, 맥주, 소주는 19~64세 성인이 가장 빈번하게 섭취하였다(표2-Ⅰ-17). 만65세이상의 경우 다른 연령군에 비해 대부분 식품의 섭취빈도가 낮았으나, 보리/잡곡, 콩류, 젓갈류의 섭취빈도는 다른 연령군에 비해 높았다(표2-Ⅰ-18).

제3기(2005)부터 제5기 1차년도(2010)까지의 식품별 주당 평균 섭취빈도(표준화)를 비교했을 때, 과일류가 감소하는 경향을 보였으며, 막걸리 섭취빈도는 2010년에 가장 높았다.

그림 2-3. 식품섭취빈도



※식품별 평균섭취빈도 : 식품섭취빈도조사표에 포함된 항목별 주당 평균섭취빈도로서, '1일 3회'부터 '거의 안 먹음'까지 총 10개 빈도구간별 응답분율을 사용하여 산출, 만12세이상

Ⅱ. 에너지 및 영양소 섭취

에너지 및 영양소 섭취량은 이전 연도 결과에 비해 대체로 증가하였다. 제5기 1차년도(2010) 에너지 섭취량(표준화)은 2,050kcal이었으며(그림2-4, 표2-Ⅱ-2), 1998년 1,934kcal에 비해 약 100kcal, 제4기 3차년도(2009)에 비해서는 170kcal 가량 높은 수준이다. 각 급원별 에너지 섭취분율(표준화)은 단백질 14.7%, 지방 19.7%, 탄수화물 65.6%로, 이전 연도 결과와 유사하였다(그림2-6).

식품군별 에너지 및 영양소 섭취량

에너지 및 영양소 섭취량에 대한 주요 급원 식품군 순위는 제4기 3차년도(2009) 결과와 매우 유사하였다. 에너지 섭취량에 가장 기여가 큰 식품군은 곡류로, 1,063.4kcal(전체의 51.9%)를 공급하며, 육류(190.3kcal), 주류(100.3kcal)가 그 다음이었다(표2-Ⅱ-8). 단백질 역시 곡류로부터 섭취하는 양이 21.2g으로 가장 높았고, 육류로 17.7g, 어패류로 11.0g을 섭취하는 것으로 조사되었다. 지방 주요 급원식품군은 육류, 곡류, 유지류(식물성) 등이었다.

칼슘은 채소류로 섭취하는 양이 141.8mg으로 가장 높았고, 우유류(120.2mg), 어패류, 두류가 그 다음으로 중요한 식품군이었다. 인은 곡류로부터, 나트륨은 조미료류와 채소류로 섭취하는 양이 가장 높았으며, 칼륨과 철은 채소류와 곡류에 의한 섭취량이 높았다.

비타민 A의 주요 급원식품군은 채소류, 조미료류, 과일류, 해조류 순으로 이전 연도에 비해 해조류에 의한 비타민 A 섭취량이 상대적으로 감소하였고 조미류에 의한 섭취량은 증가하였다. 티아민은 곡류와 육류, 리보플라빈은 곡류, 채소류, 육류, 우유류에서 섭취하는 양이 높았다. 나이아신 역시 곡류, 육류, 어패류에 의한 섭취량이 높았으며, 비타민 C 섭취에는 채소류, 과일류에 의한 기여도가 높았다.


에너지 및 영양소별 주요 급원식품 결과도 전반적으로 이전 연도와 유사하였다. 에너지의 주요 급원식품은 백미로, 전체 섭취량의 1/3 이상을 공급하는 수준이었으며 돼지고기, 라면, 소주, 빵, 우유, 떡, 국수 등이 그 다음이었다(그림2-5, 표2-Ⅱ-14). 이들 1~8위까지의 식품으로 전체 에너지 섭취량의 50%를 섭취하였으며, 2010년 결과에서는 메밀국수/냉면국수, 케이크가 30위 내에 포함되었다.

칼슘의 주요 급원식품은 우유(91.4mg, 전체 섭취량의 17.3%)이며, 배추김치, 멸치, 두부, 무청, 파, 달걀, 요구르트, 미역, 대두, 열무김치 등 11가지 식품으로 전체 섭취량의 50%를 섭취하였다(표2-Ⅱ-19).

나트륨 섭취에 가장 크게 기여하는 식품은 소금으로 전체 섭취량의 19.3%를 공급하는 수준이었으며, 배추김치, 간장, 된장이 그 다음 순위였다(표2-Ⅱ-21). 이들 4가지 식품으로부터의 나트륨 섭취량이 전체 섭취량의 50% 이상이었으며, 이전 연도와 마찬가지로 주요 급원식품 10위 안에 소금, 간장, 된장, 고추장, 쌈장 등이 포함되는 등 조미료류로 섭취하는 양이 절대적으로 높았고, 라면, 총각김치, 백미, 국수 등이 포함되어 있었다.


비타민 A의 1위 급원식품은 당근으로, 전체 섭취량의 10.1%(81.5㎍RE)를 공급하며, 고추, 김, 감, 깻잎, 열무김치, 채소음료, 시금치 등의 식품을 통해 전체 섭취량의 50% 이상을 섭취하였다(표2-Ⅱ-24).

그림 2-4. 에너지 섭취량 추이




※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상

그림 2-5. 에너지 섭취량의 주요 급원식품



※전체 에너지 섭취량 중 섭취분율(%), 만1세이상

그림 2-6. 영양소별 에너지섭취분율 추이




※단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율, 만1세이상

※지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

※'69~'95년 : 원시자료 확보가 불가하여 각 영양소 섭취량의 평균값을 이용하여 계산

※'98~'10년 : 2005년 추계인구로 연령표준화

그림 2-7. 영양섭취기준에 대한 섭취비율



※영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 영양섭취기준에 대한 개인별 영양소 섭취량 백분율의 평균값, 만1세이상

※영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 기타, 권장섭취량

영양섭취기준에 대한 섭취비율

영양섭취기준에 대한 섭취비율은 식품 및 영양소 섭취량 증가와 더불어 전반적으로 높아졌다. 제5기 1차년도(2010) 필요추정량[1]에 대한 에너지 섭취비율은 평균 99.1%이었으며, 남자 104.8%, 여자 93.4%이었다(그림2-7, 표2-Ⅱ-31~33). 남자의 에너지 필요추정량에 대한 섭취비율(표준화)은 제4기 3차년도(2009)에 비해 8.8%p 상승하여 100%를 상회하였으며, 여자의 섭취비율(표준화, 93.6%)은 2005년 결과(94.7%)와 유사하였다(표2-Ⅱ-30).

권장섭취량 대비 단백질 섭취비율은 160%, 인은 169%이었으며, 철, 비타민 A, 티아민, 나이아신, 리보플라빈, 비타민 C 섭취량은 권장섭취량의 100~140% 범위로 양호하였으나, 칼슘 섭취량(표준화)은 전년(67.4%) 대비 7%p 상승했음에도 불구하고 권장섭취량의 74.0%로 가장 낮은 비율을 보였다(표2-Ⅱ-30). 칼슘은 3세이상 전 연령대에서 권장섭취량의 85% 미만을 섭취하였고 특히 12~18세와 65세이상의 권장섭취량에 대한 섭취비율은 60% 수준이었다. 나트륨은 충분섭취량에 비해 3배 이상 섭취하였다.

만65세이상은 단백질, 인, 나트륨, 철을 제외한 모든 영양소의 섭취수준이 영양섭취기준에 비해 낮았으며, 칼슘 외에도 리보플라빈의 섭취수준이 매우 낮았다. 반면, 나트륨의 섭취수준은 다른 연령층의 성인과 마찬가지로 충분섭취량의 3배 이상을 섭취하고 있었다.

소득수준이 높을수록 영양섭취기준에 대한 각 영양소의 섭취비율(표준화)도 전반적으로 높았으며, 부족위험이 높은 칼슘의 경우 소득수준이 가장 낮은 군(67.8%)과 가장 높은 군(79.4%) 간에 12%p 차이를 보였다.

영양부족 및 과잉 섭취 현황

제5기 1차년도(2010) 결과에서는 전반적으로 전년도 결과에 비해 영양부족자 분율은 감소하였고, 에너지/지방과잉섭취자 분율은 증가하였다(표2-Ⅱ-35,39).

칼슘의 경우 평균필요량 미만 섭취자 분율은 65.9%이었으며, 연령과 상관없이 3세이상 모든 군에서 평균필요량 미만 섭취자 분율이 50% 이상이었다(표2-Ⅱ-36). 칼슘 다음으로 미만 섭취자 분율이 높은 영양소는 리보플라빈으로, 45.3%가 기준 미만이었다. 비타민 C는 44.1%, 비타민 A는 38.4%가 평균필요량 미만을 섭취하였다.

반면, 에너지 필요추정량 125%이상 섭취자 분율은 전년 결과에 비해 6%p 상승하여 20.6%이었으며(표2-Ⅱ-40), 지방의 에너지적정비율 상한선 이상 섭취자 분율은 20.4%이었다(표2-Ⅱ-41). 나트륨의 목표섭취량인 2,000mg 이상[2] 섭취자 분율(만9세이상)은 89.4%로, 칼슘 등과 대조를 보였다. 나트륨의 목표섭취량 이상 섭취자 분율이 가장 높은 연령대는 30~49세로, 총 식품 섭취량이 높은 군에서 나트륨 섭취량도 높았다.

여자의 31.9%는 에너지 필요추정량의 75% 미만을 섭취하며, 40.4%는 지방을 에너지적정비율의 하한선 미만을 섭취하는 등 남자보다 영양섭취기준 미만 섭취자 분율이 높았다(표2-Ⅱ-37,38). 여자 중 칼슘의 평균필요량 미만 섭취자 분율은 70.6%이었으며, 철은 37.4%, 리보플라빈과 비타민 C는 각각 47.6%와 48.3%이었다.

연령별 비교 시, 30~64세는 영양섭취기준 미만 섭취자 분율이 낮고 이상 섭취자 분율이 높았던 반면, 12~18세는 영양섭취기준 미만 섭취자 분율이 높았다. 만65세이상에서는 인과 철

을 제외한 모든 영양소의 영양섭취기준 미만 섭취자 분율이 30%를 넘어(리보플라빈의 경우, 78.8%) 전반적인 섭취 부족이 우려되었다.


에너지 섭취량이 필요추정량의 75% 미만이고, 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 모두 평균필요량 미만인 대상자 분율(영양섭취부족자 분율, 표준화)은 전체 9.9%로 전년도 결과(14.2%)에 비해 감소하였다(표2-Ⅱ-44). 영양섭취부족자 분율은 남자보다 여자가 약 2배 수준으로 높았으며 소득수준이 낮을수록 높은 경향을 보였다(그림2-8, 표2-Ⅱ-45). 에너지 섭취량이 필요추정량의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 대상자 분율(에너지/지방과잉섭취자 분율, 표준화)은 2009년 결과(4.7%)에 비해 7.0%로 상승하였으며(표2-Ⅱ-47), 19~29세, 30~49세 연령층에서 각각 10.0%, 9.1%로 가장 높았다(표2-Ⅱ-48).

위에서 서술한 결과는 1일 간의 섭취량 조사로부터 산출한 값이기 때문에 개인의 일상적인 섭취 수준을 평가하는 데 적합하지 않으며 영양문제집단의 크기가 과대 산출될 가능성이 높다는 한계점을 가지고 있으나[3,4] 문제 영양소 및 영양 취약 집단 추정을 위한 자료로서 활용될 수 있다.

참고문헌

1. 한국영양학회. 2010 한국인 영양섭취기준 개정판. 2010.
2. Joint WHO/FAO Expert Consultation. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Serie-916. 2003. (http://whqlibdoc.who.int/trs/)
3. Guenther PM et al. Development of an approach for estimating usual nutrient intake distributions at the population level. Journal of Nutrition. 1997;127:1106-1112.
4. Murphy SP. Using DRIs for dietary assessment. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2008;17(Suppl1): 299-301.

그림 2-8. 영양섭취부족자 및 에너지/지방과잉섭취자 분율



※영양섭취부족자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율, 만1세이상

※에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량(또는 영양권장량)의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율

※소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

※에너지 필요추정량, 영양소별 평균필요량, 지방에너지적정비율 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

Ⅲ. 식생활 행태

결식률

결식률은 하루 세 끼니 중 아침식사가 20.5%로 가장 높았고, 점심 및 저녁식사 결식률은 각각 5.7%, 4.2% 수준으로(그림2-9, 표2-Ⅲ-4~6) 2009년 결과와 유사하였다. 남자의 아침식사 결식률은 2005년도 이후 유사하나 여자의 결식률은 다소 감소하는 경향이었다(표2-Ⅲ-1). 연령별 결식률을 비교해보면 아침과 점심식사 결식률은 19~29세에서 가장 높고(각각 40.3%, 10.5%), 저녁식사 결식률은 12~18세와 19~29세가 각각 5.8%, 5.7%로 가장 높았다. 지역별로는 동지역의 아침식사 결식률(표준화)이 읍면지역에 비해 높았으며, 소득수준이 낮은 군에서 결식률이 높은 경향을 보였다.

가족동반식사율

끼니별 가족동반식사율의 경우 저녁식사가 67.7%로 가장 높았으며, 아침식사 55.1%, 점심식사 21.1% 순이었다(표2-Ⅲ-10~12). 연령별로는 아침과 저녁식사는 19~29세에서, 점심식사는 12~18세에서 가족동반식사율이 가장 낮았고, 3끼니 모두 읍면지역보다 동지역 거주자의 경우가 낮았다.

외식섭취빈도


국민건강영양조사에서 '외식'은 학교 및 산업체 급식, 교회·사찰 등의 종교시설에서 제공한 음식, 구입한 도시락, 배달 또는 포장 음식을 모두 포함한 것으로서, 외식섭취빈도는 '주 5~6회'로 응답한 경우가 26.6%로 가장 많았으며 '하루 1회'는 16.0%, '하루 2회 이상'은 9.2%이었다(표2-Ⅲ-14). 연령별로 보면 '하루 2회 이상' 외식자 분율은 19~29세에서 가장 높았던 반면, 65세이상의 39.3%는 외식을 거의 하지 않는다고 응답하였다. 하루 1회 이상 외식률은 25.3% 수준으로, 여자보다 남자에서 높고, 12~29세에 높았으며 소득수준이 높을수록 높았다(그림2-10).

영양표시

초등학생 이상을 대상으로 조사했을 때, 영양표시가 무엇인지 모른다고 응답한 분율은 31.7%이었으며, 연령별로는 65세이상(85.9%)과 6-11세(51.3%)에서 모른다고 응답한 분율이 높았다(표2-Ⅲ-16). 영양표시를 읽는다고 응답한 대상자는 24.9%이었으며(영양표시 인지자 중 약 36%), 성별로는 여자(33.4%)의 영양표시 이용률이 남자(16.4%)의 2배였다. 연령별로는 19~29세가 40.7%로 가장 높고 65세이상이 2.0%로 가장 낮았다(그림2-11).


영양표시 항목 중 가장 관심 있게 보는 영양성분에 대해 영양표시를 읽는 사람의 46.8%가 '열량'이라고 응답하였고, 다음은 트랜스지방(18.4%)이었다(표2-Ⅲ-17). 연령에 따라 관심항목에 차이가 있었는데, 12~18세, 19~29세의 경우 열량을 선택한 분율(69.2%, 59.4%)이 특히 높았고, 30~49세는 열량과 트랜스지방, 50~64세는 열량과 콜레스테롤, 65세이상은 단백질과 콜레스테롤이 중요 관심항목이었다. 영양표시를 읽는 사람 중 76.0%가 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시 내용에 영향을 받는다고 응답하였으며, 남자(69.3%)보다 여자(79.3%) 중 영향을 받는다고 응답한 분율이 높았다(표2-Ⅲ-18).

그림 2-9. 아침식사 결식률




※아침식사 결식률 : {(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율, 만1세이상
※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

그림 2-10. 하루 1회 이상 외식률



※하루 1회 이상 외식률 : 외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 분율, 만1세이상
※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

그림 2-11. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률



※가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 답한 분율, 초등학생이상
※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

영양교육 및 상담

제5기 1차년도(2010) 결과, 최근 1년 이내 영양교육 및 상담 수혜율(표준화)은 6.3%로 2005년 이후 가장 낮았다(그림2-12, 표2-Ⅲ-19). 6~11세 및 12~18세의 수혜율은 각각 28.9%, 12.2%로 타 연령대에 비해 상대적으로 높았으며, 19~29세에서 2.4%로 가장 낮았다. 영양교육 및 상담수혜율은 소득수준에 따른 차이는 크지 않았다(표2-Ⅲ-20).

식이보충제

최근 1년간 식이보충제 복용경험률(표준화)은 40.0%로, 제4기(2007-2009) 조사에서 3년 연속 유사한 경향을 보이다가 2010년 크게 증가하였다(그림2-13, 표2-Ⅲ-21). 여자의 식이보충제 복용경험률(45.5%)이 남자(34.8%)에 비해 높았으며, 연령별로는 3~5세가 52.0%로 가장 높았고, 다음으로는 50~64세(47.4%) 복용경험률이 높았다. 소득수준이 높은 군에서 식이보충제 복용경험률이 높았고(표준화), 읍면지역(32.9%)에 비해 동지역(42.0%)의 복용경험률(표준화)이 높았다.


제5기(2010-2012) 조사부터는 국제 비교 가능성을 고려하여 최근 1개월 내의 복용경험을 추가로 조사하였는데, 최근 1개월 간 식이보충제 복용경험률은 32.9%(남자 29.1%, 여자 36.8%)로 최근 1년간 복용경험률에 비해 약 80% 수준이었다. 성별, 연령에 따른 경향 등은 최근 1년간의 복용경험률과 유사하였다(표2-Ⅲ-23).

식품안정성

최근 1년간 가구의 식생활 형편을 묻는 문항에 대해 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다'로 응답한 가구 분율은 40.7%이었으며(표2-Ⅲ-25), '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'라고 응답한 분율은 54.6%로, 식품안정성 확보가구분율은 95.4%이었다.


식품안정성 확보가구분율은 소득수준이 높을수록 높았으나, 소득수준이 가장 낮은 군에서도 87.6%는 식품안정성 확보가구에 해당하였다.

그림 2-12. 영양교육 및 상담수혜율 추이



※영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율, 초등학생이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 2-13. 식이보충제 복용경험률 추이



※식이보충제 복용경험률 : 최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 비타민/무기질제 혹은 건강기능식품을 복용한 적이 있다고 응답한 분율, 만1세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

Ⅳ. 수유 및 이유 현황

영유아기 수유 및 이유식 섭취현황은 1~3세 유아를 대상으로 조사하며, 각 연도 대상자수가 충분치 않아 최근 3년의 자료를 통합하여 결과를 산출하고 있다. 본 보고서에 제시된 수유 및 이유식 섭취현황 결과는 2008년부터 2010년까지 자료를 통합한 자료로부터 산출한 것이다.

모유 수유경험률은 88.6%이었으며 조제분유 수유경험률은 67.1%이었다(표2-Ⅳ-2). 1개월령의 완전모유수유율은 56.4%이었으나 6개월령, 12개월령은 각각 49.5%, 41.1%로 감소하였다(표2-Ⅳ-3). 평균 모유 수유기간은 10개월이었고(표2-Ⅳ-2), 이유보충식 시작월령은 6.6개월, 시판우유 시작월령은 평균 14.6개월이었다(표2-Ⅳ-4).

제 3 장 만 성 질 환

Ⅰ. 비만
Ⅱ. 고혈압
Ⅲ. 당뇨병
Ⅳ. 이상지혈증
Ⅴ. 폐쇄성폐질환
Ⅵ. 구강질환
Ⅶ. B형간염
Ⅷ. 빈혈
Ⅸ. 안질환
Ⅹ. 이비인후질환
Ⅺ. 골다공증
Ⅻ. 골관절염
ⅩⅢ. 중금속

Ⅰ. 비만

비만 유병률(만19세이상, 표준화)은 남자의 경우 1998년 25.1%에서 2007년 36.2%로 증가하여 최근 3년간 36%정도를 유지하고 있으며, 여자의 경우 1998년부터 2010년까지 26% 수준으로 유지되고 있다(그림3-1, 표3-Ⅰ-1).

제5기 1차년도(2010) 결과 비만 유병률(만19세이상)은 전체 31.4%, 남자 36.5%, 여자 26.4%로 남자가 여자보다 10%p정도 높았으나, 60대 이후 여자의 비만유병률이 남자보다 높아져 70대 이상에서는 여자의 유병률이 남자보다 10%p 높았다(그림3-2, 표3-Ⅰ-7). 미국(NHANES 2005-2008, 만20세이상)의 체질량지수 25kg/㎡이상 과체중 및 비만 유병률은 남자 72.8%, 여자 63.0%였으며, 체질량지수 30kg/㎡이상 비만 유병률은 남자 32.9%, 여자 35.6%였다.[1)]

허리둘레기준 비만 유병률(만19세이상)은 남자 24.3%, 여자 22.9%이었고, 남자, 여자 모두 70대에서 가장 높았다. 체질량지수 기준 비만과 마찬가지로 허리둘레기준 비만도 20~40대에서는 남자가 여자보다 높았으나 50대 이후에서는 여자의 유병률이 높게 나타났다(그림3-4, 표3-Ⅰ-8).


체지방률 평균(만19세이상)은 남자 23.1%, 여자 34.0%로, 남녀간 10%p정도 차이가 있었다(표3-Ⅰ-6). 미국(NHANES 1999-2004, 만20세이상)의 체지방률은 남자 28.0%, 여자 39.9%로, 우리나라의 체지방률이 5%p 정도 낮았고, 남녀간 10%p정도의 차이는 유사하였다.[2)]

소아청소년(만2-18세)의 비만 유병률은 남자 12.7%, 여자 8.6%이었다(표3-Ⅰ-9). 미국의 소아청소년(NHANES 2007-2008, 2-19세이상)의 비만유병률은 남자 17.8%, 여자 15.9%로 우리나라보다 높았다.[1)]

참고문헌


1. CDC, NCHS. Health, United States, 2010. (http://www.cdc.gov/nchs/data/nus/hus10.pdf)
2. Borrud LG et al. Body composition data for individuals 8 years of age and older : U.S. population, 1999-2004. National Center for Health Statistics. Vital Health Statistic 11(250). 2010.
3. Cynthia L. Ogden et al. Prevalence of high body mass index in US children and adolescents, 2007-2008. JAMA. 2010;303(3):242-249

그림 3-1. 비만 유병률 추이(체질량지수 기준)




※비만 유병률 : 체질량지수(kg/m^2) 25 이상인 분율, 만19세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-2. 연령별 비만 유병률(체질량지수 기준)




※비만 유병률 : 체질량지수(kg/m^2) 25 이상인 분율, 만19세이상

그림 3-3. 비만 유병률 추이(허리둘레 기준)



※비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율, 만19세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-4. 연령별 비만 유병률(허리둘레 기준)



※비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율, 만19세이상

Ⅱ. 고혈압

고혈압 유병률(만30세이상, 표준화)은 연중 조사체계로 개편된 2007년 이후 남자는 26.9%에서 29.3%로 2%p정도 증가하였고, 여자는 21.8%에서 23.9%로 1%p정도 증가하였다(그림 3-5, 표3-Ⅱ-1).

제5기 1차년도(2010) 결과 고혈압 유병률(만30세이상)은 전체 28.9%, 남자 30.1%, 여자 27.7%로 남자가 2%p정도 높았다. 30-39세, 40-49세, 50-59세 연령대에서는 남자의 고혈압 유병률이 여자보다 높으나, 60-69세, 70세 이상 연령대에서는 여자의 유병률이 더 높은 경향을 보였다(그림3-6, 표3-Ⅱ-4).

미국의 고혈압 유병률(NHANES 2005-2008, 만20세이상)[1)]은 전체 32.1%, 남자 31.4%, 여자 32.8%로 우리나라보다 여자 고혈압 유병률이 높은 수준이었다. 남녀 연령대별 유병현황은 우리나라와 비슷하게 20-34세, 35-44세, 45-54세 연령대에서는 남자의 유병률이 높고, 55세-64세, 65-74세, 75세 이상 연령대에서는 여자의 유병률이 더 높은 경향이었다.


고혈압 인지율(만30세이상, 2008-2010)은 전체 67.9%, 남자 59.7%, 여자 76.7%였으며, 치료율은 전체 61.9%, 남자 52.6%, 여자 71.9%였고, 유병자 조절률은 전체 43.6%, 남자 38.2%, 여자 49.4%로 남자가 여자보다 낮았고, 특히 남자 30대, 40대의 인지·치료·유병자 조절률이 다른 연령대에 비해 낮았다. 반면, 고혈압 치료자의 조절률은 전체 69.7%, 남자 71.8%, 여자 68.1%로 남자가 여자보다 높았다(그림3-7, 표3-Ⅱ-5).

미국의 고혈압 관리수준(NHANES 2007-2008, 만18세이상)[2)]과 비교시 인지율은 13%p정도, 치료율은 11%p정도, 유병자 조절률은 7%p정도 우리나라가 더 낮았으며, 치료자 조절률은 미국과 유사한 수준이었다.

참고문헌

1. CDC, NCHS. Health, United States, 2010. (http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm)
2. Egan BM et al. US trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension, 1988-2008. JAMA. 2010;303(20):2043-50.

그림 3-5. 고혈압 유병률 추이




※고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분율, 만30세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

※2008년 7월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p참고)


그림 3-6. 연령별 고혈압 유병률



※고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분율, 만30세이상

※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 보정한 값으로 산출(13p 참고)

그림 3-7. 연령별 고혈압 관리현황



※고혈압 인지율 : 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율, 만30세이상

※고혈압 치료율 : 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율, 만30세이상

※고혈압 조절률 : 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율, 만30세이상

※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 이후 측정치는 보정 산출(13p 참고)

※2008-2010년 통합산출

Ⅲ. 당뇨병

당뇨병 유병률(만30세이상, 표준화)은 2001년 8.6%에서 2007년 9.6%까지 증가추세였으나 이후로는 10% 이내 수준을 유지하고 있다(표3-Ⅲ-1).

제5기 1차년도(2010) 결과 당뇨병 유병률(만30세이상)은 전체 10.1%, 남자 11.3%, 여자 9.0%로 남자가 더 높았고(표3-Ⅲ-4), 미국의 당뇨병 유병률(NHANES 2005-2008, 20세이상) 전체 11.3%, 남자 11.8%, 여자 10.8%와 비교 시 약간 낮은 수준이었다.[1)] 연령별 유병률은 남자, 여자 모두 연령이 증가할수록 증가하여 70대이후에서는 4명중 1명이 당뇨유병자였다(그림3-9, 표3-Ⅲ-4).


공복혈당장애 유병률(만30세이상)은 전체 19.9%, 남자 24.2%, 여자 15.8%로 남자가 더 높았고, 미국의 공복혈당장애 유병률 25.7%(NHANES 2005-2006, 만20세이상, 남자 32.1%, 여자 19.8%)보다 남녀 모두 낮은 수준이었다.[2)]

2008-2010 통합산출 결과 당뇨병 인지율(만30세이상)은 전체 73.0%, 남자 69.0%, 여자 77.6%이었으며, 치료율은 전체 59.1%, 남자 54.9%, 여자 64.0%로 여자보다 남자에서 인지율과 치료율이 낮았으며, 특히 남자 30대의 인지율은 30.5%, 치료율은 20.8%로 다른 연령에 비해 낮은 수준이었다. 반면, 조절률(유병자 기준)은 전체 28.1%, 남자 30.1%, 여자 25.8%로 인지율, 치료율에 비해 낮은 수준이었으며, 여자가 남자보다 낮은 수준이었다(그림3-10, 표3-Ⅲ-5).

참고문헌

1. CDC. National Diabetes Fact Sheet. 2011. (http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf)
2. Cowie CC et al. Full accounting of diabetes and pre-diabetes in the U.S. population in 1988-1994 and 2005-2006. Diabetes Care. 2009;32:287-294.


그림 3-8. 당뇨병유병률 추이



※당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-9. 연령별 당뇨병유병률



※당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상

그림 3-10. 연령별 당뇨병 관리현황



※당뇨병 인지율 : 당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율, 만30세이상

※당뇨병 치료율 : 당뇨병 유병자 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사 투여 분율, 만30세이상

※당뇨병 조절률(유병자 기준) : 당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율, 만30세이상

※2008-2010년 통합 산출

Ⅳ. 이상지혈증


고콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 1998년 10.0%, 2008년 10.9%, 2009년 11.5%, 2010년 13.5%로 낮은 소폭으로 증가하는 경향이며, 저HDL콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 2009년 측정소급성 확인을 통하여 기산출된 전환식으로 보정하여 산출된 유병률로 2008년 27.6%, 2009년 28.0%, 2010년 26.2%이었다. 고중성지방혈증 유병률(만30세이상, 표준화, 공복12시간 기준)은 2005년 이후 약 17% 전후 수준으로 큰 변화가 없었다(그림3-11, 표3-Ⅳ-1,5,8).

제5기 1차년도(2010) 결과 고콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상)은 전체 14.1%, 남자 13.4%, 여자 14.9%로 여자가 1.5%p 더 높았다. 또한 혈중 총콜레스테롤수치 평균값(만30세이상)은 남자 191.5 mg/dL, 여자 191.0 mg/dL로 비슷한 수준이지만 50대 이후에서 남자보다 여자가 총콜레스테롤수치가 더 높은 수준이며 특히 여자의 경우 50대 전후 유병률 차이가 약 4배 정도로 높았다(그림3-12, 표3-Ⅳ-2,3). 저HDL콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상)은 전체 26.5%, 남자 35.8%, 여자 17.4%로 여자보다 남자가 약 2배 이상 높았고, 혈중 HDL콜레스테롤수치 평균값(만30세이상)은 남자 45.3 mg/dL, 여자 50.4 mg/dL이며 전 연령대에서 여자보다 남자가 더 낮았다(그림3-13, 표3-Ⅳ-6,7). 고중성지방혈증 유병률(만30세이상)은 전체 16.9%, 남자 24.0%, 여자 10.7%로 남자가 13%p이상 더 높았고, 혈중 중성지방수치 평균값(만30세이상)은 남자 168.4 mg/dL, 여자 115.5 mg/dL이며 남자는 40대, 여자는 70세이상에서 유병률이 가장 높았다(그림3-14, 표3-Ⅳ-9,10).

고콜레스테롤혈증 관리현황(만30세이상, 2008-2010)은 인지율 42.2%, 치료율 31.6%, 유병자 중 조절률 24.3%이며, 남녀 모두 60대에서 관리현황 수준이 가장 높았다(표3-Ⅳ-4).

고콜레스테롤혈증 및 저HDL콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 남자의 경우 동지역이 읍면지역보다 높았고(표3-Ⅳ-3,7), 고중성지방혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 남녀 모두에서 소득수준이 낮을수록 높았다(표3-Ⅳ-10).

그림 3-11. 이상지혈증 유병률 추이




※고콜레스테롤혈증 유병률 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율, 만30세이상

※고중성지방혈증 유병률 : 중성지방이 200mg/dL 이상인 분율, 만30세이상

※저HDL콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 HDL콜레스테롤이 40㎎/dL 미만인 분율, 만30세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-12. 연령별 고콜레스테롤혈증 유병률




※고콜레스테롤혈증 유병률 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율, 만30세이상

그림 3-13. 연령별 저HDL콜레스테롤혈증 유병률



※저HDL콜레스테롤혈증 유병률 : HDL콜레스테롤이 40mg/dL 미만인 분율, 만30세이상

그림 3-14. 연령별 고중성지방혈증 유병률



※고중성지방혈증 유병률 : 중성지방이 200mg/dL 이상인 분율, 만30세이상

Ⅴ. 폐쇄성폐질환

폐쇄성폐질환 유병률(만40세이상, 표준화)은 2007년 15.3%, 2008년 13.1%, 2009년 10.5%, 2010년 12.3%였다(표3-Ⅴ-1). 제5기 1차년도(2010) 결과 폐쇄성폐질환 유병률은 만40세이상 13.1%, 만65세이상 31.9%로 연령이 높을수록 유병률이 높았으며, 만40세이상에서 남자 19.6%, 여자 7.0%로 남자가 2배 이상 더 높았고, 만 65세이상에서 남자 51.4%, 여자 18.4%로 3배이상 유병률이 더 높았다(표3-Ⅴ-2).


남성의 폐쇄성폐질환의 주요 위험 요인은 흡연이다.[1] 흡연여부에 따른 남자의 폐쇄성폐질환 유병률(2008~2010, 만40세이상, 표준화)은 비흡연 12.8%, 과거흡연 16.7%, 현재흡연 24.4%로 흡연자의 유병률이 비흡연자보다 높았으며(그림 3-17), 흡연갑년에 따른 유병률(2008~2010, 만40세이상, 표준화)에서도 10갑년미만 14.2%, 10~20갑년 18.8%, 20~30갑년 21.5%, 30갑년이상 22.8%로 흡연갑년이 길수록 유병률이 높았다(그림3-18).

또한 소득수준(만40세이상, 표준화)에 따른 유병률은 하위 15.1%, 중하 13.1%, 중상 10.1%, 상위 11.0%로 소득수준이 낮을수록 유병률이 더 높았다(표3-Ⅴ-2).

참고문헌


1. Zaher C et al. Smoking-related diseases: the importance of COPD. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2004, 8:1423-1428.

그림 3-15. 폐쇄성폐질환 유병률 추이




※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC < 0.7)이 있는 분율, 만40세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-16. 연령별 폐쇄성폐질환 유병률




※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC<0.7)이 있는 분율, 만40세이상

그림 3-17. 흡연여부별 폐쇄성폐질환 유병률(남자)



※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC<0.7)이 있는 분율, 만40세이상
※흡연여부
·비흡연 : 평생 비흡연 또는 담배5갑(100개비)미만 흡연
·현재흡연 : 평생 담배 5갑(100개비)이상 피웠고, 현재 흡연
·과거흡연 : 평생 담배 5갑(100개비)이상 피웠고, 현재 비흡연
※2005년 추계인구로 연령표준화
※2008-2010년 통합 산출

그림 3-18. 흡연갑년별 폐쇄성폐질환 유병률(남자)



※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC<0.7)이 있는 분율, 만40세이상
※갑년(pack-year) : 평생 흡연량을 하루평균 흡연량(갑)x흡연기간(년)으로 계산.
·현재흡연자의 흡연기간 : 만연령-흡연시작연령
※2005년 추계인구로 연령표준화
※2008-2010년 통합 산출

Ⅵ. 구강질환

영구치우식 유병률(만35~44세)은 2007년 38.3%에서 2010년 34.3%로 4%p 감소하였다(표3-Ⅵ-3). 제5기 1차년도(2010) 결과 성인(만19세이상)의 영구치우식 유병률은 전체 33.5%, 남자 37.1%, 여자 30.0%로 남자가 더 높았고(표3-Ⅵ-4), 미국(NHANES 2005-2008, 20-64세) 23.2%에 비해 여전히 높은 수준이었다.[1)] 우식경험영구치지수는 전체 6.6개, 남자 5.7개, 여자 7.5개로 여자가 더 높았다(표3-Ⅵ-2).

치주질환 유병률(만35~44세)은 2007년 33.6%에서 2010년 20.0%로 13.6%p 감소하였고(표3-Ⅵ-6), 영국(2009 Adult Dental Health Survey) 43.0%, 일본(2005 The Survey of Dental Disease) 27.0% 보다 낮은 수준이었다[2,3)]. 제5기 1차년도(2010) 결과 성인(만30세이상)의 치주질환 유병률은 전체 28.9%, 남자 35.1%, 여자 23.0%로 남자가 더 높았고, 동 지역 21.1%, 읍면 지역 35.4%로 지역간 14.3%p 차이가 있었다(표3-Ⅵ-7).

제5기 1차년도(2010) 만65세이상의 현존 자연치아수는 16.0개, 20개 이상 자연치아보유율은 46.9%로 50대 이후 급격히 감소하였고(표3-Ⅵ-8,9), 의치필요자율은 전체 26.1%, 남자 29.5%, 여자 23.7%로 남자가 더 높았다(표3-Ⅵ-10). 저작불편호소율은 2007년 56.1%에서 2010년 44.3%이었고, 남자 42.1%, 여자 45.9%로 여자가 더 높았다(표3-Ⅵ-11).


제5기 1차년도(2010) 성인(만19세이상)의 구강검진율은 21.5%(남자 22.9%, 여자 20.1%)이었고, 소득수준이 가장 높은 군(상위 25%)과 가장 낮은 군(하위 25%)간에 10%p 정도 차이가 있었다(표3-Ⅵ-13).

최근 1년 동안 치과를 가고 싶을 때 가지 못한 비율(만19세이상, 표준화)이 2009년 46.0%에서 2010년 40.1%로 감소하였고, 특히 만65세이상에서 약 10%p 감소하였다(표1-Ⅶ-3). 제5기 1차년도(2010) 결과 성인(만19세이상)은 39.7%(남자 38.7%, 여자 40.8%), 소아청소년(만1-18세)은 25.3%(남자 24.6%, 여자 26.0%)로 병의원 미치료율 성인 20.3%, 소아청소년 7.4% 보다 높았다(표1-Ⅶ-8,9).

참고문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention. Health, United States, 2010. (http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus2010tables/ Table073.pdf) 2011.
2. The NHS Information Centre. Adult Dental Health Survey 2009 - first release. 2010.
3. WHO Oral Health Country/Area Profile Programme.:Periodontal Country Profiles. (http://www.dent.niigata-u.ac.jp/prevent/perio.contents.html)

그림 3-19. 구강질환 유병률 추이




※영구치우식유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분율, 만19세이상

※치주질환 유병률 : 치주조직병치료 이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율, 만19세이상

※저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-20. 연령별 영구치우식 유병률




※영구치우식유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분율, 만19세이상

그림 3-21. 연령별 저작불편호소율



※저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율, 만19세이상

그림 3-22. 연령별 치주질환 유병률



※치주질환 유병률 : 치주조직병치료 이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율, 만19세이상


Ⅶ. B형간염

B형간염표면항원 양성률(만10세이상, 표준화)은 과거 10년간(1998~2010) 영유아 예방 접종, B형간염수직감염예방 사업 등의 실시 효과로 꾸준히 감소하여 1998년 4.6%에서 2010년 2.9%로 감소하였다(표3-Ⅶ-1).

제5기 1차년도(2010) 결과 B형간염 표면항원 양성률(만10세이상)은 전체 3.0%, 남자 2.7%, 여자 3.2% 였으며, 남자는 30~40대, 여자는 50~60대에서 4%이상으로 높았다(그림3-24, 표3-Ⅶ-2).

만19세이상 간암 고위험군(B형간염표면항원 양성 또는 C형 간염, 간경변증을 의사로부터 진단받았다고 응답한 사람) 중 최근 6개월 이내 간암검사수진율(2008-2010년 통합산출)은 전체 12.8%, 남자 14.6%, 여자 10.7%이었으며, 국가 암 조기검진대상인 만40세이상에서는 전체 14.8%로 다른 검사에 비해 낮았으며, 여자의 수진율이 남자보다 더 낮았다(표1-Ⅵ-16).


그림 3-23. B형간염 표면항원 양성률 추이



※B형간염 표면항원 양성률 : B형간염표면항원 양성인 분율, 만10세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-24. 연령별 B형간염 표면항원 양성률



※B형간염 표면항원 양성률 : B형간염표면항원 양성인 분율, 만10세이상


Ⅷ. 빈혈

빈혈 유병률(만10세이상, 표준화)은 남자는 1998년 4.8%에서 2010년 2.4%로 약간 감소하였으며, 여자는 1998년 11.9%에서 2007년 16.5%로 증가하였다가 2008년 12.9%, 2010년 12.5%로 감소하여 전체 유병률은 7~10% 이내 수준을 유지하였다(그림3-25, 표3-Ⅷ-1).

제5기 1차년도(2010) 결과 빈혈 유병률(만10세이상)은 남자 2.4%, 여자 12.6%로 여자가 남자에 비해 약 5배 정도 높았다. 연령별 유병률은 20~40대 여자의 유병률이 10%를 초과하였고 특히 30~40대 여자의 유병률이 각각 16.5%, 16.6%로 높았다. 70세이상 남녀의 유병률은 각각 12.8%, 20.7%로 노인층의 빈혈 유병률이 높았으며, 특히 여성 노인이 높은 수준이었다(그림3-26, 표3-Ⅷ-3).


소득수준에 따른 여자의 빈혈 유병률(만10세이상, 표준화)은 하위 25%, 중하위 25%인 군에서 각각 13.6%, 13.7%이었으며, 상위 25%인 군에서 9.7%로 소득수준이 낮은 경우 유병률이 높았다(표3-Ⅷ-3).

그림 3-25. 빈혈 유병률 추이



※빈혈 유병률 : 혈중 헤모글로빈 농도가 다음 수준에 해당되는 분율, 만10세이상
헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-26. 연령별 빈혈 유병률



※빈혈 유병률 : 혈중 헤모글로빈 농도가 다음 수준에 해당되는 분율, 만10세이상
헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

Ⅸ. 안질환


제5기 1차년도(2010) 결과, 시력장애 유병률(만65세이상)은 전체 4.0%(남자 3.5%, 여자 4.4%)이었다(표3-Ⅸ-1). 근시(만5세이상, 구면렌즈대응치≤-0.75) 유병률은 53.3%(남자 53.8%, 여자 52.7%)이었고, 그 중 고도근시(구면렌즈대응치≤-6.0) 유병률은 6.1%(남자 5.8%, 여자 6.3%)이었다. 원시(구면렌즈대응치≥+1.0)와 난시(실린더값≥0.75) 유병률은 각각 11.2%(남자 9.8%, 여자 12.6%), 58.8%(남자 57.6%, 여자 60.1%)이었다(표3-Ⅸ-2~7).

백내장 유병률(만40세이상)은 40.0%(남자 38.5%, 여자 41.4%)이었으며, 이중 교정시력 0.8미만인 백내장 유병률(만40세이상)은 10.9%(남자 8.2%, 여자 13.3%)이었다(표3-Ⅸ-11). 연령이 높아질수록 유병률이 높아져 65세이상의 유병률은 전체 36.9%, 남자 30.2%, 여자 41.8%로 여자가 남자보다 12%p정도 더 높았다.

나이관련황반변성 유병률(만40세이상)은 초기 6.2%, 후기 0.5%, 습성 0.4%, 건성 0.1%이었다. 초기 나이관련황반변성 또한 연령이 높을수록 유병률이 높아 65세이상에서 16.5%, 남자 13.8%, 여자 18.3%였다(표3-Ⅸ-14).


당뇨망막병증 유병률(만30세이상)은 전체 16.1%, 남자 14.8%, 여자 17.5%이었다(표3-Ⅸ-13).

그림 3-27. 연령별 백내장 유병률(교정시력0.8미만)



※백내장 유병률 : 단안 또는 양안이 백내장이거나 인공수정체안이거나 무수정체안인 분율(최대교정시력 0.8미만), 만40세이상

그림 3-28. 연령별 나이관련황반변성 유병률



※나이관련황반변성 유병률 : 단안 또는 양안의 무산동안저 촬영 결과 나이관련황반변성(초기)이 있는 분율, 만40세이상

X. 이비인후질환


제5기 1차년도(2010) 결과 양측성 난청 유병률(만12세이상)은 전체 3.8%, 남자 4.1%, 여자 3.6%로 연령이 증가할수록 유병률도 증가하여 50대이후 연령이 10세 높아짐에 따라 약 3배씩 증가하여 50대, 60대, 70대 이상에서 각각 2.9%, 9.9%, 28.6%이었다(그림3-29, 표3-X-2,3). 미국의 양측성 난청 유병률(NHANES 1999-2006, 만70세이상, 양측의 0.5, 1, 2, 4kHz 순음청력평균치가 40dB이상)은 26.3%로 우리나라가 높은 수준이었다.[1)]

평형기관이상 유병률(만40세이상)은 전체 3.3%, 남자 2.4%, 여자 4.1%이었으며, 연령이 높아짐에 따라 유병률도 증가하여 만70세이상에서 전체 13.2%로 높았다(그림3-30, 표3-X-4).

비염 유병률(만6세이상)은 전체 27.4%이었고, 연령대별 유병률은 남자 10대, 여자 20대에서 각각 37.1%, 35.4%로 가장 높았다(표3-X-5). 후각장애 유병률(만19세이상)은 전체 4.8%, 남자 4.3%, 여자 5.3%이었으며, 연령과 함께 유병률도 증가하는 경향이었다(표3-X-8).


후두양성점막질환유병률(만19세이상)은 전체 2.4%, 남자 2.5%, 여자 2.4%이었고(표3-X-9), 본인인지 음성장애 유병률(만19세이상)은 전체5.8%, 남자 4.5%, 여자 7.0%로 70대를 제외한 전연령대에서 여자가 남자보다 높았다(표3-X-10).

그림 3-29. 연령별 양측성 난청 유병률



※양측성 난청유병률 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

그림 3-30. 연령별 평형기관이상 유병률



※평형기관이상 유병률 : 어지럼증 검사 미통과(조건1-2 15초미만, 조건3-4 20초 미만)한 분율, 만40세이상

참고문헌

1. Charles F et al. Vision, Hearing, Balance, and Sensory Impairment in Americans aged 70 years and over : United States,1999-2006. NCHS Data Brief. 2010

XI. 골다공증

제5기 1차년도(2010) 결과 골다공증 유병률(만50세이상)은 여자 34.9%, 남자 7.8%로 50세 이상 여자 3명 중 1명은 골다공증을 앓고 있는 것으로 나타났다. 부위별 유병률 비교시 요추의 골다공증 유병률(만50세이상 여자기준)이 28.8%로 가장 높았고 대퇴경부 21.3%, 대퇴골 6.5%의 순이었다(표3-XI-6).

미국(NHANES 2005-2008, 만50세이상 여자)[1]의 요추 골다공증 유병률 및 대퇴경부 골다공증 유병률과 비교시 우리나라의 요추 및 대퇴경부 골다공증 유병률이 3배가량 높은 수준이며(9.9% vs 28.8%, 7.7% vs 21.3%) 대퇴골 골다공증 유병률은 미국(NHANES 2005-2006, 만50세이상 여자)[2]과 유사한 수준이었다.

골밀도는 부위별로 차이가 있어 요추, 대퇴경부, 대퇴골 골밀도 중 대퇴경부 골밀도 수준이 가장 낮았다(그림3-33~34, 표3-XI-3~5). 요추, 대퇴경부, 대퇴골 골밀도는 남녀 모든 연령에서 미국[1,2]보다는 낮았고, 일본(여자만 포함)[3,4]과는 큰 차이가 없었다.


남자의 골밀도는 요추, 대퇴경부, 대퇴골 모두 20대에서 가장 높았고, 여자의 경우 대퇴경부는 20대, 요추는 30대, 대퇴골은 40대에서 골밀도가 가장 높았으며, 남녀 모두 50대부터는 골밀도가 급격히 감소되는 양상을 보였다(그림 3-33~34, 표3-XI-3~5).

소득수준별 골다공증 유병률(만50세이상, 표준화)은 요추의 경우 소득수준이 가장 낮은 군(하위 25%)에서 30.4%, 가장 높은 군(상위 25%)에서 20.8%로 소득수준이 낮은 군에서 10%p정도 유병률이 높았으나, 대퇴경부와 대퇴골에서는 소득수준에 따른 차이가 뚜렷하지 않았다(표3-XI-6).

참고문헌

1. Looker AC et al. Lumbar spine bone mineral density in US adults : demographic patterns and relationship with femur neck skeletal status. Osteoporosis International. 2011 Jul 1(Epub ahead of print).
2. Looker AC et al. Prevalence and trends in low femur bone density among older US adults: NHANES 2005-2006 compared with NHANES III. Journal of Bone and Mineral Research. 2010;25(1):64-71.
3. Iki M et al. Bone minaral density of the spine, hip and distal forearm in representative samples of the Japanese female population: Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study. Osteoporosis International. 2001;12:529-537.
4. Iki M et al. Age-specific reference values of hip geometric indices from a representative samples of the Japanese female population : Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study. Osteoporosis International. 2011;22:1987-96.


그림 3-31. 연령별 골다공증 유병률



※골다공증 유병률 : 폐경 후 여자, 50세이상 남자에서 대퇴경부, 대퇴골, 요추 골밀도 검사결과 가장 낮은 T-score가 -2.5 이하인 분율, 만50세이상

※T-score = (대상자골밀도-최대골밀도)/최대표준편차
최대골밀도 Asia(일본기준, g/cm2): 대퇴경부 남자 0.846 여자 0.803, 대퇴 남자 0.940, 여자 0.851, 요추 남자 1.024, 여자 1.006


그림 3-32. 연령별 요추 골밀도



※만10세이상

※2008-2010년 통합 산출


그림 3-33. 연령별 대퇴경부 골밀도



※만10세이상

※2008-2010년 통합 산출

그림 3-34. 연령별 대퇴골 골밀도



※만10세이상

※2008-2010년 통합 산출


XII. 골관절염

골관절염 유병률(만50세이상)은 남자 5.5%, 여자 22.7%로 여자가 남자에 비해 4배 정도 높았다. 연령별 골관절염 유병률은 남자 50대에서 1.8%, 60대에서 8.1%, 70대에서 10.9%였고, 여자는 50대 9.5%, 60대 25.3%, 70대 41.5%로 여자에서 연령이 높아질수록 유병률은 급격히 증가하였다(그림3-35, 표3-XII-1).

거주지역에 따른 골관절염 유병률(만50세이상, 표준화)은 읍면지역이 18.8%로 동지역 13.1%보다 높은 수준이었다.

미국(NHANES, 1991-1994, 만60세이상)의 골관절염 유병률(무릎 기준) 12.1%(남자 10.0%, 여자 13.6%)[1]와 비교시 우리나라의 유병수준이 더 높았다.

그림 3-35. 연령별 골관절염 유병률



※골관절염 유병률 : 무릎관절 통증이 있고 무릎관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상 또는 엉덩관절 통증이 있고 엉덩관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상인 대상자 분율, 만50세이상

참고문헌

1. Dillon CF et al. Prevalence of knee osteoarthritis in the United States arthritis data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey 1991-94. J Rheumatol. 2006 Nov;33(11):2271-9.

XIII. 중금속

성인의 혈중 납(만20세이상) 수준은 2.24 ㎍/dL (남자 2.66 ㎍/dL, 여자 1.89 ㎍/dL)이었고(그림 3-36, 표3-XIII-1) 혈중 수은(만20세이상) 수준은 남자 4.71 ㎍/L, 여자 3.33 ㎍/L이며 연령별로는 남녀 모두 50대에서 가장 높았다(그림3-37, 표 3-XIII-2). 혈중 카드뮴(만20세이상) 수준은 1.03 ㎍/L(남자 0.95 ㎍/L, 여자 1.12 ㎍/L)이며 남자는 60대 이상, 여자는 50대 이상에서 가장 높았고 남자보다 여자의 수준이 더 높았다(그림 3-38, 표3-XIII-3).


10대의 혈중 납 수준은 1.40 ㎍/dL(남자 1.56 ㎍/dL, 여자 1.24 ㎍/dL), 혈중 수은 수준은 2.22 ㎍/L(남자 2.22 ㎍/L, 여자 2.22 ㎍/L), 혈중 카드뮴 수준은 0.38 ㎍/L(남자 0.38 ㎍/L, 여자 0.38 ㎍/L)로 성인보다 낮은 수준이었다(그림3-36~38, 표 3-XIII-1~3).

미국(NHANES 2007-2008)과 비교 시 성인(만20세이상) 및 12-19세의 경우 혈중 납이 약 2배, 혈중 수은이 약 4배로 높은 수준이며, 혈중 카드뮴은 성인(만20세이상)에서 약 3배 높은 수준[1]이지만 모든 항목에서 시계열 비교 시 감소하는 경향을 보였다.

참고문헌


1. Centers for Disease Control and Prevention. Fourth National report on human exposure to environmental chemicals. 2011.

그림 3-36. 연령별 혈중 납 수준




※만10세이상
※기하평균 값

그림 3-37. 연령별 혈중 수은 수준



※만10세이상
※기하평균 값

그림 3-38. 연령별 혈중 카드뮴 수준



※만10세이상
※기하평균 값

제 4 장 삶의 질

삶의 질

주관적건강인지율(만19세이상, 표준화)은 2010년 남자 40.3%, 여자 32.9%로 2009년에 비해 감소하였다(그림4-1, 표4-1). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 30대에서 가장 높았고, 남녀 모두 소득수준이 높을수록 높았다(그림4-2, 표4-8,9).


EQ-5D 지수(만19세이상, 표준화)는 2010년 남자 0.967, 여자 0.940으로 2009년과 비슷한 수준이었다(표4-3). 연령이 높을수록, 소득수준이 낮을수록, 동지역보다 읍면지역에서 더 낮았다(표4-11). 만성질환 여부에 따른 EQ-5D 지수(만40세이상)는 만성질환(골관절염, 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 양측성 난청)이 없는 군에 비해 있는 군에서 낮았고, 특히 골관절염 유병군이 가장 낮았다(표4-13).

활동제한율(만65세이상)은 2010년 남자 20.9%, 여자 33.2%로 2009년에 비해 감소하였고(그림4-3, 표4-5), 연령이 높을수록, 소득수준이 낮을수록 높았다(그림4-4, 표4-16).

월간와병경험률(만19세이상)은 2010년 남자 5.1%로 여자 10.9% 보다 낮았고, 월간결근결석경험률(만19세이상)도 남자 3.9%로 여자 7.4%보다 낮았다(표4-17).


2주간 이환율(만19세이상)은 2010년 남자 16.4%로 여자 27.9%보다 낮았고, 2주간 이환일수(만19세이상)는 남자 9.1일로 여자 9.8일보다 짧았으며, 연령이 높을수록 이환일수가 길었다(표4-19,20).

그림 4-1. 주관적건강인지율




※주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율, 만19세이상
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 4-2. 연령별 주관적건강인지율




※주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율, 만19세이상

그림 4-3. 활동제한율



※활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율, 만65세이상
※일부연령의 활동제한자 수가 20미만이여서 조율로 제시

그림 4-4. 연령별 활동제한율



※활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율, 만19세이상

제3부 통계표

제 1 장 건 강 행 태

Ⅰ. 흡연
Ⅱ. 음주
Ⅲ. 신체활동
Ⅳ. 우울 및 스트레스
Ⅴ. 손상 및 안전의식
Ⅵ. 건강검진
Ⅶ. 의료이용

표 1-Ⅰ-1. 현재흡연율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,823	35.2 (0.5)	8,069	30.2 (0.6)	7,801	28.8 (0.7)	2,980	25.0 (1.1)	6,797	27.3 (0.7)	7,470	26.6 (0.6)	6,256	26.9 (0.7)
65세이상	1,044	28.7 (1.7)	978	24.7 (1.9)	1,097	17.4 (1.3)	721	14.7 (1.4)	1,511	16.6 (1.3)	1,654	14.0 (1.0)	1,374	13.0 (1.1)
19세이상(표준화)[3]	8,823	35.1 (0.6)	8,069	30.2 (0.6)	7,801	28.8 (0.7)	2,980	25.3 (1.2)	6,797	27.7 (0.7)	7,470	27.2 (0.6)	6,256	27.5 (0.7)
연령(세)														
19-29	1,791	35.2 (1.2)	1,626	30.7 (1.4)	1,336	31.6 (1.4)	339	27.8 (2.9)	892	33.9 (2.0)	1,049	32.4 (1.6)	771	27.8 (1.8)
30-39	2,213	37.7 (1.0)	1,996	32.6 (1.0)	1,741	33.0 (1.4)	635	32.0 (2.1)	1,413	32.4 (1.3)	1,423	32.8 (1.4)	1,254	35.0 (1.7)
40-49	1,804	36.7 (1.0)	1,871	33.6 (1.1)	1,878	30.9 (1.2)	565	27.0 (2.2)	1,328	27.7 (1.4)	1,493	27.5 (1.3)	1,162	30.5 (1.9)
50-59	1,338	34.1 (1.3)	1,117	27.1 (1.4)	1,229	27.2 (1.4)	504	19.3 (2.1)	1,132	22.5 (1.4)	1,246	22.9 (1.5)	1,174	25.1 (1.6)
60-69	1,066	32.8 (1.6)	878	25.0 (1.8)	970	19.6 (1.4)	489	17.0 (2.5)	1,078	18.8 (1.6)	1,204	18.4 (1.4)	1,026	16.1 (1.3)
70+	611	26.6 (2.3)	581	23.6 (2.1)	647	15.9 (1.5)	448	12.8 (1.6)	954	16.0 (1.6)	1,055	13.2 (1.4)	869	12.6 (1.3)
거주지역														
동	5,716	35.0 (0.6)	6,417	29.6 (0.7)	6,237	28.5 (0.8)	2,117	25.2 (1.3)	4,999	27.8 (0.8)	5,553	26.8 (0.7)	4,890	27.0 (0.8)
읍면	3,107	36.1 (0.9)	1,652	32.7 (1.1)	1,564	30.2 (1.4)	863	24.2 (2.7)	1,798	25.1 (1.3)	1,917	26.0 (1.4)	1,366	26.6 (1.8)
소득수준[4]														
하	2,107	38.5 (1.0)	1,703	33.8 (1.3)	1,998	33.1 (1.1)	713	30.8 (2.1)	1,629	32.0 (1.4)	1,864	30.8 (1.1)	1,536	31.8 (1.8)
중하	2,266	34.9 (1.1)	1,846	31.3 (1.0)	1,987	28.8 (1.2)	696	24.9 (2.5)	1,635	28.7 (1.4)	1,859	28.0 (1.2)	1,543	26.2 (1.3)
중상	2,179	35.9 (0.9)	1,999	28.8 (1.0)	1,858	27.7 (1.1)	732	23.5 (1.8)	1,665	26.0 (1.4)	1,815	26.4 (1.3)	1,564	24.6 (1.4)
상	2,271	32.3 (0.9)	2,051	27.5 (1.0)	1,871	25.1 (1.3)	701	21.5 (1.9)	1,655	22.9 (1.3)	1,851	20.9 (1.1)	1,533	24.5 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	5,716	34.4 (0.7)	6,417	29.3 (0.7)	6,237	28.0 (0.7)	2,117	25.3 (1.2)	4,999	27.6 (0.7)	5,553	26.8 (0.7)	4,890	27.0 (0.7)
읍면	3,107	36.5 (0.9)	1,652	33.8 (1.0)	1,564	33.3 (1.3)	863	25.1 (2.9)	1,798	27.7 (2.0)	1,917	28.9 (1.7)	1,366	28.5 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	2,107	38.6 (1.0)	1,703	34.0 (1.3)	1,998	33.0 (1.1)	713	30.7 (2.1)	1,629	32.1 (1.4)	1,864	31.1 (1.2)	1,536	31.8 (1.8)
중하	2,266	34.8 (1.1)	1,846	31.2 (1.0)	1,987	28.9 (1.1)	696	25.0 (2.5)	1,635	29.3 (1.4)	1,859	28.6 (1.2)	1,543	26.6 (1.3)
중상	2,179	35.4 (0.9)	1,999	28.5 (1.1)	1,858	27.7 (1.1)	732	23.6 (1.7)	1,665	26.2 (1.4)	1,815	27.0 (1.3)	1,564	25.3 (1.4)
상	2,271	32.2 (0.9)	2,051	27.4 (0.9)	1,871	25.1 (1.3)	701	22.2 (2.0)	1,655	23.4 (1.3)	1,851	21.6 (1.2)	1,533	25.2 (1.5)
남자														
19세이상	4,110	67.0 (0.9)	3,677	61.3 (1.0)	3,509	52.3 (1.0)	1,241	45.1 (1.9)	2,838	47.7 (1.0)	3,234	46.7 (1.1)	2,704	48.1 (1.2)
65세이상	411	51.8 (3.0)	379	42.0 (3.2)	428	32.5 (2.6)	301	26.2 (3.2)	581	30.0 (2.3)	690	25.9 (1.8)	613	25.5 (1.9)
19세이상(표준화)	4,110	66.3 (0.9)	3,677	60.9 (1.0)	3,509	51.6 (1.0)	1,241	45.0 (1.8)	2,838	47.7 (1.0)	3,234	46.9 (1.1)	2,704	48.3 (1.1)
연령(세)														
19-29	816	70.7 (2.0)	715	64.7 (2.1)	583	55.5 (2.2)	141	47.5 (4.6)	366	53.6 (2.8)	485	51.9 (2.5)	307	47.3 (3.1)
30-39	1,091	71.6 (1.4)	943	67.9 (1.5)	811	60.2 (2.2)	247	58.3 (3.2)	598	56.4 (2.1)	595	56.2 (2.1)	527	60.9 (2.4)
40-49	888	67.9 (1.6)	910	66.7 (1.7)	872	55.2 (1.9)	248	48.8 (3.5)	579	49.1 (2.3)	642	48.9 (2.1)	532	53.6 (2.8)
50-59	616	62.2 (2.1)	522	55.5 (2.6)	579	47.7 (2.2)	205	34.0 (4.0)	489	41.5 (2.5)	542	41.6 (2.6)	481	45.0 (2.7)
60-69	476	58.2 (2.6)	381	49.9 (3.1)	445	38.3 (2.7)	217	31.1 (5.2)	441	34.5 (2.7)	539	33.8 (2.7)	473	30.8 (2.4)
70+	223	50.5 (3.9)	206	33.8 (4.0)	219	27.5 (3.3)	183	23.3 (3.5)	365	27.9 (3.2)	431	23.7 (2.5)	384	24.7 (2.4)
거주지역														
동	2,685	66.8 (1.0)	2,931	60.5 (1.1)	2,794	51.4 (1.2)	868	45.8 (2.2)	2,080	48.1 (1.2)	2,391	46.7 (1.2)	2,109	48.0 (1.2)
읍면	1,425	67.5 (1.4)	746	64.8 (2.4)	715	56.5 (2.1)	373	42.9 (4.0)	758	45.7 (2.1)	843	47.0 (2.4)	595	48.4 (2.7)

1) 현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 현재흡연율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	992	69.4 (1.6)	763	66.5 (2.0)	901	58.7 (1.9)	300	51.8 (3.2)	679	55.6 (2.2)	818	51.2 (1.9)	666	54.5 (2.7)
중하	1,033	67.9 (1.6)	852	64.1 (1.8)	890	52.7 (1.9)	286	45.6 (4.2)	676	49.0 (2.3)	801	50.7 (1.9)	670	48.4 (2.2)
중상	1,046	67.4 (1.5)	920	59.6 (2.0)	830	51.9 (1.7)	307	44.9 (3.3)	707	46.8 (2.1)	772	46.4 (2.2)	677	45.2 (2.3)
상	1,039	63.8 (1.5)	943	54.7 (1.9)	843	45.7 (2.2)	299	38.9 (3.7)	690	40.0 (2.0)	804	38.2 (1.9)	662	43.0 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	2,685	65.2 (1.1)	2,931	59.2 (1.1)	2,794	49.9 (1.1)	868	45.2 (2.0)	2,080	47.4 (1.2)	2,391	46.0 (1.2)	2,109	47.5 (1.2)
읍면	1,425	68.6 (1.3)	746	66.8 (2.2)	715	59.4 (2.0)	373	43.9 (4.2)	758	49.1 (3.0)	843	50.4 (2.7)	595	50.4 (3.2)
소득수준(표준화)														
하	992	69.1 (1.6)	763	66.7 (1.9)	901	57.7 (1.9)	300	50.9 (3.2)	679	55.3 (2.2)	818	51.2 (1.9)	666	54.2 (2.6)
중하	1,033	67.2 (1.6)	852	62.9 (1.7)	890	52.3 (1.7)	286	45.2 (4.1)	676	49.6 (2.3)	801	50.9 (1.9)	670	48.3 (2.2)
중상	1,046	66.2 (1.5)	920	59.1 (1.9)	830	51.2 (1.7)	307	44.9 (3.1)	707	46.4 (2.0)	772	46.4 (2.2)	677	45.8 (2.3)
상	1,039	63.4 (1.6)	943	54.2 (1.9)	843	45.2 (2.2)	299	38.9 (3.6)	690	39.9 (2.0)	804	38.7 (2.0)	662	43.5 (2.2)
여자														
19세이상	4,713	6.6 (0.5)	4,392	5.3 (0.5)	4,292	5.7 (0.5)	1,739	5.3 (0.8)	3,959	7.3 (0.6)	4,236	6.9 (0.5)	3,552	6.1 (0.6)
65세이상	633	14.8 (1.7)	599	13.6 (1.5)	669	7.3 (1.1)	420	7.0 (1.5)	930	7.4 (1.3)	964	5.9 (0.9)	761	4.3 (1.0)
19세이상(표준화)	4,713	6.5 (0.5)	4,392	5.2 (0.4)	4,292	5.7 (0.5)	1,739	5.3 (0.8)	3,959	7.4 (0.6)	4,236	7.1 (0.5)	3,552	6.3 (0.6)
연령(세)														
19-29	975	5.1 (0.8)	911	4.4 (0.9)	753	6.0 (1.1)	198	7.6 (2.3)	526	12.7 (2.1)	564	11.1 (1.5)	464	7.4 (1.6)
30-39	1,122	4.5 (0.7)	1,053	3.6 (0.7)	930	4.4 (0.8)	388	4.4 (1.2)	815	7.1 (1.0)	828	7.9 (1.1)	727	7.6 (1.2)
40-49	916	4.4 (0.8)	961	3.7 (0.8)	1,006	5.7 (0.9)	317	4.5 (1.7)	749	5.7 (0.9)	851	5.5 (1.0)	630	6.6 (1.2)
50-59	722	7.2 (1.3)	595	4.0 (1.0)	650	6.7 (1.2)	299	4.6 (1.4)	643	3.4 (0.8)	704	4.1 (0.8)	693	5.2 (1.5)
60-69	590	12.0 (1.5)	497	6.2 (1.2)	525	3.5 (0.9)	272	4.6 (1.6)	637	4.7 (1.1)	665	4.5 (1.0)	553	2.9 (0.7)
70+	388	14.5 (2.1)	375	18.0 (2.0)	428	9.3 (1.4)	265	6.6 (1.5)	589	8.7 (1.7)	624	6.8 (1.3)	485	5.0 (1.3)
거주지역														
동	3,031	6.0 (0.6)	3,486	4.9 (0.5)	3,443	5.9 (0.5)	1,249	5.4 (0.9)	2,919	7.8 (0.7)	3,162	7.2 (0.6)	2,781	6.3 (0.7)
읍면	1,682	8.6 (0.9)	906	7.0 (1.0)	849	5.0 (0.9)	490	5.1 (1.6)	1,040	5.0 (1.0)	1,074	5.3 (0.7)	771	5.6 (1.4)
소득수준														
하	1,115	10.2 (1.1)	940	8.2 (1.0)	1,097	8.5 (1.1)	413	10.0 (2.6)	950	8.7 (1.1)	1,046	10.2 (1.2)	870	10.2 (1.2)
중하	1,233	6.0 (0.9)	994	4.2 (0.7)	1,097	5.4 (0.7)	410	6.1 (1.4)	959	9.3 (1.2)	1,058	6.0 (0.8)	873	4.3 (0.8)
중상	1,133	5.6 (0.7)	1,079	3.5 (0.9)	1,028	4.3 (0.9)	425	1.7 (0.6)	958	5.0 (1.0)	1,043	6.9 (0.9)	887	4.6 (1.1)
상	1,232	5.2 (0.7)	1,108	5.4 (0.9)	1,028	4.8 (0.8)	402	3.3 (1.0)	965	6.0 (1.0)	1,047	4.0 (0.7)	871	5.1 (1.1)
거주지역(표준화)														
동	3,031	6.3 (0.6)	3,486	5.1 (0.5)	3,443	5.9 (0.5)	1,249	5.4 (0.9)	2,919	7.8 (0.7)	3,162	7.4 (0.6)	2,781	6.4 (0.7)
읍면	1,682	6.3 (0.8)	906	4.4 (0.7)	849	5.0 (1.1)	490	4.8 (1.8)	1,040	4.0 (0.8)	1,074	5.1 (0.8)	771	5.1 (1.4)
소득수준(표준화)														
하	1,115	10.0 (1.1)	940	7.6 (0.9)	1,097	8.5 (1.1)	413	9.9 (2.6)	950	8.9 (1.1)	1,046	10.3 (1.2)	870	10.3 (1.2)
중하	1,233	6.1 (0.9)	994	4.1 (0.6)	1,097	5.3 (0.7)	410	6.1 (1.4)	959	9.5 (1.2)	1,058	6.3 (0.9)	873	4.6 (0.9)
중상	1,133	5.6 (0.7)	1,079	3.6 (0.9)	1,028	4.2 (0.8)	425	1.6 (0.6)	958	5.1 (1.0)	1,043	7.0 (1.0)	887	4.9 (1.2)
상	1,232	5.1 (0.7)	1,108	5.5 (0.9)	1,028	4.8 (0.8)	402	3.1 (1.0)	965	6.3 (1.0)	1,047	4.3 (0.8)	871	5.3 (1.2)

표 1-1-2. 평생흡연자의 흡연시작연령[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : 세)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
전체														
19세이상	3,057	21.7 (0.1)	3,154	21.8 (0.1)	3,177	20.6 (0.1)	1,084	19.7 (0.2)	2,639	19.9 (0.1)	2,939	20.1 (0.1)	2,462	20.2 (0.2)
65세이상	322	27.1 (0.7)	406	26.6 (0.4)	458	24.7 (0.5)	284	24.6 (0.7)	582	24.5 (0.5)	666	23.9 (0.5)	572	23.8 (0.6)
19세이상(표준화)[3]	3,057	22.0 (0.1)	3,154	21.6 (0.1)	3,177	20.6 (0.1)	1,084	19.7 (0.2)	2,639	19.8 (0.1)	2,939	19.9 (0.1)	2,462	20.0 (0.1)
연령(세)														
19-29	625	19.2 (0.1)	565	19.0 (0.1)	454	18.1 (0.1)	109	17.4 (0.3)	321	17.4 (0.1)	396	17.5 (0.1)	242	17.9 (0.2)
30-39	831	20.3 (0.1)	810	20.2 (0.1)	720	19.5 (0.1)	225	18.3 (0.2)	577	18.9 (0.1)	577	18.9 (0.1)	514	18.8 (0.1)
40-49	635	21.8 (0.2)	778	21.4 (0.2)	803	20.7 (0.2)	214	19.2 (0.3)	522	19.7 (0.2)	587	20.3 (0.2)	483	20.1 (0.2)
50-59	428	23.5 (0.4)	427	23.1 (0.3)	539	22.0 (0.3)	173	21.0 (0.5)	435	20.2 (0.3)	467	21.1 (0.3)	432	21.1 (0.4)
60-69	359	26.0 (0.6)	332	24.9 (0.5)	385	22.7 (0.4)	182	23.7 (0.7)	406	22.9 (0.5)	480	22.0 (0.3)	426	21.7 (0.4)
70+	179	27.6 (1.2)	242	27.4 (0.7)	276	25.9 (0.8)	181	24.3 (0.9)	378	25.2 (0.6)	432	24.8 (0.6)	365	25.0 (0.8)
거주지역														
동	1,968	21.4 (0.2)	2,483	21.4 (0.1)	2,514	20.5 (0.1)	773	19.8 (0.2)	1,980	19.7 (0.1)	2,186	20.0 (0.1)	1,913	20.0 (0.2)
읍면	1,089	22.9 (0.3)	671	23.2 (0.5)	663	21.2 (0.3)	311	19.5 (0.5)	659	21.0 (0.4)	753	20.7 (0.3)	549	20.6 (0.4)
소득수준[4]														
하	793	22.0 (0.3)	707	22.8 (0.3)	870	20.7 (0.2)	274	19.2 (0.3)	669	20.1 (0.2)	791	20.3 (0.3)	635	20.5 (0.3)
중하	773	21.5 (0.2)	716	21.2 (0.2)	818	20.8 (0.2)	255	19.9 (0.4)	663	20.0 (0.2)	752	19.9 (0.2)	627	19.8 (0.2)
중상	772	21.7 (0.2)	780	21.6 (0.2)	744	20.7 (0.3)	263	20.0 (0.3)	632	19.6 (0.2)	700	20.1 (0.2)	600	20.3 (0.3)
상	719	21.8 (0.2)	769	21.6 (0.2)	704	20.3 (0.2)	244	19.7 (0.5)	592	20.1 (0.3)	662	20.2 (0.2)	571	20.0 (0.3)
거주지역(표준화)														
동	1,968	21.9 (0.2)	2,483	21.5 (0.1)	2,514	20.6 (0.1)	773	19.8 (0.2)	1,980	19.8 (0.1)	2,186	20.0 (0.1)	1,913	20.0 (0.1)
읍면	1,089	22.1 (0.2)	671	21.8 (0.3)	663	20.6 (0.2)	311	19.1 (0.3)	659	20.0 (0.3)	753	20.0 (0.2)	549	20.0 (0.3)
소득수준(표준화)														
하	793	22.0 (0.3)	707	22.2 (0.2)	870	20.7 (0.2)	274	19.2 (0.3)	669	20.0 (0.2)	791	20.2 (0.2)	635	20.3 (0.3)
중하	773	21.9 (0.3)	716	21.3 (0.2)	818	20.6 (0.2)	255	19.8 (0.3)	663	19.9 (0.2)	752	19.7 (0.2)	627	19.6 (0.2)
중상	772	22.1 (0.2)	780	21.4 (0.2)	744	20.6 (0.2)	263	19.9 (0.3)	632	19.5 (0.2)	700	19.9 (0.2)	600	20.1 (0.2)
상	719	22.0 (0.2)	769	21.7 (0.2)	704	20.3 (0.2)	244	19.6 (0.4)	592	19.9 (0.2)	662	20.0 (0.2)	571	19.8 (0.3)
남자														
19세이상	2,740	20.6 (0.1)	2,871	20.7 (0.1)	2,814	19.7 (0.1)	942	19.1 (0.2)	2,234	19.2 (0.1)	2,501	19.3 (0.1)	2,138	19.5 (0.1)
65세이상	219	21.9 (0.4)	307	22.4 (0.4)	357	20.9 (0.3)	238	22.0 (0.6)	465	21.8 (0.4)	563	21.2 (0.3)	510	21.6 (0.4)
19세이상(표준화)	2,740	20.8 (0.1)	2,871	20.6 (0.1)	2,814	19.6 (0.1)	942	19.0 (0.1)	2,234	19.1 (0.1)	2,501	19.1 (0.1)	2,138	19.3 (0.1)
연령(세)														
19-29	577	19.2 (0.1)	507	19.0 (0.1)	385	18.1 (0.1)	86	17.3 (0.3)	229	17.5 (0.2)	296	17.4 (0.2)	172	17.9 (0.2)
30-39	783	20.0 (0.1)	763	19.8 (0.1)	664	19.2 (0.1)	195	18.2 (0.3)	483	18.6 (0.1)	464	18.6 (0.1)	427	18.5 (0.1)
40-49	597	21.2 (0.2)	743	20.8 (0.2)	735	19.9 (0.2)	197	18.7 (0.2)	472	19.2 (0.2)	529	19.5 (0.2)	428	19.4 (0.2)
50-59	383	22.0 (0.3)	400	22.3 (0.3)	485	20.6 (0.2)	156	19.9 (0.3)	403	19.5 (0.2)	424	20.0 (0.2)	401	20.1 (0.3)
60-69	285	22.7 (0.4)	296	22.8 (0.4)	357	21.5 (0.4)	162	22.3 (0.4)	356	21.1 (0.3)	435	20.8 (0.3)	392	20.8 (0.3)
70+	115	21.4 (0.6)	162	21.6 (0.5)	188	20.8 (0.4)	146	21.4 (0.7)	291	22.0 (0.6)	353	21.4 (0.4)	318	22.0 (0.5)
거주지역														
동	1,791	20.6 (0.1)	2,277	20.6 (0.1)	2,214	19.5 (0.1)	667	19.1 (0.2)	1,650	19.0 (0.1)	1,825	19.1 (0.1)	1,647	19.4 (0.1)
읍면	949	20.9 (0.2)	594	21.0 (0.3)	600	20.2 (0.2)	275	18.8 (0.4)	584	19.9 (0.2)	676	19.9 (0.2)	491	19.6 (0.2)

1) 평생흡연자의 흡연시작연령(세) : 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이

2) '98년 : 현재흡연자 중 평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이, 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 평생흡연자의 흡연시작연령 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
소득수준														
하	679	20.4 (0.2)	616	21.0 (0.2)	737	19.6 (0.1)	227	18.6 (0.3)	554	19.2 (0.2)	643	19.2 (0.2)	523	19.4 (0.2)
중하	699	20.6 (0.1)	663	20.3 (0.2)	722	19.7 (0.2)	221	18.9 (0.3)	546	19.2 (0.2)	639	19.3 (0.2)	545	19.4 (0.2)
중상	706	20.7 (0.1)	733	20.8 (0.2)	669	19.8 (0.2)	236	19.6 (0.3)	558	19.0 (0.2)	593	19.2 (0.2)	536	19.8 (0.2)
상	656	20.9 (0.2)	697	20.8 (0.2)	646	19.6 (0.1)	216	18.9 (0.4)	511	19.4 (0.2)	596	19.5 (0.2)	510	19.3 (0.2)
거주지역(표준화)														
동	1,791	20.8 (0.1)	2,277	20.6 (0.1)	2,214	19.6 (0.1)	667	19.1 (0.2)	1,650	19.0 (0.1)	1,825	19.1 (0.1)	1,647	19.3 (0.1)
읍면	949	20.7 (0.1)	594	20.6 (0.2)	600	20.0 (0.2)	275	- -[5]	584	19.3 (0.2)	676	19.5 (0.2)	491	19.3 (0.2)
소득수준(표준화)														
하	679	20.5 (0.2)	616	20.8 (0.2)	737	19.5 (0.1)	227	- -	554	19.2 (0.2)	643	19.1 (0.2)	523	19.3 (0.2)
중하	699	20.7 (0.2)	663	20.3 (0.1)	722	19.6 (0.2)	221	18.8 (0.2)	546	19.1 (0.2)	639	19.1 (0.1)	545	19.2 (0.2)
중상	706	20.8 (0.2)	733	20.6 (0.2)	669	19.8 (0.2)	236	19.6 (0.3)	558	19.0 (0.2)	593	19.0 (0.1)	536	19.6 (0.2)
상	656	21.0 (0.2)	697	20.9 (0.2)	646	19.5 (0.1)	216	18.9 (0.3)	511	19.2 (0.2)	596	19.3 (0.2)	510	19.1 (0.2)
여자														
19세이상	317	31.6 (0.8)	283	31.7 (0.8)	363	29.2 (0.7)	142	25.0 (0.9)	405	25.0 (0.7)	438	25.5 (0.6)	324	24.9 (0.7)
65세이상	103	38.1 (1.8)	99	40.1 (1.4)	101	38.7 (1.4)	46	35.0 (1.7)	117	35.4 (1.4)	103	36.4 (1.5)	62	38.4 (2.0)
19세이상(표준화)	317	29.4 (0.4)	283	29.9 (0.5)	363	28.0 (0.4)	142	- -	405	26.0 (0.5)	438	26.5 (0.5)	324	25.5 (0.4)
연령(세)														
19-29	48	19.1 (0.4)	58	19.0 (0.4)	69	18.1 (0.4)	23	17.9 (0.6)	92	17.3 (0.3)	100	17.9 (0.3)	70	18.0 (0.3)
30-39	48	25.4 (0.7)	47	25.7 (0.8)	56	23.2 (0.8)	30	19.0 (0.6)	94	21.5 (0.5)	113	20.6 (0.3)	87	20.6 (0.4)
40-49	38	31.5 (1.1)	35	33.7 (1.1)	68	30.1 (1.1)	17	- -[6]	50	27.0 (1.4)	58	29.0 (1.2)	55	26.0 (1.0)
50-59	45	36.0 (1.3)	27	34.6 (1.9)	54	35.8 (1.2)	17	- -	32	31.9 (2.1)	43	35.4 (1.8)	31	33.1 (2.4)
60-69	74	39.3 (1.2)	36	42.1 (2.0)	28	38.5 (1.9)	20	35.5 (2.4)	50	39.5 (1.9)	45	34.9 (1.7)	34	32.5 (2.2)
70+	64	38.5 (2.4)	80	38.9 (1.6)	88	38.3 (1.5)	35	33.9 (2.0)	87	34.7 (1.4)	79	36.4 (1.8)	47	39.0 (2.3)
거주지역														
동	177	29.6 (1.1)	206	29.2 (0.7)	300	28.8 (0.7)	106	24.9 (1.0)	330	24.1 (0.7)	361	25.1 (0.7)	266	24.0 (0.7)
읍면	140	36.6 (1.1)	77	39.9 (1.9)	63	31.3 (1.9)	36	25.4 (2.6)	75	31.9 (2.1)	77	27.7 (1.7)	58	29.1 (1.7)
소득수준														
하	114	31.9 (1.2)	91	34.1 (1.3)	133	27.6 (0.9)	47	22.0 (1.1)	115	24.9 (1.0)	148	26.0 (1.2)	112	25.8 (1.1)
중하	74	30.1 (1.9)	53	31.5 (1.7)	96	30.7 (1.4)	34	26.8 (1.9)	117	24.5 (1.0)	113	23.7 (0.9)	82	22.8 (1.0)
중상	66	33.5 (1.7)	47	33.4 (2.0)	75	30.1 (1.5)	27	25.1 (2.5)	74	24.9 (1.5)	107	26.2 (1.2)	64	24.9 (1.5)
상	63	31.2 (1.5)	72	28.2 (1.4)	58	28.8 (1.8)	28	27.9 (2.3)	81	26.0 (1.5)	66	26.5 (1.5)	61	26.2 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	177	- -	206	- -	300	28.2 (0.4)	106	- -	330	26.0 (0.6)	361	26.5 (0.6)	266	25.4 (0.5)
읍면	140	- -	77	- -	63	- -	36	- -	75	- -	77	- -	58	- -
소득수준(표준화)														
하	114	- -	91	- -	133	- -	47	- -	115	- -	148	- -	112	- -
중하	74	- -	53	- -	96	- -	34	- -	117	- -	113	- -	82	- -
중상	66	- -	47	- -	75	- -	27	- -	74	- -	107	- -	64	- -
상	63	- -	72	- -	58	- -	28	- -	81	- -	66	- -	61	- -

표 1-I-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : 개비)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
전체														
19세이상	2,912	17.5 (0.2)	2,455	15.7 (0.2)	2,053	15.3 (0.2)	588	16.3 (0.4)	1,509	15.9 (0.3)	1,661	15.6 (0.2)	1,335	15.4 (0.3)
65세이상	305	14.8 (0.6)	232	13.8 (0.6)	203	11.9 (0.6)	110	12.5 (0.8)	226	12.3 (0.8)	224	12.8 (0.7)	181	14.2 (0.8)
19세이상(표준화)[3]	2,912	17.5 (0.2)	2,455	15.5 (0.2)	2,053	15.2 (0.2)	588	16.1 (0.4)	1,509	15.9 (0.3)	1,661	15.5 (0.2)	1,335	15.2 (0.3)
연령(세)														
19-29	610	15.1 (0.4)	503	13.0 (0.3)	366	13.1 (0.4)	77	13.1 (0.9)	255	13.6 (0.6)	308	12.1 (0.4)	180	12.3 (0.6)
30-39	779	18.1 (0.3)	680	16.4 (0.3)	525	15.5 (0.4)	156	16.8 (0.8)	390	15.6 (0.5)	397	15.4 (0.4)	351	14.6 (0.5)
40-49	599	19.7 (0.5)	623	17.1 (0.4)	537	16.9 (0.5)	131	19.2 (0.9)	330	17.8 (0.6)	358	18.3 (0.5)	316	17.2 (0.6)
50-59	410	18.4 (0.5)	308	16.6 (0.5)	322	17.0 (0.6)	84	18.0 (1.1)	219	19.5 (0.8)	255	18.5 (0.6)	220	18.5 (0.6)
60-69	346	17.1 (0.5)	210	16.2 (0.8)	191	16.5 (0.8)	75	14.9 (1.1)	175	15.2 (0.8)	205	16.4 (0.6)	157	15.1 (0.8)
70+	168	13.7 (0.8)	131	13.0 (0.8)	112	10.0 (0.7)	65	11.7 (1.1)	140	11.5 (0.8)	138	11.1 (0.7)	111	13.8 (1.0)
거주지역														
동	1,868	17.7 (0.3)	1,912	15.5 (0.2)	1,625	15.1 (0.2)	423	16.1 (0.5)	1,148	15.4 (0.3)	1,255	15.2 (0.3)	1,046	15.2 (0.3)
읍면	1,044	17.0 (0.3)	543	16.6 (0.4)	428	15.8 (0.5)	165	17.0 (0.8)	361	18.1 (0.8)	406	17.0 (0.5)	289	16.4 (0.8)
소득수준[4]														
하	763	18.1 (0.4)	574	15.8 (0.4)	613	14.8 (0.4)	178	16.3 (1.0)	427	16.5 (0.5)	482	15.8 (0.4)	401	15.1 (0.6)
중하	732	17.2 (0.3)	579	15.4 (0.3)	533	15.1 (0.4)	137	16.4 (1.0)	396	15.7 (0.5)	439	15.9 (0.5)	334	16.0 (0.5)
중상	738	17.3 (0.4)	582	16.0 (0.4)	458	16.6 (0.5)	133	16.5 (0.7)	334	16.0 (0.7)	378	15.6 (0.4)	300	14.6 (0.7)
상	679	17.6 (0.4)	574	15.5 (0.4)	421	14.6 (0.5)	117	16.3 (0.9)	307	15.1 (0.5)	337	14.7 (0.5)	284	16.0 (0.6)
거주지역(표준화)														
동	1,868	17.6 (0.3)	1,912	15.3 (0.2)	1,625	15.0 (0.2)	423	15.8 (0.5)	1,148	15.4 (0.3)	1,255	15.2 (0.3)	1,046	15.1 (0.2)
읍면	1,044	17.3 (0.3)	543	16.7 (0.4)	428	16.1 (0.5)	165	- -[5]	361	18.0 (0.9)	406	16.7 (0.5)	289	- -
소득수준(표준화)														
하	763	18.0 (0.4)	574	15.6 (0.3)	613	14.6 (0.4)	178	16.1 (0.9)	427	16.2 (0.5)	482	15.7 (0.4)	401	14.8 (0.5)
중하	732	17.1 (0.3)	579	15.4 (0.3)	533	14.8 (0.4)	137	- -	396	15.8 (0.5)	439	15.8 (0.5)	334	15.6 (0.5)
중상	738	17.3 (0.4)	582	15.6 (0.4)	458	16.5 (0.4)	133	- -	334	16.0 (0.6)	378	15.5 (0.4)	300	14.7 (0.6)
상	679	17.4 (0.4)	574	15.3 (0.4)	421	14.8 (0.5)	117	- -	307	15.1 (0.5)	337	14.7 (0.4)	284	16.0 (0.6)
남자														
19세이상	2,629	18.0 (0.2)	2,230	16.2 (0.2)	1,813	15.9 (0.2)	515	17.2 (0.5)	1,261	16.7 (0.3)	1,398	16.4 (0.3)	1,156	16.2 (0.3)
65세이상	210	16.0 (0.8)	151	15.3 (0.8)	150	12.9 (0.7)	87	13.4 (1.0)	166	13.5 (0.9)	173	13.9 (0.8)	148	15.3 (0.9)
19세이상(표준화)	2,629	17.9 (0.2)	2,230	16.1 (0.2)	1,813	15.8 (0.2)	515	16.8 (0.4)	1,261	16.6 (0.3)	1,398	16.2 (0.3)	1,156	16.0 (0.3)
연령(세)														
19-29	565	15.4 (0.4)	465	13.3 (0.4)	325	13.5 (0.5)	65	13.9 (1.0)	194	14.3 (0.6)	245	12.8 (0.4)	143	12.9 (0.7)
30-39	740	18.4 (0.3)	643	16.7 (0.3)	484	16.0 (0.4)	140	17.4 (0.8)	340	16.1 (0.5)	337	16.1 (0.5)	310	15.2 (0.5)
40-49	567	20.1 (0.5)	592	17.5 (0.4)	484	17.6 (0.5)	122	20.3 (0.8)	288	18.7 (0.7)	316	19.0 (0.5)	277	18.3 (0.7)
50-59	370	18.8 (0.6)	285	17.1 (0.5)	280	17.8 (0.6)	74	18.3 (1.2)	196	20.1 (0.8)	225	19.2 (0.6)	199	19.5 (0.6)
60-69	277	18.3 (0.5)	179	17.1 (0.8)	172	17.0 (0.9)	66	15.7 (1.1)	146	15.8 (0.9)	175	16.7 (0.7)	139	15.5 (0.9)
70+	110	14.7 (1.0)	66	14.9 (1.1)	68	11.0 (0.8)	48	11.9 (1.4)	97	12.7 (1.0)	100	12.4 (0.7)	88	15.0 (1.1)
거주지역														
동	1,710	18.1 (0.3)	1,753	16.0 (0.2)	1,424	15.8 (0.2)	369	17.0 (0.5)	947	16.2 (0.3)	1,044	16.1 (0.3)	901	16.0 (0.3)
읍면	919	17.8 (0.3)	477	17.3 (0.4)	389	16.5 (0.5)	146	17.8 (0.8)	314	19.1 (0.9)	354	17.7 (0.6)	255	17.2 (0.9)

1) 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 하루평균흡연량, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
소득수준														
하	661	18.8 (0.4)	499	16.7 (0.4)	519	15.8 (0.4)	150	17.9 (0.9)	354	17.1 (0.6)	384	16.9 (0.5)	328	16.3 (0.6)
중하	667	17.8 (0.3)	538	15.7 (0.3)	472	15.8 (0.4)	118	17.5 (1.1)	318	16.7 (0.6)	376	16.7 (0.6)	296	16.6 (0.5)
중상	680	17.6 (0.4)	544	16.6 (0.4)	414	17.1 (0.5)	123	16.6 (0.7)	296	16.8 (0.7)	318	16.5 (0.5)	267	15.2 (0.7)
상	621	18.0 (0.4)	519	15.8 (0.4)	380	15.1 (0.5)	105	17.0 (0.9)	259	15.9 (0.6)	299	15.2 (0.5)	251	16.8 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	1,710	18.0 (0.3)	1,753	15.9 (0.2)	1,424	15.6 (0.3)	369	- -	947	16.1 (0.3)	1,044	16.0 (0.3)	901	15.9 (0.3)
읍면	919	17.8 (0.3)	477	17.2 (0.4)	389	16.6 (0.6)	146	- -	314	18.8 (1.0)	354	17.2 (0.5)	255	- -
소득수준(표준화)														
하	661	18.7 (0.4)	499	- -	519	- -	150	- -	354	16.9 (0.5)	384	16.6 (0.4)	328	15.9 (0.5)
중하	667	17.6 (0.4)	538	- -	472	- -	118	- -	318	16.7 (0.5)	376	16.4 (0.5)	296	16.2 (0.5)
중상	680	17.6 (0.4)	544	- -	414	- -	123	- -	296	16.7 (0.6)	318	- -	267	- -
상	621	17.9 (0.5)	519	- -	380	- -	105	- -	259	- -	299	15.1 (0.5)	251	- -
여자														
19세이상	283	12.7 (0.6)	225	10.6 (0.6)	240	9.3 (0.5)	73	9.4 (0.8)	248	10.5 (0.6)	263	10.0 (0.5)	179	9.1 (0.4)
65세이상	95	12.1 (0.8)	81	10.8 (0.9)	53	8.9 (1.3)	23	10.1 (1.4)	60	9.2 (1.0)	51	9.3 (1.1)	33	9.9 (0.9)
19세이상(표준화)	283	12.9 (0.7)	225	10.5 (0.6)	240	- -	73	- -	248	10.8 (0.6)	263	10.4 (0.6)	179	- -
연령(세)														
19-29	45	11.3 (1.1)	38	9.1 (1.2)	41	9.0 (1.1)	12	- -[6)]	61	10.1 (1.1)	63	8.4 (0.6)	37	8.7 (0.8)
30-39	39	13.9 (1.4)	37	10.8 (1.2)	41	7.0 (0.7)	16	- -	50	11.6 (1.5)	60	9.6 (0.8)	41	8.9 (1.0)
40-49	32	12.6 (1.6)	31	11.2 (1.4)	53	9.8 (1.1)	9	- -	42	9.5 (1.3)	42	12.0 (1.4)	39	8.2 (0.8)
50-59	40	15.1 (2.5)	23	10.4 (1.3)	42	11.5 (1.4)	10	- -	23	12.9 (1.8)	30	10.7 (1.7)	21	10.3 (1.1)
60-69	69	12.4 (1.0)	31	11.1 (1.9)	19	- -	9	- -	29	11.3 (1.5)	30	14.6 (1.8)	18	- -
70+	58	11.7 (1.2)	65	11.1 (0.9)	44	8.3 (1.3)	17	- -	43	9.4 (1.1)	38	8.4 (1.1)	23	10.3 (1.2)
거주지역														
동	158	13.3 (0.8)	159	10.4 (0.6)	201	9.3 (0.5)	54	9.4 (0.9)	201	10.7 (0.7)	211	9.8 (0.6)	145	9.0 (0.5)
읍면	125	11.5 (0.9)	66	11.5 (1.4)	39	9.1 (1.1)	19	- -	47	8.9 (0.8)	52	11.2 (1.0)	34	9.7 (1.0)
소득수준														
하	102	13.2 (1.1)	75	10.3 (1.0)	94	8.6 (0.6)	28	8.4 (1.2)	73	12.3 (1.3)	98	10.5 (0.8)	73	9.3 (0.6)
중하	65	11.2 (0.9)	41	11.0 (1.2)	61	8.4 (0.8)	19	- -	78	10.4 (1.0)	63	9.8 (0.7)	38	8.7 (1.0)
중상	58	13.6 (1.0)	38	7.8 (0.8)	44	10.8 (1.2)	10	- -	38	8.4 (0.8)	60	9.6 (1.1)	33	9.2 (1.2)
상	58	12.8 (1.7)	55	12.3 (1.4)	41	10.3 (1.5)	12	- -	48	10.1 (1.3)	38	9.6 (1.4)	33	8.4 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	158	- -	159	- -	201	- -	54	- -	201	- -	211	- -	145	- -
읍면	125	- -	66	- -	39	- -	19	- -	47	- -	52	- -	34	- -
소득수준(표준화)														
하	102	- -	75	- -	94	- -	28	- -	73	- -	98	- -	73	- -
중하	65	- -	41	- -	61	- -	19	- -	78	- -	63	- -	38	- -
중상	58	- -	38	- -	44	- -	10	- -	38	- -	60	- -	33	- -
상	58	- -	55	- -	41	- -	12	- -	48	- -	38	- -	33	- -

표 1-I-4. 현재흡연자의 금연시도율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	2,474	47.4 (1.2)	2,054	60.8 (1.1)	587	60.8 (2.5)	1,499	57.3 (1.5)	1,661	57.9 (1.5)	1,332	54.6 (1.8)
65세이상	-	- -	232	36.1 (3.8)	203	52.2 (4.4)	110	61.6 (5.4)	224	52.1 (4.2)	224	42.8 (4.0)	181	56.1 (4.7)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	2,474	47.2 (1.2)	2,054	59.9 (1.1)	587	60.7 (2.4)	1,499	56.6 (1.5)	1,661	57.2 (1.5)	1,332	54.4 (1.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	506	53.6 (2.6)	366	71.2 (2.5)	77	71.2 (5.8)	252	61.9 (3.5)	308	63.1 (3.4)	180	58.5 (4.9)
30-39	-	- -	681	49.3 (2.1)	525	63.6 (2.1)	156	61.6 (3.9)	388	58.1 (2.6)	397	59.3 (2.7)	349	57.1 (2.9)
40-49	-	- -	636	47.3 (2.1)	538	57.8 (2.2)	129	52.7 (5.1)	328	59.8 (2.8)	358	55.2 (2.5)	316	52.1 (3.5)
50-59	-	- -	308	42.6 (3.1)	322	48.5 (2.9)	85	55.8 (6.0)	218	50.2 (3.7)	255	57.8 (4.1)	220	51.8 (3.6)
60-69	-	- -	213	43.0 (3.3)	191	54.2 (4.2)	75	56.4 (5.5)	174	49.8 (5.0)	205	52.0 (4.3)	156	43.6 (5.1)
70+	-	- -	130	34.9 (4.8)	112	49.3 (5.3)	65	64.6 (7.5)	139	47.0 (5.2)	138	44.0 (5.2)	111	59.8 (5.4)
거주지역														
동	-	- -	1,929	48.2 (1.3)	1,626	60.8 (1.2)	422	61.8 (3.0)	1,140	58.0 (1.7)	1,255	58.0 (1.7)	1,043	55.4 (1.9)
읍면	-	- -	545	44.2 (2.7)	428	60.9 (2.3)	165	56.9 (4.0)	359	53.8 (3.1)	406	57.2 (3.1)	289	51.6 (4.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	582	44.6 (2.4)	613	59.8 (2.2)	176	58.3 (4.4)	423	59.4 (2.9)	482	55.3 (2.5)	401	54.6 (3.0)
중하	-	- -	582	53.4 (2.0)	533	61.5 (2.3)	137	56.4 (4.2)	395	56.7 (2.6)	439	58.4 (2.8)	333	54.4 (3.3)
중상	-	- -	587	46.3 (2.3)	459	59.1 (2.2)	133	65.3 (5.4)	331	56.1 (3.3)	378	56.8 (2.9)	298	55.6 (3.3)
상	-	- -	574	47.3 (2.3)	421	62.6 (2.8)	118	64.7 (5.4)	305	58.2 (3.4)	337	62.9 (3.1)	284	53.8 (3.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	1,929	47.8 (1.4)	1,626	59.7 (1.3)	422	62.9 (2.8)	1,140	57.0 (1.6)	1,255	57.0 (1.8)	1,043	55.5 (2.0)
읍면	-	- -	545	46.8 (2.6)	428	61.3 (2.1)	165	- -[4]	359	57.0 (3.4)	406	59.7 (3.0)	289	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	582	44.8 (2.4)	613	59.3 (2.2)	176	57.5 (4.2)	423	58.9 (2.8)	482	54.7 (2.4)	401	52.7 (3.0)
중하	-	- -	582	52.7 (2.1)	533	60.6 (2.3)	137	- -	395	55.8 (2.6)	439	58.2 (2.8)	333	54.6 (3.2)
중상	-	- -	587	45.2 (2.2)	459	58.2 (2.2)	133	- -	331	54.9 (3.2)	378	55.6 (2.8)	298	55.6 (3.4)
상	-	- -	574	47.7 (2.4)	421	61.8 (2.7)	118	- -	305	57.6 (3.3)	337	61.9 (3.0)	284	54.2 (3.2)
남자														
19세이상	-	- -	2,247	48.3 (1.2)	1,814	61.0 (1.2)	514	59.9 (2.7)	1,253	57.4 (1.6)	1,398	57.9 (1.6)	1,153	53.4 (2.0)
65세이상	-	- -	152	41.0 (4.5)	150	54.9 (5.1)	87	58.0 (6.7)	164	56.2 (5.0)	173	47.4 (4.4)	148	56.8 (4.9)
19세이상(표준화)	-	- -	2,247	48.0 (1.3)	1,814	60.0 (1.2)	514	59.8 (2.7)	1,253	56.9 (1.6)	1,398	57.4 (1.6)	1,153	53.5 (2.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	468	51.7 (2.7)	325	70.0 (2.9)	65	71.8 (5.9)	192	59.6 (4.0)	245	63.1 (3.5)	143	57.0 (5.5)
30-39	-	- -	643	49.9 (2.2)	484	63.1 (2.2)	140	60.6 (4.3)	338	59.1 (2.9)	337	57.9 (3.0)	308	55.5 (3.1)
40-49	-	- -	603	48.3 (2.1)	485	58.8 (2.2)	120	52.5 (5.0)	287	60.7 (2.9)	316	54.8 (2.6)	277	51.3 (3.7)
50-59	-	- -	285	43.7 (3.2)	280	48.2 (3.3)	75	53.9 (6.4)	195	49.0 (3.8)	225	58.2 (4.0)	199	50.7 (3.9)
60-69	-	- -	182	44.6 (3.8)	172	54.8 (4.5)	66	54.9 (6.9)	145	51.7 (5.4)	175	54.0 (4.6)	138	44.3 (5.4)
70+	-	- -	66	42.1 (6.3)	68	52.7 (6.7)	48	60.5 (9.5)	96	52.8 (6.9)	100	49.6 (5.9)	88	60.5 (5.7)
거주지역														
동	-	- -	1,767	48.7 (1.4)	1,425	61.3 (1.4)	368	61.1 (3.2)	941	58.3 (1.8)	1,044	57.6 (1.9)	898	54.4 (2.2)
읍면	-	- -	480	46.8 (2.5)	389	59.9 (2.3)	146	55.3 (4.1)	312	53.2 (3.3)	354	58.9 (3.1)	255	49.7 (4.5)

1) 현재흡연자의 금연시도율 : 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간)이상 금연을 시도한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 금연시도율 추이, 성별, 만19세이상, 2001-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	--	507	46.7 (2.7)	519	60.0 (2.2)	149	56.3 (5.1)	351	59.4 (3.2)	384	53.9 (2.8)	328	53.5 (3.4)
중하	-	--	541	53.8 (2.1)	472	60.7 (2.5)	118	55.5 (4.9)	317	56.9 (3.0)	376	58.0 (3.1)	295	53.8 (3.5)
중상	-	--	549	45.9 (2.3)	415	60.4 (2.4)	123	64.9 (5.6)	293	55.3 (3.6)	318	57.9 (3.1)	265	54.5 (3.6)
상	-	--	518	47.7 (2.4)	380	62.6 (3.0)	105	63.4 (5.5)	258	59.1 (3.7)	299	62.9 (3.2)	251	51.8 (3.7)
거주지역(표준화)														
동	-	--	1,767	48.5 (1.5)	1,425	60.0 (1.5)	368	- -	941	57.6 (1.8)	1,044	56.9 (1.9)	898	55.1 (2.2)
읍면	-	--	480	48.0 (2.5)	389	60.1 (2.2)	146	- -	312	56.2 (3.7)	354	60.7 (3.1)	255	- -
소득수준(표준화)														
하	-	--	507	- -	519	- -	149	- -	351	59.2 (3.1)	384	53.4 (2.8)	328	52.0 (3.4)
중하	-	--	541	- -	472	- -	118	- -	317	56.1 (3.0)	376	57.9 (3.0)	295	53.8 (3.4)
중상	-	--	549	- -	415	- -	123	- -	293	55.0 (3.4)	318	- -	265	- -
상	-	--	518	- -	380	- -	105	- -	258	- -	299	62.1 (3.1)	251	- -
여자														
19세이상	-	--	227	39.1 (3.4)	240	59.5 (3.6)	73	67.9 (6.2)	246	56.5 (3.6)	263	57.8 (3.6)	179	63.3 (4.1)
65세이상	-	--	80	26.4 (5.7)	53	43.9 (7.4)	23	71.2 (10.7)	60	40.6 (7.5)	51	28.9 (6.7)	33	53.0 (10.5)
19세이상(표준화)	-	--	227	42.8 (3.3)	240	- -	73	- -	246	55.3 (3.4)	263	57.5 (3.4)	179	- -
연령(세)														
19-29	-	--	38	74.4 (8.0)	41	82.6 (6.4)	12	- -[5)]	60	72.6 (5.5)	63	63.0 (7.0)	37	68.7 (6.3)
30-39	-	--	38	39.6 (8.0)	41	70.3 (8.1)	16	- -	50	50.1 (7.8)	60	69.5 (7.0)	41	70.2 (7.5)
40-49	-	--	33	31.7 (7.8)	53	47.8 (8.0)	9	- -	41	51.7 (8.4)	42	58.6 (8.4)	39	59.4 (8.8)
50-59	-	--	23	30.1 (10.3)	42	50.4 (7.6)	10	- -	23	64.2 (10.1)	30	53.8 (10.5)	21	61.4 (10.8)
60-69	-	--	31	33.3 (8.1)	19	- -	9	- -	29	37.8 (9.4)	30	38.5 (8.9)	18	- -
70+	-	--	64	27.2 (6.4)	44	43.5 (7.9)	17	- -	43	36.0 (8.8)	38	32.0 (8.2)	23	57.4 (12.6)
거주지역														
동	-	--	162	43.8 (3.8)	201	57.2 (3.8)	54	67.0 (7.0)	199	56.2 (3.8)	211	60.5 (3.9)	145	62.3 (4.6)
읍면	-	--	65	24.6 (7.3)	39	71.0 (9.8)	19	- -	47	58.7 (10.7)	52	42.8 (8.0)	34	67.2 (8.1)
소득수준														
하	-	--	75	30.9 (6.0)	94	58.5 (5.9)	27	68.7 (8.9)	72	59.3 (7.0)	98	62.2 (5.3)	73	60.0 (6.9)
중하	-	--	41	47.9 (8.5)	61	69.7 (6.2)	19	- -	78	55.6 (6.2)	63	62.1 (6.9)	38	60.5 (8.5)
중상	-	--	38	51.3 (8.8)	44	44.2 (6.4)	10	- -	38	63.1 (9.2)	60	49.3 (6.9)	33	66.3 (8.1)
상	-	--	56	43.8 (6.6)	41	62.7 (9.0)	13	- -	47	52.0 (8.3)	38	62.6 (8.9)	33	71.8 (9.3)
거주지역(표준화)														
동	-	--	162	- -	201	- -	54	- -	199	- -	211	- -	145	- -
읍면	-	--	65	- -	39	- -	19	- -	47	- -	52	- -	34	- -
소득수준(표준화)														
하	-	--	75	- -	94	- -	27	- -	72	- -	98	- -	73	- -
중하	-	--	41	- -	61	- -	19	- -	78	- -	63	- -	38	- -
중상	-	--	38	- -	44	- -	10	- -	38	- -	60	- -	33	- -
상	-	--	56	- -	41	- -	13	- -	47	- -	38	- -	33	- -

표 1-I-5. 현재흡연자의 1개월내금연계획률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	2,453	7.1 (0.6)	2,053	11.0 (0.8)	585	19.8 (1.9)	1,497	18.1 (1.2)	1,661	18.7 (1.2)	1,333	21.0 (1.3)
65세이상	-	- -	229	5.3 (1.6)	203	8.7 (2.0)	110	24.2 (5.0)	224	19.1 (3.0)	224	13.0 (2.3)	181	20.3 (3.4)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	2,453	7.1 (0.6)	2,053	10.7 (0.8)	585	20.2 (1.9)	1,497	18.0 (1.2)	1,661	18.3 (1.1)	1,333	21.0 (1.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	503	8.5 (1.3)	365	10.0 (1.6)	77	19.4 (5.3)	252	15.0 (2.6)	308	18.4 (2.5)	180	22.1 (3.4)
30-39	-	- -	679	7.7 (1.1)	525	12.0 (1.4)	156	21.4 (3.5)	387	21.9 (2.3)	397	21.7 (2.6)	350	19.9 (2.3)
40-49	-	- -	631	6.9 (1.1)	538	12.8 (1.5)	128	13.7 (2.9)	327	19.9 (2.5)	358	17.3 (2.1)	316	23.2 (2.7)
50-59	-	- -	303	5.9 (1.3)	322	10.3 (1.8)	84	25.7 (6.2)	218	14.2 (3.3)	255	18.8 (2.8)	220	17.9 (2.9)
60-69	-	- -	210	6.4 (1.8)	191	6.2 (1.8)	75	25.2 (6.9)	173	19.0 (3.4)	205	18.0 (3.1)	156	23.6 (4.3)
70+	-	- -	127	5.0 (2.0)	112	8.6 (2.7)	65	21.2 (6.6)	140	14.4 (3.5)	138	9.7 (2.5)	111	17.6 (4.1)
거주지역														
동	-	- -	1,916	7.7 (0.6)	1,625	11.2 (0.9)	420	19.3 (2.1)	1,136	18.9 (1.4)	1,255	18.9 (1.4)	1,044	21.5 (1.4)
읍면	-	- -	537	4.7 (1.2)	428	9.8 (1.3)	165	21.7 (3.8)	361	14.2 (2.3)	406	17.6 (2.2)	289	19.0 (2.9)
소득수준[3]														
하	-	- -	573	5.1 (0.9)	613	11.2 (1.4)	176	23.3 (3.4)	425	17.1 (2.1)	482	17.5 (1.9)	400	22.6 (2.3)
중하	-	- -	576	6.6 (1.0)	532	9.0 (1.2)	137	21.3 (3.7)	395	18.3 (2.2)	439	19.7 (2.2)	334	19.8 (2.5)
중상	-	- -	585	8.3 (1.3)	459	11.5 (1.5)	132	19.6 (4.2)	330	20.7 (2.6)	378	17.1 (2.4)	299	20.1 (2.8)
상	-	- -	571	8.2 (1.2)	421	12.0 (1.7)	118	16.9 (3.9)	303	18.2 (2.2)	337	21.1 (2.6)	284	21.4 (3.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	1,916	7.7 (0.6)	1,625	10.8 (0.9)	420	19.8 (2.1)	1,136	18.6 (1.3)	1,255	18.4 (1.3)	1,044	22.0 (1.5)
읍면	-	- -	537	4.9 (1.2)	428	9.9 (1.4)	165	- -[4]	361	13.9 (2.5)	406	18.2 (2.5)	289	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	573	5.2 (0.9)	613	10.6 (1.4)	176	23.5 (3.4)	425	17.3 (2.1)	482	17.0 (1.8)	400	22.0 (2.3)
중하	-	- -	576	6.4 (0.9)	532	8.9 (1.2)	137	- -	395	18.0 (2.1)	439	19.6 (2.1)	334	20.3 (2.6)
중상	-	- -	585	7.9 (1.3)	459	11.2 (1.5)	132	- -	330	20.0 (2.4)	378	16.5 (2.2)	299	20.8 (2.9)
상	-	- -	571	8.3 (1.3)	421	11.8 (1.6)	118	- -	303	18.3 (2.2)	337	20.5 (2.5)	284	21.9 (3.2)
남자														
19세이상	-	- -	2,229	7.3 (0.6)	1,813	10.9 (0.8)	512	19.1 (2.0)	1,252	18.0 (1.3)	1,398	18.5 (1.2)	1,154	20.5 (1.4)
65세이상	-	- -	151	8.0 (2.4)	150	9.4 (2.3)	87	22.1 (5.6)	164	18.5 (3.4)	173	15.4 (2.9)	148	23.1 (4.3)
19세이상(표준화)	-	- -	2,229	7.5 (0.6)	1,813	10.7 (0.8)	512	19.4 (2.0)	1,252	17.7 (1.2)	1,398	18.2 (1.1)	1,154	20.8 (1.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	465	8.4 (1.3)	324	9.4 (1.6)	65	20.8 (6.2)	192	14.0 (2.7)	245	17.5 (2.6)	143	21.8 (3.8)
30-39	-	- -	641	7.3 (1.1)	484	11.4 (1.4)	140	21.4 (3.8)	337	22.7 (2.4)	337	20.7 (2.8)	309	18.6 (2.4)
40-49	-	- -	598	6.9 (1.1)	485	13.5 (1.7)	119	10.9 (2.6)	286	19.5 (2.6)	316	17.4 (2.4)	277	23.0 (2.9)
50-59	-	- -	280	6.4 (1.4)	280	10.7 (2.0)	74	25.5 (6.4)	196	14.9 (3.5)	225	19.2 (3.0)	199	16.5 (2.9)
60-69	-	- -	180	6.8 (2.0)	172	6.4 (2.0)	66	22.4 (6.6)	144	17.7 (3.7)	175	19.3 (3.5)	138	25.0 (4.6)
70+	-	- -	65	9.6 (4.0)	68	9.1 (3.3)	48	19.0 (7.8)	97	13.2 (3.5)	100	11.8 (3.2)	88	20.4 (5.0)
거주지역														
동	-	- -	1,756	7.9 (0.6)	1,424	11.1 (0.9)	366	18.6 (2.2)	938	19.0 (1.5)	1,044	18.9 (1.5)	899	21.1 (1.5)
읍면	-	- -	473	5.1 (1.4)	389	10.2 (1.3)	146	21.3 (4.0)	314	13.2 (2.2)	354	16.9 (2.2)	255	18.4 (3.1)

1) 현재흡연자의 1개월내금연계획률 : 현재흡연자 중 1개월내 금연할 계획이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 1개월내금연계획률 추이, 성별, 만19세이상, 2001-2010)

구 분	'98	'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	- - -		499	5.3 (1.0)	519	10.3 (1.4)	149	22.2 (3.9)	353	16.1 (2.3)	384	16.1 (2.1)	327	22.0 (2.7)
중하	- - -		536	6.5 (0.9)	471	9.0 (1.3)	118	19.8 (3.7)	317	19.5 (2.5)	376	19.9 (2.4)	296	19.1 (2.7)
중상	- - -		547	8.3 (1.4)	415	12.3 (1.6)	122	19.3 (4.4)	292	20.0 (2.7)	318	17.4 (2.6)	266	19.5 (3.0)
상	- - -		516	8.4 (1.3)	380	12.4 (1.7)	105	16.8 (4.3)	257	18.9 (2.5)	299	21.0 (2.8)	251	21.6 (3.6)
거주지역(표준화)														
동	- - -		1,756	8.3 (0.8)	1,424	10.7 (0.9)	366	- -	938	18.4 (1.4)	1,044	18.4 (1.3)	899	22.1 (1.7)
읍면	- - -		473	5.1 (1.2)	389	10.3 (1.3)	146	- -	314	13.0 (2.4)	354	16.9 (2.5)	255	- -
소득수준(표준화)														
하	- - -		499	- -	519	- -	149	- -	353	16.3 (2.3)	384	15.7 (2.0)	327	21.4 (2.7)
중하	- - -		536	- -	471	- -	118	- -	317	18.5 (2.3)	376	20.0 (2.3)	296	19.8 (2.7)
중상	- - -		547	- -	415	- -	122	- -	292	19.0 (2.5)	318	- -	266	- -
상	- - -		516	- -	380	- -	105	- -	257	- -	299	20.5 (2.7)	251	- -
여자														
19세이상	- - -		224	5.3 (1.5)	240	11.1 (2.5)	73	25.7 (5.3)	245	18.5 (2.8)	263	19.8 (3.1)	179	24.6 (4.5)
65세이상	- - -		78	0.0 (-)[5]	53	6.4 (3.8)	23	29.8 (10.5)	60	20.7 (5.7)	51	5.6 (2.9)	33	8.5 (5.3)
19세이상(표준화)	- - -		224	7.0 (2.0)	240	- -	73	- -	245	18.0 (2.9)	263	19.3 (2.9)	179	- -
연령(세)														
19-29	- - -		38	9.2 (4.3)	41	15.7 (6.2)	12	- -[6]	60	19.6 (5.9)	63	23.0 (6.3)	37	23.9 (8.0)
30-39	- - -		38	12.8 (5.3)	41	20.6 (7.2)	16	- -	50	15.9 (5.2)	60	29.3 (7.3)	41	30.2 (8.1)
40-49	- - -		33	7.0 (4.9)	53	6.0 (3.4)	9	- -	41	22.8 (7.3)	42	16.9 (5.6)	39	25.0 (8.9)
50-59	- - -		23	0.0 (-)	42	7.0 (4.1)	10	- -	22	5.3 (5.2)	30	14.7 (6.4)	21	29.5 (13.0)
60-69	- - -		30	3.8 (3.6)	19	- -	9	- -	29	28.0 (11.3)	30	8.9 (4.2)	18	- -
70+	- - -		62	0.0 (-)	44	7.7 (4.5)	17	- -	43	16.7 (6.1)	38	5.3 (3.3)	23	8.7 (6.2)
거주지역														
동	- - -		160	6.6 (1.9)	201	12.3 (2.9)	54	25.8 (6.4)	198	17.9 (2.9)	211	19.1 (3.4)	145	24.5 (5.0)
읍면	- - -		64	1.1 (1.1)	39	4.9 (3.6)	19	- -	47	22.9 (7.5)	52	23.5 (7.6)	34	24.7 (10.6)
소득수준														
하	- - -		74	3.4 (2.1)	94	17.1 (4.3)	27	29.0 (7.3)	72	23.5 (4.6)	98	24.5 (5.3)	73	25.6 (6.2)
중하	- - -		40	7.0 (4.0)	61	9.7 (4.7)	19	- -	78	12.4 (4.4)	63	17.7 (5.1)	38	27.6 (8.8)
중상	- - -		38	7.3 (4.4)	44	2.4 (2.4)	10	- -	38	27.0 (8.6)	60	15.3 (5.1)	33	25.5 (9.3)
상	- - -		55	6.7 (3.1)	41	8.9 (4.5)	13	- -	46	13.3 (5.5)	38	21.5 (7.5)	33	19.2 (8.3)
거주지역(표준화)														
동	- - -		160	- -	201	- -	54	- -	198	- -	211	- -	145	- -
읍면	- - -		64	- -	39	- -	19	- -	47	- -	52	- -	34	- -
소득수준(표준화)														
하	- - -		74	- -	94	- -	27	- -	72	- -	98	- -	73	- -
중하	- - -		40	- -	61	- -	19	- -	78	- -	63	- -	38	- -
중상	- - -		38	- -	44	- -	10	- -	38	- -	60	- -	33	- -
상	- - -		55	- -	41	- -	13	- -	46	- -	38	- -	33	- -

표 1-I-6. 현재비흡연자의 간접흡연노출률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	5,747	35.8 (0.9)	2,240	35.6 (1.5)	5,195	36.3 (0.8)	5,805	36.8 (0.9)	4,917	38.1 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	894	13.7 (1.3)	572	15.5 (1.9)	1,243	18.2 (1.5)	1,430	15.3 (1.3)	1,193	14.2 (1.2)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	5,747	36.4 (0.9)	2,240	36.4 (1.4)	5,195	37.1 (0.9)	5,805	37.9 (0.9)	4,917	39.7 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	970	37.7 (1.8)	254	37.1 (3.6)	629	41.2 (2.2)	741	40.1 (2.1)	590	44.6 (2.6)
30-39	-	- -	-	- -	1,216	41.3 (1.6)	433	45.1 (2.8)	1,014	40.0 (1.6)	1,023	42.0 (1.7)	903	43.6 (2.1)
40-49	-	- -	-	- -	1,340	44.2 (1.6)	410	38.3 (2.4)	985	41.1 (1.7)	1,135	44.2 (1.6)	844	45.3 (1.9)
50-59	-	- -	-	- -	907	37.4 (1.9)	397	40.1 (2.7)	897	39.0 (1.9)	991	40.1 (1.8)	953	41.6 (2.0)
60-69	-	- -	-	- -	779	19.8 (1.6)	385	22.7 (2.6)	886	24.9 (1.8)	998	24.6 (1.7)	869	25.3 (2.0)
70+	-	- -	-	- -	535	13.9 (1.6)	361	12.8 (2.2)	784	16.1 (1.8)	917	12.9 (1.5)	758	10.8 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	4,611	36.8 (1.0)	1,564	35.8 (1.7)	3,783	36.2 (1.0)	4,295	36.8 (0.9)	3,840	38.0 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,136	31.1 (2.4)	676	34.9 (3.0)	1,412	36.8 (1.9)	1,510	36.4 (2.1)	1,077	38.5 (2.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,385	32.7 (1.8)	503	39.3 (3.0)	1,181	38.6 (1.8)	1,380	34.2 (1.6)	1,135	37.9 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,454	36.7 (1.6)	523	40.2 (2.2)	1,222	39.1 (1.8)	1,419	40.8 (1.8)	1,207	36.9 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,399	37.8 (1.5)	559	34.2 (2.4)	1,311	34.1 (1.6)	1,436	37.1 (1.7)	1,263	38.2 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,450	35.2 (1.8)	549	32.4 (3.0)	1,319	34.9 (1.7)	1,514	35.2 (1.5)	1,248	39.9 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	4,611	36.5 (1.0)	1,564	36.1 (1.6)	3,783	36.3 (1.0)	4,295	37.1 (1.0)	3,840	38.6 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,136	36.0 (2.7)	676	37.6 (2.8)	1,412	41.2 (2.2)	1,510	41.9 (1.8)	1,077	43.7 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,385	33.7 (1.8)	503	39.9 (2.9)	1,181	39.5 (1.8)	1,380	35.1 (1.6)	1,135	39.4 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,454	38.0 (1.5)	523	40.8 (2.4)	1,222	39.6 (1.8)	1,419	42.0 (1.7)	1,207	38.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,399	38.0 (1.5)	559	34.4 (2.2)	1,311	34.4 (1.6)	1,436	37.9 (1.7)	1,263	39.7 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,450	35.4 (1.8)	549	33.8 (3.0)	1,319	35.8 (1.9)	1,514	36.8 (1.6)	1,248	41.4 (2.0)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	1,695	37.6 (1.4)	706	42.1 (2.5)	1,560	42.7 (1.5)	1,834	42.9 (1.3)	1,547	45.9 (1.6)
65세이상	-	- -	-	- -	278	9.6 (2.0)	209	13.6 (2.8)	405	14.8 (2.0)	517	12.2 (1.8)	465	13.4 (2.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	1,695	38.7 (1.4)	706	43.9 (2.3)	1,560	44.2 (1.5)	1,834	44.9 (1.4)	1,547	48.9 (1.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	258	37.9 (3.3)	75	35.0 (5.8)	171	45.9 (4.2)	240	40.9 (3.5)	163	49.1 (4.9)
30-39	-	- -	-	- -	327	49.8 (3.1)	105	67.8 (5.1)	257	58.4 (3.0)	257	59.1 (3.7)	217	66.9 (3.7)
40-49	-	- -	-	- -	387	47.5 (2.6)	124	49.2 (5.0)	290	47.0 (3.2)	326	54.3 (2.5)	255	50.8 (3.6)
50-59	-	- -	-	- -	299	37.5 (3.0)	129	45.3 (4.2)	291	42.9 (3.2)	317	45.8 (3.1)	282	50.2 (3.4)
60-69	-	- -	-	- -	273	18.7 (2.6)	140	16.9 (3.6)	292	26.9 (3.2)	363	25.3 (2.7)	334	32.4 (3.4)
70+	-	- -	-	- -	151	7.6 (2.1)	133	12.6 (3.4)	259	11.1 (2.0)	331	7.4 (1.6)	296	4.9 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	1,369	40.2 (1.5)	486	41.2 (2.7)	1,121	43.9 (1.7)	1,345	43.5 (1.4)	1,207	46.4 (1.7)
읍면	-	- -	-	- -	326	24.7 (3.3)	220	44.9 (5.8)	439	37.5 (2.8)	489	40.3 (3.6)	340	44.1 (4.2)

1) 현재비흡연자의 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장 또는 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 현재비흡연자의 간접흡연노출률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	382	29.5 (2.6)	144	39.5 (4.5)	321	38.5 (3.4)	433	38.4 (2.7)	338	42.5 (3.1)
중하	-	- -	-	- -	418	37.4 (2.8)	163	51.0 (3.9)	355	47.6 (3.1)	424	48.2 (2.9)	374	44.6 (3.5)
중상	-	- -	-	- -	415	41.3 (2.7)	180	41.3 (4.8)	410	43.6 (3.0)	454	45.5 (2.6)	410	47.8 (3.2)
상	-	- -	-	- -	463	39.9 (2.9)	189	40.3 (5.9)	423	42.9 (3.2)	505	40.8 (2.4)	410	49.3 (3.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	1,369	40.2 (1.4)	486	42.6 (2.6)	1,121	44.2 (1.7)	1,345	44.1 (1.5)	1,207	48.5 (1.7)
읍면	-	- -	-	- -	326	- - [4)]	220	- -	439	45.0 (2.7)	489	49.5 (3.8)	340	50.7 (4.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	382	31.0 (2.7)	144	- -	321	39.8 (3.5)	433	40.2 (2.9)	338	46.0 (3.3)
중하	-	- -	-	- -	418	40.0 (2.7)	163	- -	355	50.0 (3.2)	424	50.8 (2.9)	374	47.4 (3.6)
중상	-	- -	-	- -	415	41.9 (2.6)	180	- -	410	43.9 (3.0)	454	47.6 (2.6)	410	50.4 (3.3)
상	-	- -	-	- -	463	39.4 (2.7)	189	- -	423	44.2 (3.1)	505	42.2 (2.5)	410	52.4 (3.7)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,052	34.9 (1.1)	1,534	31.6 (1.6)	3,635	32.7 (1.0)	3,971	33.3 (1.0)	3,370	33.8 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	616	15.8 (1.6)	363	16.6 (2.5)	838	19.9 (1.8)	913	17.0 (1.5)	728	14.6 (1.6)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,052	35.4 (1.1)	1,534	32.3 (1.6)	3,635	33.3 (1.0)	3,971	34.2 (1.0)	3,370	35.1 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	712	37.6 (2.2)	179	38.3 (4.5)	458	38.5 (2.6)	501	39.7 (2.5)	427	41.9 (2.7)
30-39	-	- -	-	- -	889	37.6 (2.0)	328	33.1 (2.8)	757	30.8 (1.9)	766	33.4 (1.8)	686	33.2 (2.4)
40-49	-	- -	-	- -	953	42.6 (1.9)	286	31.8 (2.9)	695	37.7 (2.0)	809	38.7 (2.1)	589	42.5 (2.3)
50-59	-	- -	-	- -	608	37.3 (2.2)	268	36.1 (3.9)	606	36.6 (2.3)	674	36.6 (2.2)	671	36.6 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	506	20.5 (2.0)	245	26.5 (3.9)	594	23.7 (2.2)	635	24.2 (2.2)	535	20.7 (2.2)
70+	-	- -	-	- -	384	16.7 (2.1)	228	12.9 (2.9)	525	18.4 (2.5)	586	15.6 (1.9)	462	13.7 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,242	35.2 (1.2)	1,078	32.5 (1.9)	2,662	31.9 (1.1)	2,950	33.1 (1.2)	2,633	33.3 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	810	33.9 (2.5)	456	28.7 (3.1)	973	36.4 (2.1)	1,021	34.2 (2.1)	737	35.6 (2.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,003	34.0 (2.0)	359	39.3 (3.7)	860	38.6 (1.9)	947	31.9 (1.9)	797	35.6 (2.4)
중하	-	- -	-	- -	1,036	36.4 (1.9)	360	34.2 (3.1)	867	34.5 (1.9)	995	37.1 (2.1)	833	32.8 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	984	36.2 (1.8)	379	29.7 (2.8)	901	28.6 (1.9)	982	32.3 (2.1)	853	32.9 (2.2)
상	-	- -	-	- -	987	32.6 (2.0)	360	26.7 (2.9)	896	29.8 (2.0)	1,009	31.7 (1.9)	838	34.1 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,242	34.8 (1.2)	1,078	32.7 (1.9)	2,662	32.0 (1.1)	2,950	33.4 (1.2)	2,633	33.8 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	810	38.6 (2.9)	456	31.2 (3.4)	973	39.6 (2.9)	1,021	37.9 (2.1)	737	40.0 (3.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,003	34.9 (2.0)	359	40.1 (3.7)	860	39.5 (1.9)	947	32.3 (1.9)	797	36.8 (2.4)
중하	-	- -	-	- -	1,036	37.2 (1.9)	360	34.2 (3.2)	867	34.8 (2.0)	995	37.9 (2.1)	833	33.9 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	984	36.3 (1.8)	379	29.8 (2.8)	901	28.8 (1.9)	982	33.0 (2.1)	853	34.1 (2.2)
상	-	- -	-	- -	987	33.0 (2.0)	360	27.6 (2.8)	896	30.6 (2.2)	1,009	33.3 (1.9)	838	34.9 (2.2)

표 1-I-7. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	3,182	38.6 (1.2)	1,106	46.8 (2.0)	2,838	45.5 (1.3)	3,169	46.3 (1.1)	2,703	49.1 (1.3)
65세이상	-	- -	-	- -	259	12.5 (2.7)	147	27.1 (5.1)	425	24.3 (2.5)	479	19.5 (2.2)	384	23.6 (2.7)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	3,182	36.8 (1.1)	1,106	45.9 (1.9)	2,838	45.4 (1.3)	3,169	45.7 (1.0)	2,703	49.2 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	472	38.7 (2.3)	119	53.4 (4.7)	309	56.5 (3.3)	384	50.7 (3.0)	335	58.3 (3.0)
30-39	-	- -	-	- -	753	41.8 (1.8)	246	51.2 (3.7)	566	49.9 (2.3)	611	53.5 (2.2)	498	57.3 (2.5)
40-49	-	- -	-	- -	937	44.4 (1.8)	276	45.0 (3.3)	716	44.2 (2.2)	796	50.0 (1.9)	617	49.7 (2.5)
50-59	-	- -	-	- -	548	38.3 (2.5)	236	45.5 (3.2)	594	45.0 (2.5)	660	43.3 (2.4)	632	46.8 (2.6)
60-69	-	- -	-	- -	362	21.6 (2.8)	151	35.3 (5.3)	435	30.6 (2.9)	456	33.1 (2.7)	415	36.3 (3.2)
70+	-	- -	-	- -	110	9.7 (3.2)	78	24.3 (6.2)	218	21.7 (3.4)	262	14.0 (2.5)	206	15.5 (3.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,471	42.2 (1.2)	750	47.0 (2.2)	1,889	47.6 (1.5)	2,181	48.2 (1.2)	1,986	50.2 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	711	24.8 (2.8)	356	46.0 (4.5)	949	38.2 (2.8)	988	40.1 (2.8)	717	45.9 (3.4)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	646	36.6 (2.7)	255	46.5 (3.4)	641	45.6 (2.7)	712	47.3 (2.2)	559	50.1 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	796	38.1 (2.1)	261	52.8 (3.4)	689	46.3 (2.5)	785	47.9 (2.5)	702	46.6 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	813	39.0 (2.1)	285	46.3 (3.7)	732	45.7 (2.3)	805	46.8 (2.2)	703	47.9 (2.4)
상	-	- -	-	- -	901	39.1 (1.9)	279	44.0 (4.2)	718	45.5 (2.4)	845	44.3 (2.0)	710	52.3 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,471	39.6 (1.2)	750	- -[4]	1,889	46.6 (1.6)	2,181	46.6 (1.2)	1,986	48.7 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	711	28.7 (2.6)	356	48.3 (4.2)	949	44.7 (2.8)	988	45.5 (2.1)	717	52.5 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	646	36.1 (2.4)	255	46.7 (3.6)	641	45.6 (2.6)	712	47.4 (2.0)	559	50.8 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	796	36.6 (1.9)	261	- -	689	45.7 (2.6)	785	47.8 (2.6)	702	47.8 (2.5)
중상	-	- -	-	- -	813	37.3 (2.0)	285	- -	732	46.2 (2.2)	805	45.6 (2.1)	703	47.5 (2.4)
상	-	- -	-	- -	901	- -	279	- -	718	45.4 (2.4)	845	43.0 (2.0)	710	51.5 (2.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	1,251	45.3 (1.7)	460	56.3 (2.9)	1,118	53.1 (1.7)	1,273	53.6 (1.6)	1,108	57.6 (1.9)
65세이상	-	- -	-	- -	123	16.9 (4.1)	63	27.6 (7.1)	166	31.6 (4.4)	220	22.4 (3.3)	195	26.5 (4.0)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	1,251	44.5 (1.7)	460	55.1 (3.0)	1,118	53.4 (1.8)	1,273	53.2 (1.7)	1,108	58.6 (1.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	112	53.5 (4.9)	36	60.6 (8.8)	89	65.7 (5.6)	116	60.3 (5.3)	90	76.1 (4.7)
30-39	-	- -	-	- -	314	50.7 (3.1)	99	71.1 (4.7)	240	61.3 (3.0)	241	62.4 (3.6)	204	69.8 (3.2)
40-49	-	- -	-	- -	359	49.7 (2.9)	113	54.5 (5.2)	269	50.3 (3.3)	304	57.5 (2.6)	243	53.6 (3.7)
50-59	-	- -	-	- -	249	41.3 (3.4)	112	49.4 (4.8)	250	49.9 (3.6)	276	50.9 (3.4)	251	55.1 (3.6)
60-69	-	- -	-	- -	166	26.9 (3.8)	64	36.4 (7.2)	178	40.7 (4.8)	215	36.6 (3.7)	222	44.6 (4.5)
70+	-	- -	-	- -	51	11.5 (4.3)	36	25.7 (7.3)	92	23.5 (4.8)	121	16.5 (3.8)	98	10.1 (3.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	990	50.2 (1.7)	306	55.8 (3.2)	790	55.0 (2.0)	896	56.0 (1.8)	834	58.8 (2.0)
읍면	-	- -	-	- -	261	24.8 (3.2)	154	57.8 (6.2)	328	45.2 (3.7)	377	44.6 (3.8)	274	53.7 (4.5)

1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	226	44.2 (4.0)	82	58.1 (4.7)	206	50.9 (4.5)	273	53.2 (3.3)	213	57.0 (3.5)
중하	-	- -	-	- -	309	43.9 (3.0)	111	66.8 (4.3)	257	56.4 (3.6)	296	57.4 (3.3)	280	53.5 (3.9)
중상	-	- -	-	- -	326	43.5 (2.9)	124	55.7 (5.4)	308	54.6 (3.5)	341	54.5 (3.1)	303	58.5 (3.7)
상	-	- -	-	- -	379	47.8 (3.0)	134	50.0 (6.3)	320	52.3 (3.8)	353	50.7 (3.1)	304	61.6 (3.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	990	- -	306	- -	790	53.8 (2.1)	896	54.1 (1.9)	834	58.0 (1.8)
읍면	-	- -	-	- -	261	- -	154	- -	328	- -	377	- -	274	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	226	- -	82	- -	206	- -	273	54.1 (3.2)	213	- -
중하	-	- -	-	- -	309	- -	111	- -	257	- -	296	58.1 (3.7)	280	54.1 (4.0)
중상	-	- -	-	- -	326	- -	124	- -	308	55.5 (3.5)	341	52.8 (3.1)	303	60.1 (3.4)
상	-	- -	-	- -	379	- -	134	- -	320	52.9 (3.8)	353	49.8 (3.0)	304	61.5 (3.5)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	1,931	33.6 (1.4)	646	37.5 (2.3)	1,720	38.8 (1.7)	1,896	40.1 (1.4)	1,595	42.3 (1.6)
65세이상	-	- -	-	- -	136	8.5 (2.8)	84	26.7 (7.0)	259	19.1 (3.2)	259	16.7 (2.7)	189	20.9 (3.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	1,931	31.8 (1.3)	646	36.4 (2.2)	1,720	38.2 (1.6)	1,896	39.4 (1.3)	1,595	41.8 (1.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	360	32.6 (2.7)	83	49.1 (5.5)	220	50.6 (3.5)	268	45.5 (3.2)	245	48.1 (3.9)
30-39	-	- -	-	- -	439	34.4 (2.5)	147	27.8 (3.8)	326	37.3 (3.2)	370	44.6 (2.8)	294	45.4 (3.3)
40-49	-	- -	-	- -	578	40.4 (2.2)	163	35.7 (4.0)	447	39.0 (2.9)	492	43.5 (2.6)	374	46.9 (3.2)
50-59	-	- -	-	- -	299	35.3 (3.2)	124	40.1 (5.6)	344	40.1 (3.3)	384	36.1 (3.1)	381	39.8 (2.9)
60-69	-	- -	-	- -	196	17.0 (3.1)	87	34.4 (7.2)	257	20.7 (3.1)	241	29.5 (3.5)	193	26.9 (4.0)
70+	-	- -	-	- -	59	8.0 (4.4)	42	22.8 (10.7)	126	20.4 (5.1)	141	11.8 (3.1)	108	19.6 (5.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	1,481	36.0 (1.4)	444	38.9 (2.5)	1,099	40.5 (1.9)	1,285	41.1 (1.5)	1,152	43.0 (1.7)
읍면	-	- -	-	- -	450	24.8 (3.3)	202	32.2 (5.3)	621	33.4 (3.2)	611	36.9 (3.1)	443	40.5 (3.5)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	420	32.0 (3.0)	173	38.5 (4.7)	435	42.2 (3.3)	439	42.9 (2.6)	346	44.9 (3.3)
중하	-	- -	-	- -	487	33.7 (2.5)	150	39.3 (5.0)	432	38.3 (3.0)	489	40.4 (3.0)	422	41.5 (3.3)
중상	-	- -	-	- -	487	35.6 (2.5)	161	37.0 (5.1)	424	37.0 (2.9)	464	39.8 (2.8)	400	39.2 (2.8)
상	-	- -	-	- -	522	31.7 (2.3)	145	35.8 (4.2)	398	37.8 (3.1)	492	38.2 (2.6)	406	43.7 (2.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	1,481	33.4 (1.3)	444	- -	1,099	39.8 (2.0)	1,285	40.4 (1.6)	1,152	41.2 (1.6)
읍면	-	- -	-	- -	450	28.3 (3.3)	202	- -	621	38.4 (3.4)	611	41.8 (3.0)	443	46.2 (3.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	420	30.7 (2.8)	173	- -	435	41.7 (3.2)	439	42.9 (2.6)	346	45.1 (3.3)
중하	-	- -	-	- -	487	- -	150	- -	432	37.6 (2.9)	489	40.2 (2.9)	422	41.6 (2.9)
중상	-	- -	-	- -	487	- -	161	- -	424	37.3 (2.9)	464	38.5 (2.6)	400	38.4 (2.8)
상	-	- -	-	- -	522	- -	145	- -	398	37.3 (2.9)	492	36.8 (2.4)	406	42.7 (2.8)

표 1-I-8. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	5,747	18.3 (0.8)	2,362	14.4 (1.0)	5,269	15.3 (0.7)	5,805	14.5 (0.8)	4,917	14.4 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	894	10.7 (1.2)	607	10.3 (1.5)	1,279	12.1 (1.3)	1,430	10.0 (1.0)	1,193	7.4 (1.1)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	5,747	18.5 (0.8)	2,362	14.7 (1.0)	5,269	15.5 (0.7)	5,805	14.9 (0.8)	4,917	14.9 (0.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	970	24.0 (1.7)	262	17.9 (2.8)	635	19.2 (1.9)	741	20.3 (2.1)	590	21.0 (2.2)
30-39	-	- -	-	- -	1,216	19.2 (1.5)	471	17.3 (1.8)	1,021	14.4 (1.2)	1,023	14.1 (1.5)	903	14.1 (1.4)
40-49	-	- -	-	- -	1,340	17.9 (1.2)	423	12.0 (1.6)	995	15.7 (1.2)	1,135	13.3 (1.2)	844	15.4 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	907	17.8 (1.5)	415	14.0 (2.3)	908	14.7 (1.3)	991	15.1 (1.3)	953	14.0 (1.4)
60-69	-	- -	-	- -	779	11.6 (1.3)	412	13.0 (2.0)	898	12.9 (1.5)	998	11.5 (1.3)	869	8.8 (1.4)
70+	-	- -	-	- -	535	12.4 (1.6)	379	8.9 (2.0)	812	12.1 (1.7)	917	9.8 (1.2)	758	7.2 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	4,611	18.1 (0.9)	1,672	14.7 (1.1)	3,839	14.5 (0.7)	4,295	14.7 (0.9)	3,840	14.2 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,136	19.2 (1.7)	690	13.3 (1.8)	1,430	18.4 (1.7)	1,510	13.6 (1.5)	1,077	15.0 (1.7)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,385	19.4 (1.5)	528	19.5 (2.7)	1,195	19.4 (1.3)	1,380	14.1 (1.1)	1,135	16.8 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	1,454	19.8 (1.4)	552	17.0 (1.9)	1,234	17.4 (1.4)	1,419	18.1 (1.4)	1,207	13.2 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	1,399	19.4 (1.3)	591	13.0 (1.9)	1,328	12.4 (1.1)	1,436	13.5 (1.3)	1,263	13.1 (1.2)
상	-	- -	-	- -	1,450	14.4 (1.5)	578	9.4 (1.3)	1,345	12.2 (1.2)	1,514	12.0 (1.4)	1,248	14.2 (1.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	4,611	18.0 (0.9)	1,672	14.9 (1.1)	3,839	14.6 (0.7)	4,295	14.8 (0.9)	3,840	14.4 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,136	21.7 (2.0)	690	14.2 (2.0)	1,430	20.9 (2.4)	1,510	15.7 (1.8)	1,077	16.8 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,385	19.8 (1.5)	528	19.7 (2.7)	1,195	19.7 (1.4)	1,380	14.4 (1.2)	1,135	17.6 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	1,454	20.4 (1.4)	552	17.1 (1.9)	1,234	17.9 (1.6)	1,419	18.9 (1.6)	1,207	13.6 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,399	19.5 (1.3)	591	13.3 (1.9)	1,328	12.3 (1.2)	1,436	13.7 (1.3)	1,263	13.6 (1.3)
상	-	- -	-	- -	1,450	14.5 (1.5)	578	9.6 (1.3)	1,345	12.4 (1.3)	1,514	12.3 (1.4)	1,248	14.6 (1.4)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	1,695	7.1 (0.9)	719	4.5 (1.1)	1,571	5.9 (0.8)	1,834	6.3 (0.8)	1,547	5.4 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	278	3.4 (1.2)	213	6.5 (2.2)	413	3.8 (1.1)	517	3.3 (1.0)	465	2.4 (0.9)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	1,695	7.1 (0.8)	719	4.4 (1.1)	1,571	6.5 (0.9)	1,834	6.9 (0.9)	1,547	5.8 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	258	19.7 (3.0)	76	10.4 (3.4)	171	17.1 (3.2)	240	18.5 (2.9)	163	15.8 (3.5)
30-39	-	- -	-	- -	327	3.3 (1.1)	106	1.9 (1.4)	257	5.1 (1.4)	257	5.1 (1.6)	217	4.4 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	387	1.8 (0.8)	124	0.0 (-)[4]	290	1.1 (0.5)	326	1.6 (0.7)	255	1.3 (1.0)
50-59	-	- -	-	- -	299	5.2 (1.5)	130	4.9 (2.4)	292	2.4 (1.0)	317	4.3 (1.3)	282	3.2 (1.2)
60-69	-	- -	-	- -	273	3.6 (1.1)	149	4.0 (1.7)	294	5.3 (1.8)	363	3.7 (1.1)	334	3.1 (1.2)
70+	-	- -	-	- -	151	5.1 (1.9)	134	7.0 (3.3)	267	3.7 (1.3)	331	2.1 (0.8)	296	1.5 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	1,369	7.3 (1.0)	496	5.4 (1.3)	1,130	5.8 (0.8)	1,345	6.2 (0.8)	1,207	5.7 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	326	5.9 (1.7)	223	1.5 (0.9)	441	6.4 (1.8)	489	6.7 (2.2)	340	4.7 (1.5)

1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	382	7.3 (1.5)	148	6.4 (2.8)	323	6.4 (1.5)	433	7.4 (1.6)	338	9.3 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	418	9.0 (2.2)	166	7.8 (2.7)	356	9.0 (2.1)	424	8.2 (1.5)	374	4.0 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	415	8.8 (1.8)	183	3.1 (1.5)	411	4.6 (1.4)	454	5.7 (1.4)	410	4.4 (1.5)
상	-	- -	-	- -	463	2.6 (0.8)	192	1.2 (0.9)	430	3.7 (1.3)	505	3.7 (1.3)	410	4.4 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	1,369	7.0 (0.9)	496	5.2 (1.3)	1,130	6.2 (0.9)	1,345	6.4 (0.8)	1,207	5.6 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	326	- - [5)]	223	- -	441	8.7 (2.7)	489	10.8 (3.4)	340	5.8 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	382	7.3 (1.5)	148	- -	323	6.6 (1.6)	433	7.9 (1.7)	338	10.6 (2.6)
중하	-	- -	-	- -	418	8.5 (1.9)	166	- -	356	10.4 (2.4)	424	9.3 (1.6)	374	4.3 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	415	9.4 (1.8)	183	- -	411	5.1 (1.6)	454	6.0 (1.6)	410	4.5 (1.5)
상	-	- -	-	- -	463	2.7 (0.9)	192	- -	430	4.0 (1.4)	505	4.1 (1.4)	410	4.6 (1.7)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,052	23.9 (1.0)	1,643	20.1 (1.3)	3,698	20.4 (0.8)	3,971	19.1 (1.0)	3,370	19.2 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	616	14.2 (1.6)	394	12.4 (2.2)	866	16.4 (1.7)	913	13.6 (1.4)	728	10.1 (1.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,052	24.1 (1.0)	1,643	20.5 (1.3)	3,698	20.5 (0.9)	3,971	19.4 (1.0)	3,370	19.8 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	712	26.2 (2.1)	186	22.3 (3.6)	464	20.4 (2.5)	501	21.3 (2.5)	427	24.1 (2.5)
30-39	-	- -	-	- -	889	26.2 (1.8)	365	24.5 (2.4)	764	19.1 (1.5)	766	18.7 (1.8)	686	18.5 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	953	25.8 (1.7)	299	18.7 (2.3)	705	23.9 (1.7)	809	19.8 (1.7)	589	22.7 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	608	24.8 (2.0)	285	20.4 (2.9)	616	22.1 (1.9)	674	21.7 (1.8)	671	20.3 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	506	16.0 (1.9)	263	18.6 (3.0)	604	17.7 (2.0)	635	16.3 (1.9)	535	12.6 (1.9)
70+	-	- -	-	- -	384	15.7 (2.1)	245	9.9 (2.5)	545	16.1 (2.4)	586	13.7 (1.7)	462	10.1 (1.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,242	23.6 (1.2)	1,176	20.0 (1.4)	2,709	19.4 (0.9)	2,950	19.5 (1.1)	2,633	18.8 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	810	25.1 (2.2)	467	20.5 (2.9)	989	25.1 (1.9)	1,021	17.4 (1.7)	737	20.4 (2.1)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,003	24.6 (1.8)	380	26.5 (3.3)	872	25.7 (1.7)	947	17.7 (1.6)	797	20.4 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	1,036	25.1 (1.7)	386	21.9 (2.5)	878	21.8 (1.7)	995	23.1 (1.8)	833	18.0 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	984	24.5 (1.6)	408	18.7 (2.5)	917	16.7 (1.4)	982	17.9 (1.7)	853	17.9 (1.6)
상	-	- -	-	- -	987	21.0 (2.0)	386	14.9 (2.0)	915	17.5 (1.6)	1,009	17.2 (1.7)	838	20.2 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,242	23.4 (1.2)	1,176	20.2 (1.4)	2,709	19.4 (0.9)	2,950	19.6 (1.2)	2,633	19.0 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	810	28.0 (2.5)	467	21.9 (3.1)	989	27.4 (2.8)	1,021	18.3 (1.8)	737	22.7 (2.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,003	25.2 (1.8)	380	27.2 (3.4)	872	26.0 (1.7)	947	17.8 (1.6)	797	21.0 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	1,036	25.7 (1.8)	386	21.9 (2.6)	878	22.1 (1.8)	995	23.6 (2.0)	833	18.3 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	984	24.5 (1.7)	408	18.9 (2.6)	917	16.5 (1.5)	982	18.0 (1.7)	853	18.4 (1.7)
상	-	- -	-	- -	987	21.2 (2.0)	386	15.2 (2.1)	915	17.6 (1.7)	1,009	17.4 (1.8)	838	20.6 (1.9)

표 1-I-9. 흡연예방 또는 금연교육 경험률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,975	6.7 (0.7)	6,792	6.8 (0.4)	7,480	7.1 (0.4)	6,254	7.1 (0.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	720	1.9 (0.5)	1,509	1.9 (0.4)	1,656	2.5 (0.7)	1,374	1.4 (0.6)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,975	6.9 (0.7)	6,792	7.0 (0.5)	7,480	7.3 (0.4)	6,254	7.5 (0.4)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	338	12.6 (2.1)	891	12.8 (1.4)	1,049	11.9 (1.2)	771	13.4 (1.5)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	635	7.4 (1.3)	1,411	7.2 (0.9)	1,425	7.9 (0.9)	1,254	9.6 (0.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	564	6.2 (1.1)	1,327	6.2 (0.8)	1,495	6.9 (0.8)	1,162	5.9 (0.7)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	502	4.3 (1.2)	1,133	4.4 (0.8)	1,248	5.6 (0.8)	1,173	4.5 (0.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	489	1.8 (0.9)	1,077	3.1 (0.6)	1,207	2.5 (0.6)	1,025	1.9 (0.6)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	447	1.8 (0.5)	953	1.6 (0.4)	1,056	2.8 (0.9)	869	1.4 (0.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,114	6.4 (0.8)	4,996	6.7 (0.5)	5,560	7.3 (0.5)	4,888	7.6 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	861	7.7 (1.3)	1,796	7.1 (0.9)	1,920	6.4 (0.9)	1,366	5.4 (0.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	711	3.9 (0.8)	1,626	5.9 (0.8)	1,865	6.4 (0.8)	1,536	5.6 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	695	7.8 (1.4)	1,634	7.0 (0.9)	1,860	5.6 (0.7)	1,541	7.2 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	9.9 (1.9)	1,663	6.0 (0.7)	1,819	7.7 (0.9)	1,564	7.2 (0.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	700	5.5 (1.1)	1,657	8.0 (0.9)	1,855	8.6 (0.8)	1,533	8.6 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,114	6.5 (0.8)	4,996	6.7 (0.5)	5,560	7.3 (0.5)	4,888	7.6 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	861	8.7 (1.5)	1,796	9.6 (1.5)	1,920	7.0 (0.9)	1,366	7.0 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	711	4.0 (0.8)	1,626	6.0 (0.8)	1,865	6.6 (0.8)	1,536	6.0 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	695	7.9 (1.3)	1,634	7.3 (0.9)	1,860	5.8 (0.7)	1,541	7.8 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	10.0 (1.8)	1,663	6.1 (0.8)	1,819	8.1 (0.9)	1,564	7.6 (0.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	700	5.7 (1.1)	1,657	8.4 (0.9)	1,855	9.1 (0.9)	1,533	9.1 (1.0)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,239	9.1 (1.2)	2,835	9.7 (0.7)	3,236	10.9 (0.8)	2,704	10.9 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	301	2.6 (0.8)	579	3.1 (0.7)	691	4.8 (1.3)	613	2.5 (0.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,239	9.2 (1.2)	2,835	9.8 (0.7)	3,236	11.0 (0.8)	2,704	11.2 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	141	16.3 (3.9)	366	15.8 (2.1)	485	15.9 (2.1)	307	17.5 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	247	11.5 (2.1)	597	10.9 (1.4)	595	12.6 (1.7)	527	15.1 (1.7)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	247	6.6 (1.5)	579	9.3 (1.4)	642	10.3 (1.4)	532	9.3 (1.4)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	204	5.9 (1.8)	489	6.5 (1.2)	543	9.1 (1.5)	481	7.9 (1.4)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	217	2.1 (1.4)	440	4.4 (1.0)	540	4.2 (1.2)	473	3.2 (1.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	183	3.6 (1.2)	364	2.9 (1.0)	431	5.5 (1.7)	384	2.1 (0.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	9.0 (1.4)	2,079	9.7 (0.8)	2,391	11.0 (0.9)	2,109	11.5 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	372	9.5 (2.1)	756	9.7 (1.5)	845	10.2 (1.7)	595	8.8 (1.5)

1) 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 흡연예방 또는 금연교육 경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	4.6 (1.1)	678	7.8 (1.3)	818	9.1 (1.4)	666	8.7 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	9.8 (2.2)	675	10.9 (1.7)	801	9.7 (1.3)	670	11.3 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	14.2 (2.6)	707	8.7 (1.3)	772	12.7 (1.6)	677	11.6 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	7.9 (2.1)	690	10.8 (1.6)	806	11.9 (1.4)	662	12.2 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	8.8 (1.3)	2,079	9.5 (0.8)	2,391	10.8 (0.8)	2,109	11.3 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	372	10.9 (2.6)	756	11.4 (2.0)	845	10.9 (1.7)	595	10.9 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	4.7 (1.1)	678	7.9 (1.3)	818	9.1 (1.4)	666	9.4 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	10.1 (2.3)	675	11.2 (1.7)	801	9.9 (1.3)	670	11.9 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	13.9 (2.5)	707	8.6 (1.3)	772	12.7 (1.6)	677	11.7 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	7.8 (2.1)	690	10.9 (1.6)	806	12.3 (1.4)	662	12.5 (1.7)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,736	4.4 (0.7)	3,957	3.9 (0.4)	4,244	3.4 (0.3)	3,550	3.4 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	419	1.4 (0.8)	930	1.0 (0.4)	965	0.9 (0.4)	761	0.7 (0.6)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,736	4.6 (0.8)	3,957	4.2 (0.5)	4,244	3.6 (0.3)	3,550	3.7 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	8.8 (2.3)	525	9.6 (1.5)	564	7.5 (1.2)	464	9.1 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	388	3.0 (1.1)	814	3.2 (0.8)	830	3.0 (0.7)	727	3.7 (0.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	317	5.8 (1.4)	748	2.9 (0.7)	853	3.3 (0.7)	630	2.3 (0.5)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	298	2.7 (1.2)	644	2.4 (0.7)	705	2.2 (0.5)	692	1.1 (0.3)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	272	1.5 (1.0)	637	1.9 (0.7)	667	0.9 (0.3)	552	0.7 (0.5)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	264	0.7 (0.5)	589	0.8 (0.4)	625	1.2 (0.6)	485	1.0 (0.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	4.0 (0.8)	2,917	3.7 (0.5)	3,169	3.6 (0.4)	2,779	3.7 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	5.8 (2.1)	1,040	4.5 (1.1)	1,075	2.5 (0.5)	771	2.2 (0.8)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	411	3.2 (1.3)	948	3.9 (1.0)	1,047	3.8 (0.7)	870	2.8 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	409	5.9 (1.9)	959	3.3 (0.8)	1,059	1.6 (0.4)	871	3.1 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	5.6 (1.8)	956	3.3 (0.7)	1,047	2.9 (0.6)	887	3.0 (0.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	3.1 (1.0)	967	5.2 (0.9)	1,049	5.4 (0.9)	871	4.8 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	4.1 (0.8)	2,917	3.8 (0.5)	3,169	3.7 (0.4)	2,779	3.9 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	6.9 (2.4)	1,040	7.5 (1.8)	1,075	2.8 (0.6)	771	2.7 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	411	3.3 (1.2)	948	4.1 (1.0)	1,047	4.1 (0.8)	870	2.9 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	409	6.1 (1.9)	959	3.6 (0.8)	1,059	1.7 (0.5)	871	3.6 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	5.7 (1.9)	956	3.5 (0.8)	1,047	3.2 (0.7)	887	3.4 (0.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	3.2 (1.0)	967	5.8 (0.9)	1,049	5.8 (0.9)	871	5.5 (1.0)

표 1-I-10. 평생흡연율[1], 현재흡연율[2], 과거흡연율[3] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	평생	현재	과거	N	평생	현재	과거	N	평생	현재	과거
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	6,256	44.1 (0.6)	26.9 (0.7)	17.2 (0.6)	2,704	77.9 (0.9)	48.1 (1.2)	29.8 (1.1)	3,552	11.0 (0.8)	6.1 (0.6)	4.9 (0.5)
연령(세)												
19-29	771	37.2 (2.0)	27.8 (1.8)	9.4 (1.3)	307	57.5 (2.8)	47.3 (3.1)	10.2 (1.7)	464	15.9 (1.9)	7.4 (1.6)	8.5 (1.6)
30-39	1,254	49.4 (1.6)	35.0 (1.7)	14.4 (1.3)	527	82.4 (1.9)	60.9 (2.4)	21.5 (2.2)	727	14.5 (1.5)	7.6 (1.2)	6.8 (1.1)
40-49	1,162	46.4 (1.6)	30.5 (1.9)	15.8 (1.3)	532	81.9 (1.9)	53.6 (2.8)	28.3 (2.3)	630	9.4 (1.4)	6.6 (1.2)	2.9 (0.7)
50-59	1,174	45.9 (1.3)	25.1 (1.6)	20.8 (1.4)	481	85.1 (1.7)	45.0 (2.7)	40.1 (2.5)	693	6.8 (1.6)	5.2 (1.5)	1.5 (0.6)
60-69	1,026	42.3 (1.5)	16.1 (1.3)	26.2 (1.4)	473	82.7 (2.1)	30.8 (2.4)	51.9 (2.7)	553	5.8 (1.1)	2.9 (0.7)	2.9 (0.9)
70+	869	40.0 (1.8)	12.6 (1.3)	27.4 (1.6)	384	85.8 (1.7)	24.7 (2.4)	61.1 (2.6)	485	11.2 (1.9)	5.0 (1.3)	6.2 (1.7)
19-64	4,882	44.7 (0.7)	29.1 (0.8)	15.7 (0.6)	2,091	77.0 (0.9)	51.0 (1.2)	26.1 (1.2)	2,791	11.4 (0.8)	6.5 (0.7)	4.9 (0.6)
65+	1,374	40.3 (1.5)	13.0 (1.1)	27.3 (1.3)	613	85.0 (1.5)	25.5 (1.9)	59.6 (2.2)	761	9.1 (1.4)	4.3 (1.0)	4.8 (1.2)
거주지역												
동	4,890	43.9 (0.7)	27.0 (0.8)	17.0 (0.6)	2,109	76.9 (0.9)	48.0 (1.2)	28.9 (1.2)	2,781	11.5 (0.8)	6.3 (0.7)	5.2 (0.6)
읍면	1,366	44.8 (1.2)	26.6 (1.8)	18.2 (1.5)	595	81.7 (1.9)	48.4 (2.7)	33.3 (2.9)	771	9.4 (1.8)	5.6 (1.4)	3.8 (1.1)
소득수준[4]												
하	1,536	45.5 (1.5)	31.8 (1.8)	13.7 (1.0)	666	77.2 (1.9)	54.5 (2.7)	22.7 (1.9)	870	15.3 (1.4)	10.2 (1.2)	5.1 (1.0)
중하	1,543	45.8 (1.4)	26.2 (1.3)	19.7 (1.2)	670	82.2 (1.8)	48.4 (2.2)	33.8 (2.2)	873	10.2 (1.5)	4.3 (0.8)	5.9 (1.1)
중상	1,564	42.2 (1.4)	24.6 (1.4)	17.6 (1.0)	677	77.0 (1.9)	45.2 (2.3)	31.8 (2.0)	887	8.6 (1.2)	4.6 (1.1)	4.0 (0.7)
상	1,533	43.1 (1.7)	24.5 (1.5)	18.6 (1.3)	662	75.3 (1.9)	43.0 (2.2)	32.2 (2.2)	871	9.4 (1.6)	5.1 (1.1)	4.3 (1.0)
거주지역(표준화)[5]												
동	4,890	43.9 (0.7)	27.0 (0.7)	16.9 (0.6)	2,109	76.9 (0.9)	47.5 (1.2)	29.4 (1.0)	2,781	11.7 (0.8)	6.4 (0.7)	5.3 (0.6)
읍면	1,366	45.1 (1.7)	28.5 (2.2)	16.6 (1.5)	595	79.6 (2.3)	50.4 (3.2)	29.2 (2.5)	771	9.6 (1.9)	5.1 (1.4)	4.4 (1.1)
소득수준(표준화)												
하	1,536	45.0 (1.6)	31.8 (1.8)	13.2 (1.0)	666	76.2 (2.0)	54.2 (2.6)	22.0 (1.6)	870	15.5 (1.4)	10.3 (1.2)	5.2 (1.0)
중하	1,543	45.8 (1.4)	26.6 (1.3)	19.2 (1.3)	670	81.4 (1.8)	48.3 (2.2)	33.1 (2.1)	873	10.8 (1.5)	4.6 (0.9)	6.2 (1.1)
중상	1,564	41.9 (1.4)	25.3 (1.4)	16.6 (1.0)	677	76.5 (2.0)	45.8 (2.3)	30.7 (1.7)	887	9.1 (1.3)	4.9 (1.2)	4.2 (0.8)
상	1,533	43.4 (1.8)	25.2 (1.5)	18.2 (1.3)	662	75.3 (1.9)	43.5 (2.2)	31.7 (2.0)	871	9.8 (1.7)	5.3 (1.2)	4.5 (1.1)

1) 평생흡연율 : 평생 살아오면서 담배 5갑(100개비)이상 피운 분율

2) 현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율

3) 과거흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거 담배를 피웠지만 현재 담배를 피우지 않는 분율

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-I-11. 평생흡연자의 흡연시작연령[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 세)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)
19세이상	2,462	20.2 (0.2)	2,138	19.5 (0.1)	324	24.9 (0.7)
연령(세)						
19-29	242	17.9 (0.2)	172	17.9 (0.2)	70	18.0 (0.3)
30-39	514	18.8 (0.1)	427	18.5 (0.1)	87	20.6 (0.4)
40-49	483	20.1 (0.2)	428	19.4 (0.2)	55	26.0 (1.0)
50-59	432	21.1 (0.4)	401	20.1 (0.3)	31	33.1 (2.4)
60-69	426	21.7 (0.4)	392	20.8 (0.3)	34	32.5 (2.2)
70+	365	25.0 (0.8)	318	22.0 (0.5)	47	39.0 (2.3)
19-64	1,890	19.6 (0.1)	1,628	19.2 (0.1)	262	22.9 (0.6)
65+	572	23.8 (0.6)	510	21.6 (0.4)	62	38.4 (2.0)
거주지역						
동	1,913	20.0 (0.2)	1,647	19.4 (0.1)	266	24.0 (0.7)
읍면	549	20.6 (0.4)	491	19.6 (0.2)	58	29.1 (1.7)
소득수준[2]						
하	635	20.5 (0.3)	523	19.4 (0.2)	112	25.8 (1.1)
중하	627	19.8 (0.2)	545	19.4 (0.2)	82	22.8 (1.0)
중상	600	20.3 (0.3)	536	19.8 (0.2)	64	24.9 (1.5)
상	571	20.0 (0.3)	510	19.3 (0.2)	61	26.2 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,913	20.0 (0.1)	1,647	19.3 (0.1)	266	25.4 (0.5)
읍면	549	20.0 (0.3)	491	19.3 (0.2)	58	- -[4]
소득수준(표준화)						
하	635	20.3 (0.3)	523	19.3 (0.2)	112	- -
중하	627	19.6 (0.2)	545	19.2 (0.2)	82	- -
중상	600	20.1 (0.2)	536	19.6 (0.2)	64	- -
상	571	19.8 (0.3)	510	19.1 (0.2)	61	- -

1) 평생흡연자의 흡연시작연령(세) : 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-12. 현재흡연자의 하루평균흡연량[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 개비, %)

구 분	N	흡연량	10개비 이하	11-20개비 이하	21개비 이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,335	15.4 (0.3)	39.9 (1.5)	49.7 (1.6)	10.3 (1.0)
연령(세)					
19-29	180	12.3 (0.6)	58.5 (4.0)	35.9 (4.4)	5.5 (2.2)
30-39	351	14.6 (0.5)	41.5 (2.9)	50.9 (2.9)	7.6 (1.5)
40-49	316	17.2 (0.6)	32.1 (3.1)	52.7 (3.3)	15.2 (2.4)
50-59	220	18.5 (0.6)	23.5 (3.6)	59.8 (4.1)	16.7 (3.0)
60-69	157	15.1 (0.8)	40.5 (4.5)	53.5 (4.5)	6.1 (1.9)
70+	111	13.8 (1.0)	48.7 (6.0)	46.9 (5.7)	4.4 (2.4)
19-64	1,154	15.5 (0.3)	39.3 (1.6)	50.1 (1.7)	10.6 (1.1)
65+	181	14.2 (0.8)	48.5 (4.1)	45.2 (4.0)	6.2 (2.2)
거주지역					
동	1,046	15.2 (0.3)	41.6 (1.7)	48.3 (1.9)	10.0 (1.0)
읍면	289	16.4 (0.8)	33.8 (2.7)	54.9 (3.0)	11.4 (3.0)
소득수준[2]					
하	401	15.1 (0.6)	42.4 (2.9)	47.9 (2.6)	9.7 (1.6)
중하	334	16.0 (0.5)	35.9 (3.3)	54.9 (2.9)	9.2 (1.8)
중상	300	14.6 (0.7)	43.8 (3.3)	46.4 (3.2)	9.8 (2.3)
상	284	16.0 (0.6)	36.8 (3.4)	51.2 (4.1)	12.0 (2.4)
거주지역(표준화)[3]					
동	1,046	15.1 (0.2)	42.0 (1.6)	48.3 (1.8)	9.6 (1.0)
읍면	289	- -[4]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	401	14.8 (0.5)	43.9 (2.8)	47.8 (2.7)	8.4 (1.4)
중하	334	15.6 (0.5)	38.0 (3.1)	53.7 (2.9)	8.3 (1.6)
중상	300	14.7 (0.6)	43.5 (3.0)	47.0 (3.1)	9.5 (2.2)
상	284	16.0 (0.6)	36.8 (3.4)	50.9 (4.0)	12.3 (2.4)

1) 현재흡연자의 하루 평균 흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-13. 현재흡연자의 하루평균흡연량[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 개비, %)

구 분	N	흡연량	10개비 이하	11-20개비 이하	21개비 이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,156	16.2 (0.3)	34.5 (1.5)	53.9 (1.7)	11.6 (1.1)
연령(세)					
19-29	143	12.9 (0.7)	55.1 (4.7)	38.5 (4.7)	6.4 (2.7)
30-39	310	15.2 (0.5)	37.3 (3.1)	54.2 (3.1)	8.5 (1.7)
40-49	277	18.3 (0.7)	25.4 (3.0)	57.6 (3.4)	16.9 (2.6)
50-59	199	19.5 (0.6)	17.0 (3.0)	64.4 (4.1)	18.7 (3.3)
60-69	139	15.5 (0.9)	36.1 (4.8)	58.1 (4.7)	5.9 (2.0)
70+	88	15.0 (1.1)	39.3 (5.8)	54.8 (5.8)	5.8 (3.1)
19-64	1,008	16.3 (0.3)	34.1 (1.6)	54.0 (1.8)	11.9 (1.2)
65+	148	15.3 (0.9)	40.7 (4.4)	51.6 (4.5)	7.8 (2.6)
거주지역					
동	901	16.0 (0.3)	36.4 (1.8)	52.3 (1.9)	11.3 (1.2)
읍면	255	17.2 (0.9)	27.7 (2.5)	59.6 (3.3)	12.8 (3.3)
소득수준[2]					
하	328	16.3 (0.6)	35.1 (3.1)	53.3 (3.0)	11.6 (1.9)
중하	296	16.6 (0.5)	31.8 (3.2)	58.1 (2.9)	10.1 (2.0)
중상	267	15.2 (0.7)	40.1 (3.3)	49.0 (3.3)	10.9 (2.5)
상	251	16.8 (0.7)	30.6 (3.5)	56.0 (4.1)	13.3 (2.8)
거주지역(표준화)[3]					
동	901	15.9 (0.3)	37.0 (1.7)	52.3 (1.9)	10.7 (1.1)
읍면	255	- -[4]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	328	15.9 (0.5)	36.6 (2.8)	53.3 (3.0)	10.1 (1.6)
중하	296	16.2 (0.5)	34.3 (3.1)	56.6 (2.9)	9.1 (1.7)
중상	267	- -	- -	- -	- -
상	251	- -	- -	- -	- -

1) 현재흡연자의 하루 평균 흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-14. 현재흡연자의 하루평균흡연량[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 개비, %)

구 분	N	흡연량	10개비 이하	11-20개비 이하	21개비 이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	179	9.1 (0.4)	81.4 (3.2)	18.2 (3.2)	0.4 (0.4)
연령(세)					
19-29	37	8.7 (0.8)	81.6 (6.7)	18.4 (6.7)	0.0 (-)[4]
30-39	41	8.9 (1.0)	77.0 (7.9)	23.0 (7.9)	0.0 (-)
40-49	39	8.2 (0.8)	88.5 (5.8)	11.5 (5.8)	0.0 (-)
50-59	21	10.3 (1.1)	79.6 (5.9)	20.4 (5.9)	0.0 (-)
60-69	18	- -[5]	- -	- -	- -
70+	23	10.3 (1.2)	77.9 (9.0)	22.1 (9.0)	0.0 (-)
19-64	146	9.0 (0.5)	81.5 (3.5)	18.0 (3.5)	0.5 (0.5)
65+	33	9.9 (0.9)	80.8 (7.1)	19.2 (7.1)	0.0 (-)
거주지역					
동	145	9.0 (0.5)	80.9 (3.8)	18.6 (3.8)	0.5 (0.5)
읍면	34	9.7 (1.0)	83.7 (5.2)	16.3 (5.2)	0.0 (-)
소득수준[2]					
하	73	9.3 (0.6)	79.7 (5.1)	20.3 (5.1)	0.0 (-)
중하	38	8.7 (1.0)	80.8 (7.4)	19.2 (7.4)	0.0 (-)
중상	33	9.2 (1.2)	77.7 (8.3)	22.3 (8.3)	0.0 (-)
상	33	8.4 (0.8)	91.6 (4.5)	8.4 (4.5)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[3]					
동	145	- -[6]	- -	- -	- -
읍면	34	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	73	- -	- -	- -	- -
중하	38	- -	- -	- -	- -
중상	33	- -	- -	- -	- -
상	33	- -	- -	- -	- -

1) 현재흡연자의 하루 평균 흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

6) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-15. 현재흡연자의 금연시도율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	1,332	54.6 (1.8)	1,153	53.4 (2.0)	179	63.3 (4.1)
연령(세)						
19-29	180	58.5 (4.9)	143	57.0 (5.5)	37	68.7 (6.3)
30-39	349	57.1 (2.9)	308	55.5 (3.1)	41	70.2 (7.5)
40-49	316	52.1 (3.5)	277	51.3 (3.7)	39	59.4 (8.8)
50-59	220	51.8 (3.6)	199	50.7 (3.9)	21	61.4 (10.8)
60-69	156	43.6 (5.1)	138	44.3 (5.4)	18	- -[4]
70+	111	59.8 (5.4)	88	60.5 (5.7)	23	57.4 (12.6)
19-64	1,151	54.5 (1.9)	1,005	53.2 (2.1)	146	64.6 (4.3)
65+	181	56.1 (4.7)	148	56.8 (4.9)	33	53.0 (10.5)
거주지역						
동	1,043	55.4 (1.9)	898	54.4 (2.2)	145	62.3 (4.6)
읍면	289	51.6 (4.3)	255	49.7 (4.5)	34	67.2 (8.1)
소득수준[2]						
하	401	54.6 (3.0)	328	53.5 (3.4)	73	60.0 (6.9)
중하	333	54.4 (3.3)	295	53.8 (3.5)	38	60.5 (8.5)
중상	298	55.6 (3.3)	265	54.5 (3.6)	33	66.3 (8.1)
상	284	53.8 (3.3)	251	51.8 (3.7)	33	71.8 (9.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,043	55.5 (2.0)	898	55.1 (2.2)	145	- -
읍면	289	- -[5]	255	- -	34	- -
소득수준(표준화)						
하	401	52.7 (3.0)	328	52.0 (3.4)	73	- -
중하	333	54.6 (3.2)	295	53.8 (3.4)	38	- -
중상	298	55.6 (3.4)	265	- -	33	- -
상	284	54.2 (3.2)	251	- -	33	- -

1) 현재흡연자의 금연시도율 : 현재 흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간)이상 금연을 시도한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-16. 현재흡연자의 금연계획 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1개월이내	6개월이내	언젠가	계획없음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,333	21.0 (1.3)	13.0 (1.2)	37.6 (1.5)	28.4 (1.6)
연령(세)					
19-29	180	22.1 (3.4)	20.0 (3.4)	34.5 (3.7)	23.4 (3.4)
30-39	350	19.9 (2.3)	16.1 (2.2)	37.6 (3.0)	26.4 (3.1)
40-49	316	23.2 (2.7)	9.8 (1.9)	40.0 (3.0)	27.0 (3.1)
50-59	220	17.9 (2.9)	9.2 (2.3)	41.4 (4.2)	31.5 (3.9)
60-69	156	23.6 (4.3)	4.7 (1.7)	37.1 (4.3)	34.6 (4.0)
70+	111	17.6 (4.1)	5.1 (2.2)	24.7 (4.7)	52.6 (5.5)
19-64	1,152	21.0 (1.3)	13.6 (1.3)	38.2 (1.6)	27.1 (1.7)
65+	181	20.3 (3.4)	4.4 (1.6)	28.6 (4.7)	46.7 (4.3)
거주지역					
동	1,044	21.5 (1.4)	12.8 (1.3)	38.1 (1.8)	27.7 (1.8)
읍면	289	19.0 (2.9)	14.1 (2.7)	36.0 (2.9)	30.9 (4.0)
소득수준[1)]					
하	400	22.6 (2.3)	10.2 (1.8)	35.7 (2.5)	31.6 (2.9)
중하	334	19.8 (2.5)	11.9 (2.1)	44.0 (3.2)	24.3 (2.8)
중상	299	20.1 (2.8)	13.8 (2.6)	39.1 (3.3)	27.0 (3.2)
상	284	21.4 (3.3)	18.3 (3.1)	30.5 (2.9)	29.9 (3.4)
거주지역(표준화)[2)]					
동	1,044	22.0 (1.5)	11.8 (1.2)	37.2 (1.8)	29.0 (1.8)
읍면	289	- -[3)]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	400	22.0 (2.3)	10.4 (1.8)	35.1 (2.4)	32.6 (2.8)
중하	334	20.3 (2.6)	11.7 (2.2)	43.1 (3.2)	24.8 (2.7)
중상	299	20.8 (2.9)	12.9 (2.4)	39.0 (3.2)	27.3 (3.1)
상	284	21.9 (3.2)	17.1 (2.9)	30.1 (2.9)	30.9 (3.3)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-17. 현재흡연자의 금연계획 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1개월이내	6개월이내	언젠가	계획없음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,154	20.5 (1.4)	13.2 (1.3)	37.7 (1.7)	28.6 (1.8)
연령(세)					
19-29	143	21.8 (3.8)	18.1 (3.6)	34.1 (4.1)	26.1 (4.1)
30-39	309	18.6 (2.4)	17.0 (2.4)	37.5 (3.3)	26.8 (3.3)
40-49	277	23.0 (2.9)	10.5 (2.0)	40.2 (3.2)	26.2 (3.3)
50-59	199	16.5 (2.9)	9.6 (2.5)	41.7 (4.7)	32.2 (4.2)
60-69	138	25.0 (4.6)	5.1 (1.9)	34.4 (4.7)	35.5 (4.4)
70+	88	20.4 (5.0)	5.8 (2.8)	28.7 (5.4)	45.0 (5.7)
19-64	1,006	20.3 (1.5)	13.7 (1.4)	38.1 (1.8)	27.9 (1.9)
65+	148	23.1 (4.3)	4.9 (1.9)	31.4 (5.2)	40.5 (4.6)
거주지역					
동	899	21.1 (1.5)	12.6 (1.4)	38.2 (2.0)	28.1 (2.0)
읍면	255	18.4 (3.1)	15.3 (3.0)	35.8 (3.4)	30.6 (4.2)
소득수준[1)]					
하	327	22.0 (2.7)	10.4 (2.1)	37.0 (3.0)	30.6 (3.1)
중하	296	19.1 (2.7)	11.4 (2.1)	44.6 (3.4)	25.0 (2.9)
중상	266	19.5 (3.0)	14.6 (2.8)	36.9 (3.4)	29.0 (3.5)
상	251	21.6 (3.6)	18.1 (3.3)	30.6 (3.1)	29.7 (3.6)
거주지역(표준화)[2)]					
동	899	22.1 (1.7)	11.6 (1.3)	37.2 (2.0)	29.1 (2.0)
읍면	255	- -[3)]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	327	21.4 (2.7)	10.5 (2.1)	36.5 (2.8)	31.7 (3.0)
중하	296	19.8 (2.7)	11.3 (2.2)	43.5 (3.4)	25.4 (2.9)
중상	266	- -	- -	- -	- -
상	251	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-18. 현재흡연자의 금연계획 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1개월이내	6개월이내	언젠가	계획없음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	179	24.6 (4.5)	11.7 (3.1)	37.1 (4.2)	26.6 (3.9)
연령(세)					
19-29	37	23.9 (8.0)	33.2 (11.4)	37.9 (12.9)	5.0 (3.1)
30-39	41	30.2 (8.0)	8.5 (4.2)	38.0 (8.7)	23.3 (7.8)
40-49	39	25.0 (8.9)	3.4 (2.7)	37.8 (9.1)	33.8 (8.7)
50-59	21	29.5 (13.0)	5.8 (4.4)	39.0 (10.9)	25.7 (8.1)
60-69	18	- -[3]	- -	- -	- -
70+	23	8.7 (6.3)	3.0 (3.0)	12.4 (6.8)	75.9 (10.1)
19-64	146	26.6 (5.0)	12.9 (3.5)	39.6 (4.6)	20.9 (3.6)
65+	33	8.5 (5.3)	2.4 (2.4)	17.0 (6.7)	72.1 (8.7)
거주지역					
동	145	24.5 (4.9)	13.6 (3.7)	37.0 (5.0)	24.9 (4.1)
읍면	34	24.7 (10.6)	4.3 (3.1)	37.4 (6.5)	33.6 (9.5)
소득수준[1]					
하	73	25.6 (6.3)	8.9 (3.3)	29.1 (5.1)	36.4 (6.5)
중하	38	27.6 (8.8)	16.9 (7.2)	38.1 (9.5)	17.4 (6.5)
중상	33	25.5 (9.3)	6.0 (4.9)	60.3 (11.6)	8.2 (3.7)
상	33	19.2 (8.3)	20.1 (9.3)	29.7 (7.6)	31.0 (8.9)
거주지역(표준화)[2]					
동	145	- -[4]	- -	- -	- -
읍면	34	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	73	- -	- -	- -	- -
중하	38	- -	- -	- -	- -
중상	33	- -	- -	- -	- -
상	33	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-19. 과거흡연자의 금연방법 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	자신의지	니코틴 대체용품	의사처방 약물치료	금연클리닉	금연상담 전화	금연초	금연침	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,128	90.3 (1.1)	4.6 (0.8)	1.5 (0.4)	4.2 (0.8)	0.4 (0.2)	2.1 (0.5)	1.3 (0.4)	1.6 (0.4)
연령(세)									
19-29	62	98.7 (1.3)	2.3 (2.2)	0.0 (-)[3]	0.2 (0.2)	0.0 (-)	0.0 (-)	2.3 (2.2)	0.0 (-)
30-39	163	92.9 (2.2)	4.7 (2.0)	0.3 (0.3)	4.5 (2.2)	0.7 (0.7)	1.5 (0.9)	2.1 (1.1)	0.5 (0.5)
40-49	168	84.0 (3.3)	5.2 (1.7)	1.4 (1.0)	3.3 (1.6)	0.7 (0.7)	3.5 (1.8)	1.1 (0.7)	1.9 (1.0)
50-59	212	85.4 (3.3)	7.4 (2.2)	2.6 (1.2)	7.9 (2.4)	0.0 (-)	3.2 (1.3)	0.6 (0.5)	2.3 (1.2)
60-69	269	92.0 (1.7)	3.1 (1.1)	2.3 (1.6)	3.5 (1.1)	0.0 (-)	2.1 (0.9)	1.5 (0.8)	2.7 (1.0)
70+	254	94.8 (1.6)	2.8 (1.0)	1.8 (1.3)	3.3 (1.9)	0.6 (0.5)	0.7 (0.5)	0.4 (0.4)	1.2 (0.6)
19-64	737	89.3 (1.4)	5.1 (1.0)	1.5 (0.5)	4.3 (0.9)	0.3 (0.2)	2.2 (0.6)	1.4 (0.5)	1.5 (0.5)
65+	391	93.7 (1.3)	2.8 (0.8)	1.5 (0.9)	3.8 (1.3)	0.4 (0.3)	1.4 (0.6)	0.9 (0.5)	1.7 (0.6)
거주지역									
동	867	90.2 (1.2)	4.6 (0.9)	1.7 (0.5)	3.9 (0.8)	0.4 (0.2)	2.2 (0.6)	1.6 (0.5)	1.6 (0.5)
읍면	261	90.7 (2.7)	4.7 (1.8)	0.8 (0.5)	5.2 (1.8)	0.2 (0.2)	1.5 (0.8)	0.3 (0.3)	1.3 (0.7)
소득수준[1]									
하	235	90.2 (2.4)	2.7 (1.1)	2.0 (1.4)	6.4 (2.1)	0.3 (0.3)	1.1 (0.7)	1.4 (0.7)	1.9 (1.0)
중하	293	91.6 (2.0)	5.9 (1.7)	0.7 (0.4)	6.2 (1.9)	0.9 (0.7)	1.3 (0.6)	2.1 (1.1)	0.6 (0.3)
중상	300	89.3 (2.4)	4.6 (1.3)	2.1 (1.0)	3.4 (1.2)	0.1 (0.1)	1.9 (0.9)	1.2 (0.7)	0.9 (0.5)
상	287	89.5 (2.3)	4.0 (1.5)	1.6 (0.8)	0.5 (0.3)	0.0 (-)	4.1 (1.6)	0.4 (0.3)	2.8 (1.2)
거주지역(표준화)[2]									
동	867	91.2 (1.2)	4.3 (1.0)	1.3 (0.4)	3.4 (0.8)	0.4 (0.3)	2.0 (0.6)	1.9 (0.7)	1.3 (0.4)
읍면	261	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	235	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	293	92.4 (1.9)	5.6 (1.9)	0.4 (0.2)	5.3 (1.6)	1.2 (0.8)	1.1 (0.6)	2.6 (1.5)	0.5 (0.2)
중상	300	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	287	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-20. 과거흡연자의 금연방법 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	자신의지	니코틴 대체용품	의사처방 약물치료	금연클리닉	금연상담 전화	금연초	금연침	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	983	89.5 (1.3)	4.5 (0.8)	1.8 (0.5)	4.3 (0.8)	0.2 (0.2)	2.0 (0.6)	1.0 (0.3)	1.8 (0.5)
연령(세)									
19-29	29	97.7 (2.3)	0.0 (-)[3]	0.0 (-)	0.3 (0.3)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
30-39	117	92.6 (2.7)	4.1 (1.9)	0.3 (0.3)	5.9 (2.8)	0.9 (0.9)	1.1 (0.9)	2.1 (1.3)	0.6 (0.6)
40-49	152	83.5 (3.7)	4.9 (1.8)	1.5 (1.1)	3.1 (1.7)	0.0 (-)	3.8 (2.0)	1.2 (0.7)	2.1 (1.1)
50-59	202	85.2 (3.4)	7.7 (2.3)	2.7 (1.2)	8.2 (2.4)	0.0 (-)	2.9 (1.3)	0.6 (0.5)	2.3 (1.3)
60-69	253	93.1 (1.7)	2.7 (1.0)	2.4 (1.6)	2.6 (1.0)	0.0 (-)	1.2 (0.7)	1.2 (0.7)	2.6 (1.0)
70+	230	94.0 (1.9)	3.2 (1.1)	2.1 (1.5)	1.7 (0.9)	0.7 (0.5)	0.8 (0.6)	0.4 (0.4)	1.3 (0.7)
19-64	621	88.5 (1.7)	4.8 (1.0)	1.8 (0.6)	4.8 (1.0)	0.2 (0.2)	2.2 (0.7)	1.1 (0.4)	1.7 (0.6)
65+	362	93.0 (1.4)	3.1 (0.9)	1.6 (1.0)	2.5 (0.8)	0.5 (0.3)	1.3 (0.6)	0.6 (0.4)	1.9 (0.7)
거주지역									
동	746	89.4 (1.4)	4.6 (1.0)	2.0 (0.6)	4.4 (1.0)	0.2 (0.2)	2.1 (0.7)	1.2 (0.4)	1.9 (0.5)
읍면	237	90.0 (3.1)	4.0 (1.7)	0.9 (0.5)	4.0 (1.5)	0.3 (0.3)	1.7 (0.9)	0.4 (0.3)	1.4 (0.8)
소득수준[1]									
하	196	89.5 (2.9)	3.3 (1.3)	2.5 (1.7)	6.4 (2.2)	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)	1.2 (0.7)	2.4 (1.2)
중하	249	90.8 (2.3)	5.1 (1.6)	0.8 (0.4)	6.7 (2.2)	0.5 (0.5)	1.2 (0.7)	1.1 (0.7)	0.5 (0.3)
중상	269	89.5 (2.6)	4.7 (1.4)	2.3 (1.1)	3.4 (1.2)	0.2 (0.2)	1.7 (0.9)	1.4 (0.8)	1.1 (0.5)
상	259	88.2 (2.6)	4.5 (1.7)	1.8 (0.9)	0.6 (0.4)	0.0 (-)	4.6 (1.9)	0.5 (0.3)	3.1 (1.3)
거주지역(표준화)[2]									
동	746	90.8 (1.5)	3.9 (0.9)	1.4 (0.5)	3.8 (1.0)	0.3 (0.3)	1.9 (0.7)	1.2 (0.4)	1.3 (0.4)
읍면	237	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	196	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	249	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	269	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	259	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-21. 과거흡연자의 금연방법 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	자신의지	니코틴 대체용품	의사처방 약물치료	금연클리닉	금연상담 전화	금연초	금연침	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	145	94.6 (1.8)	5.4 (2.6)	0.0 (-)[3]	3.6 (2.5)	1.0 (1.0)	2.5 (1.2)	2.9 (1.8)	0.3 (0.3)
연령(세)									
19-29	33	100.0 (0.0)	5.3 (4.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	5.3 (4.9)	0.0 (-)
30-39	46	94.0 (3.2)	6.9 (5.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	2.6 (2.5)	2.2 (2.2)	0.0 (-)
40-49	16	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50-59	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60-69	16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70+	24	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	13.2 (11.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
19-64	116	93.6 (2.1)	6.4 (3.0)	0.0 (-)	1.5 (1.1)	1.2 (1.2)	2.4 (1.3)	2.8 (2.1)	0.4 (0.4)
65+	29	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.2 (0.2)	14.8 (10.5)	0.0 (-)	3.0 (3.0)	3.0 (3.0)	0.0 (-)
거주지역									
동	121	94.3 (2.0)	4.4 (2.4)	0.0 (-)	1.3 (0.9)	1.2 (1.2)	2.9 (1.5)	3.4 (2.2)	0.4 (0.4)
읍면	24	96.0 (3.5)	10.3 (9.6)	0.0 (-)	14.8 (12.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
소득수준[1]									
하	39	93.6 (3.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	6.4 (6.0)	0.0 (-)	4.7 (3.2)	2.3 (2.3)	0.0 (-)
중하	44	96.1 (2.4)	10.1 (6.5)	0.1 (0.1)	3.6 (2.5)	3.4 (3.4)	1.5 (1.6)	7.5 (5.9)	1.0 (1.1)
중상	31	87.6 (6.1)	3.4 (3.3)	0.0 (-)	3.5 (3.5)	0.0 (-)	3.4 (3.3)	0.0 (-)	0.0 (-)
상	28	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[2]									
동	121	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
읍면	24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
2) 2005년 추계인구로 연령표준화
3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시
4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시
5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-22. 현재비흡연자의 간접흡연노출률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	4,917	38.1 (1.0)	1,547	45.9 (1.6)	3,370	33.8 (1.1)
연령(세)						
19-29	590	44.6 (2.6)	163	49.1 (4.9)	427	41.9 (2.7)
30-39	903	43.6 (2.1)	217	66.9 (3.7)	686	33.2 (2.4)
40-49	844	45.3 (1.9)	255	50.8 (3.6)	589	42.5 (2.3)
50-59	953	41.6 (2.0)	282	50.2 (3.4)	671	36.6 (2.1)
60-69	869	25.3 (2.0)	334	32.4 (3.4)	535	20.7 (2.2)
70+	758	10.8 (1.4)	296	4.9 (1.4)	462	13.7 (2.0)
19-64	3,724	42.7 (1.1)	1,082	52.2 (1.8)	2,642	37.6 (1.2)
65+	1,193	14.2 (1.2)	465	13.4 (2.1)	728	14.6 (1.6)
거주지역						
동	3,840	38.0 (1.0)	1,207	46.4 (1.7)	2,633	33.3 (1.2)
읍면	1,077	38.5 (2.5)	340	44.1 (4.2)	737	35.6 (2.7)
소득수준[2]						
하	1,135	37.9 (2.0)	338	42.5 (3.1)	797	35.6 (2.4)
중하	1,207	36.9 (2.0)	374	44.6 (3.5)	833	32.8 (2.3)
중상	1,263	38.2 (1.9)	410	47.8 (3.2)	853	32.9 (2.2)
상	1,248	39.9 (1.9)	410	49.3 (3.7)	838	34.1 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,840	38.6 (1.0)	1,207	48.5 (1.7)	2,633	33.8 (1.2)
읍면	1,077	43.7 (2.9)	340	50.7 (4.7)	737	40.0 (3.3)
소득수준(표준화)						
하	1,135	39.4 (2.0)	338	46.0 (3.3)	797	36.8 (2.4)
중하	1,207	38.5 (2.0)	374	47.4 (3.6)	833	33.9 (2.3)
중상	1,263	39.7 (1.9)	410	50.4 (3.3)	853	34.1 (2.2)
상	1,248	41.4 (2.0)	410	52.4 (3.7)	838	34.9 (2.2)

1) 현재비흡연자의 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정의 실내 또는 직장에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-I-23. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	2,703	49.1 (1.3)	1,108	57.6 (1.9)	1,595	42.3 (1.6)
연령(세)						
19-29	335	58.3 (3.0)	90	76.1 (4.7)	245	48.1 (3.9)
30-39	498	57.3 (2.5)	204	69.8 (3.2)	294	45.4 (3.3)
40-49	617	49.7 (2.5)	243	53.6 (3.7)	374	46.9 (3.2)
50-59	632	46.8 (2.6)	251	55.1 (3.6)	381	39.8 (2.9)
60-69	415	36.3 (3.2)	222	44.6 (4.5)	193	26.9 (4.0)
70+	206	15.5 (3.1)	98	10.1 (3.5)	108	19.6 (5.2)
19-64	2,319	51.5 (1.3)	913	60.9 (1.8)	1,406	44.2 (1.7)
65+	384	23.6 (2.7)	195	26.5 (4.0)	189	20.9 (3.8)
거주지역						
동	1,986	50.2 (1.3)	834	58.8 (2.0)	1,152	43.0 (1.7)
읍면	717	45.9 (3.4)	274	53.7 (4.5)	443	40.5 (3.5)
소득수준[2]						
하	559	50.1 (2.3)	213	57.0 (3.5)	346	44.9 (3.3)
중하	702	46.6 (2.6)	280	53.5 (3.9)	422	41.5 (3.3)
중상	703	47.9 (2.4)	303	58.5 (3.7)	400	39.2 (2.8)
상	710	52.3 (2.5)	304	61.6 (3.8)	406	43.7 (2.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,986	48.7 (1.2)	834	58.0 (1.8)	1,152	41.2 (1.6)
읍면	717	52.5 (2.9)	274	- -[4]	443	46.2 (3.4)
소득수준(표준화)						
하	559	50.8 (2.2)	213	- -	346	45.1 (3.3)
중하	702	47.8 (2.5)	280	54.1 (4.0)	422	41.6 (2.9)
중상	703	47.5 (2.4)	303	60.1 (3.4)	400	38.4 (2.8)
상	710	51.5 (2.5)	304	61.5 (3.5)	406	42.7 (2.8)

1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-I-24. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	4,917	14.4 (0.7)	1,547	5.4 (0.9)	3,370	19.2 (1.0)
연령(세)						
19-29	590	21.0 (2.2)	163	15.8 (3.5)	427	24.1 (2.5)
30-39	903	14.1 (1.4)	217	4.4 (1.6)	686	18.5 (1.9)
40-49	844	15.4 (1.6)	255	1.3 (1.0)	589	22.7 (2.1)
50-59	953	14.0 (1.4)	282	3.2 (1.2)	671	20.3 (1.9)
60-69	869	8.8 (1.4)	334	3.1 (1.2)	535	12.6 (1.9)
70+	758	7.2 (1.4)	296	1.5 (0.7)	462	10.1 (1.9)
19-64	3,724	15.7 (0.8)	1,082	6.0 (1.0)	2,642	20.9 (1.1)
65+	1,193	7.4 (1.1)	465	2.4 (0.9)	728	10.1 (1.4)
거주지역						
동	3,840	14.2 (0.8)	1,207	5.7 (1.0)	2,633	18.8 (1.1)
읍면	1,077	15.0 (1.7)	340	4.7 (1.5)	737	20.4 (2.1)
소득수준[2]						
하	1,135	16.8 (1.8)	338	9.3 (2.3)	797	20.4 (2.2)
중하	1,207	13.2 (1.6)	374	4.0 (1.8)	833	18.0 (2.0)
중상	1,263	13.1 (1.2)	410	4.4 (1.5)	853	17.9 (1.6)
상	1,248	14.2 (1.3)	410	4.4 (1.6)	838	20.2 (1.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,840	14.4 (0.8)	1,207	5.6 (1.0)	2,633	19.0 (1.1)
읍면	1,077	16.8 (2.3)	340	5.8 (2.4)	737	22.7 (2.6)
소득수준(표준화)						
하	1,135	17.6 (1.9)	338	10.6 (2.6)	797	21.0 (2.2)
중하	1,207	13.6 (1.7)	374	4.3 (1.8)	833	18.3 (2.1)
중상	1,263	13.6 (1.3)	410	4.5 (1.5)	853	18.4 (1.7)
상	1,248	14.6 (1.4)	410	4.6 (1.7)	838	20.6 (1.9)

1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-I-25. 흡연예방 또는 금연교육 경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,254	7.1 (0.4)	2,704	10.9 (0.8)	3,550	3.4 (0.5)
연령(세)						
19-29	771	13.4 (1.5)	307	17.5 (2.4)	464	9.1 (2.0)
30-39	1,254	9.6 (0.9)	527	15.1 (1.7)	727	3.7 (0.9)
40-49	1,162	5.9 (0.7)	532	9.3 (1.4)	630	2.3 (0.5)
50-59	1,173	4.5 (0.7)	481	7.9 (1.4)	692	1.1 (0.3)
60-69	1,025	1.9 (0.6)	473	3.2 (1.1)	552	0.7 (0.5)
70+	869	1.4 (0.6)	384	2.1 (0.9)	485	1.0 (0.8)
19-64	4,880	8.0 (0.5)	2,091	12.0 (0.9)	2,789	3.9 (0.6)
65+	1,374	1.4 (0.6)	613	2.5 (0.8)	761	0.7 (0.6)
거주지역						
동	4,888	7.6 (0.5)	2,109	11.5 (0.9)	2,779	3.7 (0.6)
읍면	1,366	5.4 (0.8)	595	8.8 (1.5)	771	2.2 (0.8)
소득수준[2]						
하	1,536	5.6 (0.9)	666	8.7 (1.6)	870	2.8 (1.0)
중하	1,541	7.2 (0.8)	670	11.3 (1.5)	871	3.1 (0.8)
중상	1,564	7.2 (0.8)	677	11.6 (1.4)	887	3.0 (0.6)
상	1,533	8.6 (1.0)	662	12.2 (1.7)	871	4.8 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,888	7.6 (0.5)	2,109	11.3 (0.8)	2,779	3.9 (0.6)
읍면	1,366	7.0 (1.1)	595	10.9 (1.9)	771	2.7 (0.9)
소득수준(표준화)						
하	1,536	6.0 (0.9)	666	9.4 (1.5)	870	2.9 (1.0)
중하	1,541	7.8 (0.8)	670	11.9 (1.4)	871	3.6 (0.9)
중상	1,564	7.6 (0.8)	677	11.7 (1.4)	887	3.4 (0.7)
상	1,533	9.1 (1.0)	662	12.5 (1.7)	871	5.5 (1.0)

1) 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-Ⅱ-1. 연간음주율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,802	78.4 (0.7)	2,979	74.2 (1.0)	6,796	75.5 (0.7)	7,481	75.7 (0.7)	6,198	77.7 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	47.0 (1.8)	721	43.0 (2.7)	1,512	43.3 (1.7)	1,656	44.3 (1.6)	1,368	46.8 (1.5)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,802	78.4 (0.6)	2,979	74.8 (0.8)	6,796	76.4 (0.6)	7,481	77.0 (0.6)	6,198	79.0 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	90.5 (0.9)	339	85.3 (2.1)	892	87.6 (1.2)	1,049	89.4 (1.0)	759	89.0 (1.3)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	86.1 (1.1)	635	82.7 (1.6)	1,413	84.0 (1.1)	1,425	83.3 (1.3)	1,238	87.1 (1.1)
40-49	-	- -	-	- -	1,878	82.0 (1.1)	564	79.1 (2.2)	1,328	81.1 (1.3)	1,495	82.0 (1.0)	1,153	83.4 (1.5)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	73.8 (1.5)	504	71.8 (2.1)	1,130	70.6 (1.7)	1,248	70.8 (1.6)	1,163	74.9 (1.4)
60-69	-	- -	-	- -	970	58.2 (1.8)	489	53.8 (2.9)	1,078	58.4 (1.8)	1,208	58.9 (1.6)	1,021	60.7 (2.0)
70+	-	- -	-	- -	647	42.0 (2.2)	448	38.0 (3.2)	955	39.0 (2.0)	1,056	39.3 (1.8)	864	41.7 (1.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	80.0 (0.8)	2,117	75.6 (1.1)	4,997	76.8 (0.7)	5,561	77.2 (0.8)	4,837	79.1 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	71.7 (2.1)	862	68.8 (2.4)	1,799	69.4 (1.6)	1,920	69.4 (2.0)	1,361	72.6 (1.7)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,998	75.8 (1.3)	713	72.4 (2.1)	1,627	73.6 (1.4)	1,866	72.4 (1.3)	1,520	74.8 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	1,987	78.4 (1.2)	696	71.9 (2.0)	1,634	77.6 (1.3)	1,860	75.9 (1.3)	1,534	78.8 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	1,858	80.4 (1.0)	732	75.9 (1.6)	1,663	73.5 (1.3)	1,819	77.2 (1.3)	1,547	78.9 (1.2)
상	-	- -	-	- -	1,872	79.2 (1.2)	701	77.9 (1.7)	1,658	79.1 (1.1)	1,855	77.7 (1.2)	1,518	78.6 (1.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	78.6 (0.7)	2,117	75.5 (1.0)	4,997	76.4 (0.7)	5,561	77.1 (0.7)	4,837	79.1 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	77.7 (1.4)	862	71.5 (1.8)	1,799	75.1 (1.5)	1,920	76.5 (1.2)	1,361	78.8 (1.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,998	75.6 (1.1)	713	72.5 (1.9)	1,627	73.9 (1.4)	1,866	73.3 (1.2)	1,520	75.8 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,987	78.8 (1.0)	696	72.1 (1.7)	1,634	78.4 (1.2)	1,860	77.1 (1.1)	1,534	79.8 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	1,858	80.3 (0.9)	732	76.0 (1.6)	1,663	74.1 (1.2)	1,819	78.3 (1.1)	1,547	80.5 (1.1)
상	-	- -	-	- -	1,872	79.1 (1.1)	701	79.5 (1.5)	1,658	80.1 (1.0)	1,855	79.6 (1.1)	1,518	80.5 (1.2)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,510	87.2 (0.7)	1,241	85.4 (1.3)	2,836	85.8 (0.8)	3,237	86.0 (0.7)	2,682	87.7 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	428	64.3 (2.8)	301	62.4 (4.0)	581	61.8 (2.7)	691	64.4 (2.1)	610	64.2 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,510	86.4 (0.7)	1,241	85.0 (1.2)	2,836	85.6 (0.8)	3,237	86.0 (0.7)	2,682	88.1 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	93.4 (1.1)	141	90.0 (2.9)	366	90.9 (1.7)	485	93.1 (1.3)	304	96.7 (1.0)
30-39	-	- -	-	- -	812	93.3 (1.0)	247	91.8 (2.0)	598	92.8 (1.2)	595	89.7 (1.4)	518	94.3 (1.2)
40-49	-	- -	-	- -	872	88.5 (1.2)	248	89.4 (2.3)	579	89.5 (1.4)	642	89.7 (1.2)	529	89.6 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	579	85.2 (1.6)	205	84.4 (2.6)	488	81.3 (2.0)	543	83.6 (1.8)	479	84.6 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	445	73.5 (2.5)	217	67.6 (4.1)	440	76.3 (2.4)	541	75.7 (2.1)	471	74.8 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	219	56.7 (3.9)	183	59.7 (4.7)	365	55.6 (3.3)	431	59.9 (2.5)	381	61.6 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	88.2 (0.8)	868	86.9 (1.5)	2,079	86.8 (0.9)	2,392	86.8 (0.8)	2,088	88.9 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	715	82.8 (1.7)	373	79.8 (2.6)	757	81.1 (1.8)	845	82.6 (1.8)	594	83.6 (1.5)

1) 연간음주율 : 최근 1년 동안 1잔 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간음주율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	901	83.3 (1.3)	300	81.7 (2.8)	678	83.0 (1.5)	819	81.2 (1.5)	661	84.1 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	890	88.3 (1.2)	286	84.3 (2.4)	674	87.5 (1.5)	801	86.5 (1.4)	667	88.7 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	830	88.7 (1.1)	307	88.7 (1.9)	707	85.4 (1.5)	772	88.4 (1.2)	669	89.7 (1.3)
상	-	- -	-	- -	844	89.0 (1.3)	299	88.3 (1.8)	691	89.1 (1.4)	806	88.4 (1.2)	656	89.2 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	86.6 (0.8)	868	86.3 (1.4)	2,079	85.7 (0.9)	2,392	86.1 (0.8)	2,088	88.4 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	715	85.1 (1.4)	373	81.0 (2.6)	757	83.4 (1.7)	845	85.9 (1.5)	594	87.4 (1.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	901	82.3 (1.3)	300	81.3 (2.7)	678	82.8 (1.5)	819	81.3 (1.5)	661	84.6 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	890	87.7 (1.1)	286	83.8 (2.3)	674	87.5 (1.3)	801	86.5 (1.3)	667	88.7 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	830	87.8 (1.0)	307	88.0 (1.9)	707	84.7 (1.4)	772	88.3 (1.2)	669	90.3 (1.2)
상	-	- -	-	- -	844	88.4 (1.3)	299	88.3 (1.9)	691	89.2 (1.3)	806	88.7 (1.1)	656	89.5 (1.4)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	69.8 (1.0)	1,738	63.3 (1.4)	3,960	65.4 (1.0)	4,244	65.6 (1.0)	3,516	67.8 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	669	35.5 (2.1)	420	29.9 (2.8)	931	30.7 (2.0)	965	30.4 (1.9)	758	34.6 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	70.9 (0.8)	1,738	65.1 (1.2)	3,960	67.6 (0.9)	4,244	68.4 (0.8)	3,516	70.4 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	87.4 (1.3)	198	80.5 (3.3)	526	84.0 (1.8)	564	85.4 (1.7)	455	81.0 (2.3)
30-39	-	- -	-	- -	930	78.6 (1.6)	388	73.2 (2.6)	815	74.7 (1.7)	830	76.4 (1.7)	720	79.5 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	75.3 (1.6)	316	68.5 (3.0)	749	72.4 (2.1)	853	74.1 (1.6)	624	77.0 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	650	62.3 (2.3)	299	59.0 (3.1)	642	59.8 (2.2)	705	58.0 (2.4)	684	65.1 (2.2)
60-69	-	- -	-	- -	525	45.0 (2.5)	272	41.7 (4.3)	638	42.5 (2.4)	667	43.9 (2.2)	550	48.0 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	428	33.6 (2.5)	265	25.1 (3.2)	590	29.0 (2.3)	625	26.7 (2.2)	483	29.3 (2.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	71.8 (1.0)	1,249	64.8 (1.6)	2,918	67.1 (1.0)	3,169	67.8 (1.0)	2,749	69.4 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	61.1 (2.6)	489	57.6 (3.4)	1,042	57.9 (2.8)	1,075	56.3 (2.6)	767	62.0 (2.8)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	68.6 (1.8)	413	63.1 (3.1)	949	64.3 (2.2)	1,047	63.5 (1.8)	859	66.0 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,097	68.8 (1.9)	410	60.7 (3.1)	960	68.2 (1.8)	1,059	65.7 (1.7)	867	69.1 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	1,028	72.4 (1.5)	425	63.0 (2.4)	956	61.6 (2.0)	1,047	66.3 (1.8)	878	68.4 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,028	69.6 (1.7)	402	67.1 (2.5)	967	69.2 (1.7)	1,049	67.4 (1.7)	862	67.5 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	71.1 (0.9)	1,249	65.9 (1.4)	2,918	67.6 (1.0)	3,169	68.8 (0.9)	2,749	70.2 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	70.7 (1.8)	489	61.0 (2.8)	1,042	66.8 (3.3)	1,075	67.3 (1.8)	767	70.5 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	69.5 (1.5)	413	63.7 (2.8)	949	65.6 (2.0)	1,047	65.7 (1.7)	859	67.8 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	1,097	70.2 (1.6)	410	61.6 (2.8)	960	69.8 (1.7)	1,059	68.1 (1.4)	867	71.0 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	1,028	73.3 (1.4)	425	64.1 (2.6)	956	63.6 (1.8)	1,047	69.0 (1.6)	878	71.4 (1.8)
상	-	- -	-	- -	1,028	70.4 (1.6)	402	71.2 (2.1)	967	71.7 (1.6)	1,049	71.1 (1.5)	862	71.4 (1.8)

표 1-II-2. 월간음주율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,802	54.6 (0.8)	2,979	56.7 (1.2)	6,796	58.7 (0.8)	7,481	58.3 (0.8)	6,198	59.3 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	30.3 (1.5)	721	28.6 (2.1)	1,512	31.9 (1.6)	1,656	31.0 (1.4)	1,368	33.0 (1.4)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,802	54.6 (0.7)	2,979	57.2 (1.1)	6,796	59.5 (0.7)	7,481	59.4 (0.8)	6,198	60.4 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	65.5 (1.5)	339	68.9 (2.9)	892	69.9 (1.8)	1,049	69.6 (1.5)	759	67.3 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	60.0 (1.4)	635	62.1 (2.2)	1,413	65.5 (1.5)	1,425	64.5 (1.6)	1,238	67.5 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	1,878	57.7 (1.2)	564	60.4 (2.5)	1,328	64.2 (1.5)	1,495	64.0 (1.3)	1,153	65.5 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	50.1 (1.6)	504	56.0 (2.6)	1,130	54.2 (1.7)	1,248	54.5 (1.7)	1,163	57.3 (1.5)
60-69	-	- -	-	- -	970	37.7 (1.7)	489	38.3 (2.3)	1,078	41.6 (2.0)	1,208	43.7 (1.7)	1,021	43.9 (1.9)
70+	-	- -	-	- -	647	25.7 (1.9)	448	24.3 (2.7)	955	28.3 (1.7)	1,056	27.7 (1.6)	864	29.2 (1.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	55.6 (0.9)	2,117	57.4 (1.4)	4,997	60.3 (0.9)	5,561	59.4 (0.9)	4,837	60.5 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	50.1 (1.9)	862	54.1 (2.2)	1,799	51.6 (1.6)	1,920	53.5 (2.1)	1,361	55.0 (1.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,998	52.3 (1.4)	713	55.8 (2.0)	1,627	56.8 (1.8)	1,866	54.8 (1.6)	1,520	58.0 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	1,987	55.0 (1.4)	696	54.2 (2.5)	1,634	60.8 (1.5)	1,860	58.5 (1.5)	1,534	59.0 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	1,858	56.4 (1.4)	732	60.2 (2.1)	1,663	58.7 (1.6)	1,819	59.8 (1.4)	1,547	60.7 (1.7)
상	-	- -	-	- -	1,872	54.9 (1.3)	701	57.9 (2.1)	1,658	60.3 (1.5)	1,855	60.7 (1.4)	1,518	59.9 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	54.5 (0.8)	2,117	57.3 (1.4)	4,997	59.9 (0.8)	5,561	59.3 (0.8)	4,837	60.5 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	54.4 (1.6)	862	57.2 (1.8)	1,799	54.2 (1.8)	1,920	59.3 (1.8)	1,361	60.1 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,998	52.2 (1.3)	713	56.0 (1.9)	1,627	57.1 (1.7)	1,866	55.7 (1.5)	1,520	58.7 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,987	55.3 (1.4)	696	54.3 (2.4)	1,634	61.4 (1.4)	1,860	59.3 (1.4)	1,534	59.8 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,858	56.3 (1.3)	732	60.2 (2.1)	1,663	59.1 (1.5)	1,819	60.8 (1.3)	1,547	61.9 (1.7)
상	-	- -	-	- -	1,872	54.8 (1.2)	701	59.3 (2.0)	1,658	61.4 (1.5)	1,855	62.4 (1.3)	1,518	61.5 (1.6)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,510	73.3 (0.9)	1,241	73.9 (1.6)	2,836	74.8 (1.1)	3,237	75.7 (1.0)	2,682	77.7 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	428	52.3 (2.7)	301	50.8 (4.0)	581	55.3 (2.8)	691	54.4 (2.2)	610	55.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,510	72.6 (0.9)	1,241	73.5 (1.6)	2,836	74.6 (1.0)	3,237	75.7 (1.0)	2,682	77.8 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	78.4 (2.0)	141	74.6 (4.3)	366	75.6 (2.7)	485	82.7 (2.1)	304	81.6 (2.6)
30-39	-	- -	-	- -	812	77.8 (1.5)	247	79.9 (2.6)	598	79.9 (1.9)	595	78.1 (2.0)	518	84.9 (1.7)
40-49	-	- -	-	- -	872	76.1 (1.5)	248	79.4 (2.9)	579	80.5 (1.8)	642	79.1 (1.8)	529	79.8 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	579	71.5 (2.1)	205	75.8 (3.2)	488	74.1 (2.3)	543	75.1 (2.1)	479	78.1 (2.2)
60-69	-	- -	-	- -	445	60.7 (2.5)	217	58.3 (4.1)	440	65.6 (2.8)	541	66.4 (2.5)	471	66.6 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	219	45.3 (3.6)	183	47.8 (5.2)	365	50.3 (3.2)	431	50.5 (2.7)	381	51.1 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	74.1 (1.0)	868	75.2 (1.9)	2,079	76.1 (1.2)	2,392	76.1 (1.1)	2,088	78.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	715	70.0 (1.8)	373	69.5 (2.6)	757	69.2 (2.2)	845	74.3 (2.3)	594	74.4 (2.4)

1) 월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 월간음주율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	901	67.7 (1.7)	300	71.4 (2.9)	678	71.8 (2.2)	819	70.6 (1.9)	661	74.5 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	890	74.3 (1.8)	286	68.4 (3.3)	674	77.6 (1.9)	801	75.4 (1.9)	667	77.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	830	75.5 (1.5)	307	77.7 (2.8)	707	74.5 (2.0)	772	78.0 (1.7)	669	80.1 (2.2)
상	-	- -	-	- -	844	76.2 (1.7)	299	78.4 (2.7)	691	77.6 (2.1)	806	80.1 (1.6)	656	79.5 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	72.4 (1.0)	868	74.4 (1.9)	2,079	75.1 (1.1)	2,392	75.3 (1.1)	2,088	78.0 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	715	71.6 (1.7)	373	71.0 (2.6)	757	68.4 (2.3)	845	77.0 (2.2)	594	76.7 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	901	66.8 (1.6)	300	70.9 (2.8)	678	71.4 (2.2)	819	70.7 (1.8)	661	74.7 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	890	73.9 (1.7)	286	67.7 (3.2)	674	77.5 (1.9)	801	75.1 (1.9)	667	77.4 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	830	74.5 (1.5)	307	76.8 (2.8)	707	73.8 (1.9)	772	77.9 (1.7)	669	80.3 (2.2)
상	-	- -	-	- -	844	75.6 (1.7)	299	78.3 (2.7)	691	77.6 (2.0)	806	80.5 (1.6)	656	79.6 (2.2)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	36.2 (1.0)	1,738	39.9 (1.6)	3,960	42.9 (0.9)	4,244	41.2 (0.9)	3,516	41.3 (1.2)
65세이상	-	- -	-	- -	669	15.6 (1.6)	420	13.5 (2.0)	931	15.9 (1.4)	965	14.9 (1.3)	758	17.4 (1.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	36.9 (0.9)	1,738	41.5 (1.5)	3,960	44.9 (0.9)	4,244	43.3 (0.9)	3,516	43.3 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	51.8 (1.9)	198	63.1 (3.3)	526	63.8 (2.3)	564	55.4 (2.4)	455	52.1 (3.0)
30-39	-	- -	-	- -	930	41.2 (1.9)	388	43.5 (3.3)	815	50.3 (2.1)	830	50.1 (2.0)	720	49.1 (2.6)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	38.6 (1.7)	316	40.6 (3.3)	749	47.5 (2.1)	853	48.6 (1.8)	624	50.6 (2.4)
50-59	-	- -	-	- -	650	28.6 (2.0)	299	36.0 (3.4)	642	34.4 (2.0)	705	33.9 (2.3)	684	36.4 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	525	17.9 (1.9)	272	20.6 (3.4)	638	20.4 (2.0)	667	23.2 (1.9)	550	23.4 (2.3)
70+	-	- -	-	- -	428	14.5 (2.0)	265	10.4 (2.4)	590	15.0 (1.5)	625	13.8 (1.6)	483	15.5 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	37.4 (1.1)	1,249	40.3 (1.9)	2,918	44.8 (1.0)	3,169	43.2 (1.0)	2,749	42.7 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	849	31.1 (2.4)	489	38.4 (3.3)	1,042	34.3 (2.2)	1,075	33.0 (2.2)	767	36.3 (2.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	37.5 (1.8)	413	40.3 (3.0)	949	42.1 (2.4)	1,047	38.9 (2.0)	859	42.2 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	1,097	36.1 (1.7)	410	41.3 (3.7)	960	44.8 (1.7)	1,059	42.3 (1.8)	867	40.8 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	1,028	37.8 (2.0)	425	42.4 (2.9)	956	42.8 (2.0)	1,047	42.1 (1.7)	878	42.0 (2.3)
상	-	- -	-	- -	1,028	33.9 (1.7)	402	36.5 (2.8)	967	43.2 (2.0)	1,049	41.8 (1.7)	862	39.5 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	36.9 (1.0)	1,249	41.3 (1.7)	2,918	45.3 (1.0)	3,169	43.9 (1.0)	2,749	43.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	849	37.0 (2.3)	489	41.8 (3.0)	1,042	40.0 (2.8)	1,075	40.7 (2.1)	767	43.2 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	38.1 (1.6)	413	40.7 (2.7)	949	43.4 (2.2)	1,047	40.4 (2.0)	859	43.8 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	1,097	37.0 (1.7)	410	42.2 (3.4)	960	46.1 (1.8)	1,059	44.0 (1.7)	867	42.3 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	1,028	38.5 (1.9)	425	43.6 (3.0)	956	44.6 (1.7)	1,047	44.4 (1.7)	878	44.3 (2.3)
상	-	- -	-	- -	1,028	34.4 (1.6)	402	39.6 (2.8)	967	45.8 (1.9)	1,049	44.8 (1.7)	862	42.3 (2.1)

표 1-II-3. 평생음주자의 음주시작연령[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : 세)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	6,009	23.2 (0.1)	3,978	22.8 (0.1)	6,722	21.7 (0.1)	2,368	21.7 (0.2)	5,756	21.7 (0.1)	6,360	21.5 (0.1)	5,377	21.9 (0.2)
65세이상	396	31.4 (0.7)	290	27.9 (0.7)	732	30.6 (0.6)	471	30.1 (0.9)	1,035	30.6 (0.5)	1,084	30.2 (0.5)	949	31.7 (0.7)
19세이상(표준화)[2]	6,009	24.3 (0.1)	3,978	23.2 (0.1)	6,722	22.1 (0.1)	2,368	21.9 (0.2)	5,756	21.8 (0.1)	6,360	21.6 (0.1)	5,377	21.9 (0.1)
연령(세)														
19-29	1,606	19.5 (0.1)	997	19.4 (0.1)	1,268	17.8 (0.1)	306	17.6 (0.2)	845	17.5 (0.1)	1,003	17.5 (0.1)	745	17.7 (0.1)
30-39	1,739	22.0 (0.1)	1,103	21.6 (0.1)	1,610	19.2 (0.1)	573	19.3 (0.2)	1,326	19.1 (0.1)	1,362	18.8 (0.1)	1,211	18.7 (0.1)
40-49	1,241	24.8 (0.2)	957	24.1 (0.3)	1,680	22.0 (0.2)	457	21.6 (0.3)	1,192	21.1 (0.2)	1,381	21.0 (0.2)	1,071	21.3 (0.2)
50-59	732	27.4 (0.4)	455	25.8 (0.4)	1,024	24.5 (0.3)	391	24.4 (0.6)	952	24.8 (0.4)	1,044	24.5 (0.3)	988	24.7 (0.4)
60-69	485	28.8 (0.6)	311	26.5 (0.6)	729	28.7 (0.5)	366	28.0 (0.9)	803	28.4 (0.5)	902	27.7 (0.5)	786	27.6 (0.5)
70+	206	33.0 (1.1)	155	28.4 (1.0)	411	31.0 (0.8)	275	30.9 (1.3)	638	31.5 (0.8)	668	30.7 (0.6)	576	33.3 (0.8)
거주지역														
동	4,142	22.8 (0.1)	3,275	22.7 (0.1)	5,456	21.3 (0.1)	1,704	21.3 (0.2)	4,319	21.3 (0.1)	4,849	21.1 (0.1)	4,267	21.5 (0.2)
읍면	1,867	25.0 (0.3)	703	23.4 (0.4)	1,266	23.4 (0.4)	664	23.0 (0.7)	1,437	23.8 (0.4)	1,511	23.2 (0.4)	1,110	23.3 (0.4)
소득수준[3]														
하	1,392	23.5 (0.2)	836	23.8 (0.3)	1,706	21.8 (0.2)	570	21.8 (0.4)	1,367	21.7 (0.2)	1,557	21.8 (0.2)	1,323	22.2 (0.4)
중하	1,518	23.3 (0.2)	900	22.4 (0.2)	1,707	21.8 (0.2)	551	21.8 (0.4)	1,414	22.0 (0.3)	1,597	21.6 (0.2)	1,325	21.7 (0.2)
중상	1,505	23.0 (0.2)	1,003	22.8 (0.3)	1,636	21.8 (0.2)	583	21.7 (0.4)	1,402	21.4 (0.2)	1,567	21.2 (0.2)	1,345	21.7 (0.3)
상	1,594	23.2 (0.2)	1,025	22.2 (0.2)	1,602	21.3 (0.2)	564	21.2 (0.4)	1,416	21.6 (0.3)	1,574	21.4 (0.2)	1,320	21.6 (0.3)
거주지역(표준화)														
동	4,142	24.1 (0.2)	3,275	23.2 (0.1)	5,456	22.0 (0.1)	1,704	21.7 (0.2)	4,319	21.8 (0.1)	4,849	21.5 (0.1)	4,267	21.9 (0.1)
읍면	1,867	24.8 (0.2)	703	23.1 (0.3)	1,266	22.3 (0.2)	664	22.5 (0.4)	1,437	22.1 (0.2)	1,511	21.8 (0.2)	1,110	21.8 (0.2)
소득수준(표준화)														
하	1,392	24.5 (0.3)	836	24.0 (0.3)	1,706	22.2 (0.2)	570	22.0 (0.4)	1,367	21.9 (0.2)	1,557	22.0 (0.2)	1,323	22.3 (0.3)
중하	1,518	24.4 (0.2)	900	23.2 (0.3)	1,707	22.2 (0.2)	551	22.2 (0.3)	1,414	22.0 (0.2)	1,597	21.6 (0.2)	1,325	21.7 (0.2)
중상	1,505	24.2 (0.2)	1,003	23.0 (0.3)	1,636	22.1 (0.2)	583	22.1 (0.4)	1,402	21.7 (0.2)	1,567	21.3 (0.2)	1,345	21.6 (0.2)
상	1,594	24.1 (0.2)	1,025	22.7 (0.2)	1,602	21.7 (0.2)	564	21.2 (0.3)	1,416	21.6 (0.2)	1,574	21.4 (0.2)	1,320	21.6 (0.2)
남자														
19세이상	3,436	21.0 (0.1)	2,662	21.0 (0.1)	3,313	18.9 (0.1)	1,101	19.1 (0.2)	2,660	19.0 (0.1)	3,046	18.9 (0.1)	2,563	19.1 (0.1)
65세이상	238	23.6 (0.6)	213	23.9 (0.7)	381	22.1 (0.5)	249	23.4 (0.8)	512	22.4 (0.4)	602	22.0 (0.4)	540	22.6 (0.5)
19세이상(표준화)	3,436	21.3 (0.1)	2,662	21.0 (0.1)	3,313	19.1 (0.1)	1,101	19.2 (0.2)	2,660	19.1 (0.1)	3,046	18.9 (0.1)	2,563	19.1 (0.1)
연령(세)														
19-29	790	19.1 (0.1)	545	19.1 (0.1)	565	17.4 (0.1)	127	17.2 (0.3)	351	17.3 (0.1)	470	17.0 (0.1)	302	17.4 (0.1)
30-39	980	20.2 (0.1)	729	20.1 (0.1)	779	18.0 (0.1)	231	18.3 (0.3)	574	18.1 (0.2)	576	17.9 (0.1)	519	18.0 (0.2)
40-49	750	21.6 (0.2)	678	21.2 (0.2)	832	19.0 (0.1)	228	19.2 (0.4)	554	19.0 (0.2)	624	19.0 (0.2)	514	19.0 (0.2)
50-59	472	22.9 (0.3)	357	22.6 (0.3)	539	20.0 (0.3)	178	19.8 (0.5)	457	19.8 (0.3)	515	19.9 (0.3)	461	20.1 (0.4)
60-69	326	23.5 (0.5)	246	23.8 (0.5)	405	21.9 (0.4)	192	21.0 (0.7)	403	21.8 (0.5)	489	20.9 (0.3)	435	20.9 (0.4)
70+	118	24.3 (0.9)	107	22.9 (0.9)	193	21.8 (0.7)	145	24.4 (1.3)	321	23.0 (0.6)	372	22.5 (0.5)	332	23.8 (0.7)
거주지역														
동	2,329	20.8 (0.1)	2,166	20.9 (0.1)	2,650	18.7 (0.1)	782	19.0 (0.3)	1,957	18.9 (0.1)	2,261	18.7 (0.1)	2,006	19.1 (0.1)
읍면	1,107	21.7 (0.2)	496	21.3 (0.4)	663	19.9 (0.3)	319	19.6 (0.5)	703	19.8 (0.3)	785	19.7 (0.2)	557	19.3 (0.3)

1) 평생음주자의 음주시작연령 : 평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 평생음주자의 음주시작연령 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	814	21.3 (0.2)	544	21.4 (0.3)	834	19.0 (0.2)	262	19.0 (0.5)	629	19.0 (0.3)	764	19.4 (0.2)	628	19.2 (0.3)
중하	849	20.9 (0.2)	629	20.7 (0.2)	842	18.9 (0.2)	261	19.4 (0.4)	643	19.2 (0.2)	753	18.9 (0.2)	631	19.1 (0.2)
중상	885	20.8 (0.2)	670	21.2 (0.2)	794	19.0 (0.2)	270	19.2 (0.3)	661	18.9 (0.2)	734	18.7 (0.2)	649	19.2 (0.2)
상	888	20.9 (0.1)	680	20.6 (0.1)	801	18.7 (0.1)	268	18.9 (0.4)	650	19.0 (0.2)	761	18.6 (0.1)	629	18.8 (0.2)
거주지역(표준화)														
동	2,329	21.2 (0.1)	2,166	21.1 (0.1)	2,650	18.9 (0.1)	782	19.2 (0.2)	1,957	19.1 (0.2)	2,261	18.8 (0.1)	2,006	19.2 (0.1)
읍면	1,107	21.5 (0.2)	496	21.0 (0.3)	663	19.4 (0.2)	319	19.4 (0.3)	703	19.3 (0.2)	785	19.2 (0.2)	557	18.9 (0.3)
소득수준(표준화)														
하	814	21.7 (0.3)	544	21.3 (0.3)	834	19.2 (0.2)	262	19.0 (0.4)	629	19.1 (0.2)	764	19.4 (0.2)	628	19.2 (0.3)
중하	849	21.1 (0.2)	629	20.9 (0.3)	842	19.0 (0.2)	261	19.5 (0.4)	643	19.2 (0.2)	753	18.8 (0.1)	631	19.1 (0.2)
중상	885	21.2 (0.2)	670	21.1 (0.2)	794	19.1 (0.2)	270	19.3 (0.3)	661	19.0 (0.2)	734	18.7 (0.2)	649	19.2 (0.2)
상	888	21.1 (0.2)	680	20.7 (0.1)	801	18.8 (0.2)	268	18.9 (0.4)	650	19.0 (0.2)	761	18.6 (0.1)	629	18.8 (0.2)
여자														
19세이상	2,573	26.3 (0.2)	1,316	26.4 (0.3)	3,409	24.8 (0.3)	1,267	24.6 (0.4)	3,096	24.8 (0.3)	3,314	24.5 (0.2)	2,814	25.0 (0.3)
65세이상	158	42.9 (1.1)	77	39.8 (1.7)	351	40.1 (0.9)	222	37.3 (1.3)	523	39.1 (0.8)	482	40.0 (0.8)	409	41.9 (0.8)
19세이상(표준화)	2,573	29.3 (0.2)	1,316	29.1 (0.3)	3,409	25.5 (0.2)	1,267	25.1 (0.3)	3,096	25.0 (0.2)	3,314	24.8 (0.2)	2,814	25.1 (0.2)
연령(세)														
19-29	816	19.9 (0.1)	452	19.8 (0.1)	703	18.2 (0.1)	179	18.1 (0.2)	494	17.8 (0.1)	533	18.1 (0.1)	443	18.0 (0.1)
30-39	759	24.3 (0.2)	374	24.2 (0.3)	831	20.4 (0.1)	342	20.5 (0.3)	752	20.2 (0.1)	786	19.7 (0.1)	692	19.6 (0.1)
40-49	491	30.0 (0.4)	279	31.1 (0.5)	848	25.4 (0.3)	229	24.6 (0.5)	638	23.6 (0.3)	757	23.3 (0.3)	557	23.8 (0.3)
50-59	260	36.5 (0.6)	98	37.2 (1.2)	485	30.2 (0.6)	213	30.1 (1.0)	495	30.8 (0.7)	529	30.4 (0.6)	527	30.3 (0.5)
60-69	159	40.2 (1.1)	65	37.2 (1.5)	324	37.1 (0.8)	174	37.0 (1.2)	400	36.8 (0.8)	413	36.6 (0.8)	351	36.2 (0.9)
70+	88	43.8 (1.5)	48	40.5 (2.1)	218	39.8 (1.2)	130	37.1 (1.9)	317	39.4 (1.1)	296	40.0 (1.0)	244	43.1 (1.0)
거주지역														
동	1,813	25.5 (0.2)	1,109	26.1 (0.3)	2,806	24.2 (0.3)	922	24.0 (0.3)	2,362	24.0 (0.3)	2,588	23.8 (0.2)	2,261	24.2 (0.3)
읍면	760	29.9 (0.6)	207	28.8 (0.8)	603	27.7 (0.7)	345	26.9 (1.1)	734	28.6 (0.8)	726	27.6 (0.8)	553	28.1 (0.6)
소득수준														
하	578	26.5 (0.4)	292	28.2 (0.5)	872	24.8 (0.4)	308	24.9 (0.6)	738	24.7 (0.5)	793	24.7 (0.4)	695	25.5 (0.6)
중하	669	26.4 (0.4)	271	26.5 (0.6)	865	25.2 (0.4)	290	24.7 (0.6)	771	25.0 (0.4)	844	24.7 (0.4)	694	24.5 (0.4)
중상	620	26.1 (0.4)	333	26.1 (0.6)	842	24.9 (0.4)	313	24.7 (0.7)	741	24.4 (0.5)	833	24.0 (0.4)	696	24.6 (0.5)
상	706	26.1 (0.4)	345	25.3 (0.5)	801	24.3 (0.4)	296	24.1 (0.6)	766	24.5 (0.4)	813	24.5 (0.4)	691	25.0 (0.5)
거주지역(표준화)														
동	1,813	29.1 (0.3)	1,109	29.2 (0.4)	2,806	25.4 (0.2)	922	24.7 (0.3)	2,362	24.8 (0.2)	2,588	24.7 (0.2)	2,261	25.1 (0.2)
읍면	760	30.0 (0.3)	207	- -[4]	603	25.8 (0.3)	345	26.4 (0.6)	734	25.5 (0.3)	726	25.2 (0.3)	553	25.3 (0.3)
소득수준(표준화)														
하	578	29.5 (0.4)	292	- -	872	25.5 (0.3)	308	25.5 (0.5)	738	25.3 (0.3)	793	25.3 (0.3)	695	25.8 (0.4)
중하	669	29.2 (0.4)	271	- -	865	26.0 (0.3)	290	25.7 (0.5)	771	25.1 (0.3)	844	24.7 (0.3)	694	24.7 (0.3)
중상	620	- -	333	- -	842	25.5 (0.3)	313	25.6 (0.5)	741	24.8 (0.3)	833	24.6 (0.3)	696	24.5 (0.3)
상	706	29.0 (0.4)	345	- -	801	25.0 (0.3)	296	24.1 (0.5)	766	24.5 (0.4)	813	24.9 (0.3)	691	25.1 (0.3)

표 1-II-4. 연간음주자의 고위험음주율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	5,939	14.8 (0.5)	2,019	16.7 (0.9)	4,697	20.3 (0.8)	5,282	17.5 (0.7)	4,486	17.6 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	514	13.6 (1.6)	319	7.1 (1.6)	644	11.1 (1.6)	733	10.5 (1.1)	658	9.4 (1.4)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	5,939	14.9 (0.5)	2,019	16.1 (0.9)	4,697	19.8 (0.8)	5,282	17.1 (0.7)	4,486	17.2 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,196	10.7 (1.0)	289	13.1 (2.0)	760	18.2 (1.8)	923	16.1 (1.5)	665	14.7 (1.7)
30-39	-	- -	-	- -	1,487	13.3 (1.1)	515	19.0 (1.9)	1,157	20.4 (1.4)	1,171	18.3 (1.3)	1,054	21.0 (1.7)
40-49	-	- -	-	- -	1,525	19.5 (1.0)	435	22.0 (2.1)	1,060	23.9 (1.5)	1,199	20.6 (1.4)	956	20.3 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	894	17.8 (1.4)	340	14.5 (2.0)	761	24.2 (1.8)	869	18.5 (1.6)	823	18.6 (1.8)
60-69	-	- -	-	- -	572	15.1 (1.8)	262	13.6 (2.5)	581	13.5 (1.8)	695	13.5 (1.4)	617	11.0 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	265	12.4 (2.3)	178	4.7 (1.6)	378	9.7 (1.9)	425	7.3 (1.4)	371	8.6 (1.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	4,857	14.5 (0.6)	1,507	16.6 (1.1)	3,575	20.3 (0.9)	4,068	17.6 (0.8)	3,581	17.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,082	16.3 (1.2)	512	16.8 (1.8)	1,122	20.0 (1.5)	1,214	16.9 (1.4)	905	18.7 (1.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,462	15.9 (1.1)	476	17.3 (2.0)	1,081	24.0 (1.7)	1,257	19.8 (1.5)	1,072	20.4 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	1,514	14.3 (1.0)	466	15.7 (2.3)	1,154	20.1 (1.5)	1,313	18.2 (1.3)	1,108	17.2 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	1,458	14.2 (1.0)	501	15.7 (1.9)	1,125	20.1 (1.4)	1,313	17.1 (1.3)	1,134	17.0 (1.7)
상	-	- -	-	- -	1,440	14.3 (1.0)	499	18.2 (2.2)	1,221	17.9 (1.3)	1,347	15.2 (1.2)	1,119	15.8 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	4,857	14.3 (0.6)	1,507	16.0 (1.0)	3,575	19.5 (0.9)	4,068	17.0 (0.8)	3,581	16.8 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,082	16.0 (1.2)	512	16.8 (1.9)	1,122	19.1 (1.4)	1,214	16.9 (1.4)	905	18.3 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,462	16.1 (1.1)	476	17.5 (1.9)	1,081	23.3 (1.6)	1,257	19.4 (1.4)	1,072	19.5 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,514	14.5 (1.0)	466	15.3 (2.2)	1,154	19.6 (1.5)	1,313	17.7 (1.3)	1,108	16.8 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	1,458	14.2 (1.0)	501	15.2 (1.7)	1,125	19.5 (1.3)	1,313	16.7 (1.3)	1,134	17.0 (1.7)
상	-	- -	-	- -	1,440	14.3 (1.0)	499	17.3 (2.1)	1,221	17.5 (1.2)	1,347	14.9 (1.2)	1,119	15.3 (1.4)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,018	22.9 (0.9)	1,002	25.3 (1.5)	2,322	29.1 (1.2)	2,675	25.1 (1.0)	2,260	25.5 (1.2)
65세이상	-	- -	-	- -	283	23.3 (2.8)	189	11.2 (2.7)	358	17.7 (2.6)	442	16.7 (1.9)	397	15.7 (2.3)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,018	23.2 (0.9)	1,002	24.5 (1.4)	2,322	28.4 (1.2)	2,675	24.6 (0.9)	2,260	24.9 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	538	14.0 (1.7)	127	18.7 (3.2)	331	23.2 (2.6)	452	21.7 (2.1)	293	18.6 (2.5)
30-39	-	- -	-	- -	757	20.7 (1.8)	228	29.3 (3.2)	548	28.8 (2.2)	535	26.5 (1.9)	492	29.4 (2.7)
40-49	-	- -	-	- -	773	31.8 (1.6)	218	33.8 (3.2)	517	34.8 (2.3)	574	30.6 (2.2)	478	29.9 (2.7)
50-59	-	- -	-	- -	487	27.8 (2.3)	172	22.1 (3.0)	392	37.2 (3.0)	449	26.8 (2.5)	405	30.0 (2.7)
60-69	-	- -	-	- -	333	24.2 (2.8)	147	22.2 (4.0)	325	21.4 (2.9)	410	19.2 (2.2)	360	18.5 (2.9)
70+	-	- -	-	- -	130	22.6 (4.4)	110	6.3 (2.5)	209	15.7 (2.9)	255	12.1 (2.4)	232	14.0 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,440	22.5 (1.0)	731	25.1 (1.8)	1,736	28.9 (1.4)	2,005	25.2 (1.0)	1,792	25.0 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	578	25.3 (2.0)	271	26.4 (2.9)	586	29.7 (2.5)	670	24.5 (2.0)	468	27.3 (2.3)

1) 연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔 이상(여자 5잔)이며 주 2회 이상 음주하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 연간음주자의 고위험음주율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	737	24.2 (1.7)	236	25.8 (3.3)	540	33.5 (2.6)	639	27.5 (2.0)	534	27.4 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	773	21.3 (1.6)	232	23.1 (3.6)	559	30.2 (2.4)	666	25.5 (2.0)	557	26.0 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	726	23.3 (1.8)	249	23.1 (2.9)	566	27.3 (2.0)	656	24.9 (2.0)	578	24.4 (2.4)
상	-	- -	-	- -	743	22.3 (1.6)	252	29.7 (3.4)	600	26.6 (2.1)	684	22.9 (1.9)	569	24.1 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,440	22.3 (1.0)	731	24.4 (1.7)	1,736	28.0 (1.3)	2,005	24.5 (1.0)	1,792	24.4 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	578	25.0 (1.8)	271	26.2 (2.9)	586	28.3 (2.3)	670	25.0 (2.2)	468	25.7 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	737	24.5 (1.7)	236	25.5 (3.1)	540	32.5 (2.5)	639	27.0 (1.9)	534	26.2 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	773	22.0 (1.6)	232	22.4 (3.6)	559	29.2 (2.3)	666	25.0 (1.9)	557	25.1 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	726	23.5 (1.8)	249	22.6 (2.7)	566	26.7 (1.9)	656	24.4 (1.9)	578	24.5 (2.4)
상	-	- -	-	- -	743	22.1 (1.6)	252	28.2 (3.3)	600	26.2 (2.1)	684	22.5 (1.9)	569	23.7 (2.0)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	2,921	4.8 (0.5)	1,017	5.3 (0.9)	2,375	8.9 (0.7)	2,607	7.7 (0.6)	2,226	7.6 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	231	1.9 (1.0)	130	1.2 (0.9)	286	2.1 (0.9)	291	1.5 (0.7)	261	1.2 (0.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	2,921	4.6 (0.4)	1,017	5.0 (0.8)	2,375	8.4 (0.7)	2,607	7.3 (0.6)	2,226	7.4 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	658	7.1 (1.1)	162	6.7 (2.3)	429	12.4 (1.9)	471	9.6 (1.5)	372	9.8 (1.9)
30-39	-	- -	-	- -	730	4.0 (0.8)	287	5.5 (1.3)	609	9.5 (1.3)	636	8.3 (1.3)	562	10.5 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	752	4.6 (0.9)	217	6.1 (1.9)	543	9.8 (1.5)	625	8.1 (1.2)	478	8.7 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	407	4.1 (1.2)	168	3.5 (1.6)	369	6.2 (1.5)	420	6.5 (1.3)	418	3.9 (1.2)
60-69	-	- -	-	- -	239	2.3 (1.0)	115	1.3 (0.9)	256	1.0 (0.5)	285	4.5 (1.4)	257	0.6 (0.4)
70+	-	- -	-	- -	135	2.5 (1.4)	68	2.2 (1.6)	169	2.8 (1.5)	170	0.8 (0.8)	139	1.5 (1.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,417	4.8 (0.5)	776	5.8 (1.0)	1,839	9.4 (0.8)	2,063	8.0 (0.7)	1,789	7.6 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	504	4.7 (1.1)	241	3.2 (1.6)	536	6.7 (1.3)	544	5.8 (1.1)	437	7.5 (1.5)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	725	6.2 (1.0)	240	6.4 (1.8)	541	11.8 (1.7)	618	9.9 (1.5)	538	11.9 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	741	5.4 (1.0)	234	6.4 (2.2)	595	7.9 (1.2)	647	8.8 (1.3)	551	6.2 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	732	3.2 (0.7)	252	5.3 (1.5)	559	10.0 (1.8)	657	7.0 (1.1)	556	7.7 (1.7)
상	-	- -	-	- -	697	4.3 (0.9)	247	2.4 (1.0)	621	6.7 (1.1)	663	5.4 (1.0)	550	4.3 (1.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,417	4.4 (0.5)	776	5.3 (0.9)	1,839	8.5 (0.7)	2,063	7.6 (0.7)	1,789	7.2 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	504	4.8 (1.1)	241	3.1 (1.6)	536	7.4 (1.8)	544	5.6 (1.1)	437	8.8 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	725	5.9 (0.9)	240	6.4 (1.7)	541	11.1 (1.5)	618	9.4 (1.4)	538	11.3 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	741	5.1 (0.9)	234	- -[4)]	595	7.7 (1.2)	647	8.5 (1.2)	551	6.2 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	732	3.1 (0.6)	252	- -	559	9.1 (1.6)	657	6.7 (1.1)	556	7.6 (1.6)
상	-	- -	-	- -	697	4.0 (0.8)	247	- -	621	6.4 (1.0)	663	5.0 (0.9)	550	4.1 (1.1)

표 1-II-5. 자동차 또는 오토바이 운전자의 음주운전경험률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	2,886	28.0 (1.1)	3,246	16.0 (0.7)	4,001	19.5 (0.8)	1,336	17.2 (1.3)	3,447	18.3 (0.8)	3,853	17.5 (0.8)	3,521	18.7 (1.0)
65세이상	33	5.3 (3.8)	56	1.3 (1.3)	157	18.2 (3.4)	132	16.4 (3.8)	290	20.6 (3.0)	342	24.0 (2.7)	337	25.3 (4.0)
19세이상(표준화)[3]	2,886	- -[5]	3,246	- -	4,001	18.8 (0.9)	1,336	16.6 (1.3)	3,447	18.5 (0.8)	3,853	18.0 (0.8)	3,521	19.0 (1.1)
연령(세)														
19-29	591	30.8 (2.5)	561	18.5 (1.8)	679	14.3 (1.6)	152	12.1 (2.7)	456	14.8 (1.8)	540	18.0 (1.9)	414	15.1 (1.9)
30-39	1,069	30.1 (1.4)	1,142	17.1 (1.3)	1,203	21.9 (1.3)	391	20.8 (2.6)	965	16.9 (1.5)	980	16.7 (1.5)	953	16.7 (1.6)
40-49	805	28.5 (1.6)	1,014	16.0 (1.3)	1,213	22.8 (1.5)	345	18.1 (2.9)	888	20.5 (1.7)	1,042	15.1 (1.1)	877	19.7 (1.5)
50-59	327	20.5 (2.5)	389	12.5 (2.0)	586	18.1 (1.6)	238	15.8 (2.3)	645	20.3 (2.1)	697	20.5 (1.8)	689	22.1 (2.1)
60-69	90	6.7 (2.7)	128	7.3 (2.5)	251	15.2 (2.3)	140	18.3 (3.6)	357	19.2 (2.4)	435	20.4 (2.0)	427	20.2 (2.6)
70+	4	- -[6]	12	- -	69	16.9 (5.3)	70	11.3 (3.3)	136	24.0 (4.6)	159	23.1 (3.9)	161	29.1 (5.0)
거주지역														
동	2,068	25.3 (1.3)	2,679	14.7 (0.8)	3,309	18.1 (0.9)	961	16.3 (1.6)	2,610	16.7 (0.9)	2,911	15.5 (0.8)	2,763	15.7 (1.0)
읍면	818	41.6 (1.9)	567	22.9 (2.0)	692	26.4 (2.2)	375	20.3 (2.7)	837	25.7 (2.1)	942	26.1 (1.6)	758	29.5 (2.2)
소득수준[4]														
하	482	35.7 (2.5)	510	18.2 (1.7)	816	19.0 (1.5)	260	21.3 (2.5)	693	16.9 (1.5)	847	18.0 (1.6)	721	20.1 (1.7)
중하	683	31.4 (2.7)	662	19.0 (1.7)	957	21.0 (1.6)	308	15.1 (2.4)	777	18.6 (1.5)	870	18.8 (1.4)	841	17.1 (1.6)
중상	750	26.5 (1.8)	827	15.7 (1.5)	1,013	19.7 (1.4)	347	19.5 (2.2)	915	18.9 (1.6)	971	16.3 (1.5)	917	18.1 (1.5)
상	971	23.6 (1.5)	1,070	13.6 (1.3)	1,168	18.4 (1.3)	390	14.5 (2.1)	987	18.7 (1.4)	1,129	17.7 (1.4)	1,006	19.9 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	2,068	- -	2,679	- -	3,309	16.7 (0.9)	961	15.4 (1.5)	2,610	16.0 (0.9)	2,911	15.2 (0.9)	2,763	15.7 (1.2)
읍면	818	- -	567	- -	692	26.3 (2.3)	375	19.7 (2.8)	837	24.0 (1.7)	942	26.1 (1.5)	758	28.6 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	482	- -	510	- -	816	- -	260	- -	693	17.0 (1.5)	847	19.3 (1.6)	721	20.0 (1.8)
중하	683	- -	662	- -	957	- -	308	- -	777	18.9 (1.6)	870	19.0 (1.4)	841	16.8 (1.7)
중상	750	- -	827	- -	1,013	- -	347	- -	915	19.1 (1.6)	971	16.8 (1.6)	917	19.4 (1.6)
상	971	- -	1,070	- -	1,168	17.8 (1.4)	390	14.2 (2.3)	987	19.2 (1.5)	1,129	17.9 (1.4)	1,006	20.0 (2.3)
남자														
19세이상	2,326	32.9 (1.4)	2,417	19.4 (0.9)	2,656	25.0 (1.1)	849	22.0 (1.8)	2,191	23.6 (1.1)	2,496	21.9 (1.0)	2,179	23.8 (1.3)
65세이상	32	5.4 (3.8)	55	1.4 (1.4)	131	22.3 (4.1)	116	17.6 (4.0)	264	21.9 (3.3)	320	25.3 (2.8)	308	27.5 (4.3)
19세이상(표준화)	2,326	- -	2,417	- -	2,656	24.2 (1.2)	849	20.7 (1.8)	2,191	23.2 (1.0)	2,496	22.0 (1.0)	2,179	23.7 (1.3)
연령(세)														
19-29	468	34.9 (3.0)	413	22.9 (2.4)	425	17.7 (2.0)	87	13.0 (3.5)	263	17.6 (2.4)	339	21.9 (2.6)	233	19.5 (2.5)
30-39	833	36.8 (1.8)	801	21.5 (1.5)	740	29.5 (1.8)	209	29.1 (3.9)	554	22.7 (2.0)	552	22.0 (2.1)	502	21.7 (2.3)
40-49	640	34.2 (2.0)	738	20.5 (1.6)	769	29.7 (2.0)	213	23.9 (3.9)	524	26.3 (2.2)	603	18.3 (1.6)	501	25.0 (2.2)
50-59	295	22.2 (2.7)	331	13.3 (2.1)	449	22.1 (2.0)	157	19.6 (3.2)	416	28.2 (2.7)	478	26.1 (2.4)	435	28.6 (2.7)
60-69	86	7.0 (2.8)	122	7.6 (2.6)	223	17.1 (2.6)	122	19.5 (3.9)	303	21.9 (2.7)	367	23.4 (2.3)	359	23.3 (3.1)
70+	4	- -	12	- -	50	23.8 (7.3)	61	12.0 (3.6)	131	24.3 (4.7)	157	23.7 (3.9)	149	30.9 (5.2)
거주지역														
동	1,650	29.8 (1.6)	1,979	17.8 (1.0)	2,161	23.3 (1.1)	609	20.5 (2.3)	1,617	21.4 (1.1)	1,847	19.1 (1.1)	1,686	19.4 (1.3)
읍면	676	47.1 (2.2)	438	27.7 (2.4)	495	32.7 (2.6)	240	27.2 (3.2)	574	33.7 (2.5)	649	33.5 (2.1)	493	39.2 (3.3)

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) '98년 : 만 20세 이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	419	39.2 (2.7)	412	20.5 (2.0)	591	23.7 (1.9)	174	24.6 (3.3)	472	21.3 (2.1)	582	22.0 (1.9)	483	24.7 (2.2)
중하	579	35.6 (3.0)	522	23.0 (2.1)	661	26.4 (2.0)	200	20.1 (3.3)	513	24.8 (2.1)	606	22.7 (1.8)	538	23.0 (2.2)
중상	621	30.0 (2.0)	639	18.9 (1.8)	662	25.7 (1.9)	222	23.8 (3.0)	575	23.7 (2.1)	611	20.3 (2.0)	553	23.5 (2.2)
상	707	29.9 (2.1)	722	16.7 (1.7)	709	24.0 (1.8)	230	20.2 (3.2)	575	25.1 (2.0)	672	23.6 (1.9)	584	24.6 (2.8)
거주지역(표준화)														
동	1,650	- -	1,979	- -	2,161	21.8 (1.3)	609	19.0 (2.1)	1,617	20.2 (1.2)	1,847	18.6 (1.1)	1,686	19.2 (1.4)
읍면	676	- -	438	- -	495	32.3 (2.7)	240	- -	574	31.1 (2.3)	649	32.9 (2.0)	493	37.7 (3.3)
소득수준(표준화)														
하	419	- -	412	- -	591	- -	174	- -	472	20.7 (2.0)	582	22.6 (1.8)	483	24.0 (2.3)
중하	579	- -	522	- -	661	- -	200	- -	513	24.2 (2.1)	606	22.8 (1.8)	538	22.4 (2.2)
중상	621	- -	639	- -	662	- -	222	- -	575	23.5 (2.1)	611	20.0 (2.0)	553	24.3 (2.3)
상	707	- -	722	- -	709	- -	230	- -	575	25.3 (2.0)	672	23.4 (1.9)	584	24.5 (3.0)
여자														
19세이상	560	7.6 (1.2)	829	6.4 (1.0)	1,345	6.9 (0.8)	487	6.0 (1.3)	1,256	6.4 (0.8)	1,357	7.2 (0.8)	1,342	7.8 (1.0)
65세이상	1	- -	1	- -	26	0.0 (-)[7]	16	- -	26	5.3 (3.3)	22	0.0 (-)	29	0.0 (-)
19세이상(표준화)	560	- -	829	- -	1,345	- -	487	- -	1,256	- -	1,357	- -	1,342	- -
연령(세)														
19-29	123	14.4 (3.3)	148	6.2 (2.0)	254	6.6 (1.8)	65	10.4 (3.8)	193	8.8 (2.5)	201	9.7 (2.3)	181	5.6 (1.9)
30-39	236	6.2 (1.6)	341	7.6 (1.5)	463	7.5 (1.2)	182	4.0 (1.3)	411	5.3 (1.2)	428	6.2 (1.3)	451	8.5 (1.5)
40-49	165	5.7 (1.9)	276	4.7 (1.2)	444	8.1 (1.3)	132	4.9 (2.0)	364	8.9 (1.7)	439	8.9 (1.7)	376	10.7 (2.1)
50-59	32	3.7 (3.6)	58	8.4 (6.7)	137	4.4 (1.8)	81	5.3 (2.8)	229	2.0 (0.9)	219	3.6 (1.3)	254	4.6 (1.4)
60-69	4	- -	6	- -	28	0.0 (-)	18	- -	54	1.1 (1.0)	68	1.7 (1.4)	68	1.2 (1.1)
70+	0	- -	0	- -	19	- -	9	- -	5	- -	2	- -	12	- -
거주지역														
동	418	6.7 (1.2)	700	6.1 (1.1)	1,148	6.6 (0.9)	352	6.0 (1.6)	993	6.5 (1.0)	1,064	7.1 (0.9)	1,077	7.8 (1.2)
읍면	142	13.0 (3.8)	129	7.7 (2.5)	197	8.8 (2.2)	135	5.9 (1.9)	263	6.3 (1.5)	293	7.8 (1.9)	265	7.8 (1.6)
소득수준														
하	63	12.8 (4.7)	98	8.7 (2.9)	225	4.9 (1.5)	86	11.9 (4.0)	221	4.6 (1.4)	265	7.4 (2.0)	238	7.9 (2.0)
중하	104	7.3 (2.8)	140	3.8 (1.5)	296	6.7 (1.5)	108	2.7 (1.5)	264	3.8 (1.2)	264	7.4 (1.7)	303	4.2 (1.2)
중상	129	8.0 (2.3)	188	5.5 (1.7)	351	6.6 (1.5)	125	9.0 (2.7)	340	8.4 (2.0)	360	7.3 (1.6)	364	7.8 (1.6)
상	264	6.4 (1.5)	348	7.6 (1.8)	459	8.4 (1.2)	160	3.0 (1.4)	412	7.2 (1.5)	457	7.2 (1.4)	422	10.4 (2.3)
거주지역(표준화)														
동	418	- -	700	- -	1,148	- -	352	- -	993	- -	1,064	- -	1,077	- -
읍면	142	- -	129	- -	197	- -	135	- -	263	- -	293	- -	265	- -
소득수준(표준화)														
하	63	- -	98	- -	225	- -	86	- -	221	- -	265	- -	238	- -
중하	104	- -	140	- -	296	- -	108	- -	264	- -	264	- -	303	- -
중상	129	- -	188	- -	351	- -	125	- -	340	- -	360	- -	364	- -
상	264	- -	348	- -	459	- -	160	- -	412	- -	457	- -	422	- -

표 1-II-6. 연간음주운전차량동승률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	18.4 (0.7)	8,009	14.9 (0.5)	7,799	16.4 (0.6)	2,975	17.2 (1.0)	6,801	17.0 (0.6)	7,481	17.2 (0.6)	6,257	17.2 (0.8)
65세이상	1,044	1.6 (0.4)	968	0.8 (0.4)	1,097	4.2 (0.8)	719	3.9 (0.8)	1,511	4.4 (0.6)	1,656	5.1 (0.8)	1,374	6.1 (0.9)
19세이상(표준화)[2]	8,991	18.0 (0.6)	8,009	15.2 (0.5)	7,799	16.4 (0.6)	2,975	17.5 (1.0)	6,801	17.4 (0.6)	7,481	17.6 (0.6)	6,257	17.5 (0.8)
연령(세)														
19-29	1,959	27.7 (1.3)	1,615	24.1 (1.4)	1,336	22.8 (1.4)	339	23.8 (2.4)	892	22.2 (1.6)	1,049	23.1 (1.5)	771	21.8 (2.3)
30-39	2,213	23.5 (1.1)	1,992	19.0 (1.0)	1,741	19.2 (1.2)	635	22.7 (2.1)	1,413	20.2 (1.2)	1,425	20.2 (1.4)	1,254	19.8 (1.4)
40-49	1,804	19.4 (1.1)	1,858	17.0 (1.0)	1,877	18.6 (1.1)	563	17.7 (1.9)	1,329	20.2 (1.5)	1,495	18.6 (1.2)	1,162	17.3 (1.3)
50-59	1,338	9.6 (0.9)	1,100	7.9 (0.9)	1,229	12.1 (1.0)	504	14.4 (1.7)	1,134	14.9 (1.3)	1,248	15.7 (1.1)	1,174	19.5 (1.7)
60-69	1,066	4.1 (0.7)	868	3.0 (0.6)	969	5.9 (0.9)	488	6.4 (1.1)	1,078	8.5 (1.0)	1,208	10.0 (1.1)	1,027	10.1 (1.1)
70+	611	1.0 (0.4)	576	0.9 (0.4)	647	3.1 (1.1)	446	2.5 (0.7)	955	2.3 (0.5)	1,056	4.0 (0.8)	869	3.8 (0.9)
거주지역														
동	5,848	17.5 (0.8)	6,363	14.8 (0.6)	6,235	15.9 (0.7)	2,114	16.3 (1.1)	5,001	16.4 (0.7)	5,561	16.3 (0.7)	4,891	15.8 (0.9)
읍면	3,143	21.6 (1.2)	1,646	15.0 (1.2)	1,564	18.4 (1.6)	861	20.7 (3.1)	1,800	19.7 (1.4)	1,920	20.7 (1.1)	1,366	22.1 (1.5)
소득수준[3]														
하	2,141	18.6 (1.1)	1,687	14.7 (1.0)	1,998	16.8 (1.1)	712	16.2 (1.7)	1,630	16.2 (1.2)	1,866	16.9 (1.1)	1,536	15.2 (1.0)
중하	2,309	19.3 (1.3)	1,831	13.6 (0.9)	1,986	15.9 (1.1)	695	18.0 (1.8)	1,635	15.6 (1.2)	1,860	16.5 (1.1)	1,543	16.4 (1.4)
중상	2,224	18.5 (1.0)	1,981	15.7 (0.9)	1,858	16.5 (1.1)	732	17.4 (1.8)	1,665	17.3 (1.2)	1,819	16.2 (1.1)	1,564	17.3 (1.2)
상	2,317	17.4 (1.1)	2,043	14.7 (1.0)	1,870	15.8 (1.0)	700	16.5 (2.0)	1,658	19.5 (1.4)	1,855	19.4 (1.1)	1,534	20.5 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	5,848	16.2 (0.7)	6,363	14.5 (0.6)	6,235	15.3 (0.6)	2,114	16.3 (1.0)	5,001	16.3 (0.7)	5,561	16.3 (0.7)	4,891	15.8 (0.9)
읍면	3,143	26.4 (1.3)	1,646	19.5 (1.5)	1,564	21.4 (1.9)	861	22.6 (3.3)	1,800	21.8 (1.5)	1,920	24.0 (1.5)	1,366	24.0 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	2,141	18.6 (1.1)	1,687	15.6 (1.0)	1,998	16.7 (1.1)	712	16.3 (1.7)	1,630	16.5 (1.2)	1,866	17.2 (1.1)	1,536	15.4 (1.0)
중하	2,309	18.5 (1.1)	1,831	13.5 (0.9)	1,986	16.1 (1.1)	695	18.1 (1.7)	1,635	16.0 (1.3)	1,860	17.0 (1.1)	1,543	16.4 (1.4)
중상	2,224	17.8 (1.0)	1,981	15.9 (0.9)	1,858	16.5 (1.0)	732	17.4 (1.8)	1,665	17.5 (1.1)	1,819	16.5 (1.1)	1,564	18.2 (1.3)
상	2,317	17.2 (1.1)	2,043	14.6 (1.0)	1,870	15.8 (1.0)	700	17.0 (2.1)	1,658	19.9 (1.5)	1,855	20.0 (1.2)	1,534	21.0 (1.9)
남자														
19세이상	4,180	23.7 (0.9)	3,652	19.7 (0.8)	3,508	21.3 (0.9)	1,239	21.4 (1.5)	2,839	19.6 (0.9)	3,237	20.8 (0.9)	2,704	21.6 (1.2)
65세이상	411	3.6 (0.9)	375	1.2 (0.6)	428	8.0 (1.7)	300	6.9 (1.6)	580	7.9 (1.3)	691	8.5 (1.2)	613	11.3 (1.8)
19세이상(표준화)	4,180	22.8 (0.8)	3,652	19.7 (0.8)	3,508	20.8 (0.9)	1,239	21.2 (1.5)	2,839	19.5 (0.9)	3,237	20.7 (0.9)	2,704	21.4 (1.2)
연령(세)														
19-29	886	32.0 (1.7)	709	29.2 (1.9)	583	27.4 (2.2)	141	23.9 (3.8)	366	20.2 (2.2)	485	24.4 (2.4)	307	23.2 (3.1)
30-39	1,091	28.1 (1.4)	940	23.3 (1.6)	812	23.2 (1.8)	247	26.8 (3.1)	598	21.7 (1.8)	595	22.5 (2.2)	527	22.2 (2.5)
40-49	888	26.0 (1.7)	907	23.0 (1.6)	871	22.9 (1.5)	247	22.8 (2.9)	580	23.9 (2.2)	642	20.3 (1.6)	532	21.8 (2.2)
50-59	616	15.8 (1.6)	516	12.9 (1.7)	579	17.9 (1.8)	205	21.2 (2.9)	490	19.6 (1.9)	543	23.2 (2.1)	481	26.5 (2.9)
60-69	476	7.3 (1.3)	376	5.1 (1.1)	444	10.3 (1.8)	217	10.1 (2.1)	440	13.8 (1.9)	541	16.3 (1.9)	473	18.4 (2.3)
70+	223	2.2 (1.0)	204	1.8 (0.9)	219	6.3 (2.4)	182	5.1 (1.6)	365	3.7 (0.9)	431	6.7 (1.4)	384	6.1 (1.6)
거주지역														
동	2,746	21.9 (1.0)	2,907	19.3 (0.8)	2,793	20.8 (1.0)	866	20.1 (1.8)	2,081	18.5 (1.1)	2,392	19.3 (1.1)	2,109	19.6 (1.3)
읍면	1,434	30.3 (1.4)	745	21.4 (2.0)	715	23.4 (2.4)	373	26.0 (3.8)	758	24.5 (2.0)	845	27.4 (1.7)	595	29.0 (2.8)

1) 연간음주운전차량동승률 : 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간음주자운전차량동승률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	1,005	25.8 (1.6)	754	19.3 (1.5)	901	22.6 (1.6)	300	21.6 (2.6)	680	17.5 (1.7)	819	20.5 (1.7)	666	18.9 (1.5)
중하	1,053	25.2 (1.6)	846	19.3 (1.5)	889	20.3 (1.7)	285	20.5 (2.8)	676	16.9 (1.8)	801	20.3 (1.6)	670	20.3 (2.1)
중상	1,063	22.9 (1.4)	912	20.6 (1.4)	830	20.7 (1.6)	307	22.5 (2.8)	707	19.8 (1.6)	772	19.2 (1.8)	677	21.6 (1.9)
상	1,059	21.2 (1.5)	941	19.0 (1.5)	843	20.8 (1.7)	298	20.4 (2.9)	691	23.7 (2.1)	806	23.5 (1.8)	662	26.4 (2.9)
거주지역(표준화)														
동	2,746	20.3 (0.9)	2,907	18.8 (0.8)	2,793	19.8 (0.9)	866	19.7 (1.8)	2,081	17.9 (1.0)	2,392	18.8 (1.0)	2,109	19.3 (1.3)
읍면	1,434	34.3 (1.5)	745	25.3 (2.2)	715	25.2 (2.7)	373	26.8 (4.1)	758	24.9 (2.1)	845	28.4 (2.0)	595	28.1 (2.8)
소득수준(표준화)														
하	1,005	25.2 (1.6)	754	19.8 (1.6)	901	22.2 (1.5)	300	21.3 (2.6)	680	17.4 (1.7)	819	20.5 (1.6)	666	18.8 (1.5)
중하	1,053	24.1 (1.5)	846	18.9 (1.5)	889	19.9 (1.6)	285	20.0 (2.7)	676	16.9 (1.8)	801	20.2 (1.6)	670	19.6 (2.0)
중상	1,063	21.9 (1.4)	912	20.9 (1.5)	830	20.4 (1.6)	307	21.9 (2.7)	707	19.4 (1.5)	772	18.9 (1.7)	677	21.8 (1.9)
상	1,059	20.7 (1.5)	941	18.7 (1.5)	843	20.4 (1.6)	298	20.2 (3.0)	691	23.4 (1.9)	806	23.4 (1.8)	662	26.5 (3.0)
여자														
19세이상	4,811	13.7 (0.7)	4,357	11.0 (0.6)	4,291	11.5 (0.6)	1,736	13.1 (1.0)	3,962	14.5 (0.8)	4,244	13.6 (0.6)	3,553	12.9 (0.8)
65세이상	633	0.3 (0.2)	593	0.6 (0.4)	669	1.6 (0.5)	419	1.9 (0.8)	931	2.0 (0.5)	965	2.8 (0.7)	761	2.4 (0.8)
19세이상(표준화)	4,811	13.4 (0.7)	4,357	11.5 (0.6)	4,291	11.9 (0.6)	1,736	13.9 (1.0)	3,962	15.5 (0.8)	4,244	14.6 (0.7)	3,553	13.7 (0.8)
연령(세)														
19-29	1,073	24.1 (1.6)	906	20.2 (1.6)	753	17.9 (1.5)	198	23.7 (2.6)	526	24.3 (2.2)	564	21.8 (2.0)	464	20.4 (2.6)
30-39	1,122	19.0 (1.4)	1,052	15.5 (1.2)	929	14.9 (1.2)	388	18.5 (2.7)	815	18.6 (1.6)	830	17.7 (1.4)	727	17.2 (1.7)
40-49	916	12.7 (1.2)	951	11.5 (1.1)	1,006	14.1 (1.3)	316	12.4 (2.2)	749	16.4 (1.6)	853	16.8 (1.5)	630	12.7 (1.7)
50-59	722	3.6 (0.8)	584	3.7 (0.8)	650	6.2 (1.0)	299	7.5 (1.9)	644	10.1 (1.4)	705	8.1 (1.0)	693	12.6 (1.4)
60-69	590	1.5 (0.6)	492	1.4 (0.5)	525	2.1 (0.7)	271	3.1 (1.1)	638	3.7 (0.9)	667	4.3 (1.0)	554	2.6 (0.6)
70+	388	0.3 (0.2)	372	0.4 (0.4)	428	1.2 (0.5)	264	1.0 (0.7)	590	1.5 (0.5)	625	2.3 (0.8)	485	2.3 (1.2)
거주지역														
동	3,102	13.6 (0.8)	3,456	11.3 (0.6)	3,442	11.1 (0.7)	1,248	12.6 (1.1)	2,920	14.4 (0.9)	3,169	13.4 (0.7)	2,782	12.1 (0.9)
읍면	1,709	14.1 (1.4)	901	9.9 (1.2)	849	13.6 (1.4)	488	15.2 (2.6)	1,042	15.0 (1.5)	1,075	14.2 (1.6)	771	15.6 (1.5)
소득수준														
하	1,136	12.1 (1.2)	933	11.1 (1.1)	1,097	11.1 (1.2)	412	10.9 (2.0)	950	14.9 (1.7)	1,047	13.1 (1.2)	870	11.6 (1.2)
중하	1,256	14.1 (1.4)	985	8.8 (1.1)	1,097	11.7 (1.2)	410	15.7 (2.3)	959	14.4 (1.5)	1,059	12.8 (1.3)	873	12.5 (1.6)
중상	1,161	14.2 (1.1)	1,069	11.6 (0.9)	1,028	12.5 (1.2)	425	12.3 (2.1)	958	14.9 (1.5)	1,047	13.2 (1.2)	887	13.1 (1.4)
상	1,258	14.0 (1.2)	1,102	11.2 (1.0)	1,027	10.9 (1.0)	402	12.5 (2.1)	967	15.3 (1.6)	1,049	15.4 (1.5)	872	14.3 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	3,102	12.4 (0.7)	3,456	11.0 (0.6)	3,442	10.8 (0.6)	1,248	13.1 (1.1)	2,920	14.6 (0.9)	3,169	13.8 (0.7)	2,782	12.4 (0.9)
읍면	1,709	18.9 (1.7)	901	14.2 (1.8)	849	17.4 (1.7)	488	17.4 (2.6)	1,042	19.0 (2.0)	1,075	19.7 (2.1)	771	19.8 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	1,136	12.2 (1.2)	933	12.1 (1.1)	1,097	11.4 (1.2)	412	11.1 (2.0)	950	15.5 (1.7)	1,047	13.8 (1.3)	870	12.1 (1.2)
중하	1,256	13.5 (1.3)	985	9.1 (1.1)	1,097	12.2 (1.2)	410	16.3 (2.3)	959	15.1 (1.6)	1,059	14.0 (1.3)	873	13.1 (1.7)
중상	1,161	13.7 (1.1)	1,069	11.9 (0.9)	1,028	12.8 (1.2)	425	12.7 (2.2)	958	15.6 (1.5)	1,047	14.2 (1.2)	887	14.8 (1.6)
상	1,258	14.0 (1.2)	1,102	11.2 (1.0)	1,027	11.2 (1.0)	402	14.0 (2.3)	967	16.4 (1.8)	1,049	16.8 (1.6)	872	15.1 (1.7)

표 1-II-7. 평생음주율[1], 연간음주율[2], 월간음주율[3] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체			남자			여자		
	평생음주율	연간음주율	월간음주율	평생음주율	연간음주율	월간음주율	평생음주율	연간음주율	월간음주율
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
19세이상	6,257 89.2(0.5)	6,198 77.7(0.7)	6,198 59.3(1.0)	2,704 95.8(0.4)	2,682 87.7(0.7)	2,682 77.7(1.1)	3,553 82.7(0.8)	3,516 67.8(1.1)	3,516 41.3(1.2)
연령(세)									
19-29	771 96.6(0.8)	759 89.0(1.3)	759 67.3(2.4)	307 98.2(0.8)	304 96.7(1.0)	304 81.6(2.6)	464 94.8(1.3)	455 81.0(2.3)	455 52.1(3.0)
30-39	1,254 96.8(0.7)	1,238 87.1(1.1)	1,238 67.5(1.6)	527 98.5(0.8)	518 94.3(1.2)	518 84.9(1.7)	727 94.9(1.0)	720 79.5(1.9)	720 49.1(2.6)
40-49	1,162 92.7(1.0)	1,153 83.4(1.5)	1,153 65.5(1.7)	532 96.2(1.0)	529 89.6(1.6)	529 79.8(2.1)	630 89.1(1.5)	624 77.0(2.1)	624 50.6(2.4)
50-59	1,174 86.1(1.2)	1,163 74.9(1.4)	1,163 57.3(1.5)	481 95.0(1.3)	479 84.6(1.9)	479 78.1(2.2)	693 77.2(2.1)	684 65.1(2.2)	684 36.4(1.9)
60-69	1,027 76.8(1.8)	1,021 60.7(2.0)	1,021 43.9(1.9)	473 91.1(2.0)	471 74.8(2.6)	471 66.6(2.6)	554 63.9(2.5)	550 48.0(2.6)	550 23.4(2.3)
70+	869 66.5(2.0)	864 41.7(1.8)	864 29.2(1.6)	384 87.3(2.0)	381 61.6(2.7)	381 51.1(2.7)	485 53.5(3.0)	483 29.3(2.8)	483 15.5(2.0)
19-64	4,883 92.4(0.5)	4,830 82.6(0.7)	4,830 63.5(1.0)	2,091 96.7(0.5)	2,072 90.8(0.7)	2,072 80.5(1.1)	2,792 87.9(0.7)	2,758 74.1(1.2)	2,758 45.8(1.3)
65+	1,374 68.9(1.6)	1,368 46.8(1.5)	1,368 33.0(1.4)	613 88.6(1.5)	610 64.2(2.2)	610 55.5(2.3)	761 55.1(2.3)	758 34.6(2.2)	758 17.4(1.7)
거주지역									
동	4,891 90.4(0.5)	4,837 79.1(0.8)	4,837 60.5(1.1)	2,109 96.1(0.5)	2,088 88.9(0.8)	2,088 78.6(1.2)	2,782 84.7(0.8)	2,749 69.4(1.2)	2,749 42.7(1.3)
읍면	1,366 84.8(1.2)	1,361 72.6(1.7)	1,361 55.0(1.8)	595 94.6(1.0)	594 83.6(1.5)	594 74.4(2.4)	771 75.4(2.0)	767 62.0(2.8)	767 36.3(2.3)
소득수준[4]									
하	1,536 88.3(1.1)	1,520 74.8(1.5)	1,520 58.0(1.8)	666 95.0(1.1)	661 84.1(1.6)	661 74.5(2.1)	870 82.0(1.5)	859 66.0(2.0)	859 42.2(2.3)
중하	1,543 90.2(0.9)	1,534 78.8(1.4)	1,534 59.0(1.6)	670 96.2(0.9)	667 88.7(1.3)	667 77.5(2.0)	873 84.3(1.6)	867 69.1(2.3)	867 40.8(2.2)
중상	1,564 89.0(1.0)	1,547 78.9(1.2)	1,547 60.7(1.7)	677 96.4(0.9)	669 89.7(1.3)	669 80.1(2.2)	887 81.9(1.6)	878 68.4(1.9)	878 42.0(2.3)
상	1,534 89.4(0.8)	1,518 78.6(1.3)	1,518 59.9(1.6)	662 95.9(0.8)	656 89.2(1.4)	656 79.5(2.1)	872 82.6(1.3)	862 67.5(1.9)	862 39.5(2.0)
거주지역(표준화)[5]									
동	4,891 90.4(0.5)	4,837 79.1(0.7)	4,837 60.5(1.0)	2,109 95.9(0.5)	2,088 88.4(0.7)	2,088 78.0(1.2)	2,782 85.5(0.7)	2,749 70.2(1.2)	2,749 43.3(1.3)
읍면	1,366 88.4(1.0)	1,361 78.8(1.3)	1,361 60.1(1.8)	595 95.6(0.9)	594 87.4(1.2)	594 76.7(2.5)	771 81.9(1.9)	767 70.5(2.5)	767 43.2(2.3)
소득수준(표준화)									
하	1,536 88.9(1.0)	1,520 75.8(1.4)	1,520 58.7(1.7)	666 95.2(1.0)	661 84.6(1.4)	661 74.7(2.0)	870 83.5(1.4)	859 67.8(1.9)	859 43.8(2.2)
중하	1,543 90.9(0.8)	1,534 79.8(1.2)	1,534 59.8(1.5)	670 96.0(0.8)	667 88.7(1.2)	667 77.4(2.0)	873 86.2(1.3)	867 71.0(2.2)	867 42.3(2.1)
중상	1,564 90.1(0.9)	1,547 80.5(1.1)	1,547 61.9(1.7)	677 96.6(0.9)	669 90.3(1.2)	669 80.3(2.2)	887 84.5(1.4)	878 71.4(1.8)	878 44.3(2.3)
상	1,534 90.7(0.7)	1,518 80.5(1.2)	1,518 61.5(1.6)	662 96.0(0.8)	656 89.5(1.4)	656 79.6(2.2)	872 85.7(1.1)	862 71.4(1.8)	862 42.3(2.1)

1) 평생음주율 : 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 분율

2) 연간음주율 : 최근 1년 동안 1잔 이상 음주한 분율

3) 월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-8. 평생음주자의 음주시작연령[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 세)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	5,377	21.9 (0.2)	2,563	19.1 (0.1)	2,814	25.0 (0.3)
연령(세)						
19-29	745	17.7 (0.1)	302	17.4 (0.1)	443	18.0 (0.1)
30-39	1,211	18.7 (0.1)	519	18.0 (0.2)	692	19.6 (0.1)
40-49	1,071	21.3 (0.2)	514	19.0 (0.2)	557	23.8 (0.3)
50-59	988	24.7 (0.4)	461	20.1 (0.4)	527	30.3 (0.5)
60-69	786	27.6 (0.5)	435	20.9 (0.4)	351	36.2 (0.9)
70+	576	33.3 (0.8)	332	23.8 (0.7)	244	43.1 (1.0)
19-64	4,428	20.7 (0.1)	2,023	18.7 (0.1)	2,405	23.0 (0.2)
65+	949	31.7 (0.7)	540	22.6 (0.5)	409	41.9 (0.8)
거주지역						
동	4,267	21.5 (0.2)	2,006	19.1 (0.1)	2,261	24.2 (0.3)
읍면	1,110	23.3 (0.4)	557	19.3 (0.3)	553	28.1 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,323	22.2 (0.4)	628	19.2 (0.3)	695	25.5 (0.6)
중하	1,325	21.7 (0.2)	631	19.1 (0.2)	694	24.5 (0.4)
중상	1,345	21.7 (0.3)	649	19.2 (0.2)	696	24.6 (0.5)
상	1,320	21.6 (0.3)	629	18.8 (0.2)	691	25.0 (0.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,267	21.9 (0.1)	2,006	19.2 (0.1)	2,261	25.1 (0.2)
읍면	1,110	21.8 (0.2)	557	18.9 (0.3)	553	25.3 (0.3)
소득수준(표준화)						
하	1,323	22.3 (0.3)	628	19.2 (0.3)	695	25.8 (0.4)
중하	1,325	21.7 (0.2)	631	19.1 (0.2)	694	24.7 (0.3)
중상	1,345	21.6 (0.2)	649	19.2 (0.2)	696	24.5 (0.3)
상	1,320	21.6 (0.2)	629	18.8 (0.2)	691	25.1 (0.3)

1) 평생음주자의 음주시작연령 : 평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-9. 평생음주자의 연간음주빈도[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없음	월1회미만	월1회정도	월2~4회	주2~3회	주4회 이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	5,328	12.8 (0.6)	20.6 (0.7)	11.6 (0.5)	28.6 (0.8)	17.9 (0.7)	8.6 (0.5)
연령(세)							
19-29	733	7.7 (1.1)	22.5 (2.0)	13.4 (1.6)	39.7 (2.1)	14.9 (1.6)	1.8 (0.6)
30-39	1,196	9.9 (0.9)	20.3 (1.3)	11.4 (1.0)	32.0 (1.5)	20.6 (1.5)	5.8 (0.9)
40-49	1,064	9.9 (1.1)	19.4 (1.5)	12.7 (1.1)	27.2 (1.8)	21.0 (1.6)	9.9 (1.3)
50-59	978	12.9 (1.2)	20.4 (1.5)	10.7 (1.0)	23.8 (1.8)	18.0 (1.6)	14.1 (1.5)
60-69	782	20.8 (1.7)	22.0 (1.8)	9.6 (1.2)	19.3 (1.9)	15.7 (1.7)	12.8 (1.5)
70+	575	37.1 (2.2)	18.9 (1.9)	7.7 (1.4)	11.1 (1.5)	9.9 (1.3)	15.4 (2.0)
19-64	4,380	10.5 (0.6)	20.7 (0.8)	12.0 (0.6)	30.5 (0.9)	18.6 (0.8)	7.7 (0.5)
65+	948	32.0 (1.7)	20.0 (1.6)	7.7 (1.1)	12.9 (1.3)	11.9 (1.3)	15.6 (1.7)
거주지역							
동	4,222	12.4 (0.7)	20.6 (0.8)	11.9 (0.6)	29.5 (0.9)	18.4 (0.8)	7.3 (0.5)
읍면	1,106	14.3 (1.2)	20.8 (1.6)	10.1 (1.0)	25.3 (1.7)	15.9 (1.6)	13.5 (1.5)
소득수준[2]							
하	1,309	15.2 (1.2)	19.1 (1.2)	11.4 (1.1)	26.0 (1.6)	18.7 (1.4)	9.7 (0.9)
중하	1,319	12.6 (1.2)	22.0 (1.4)	10.9 (1.1)	29.9 (1.6)	15.7 (1.1)	8.9 (1.0)
중상	1,330	11.2 (1.0)	20.5 (1.6)	12.1 (1.1)	28.9 (1.5)	19.6 (1.7)	7.7 (0.9)
상	1,307	11.9 (1.2)	20.9 (1.3)	11.6 (1.0)	29.6 (1.7)	17.9 (1.4)	8.1 (0.9)
거주지역(표준화)[3]							
동	4,222	13.1 (0.6)	20.6 (0.8)	11.8 (0.6)	28.8 (0.9)	18.1 (0.8)	7.4 (0.5)
읍면	1,106	11.6 (0.9)	21.1 (1.8)	10.7 (0.9)	29.1 (2.3)	16.0 (1.9)	11.5 (1.6)
소득수준(표준화)							
하	1,309	15.4 (1.1)	19.3 (1.2)	11.5 (1.1)	26.1 (1.5)	18.3 (1.3)	9.4 (0.9)
중하	1,319	13.0 (1.1)	21.9 (1.4)	10.8 (1.1)	30.1 (1.5)	15.5 (1.1)	8.6 (0.9)
중상	1,330	11.1 (1.0)	20.6 (1.6)	12.3 (1.1)	28.8 (1.6)	19.7 (1.7)	7.4 (0.9)
상	1,307	12.1 (1.1)	21.0 (1.4)	11.5 (1.0)	29.7 (1.6)	17.7 (1.4)	8.0 (0.9)

1) 평생음주자의 연간음주빈도 : 평생음주자의 최근 1년간 음주 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-10. 평생음주자의 연간음주빈도[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없음	월1회미만	월1회정도	월2~4회	주2~3회	주4회 이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,546	8.4 (0.5)	10.5 (0.8)	9.6 (0.7)	32.5 (1.1)	25.2 (1.1)	13.8 (0.9)
연령(세)							
19-29	299	1.6 (0.6)	15.3 (2.6)	13.7 (2.3)	46.5 (3.2)	21.0 (2.5)	2.0 (0.8)
30-39	511	4.2 (0.9)	9.5 (1.4)	10.8 (1.5)	37.6 (2.5)	28.2 (2.4)	9.8 (1.6)
40-49	513	6.8 (1.3)	10.2 (1.7)	7.9 (1.4)	30.8 (2.2)	29.5 (2.5)	14.8 (2.0)
50-59	459	11.0 (1.6)	6.9 (1.4)	7.7 (1.3)	25.5 (2.4)	25.9 (2.4)	23.1 (2.4)
60-69	434	17.9 (2.2)	9.0 (1.9)	7.6 (1.3)	20.8 (2.4)	23.7 (2.7)	21.0 (2.5)
70+	330	29.4 (2.7)	12.0 (2.1)	6.1 (1.4)	11.0 (1.9)	14.4 (2.1)	27.2 (2.9)
19-64	2,007	6.1 (0.6)	10.6 (0.9)	10.1 (0.7)	34.8 (1.1)	26.1 (1.2)	12.3 (0.9)
65+	539	27.5 (2.3)	9.9 (1.6)	5.4 (1.0)	12.7 (1.6)	18.1 (2.0)	26.5 (2.8)
거주지역							
동	1,989	7.5 (0.6)	10.7 (1.0)	10.1 (0.8)	33.8 (1.1)	26.2 (1.2)	11.7 (0.8)
읍면	557	11.6 (1.4)	9.7 (1.7)	7.8 (1.2)	27.5 (2.5)	21.8 (2.3)	21.6 (2.3)
소득수준[2]							
하	625	11.5 (1.4)	10.1 (1.5)	10.3 (1.6)	27.8 (2.2)	25.3 (2.1)	15.0 (1.6)
중하	629	7.8 (1.0)	11.6 (1.6)	9.9 (1.5)	32.6 (2.1)	23.3 (1.9)	14.8 (1.7)
중상	643	6.9 (1.1)	10.0 (1.7)	8.8 (1.4)	34.8 (2.3)	26.9 (2.6)	12.6 (1.5)
상	623	6.9 (1.2)	10.2 (1.7)	9.1 (1.4)	34.9 (2.4)	25.9 (1.9)	13.0 (1.5)
거주지역(표준화)[3]							
동	1,989	8.0 (0.5)	10.9 (1.0)	10.0 (0.8)	33.3 (1.1)	25.9 (1.2)	11.9 (0.8)
읍면	557	8.8 (0.9)	11.1 (2.2)	8.1 (1.4)	32.8 (2.9)	21.5 (2.7)	17.7 (2.1)
소득수준(표준화)							
하	625	11.4 (1.2)	10.3 (1.6)	10.6 (1.7)	28.4 (2.1)	24.9 (2.1)	14.4 (1.5)
중하	629	8.0 (1.0)	11.7 (1.6)	10.0 (1.5)	33.4 (2.0)	22.8 (1.8)	14.0 (1.5)
중상	643	6.6 (1.0)	10.4 (1.8)	9.2 (1.5)	34.7 (2.4)	27.1 (2.6)	12.1 (1.4)
상	623	6.9 (1.2)	10.3 (1.7)	9.1 (1.4)	35.1 (2.3)	25.6 (1.9)	12.9 (1.4)

1) 평생음주자의 연간음주빈도 : 평생음주자의 최근 1년간 음주 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-11. 평생음주자의 연간음주빈도[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없음	월1회미만	월1회정도	월2~4회	주2~3회	주4회 이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,782	17.8 (1.0)	32.2 (1.1)	13.8 (0.8)	24.2 (1.1)	9.5 (0.7)	2.6 (0.4)
연령(세)							
19-29	434	14.5 (2.2)	30.5 (2.5)	13.0 (1.7)	32.2 (2.5)	8.2 (1.6)	1.7 (0.7)
30-39	685	16.2 (1.7)	32.1 (2.2)	12.0 (1.6)	26.0 (1.9)	12.4 (1.6)	1.4 (0.6)
40-49	551	13.4 (1.9)	29.7 (2.2)	18.0 (1.8)	23.1 (2.2)	11.5 (1.7)	4.3 (1.1)
50-59	519	15.4 (1.6)	37.3 (2.4)	14.4 (1.7)	21.8 (2.2)	8.2 (1.5)	3.0 (0.9)
60-69	348	24.5 (2.8)	38.7 (2.9)	12.1 (2.0)	17.3 (2.5)	5.4 (1.7)	2.0 (0.9)
70+	245	45.1 (3.9)	25.9 (3.3)	9.4 (2.2)	11.1 (2.5)	5.3 (1.4)	3.3 (1.2)
19-64	2,373	15.5 (1.1)	32.2 (1.2)	14.2 (0.8)	25.5 (1.2)	10.0 (0.8)	2.5 (0.4)
65+	409	37.1 (2.7)	31.3 (2.7)	10.2 (1.9)	13.1 (1.9)	4.9 (1.1)	3.3 (1.0)
거주지역							
동	2,233	17.9 (1.2)	31.7 (1.2)	14.0 (0.9)	24.6 (1.2)	9.7 (0.9)	2.3 (0.4)
읍면	549	17.6 (2.0)	34.2 (2.3)	13.0 (1.4)	22.7 (2.4)	8.8 (1.1)	3.7 (1.1)
소득수준[2]							
하	684	19.3 (1.8)	29.1 (1.9)	12.7 (1.4)	23.9 (2.3)	11.3 (1.6)	3.7 (0.9)
중하	690	18.0 (2.0)	33.6 (2.0)	12.1 (1.6)	26.8 (2.3)	7.2 (1.1)	2.4 (0.7)
중상	687	16.1 (1.7)	32.4 (2.4)	15.9 (1.7)	22.2 (1.7)	11.3 (1.5)	2.0 (0.6)
상	684	18.0 (1.9)	34.1 (2.2)	14.6 (1.6)	23.1 (1.9)	8.1 (1.4)	2.1 (0.7)
거주지역(표준화)[3]							
동	2,233	18.8 (1.2)	31.8 (1.2)	13.9 (0.9)	23.9 (1.1)	9.4 (0.9)	2.2 (0.4)
읍면	549	14.9 (1.8)	33.4 (2.3)	13.9 (1.4)	24.8 (2.7)	9.1 (1.4)	3.8 (1.4)
소득수준(표준화)							
하	684	19.5 (1.7)	29.4 (1.9)	12.6 (1.3)	23.7 (2.2)	11.1 (1.5)	3.7 (0.9)
중하	690	18.3 (2.0)	33.5 (1.9)	12.0 (1.6)	26.6 (2.1)	7.2 (1.1)	2.4 (0.7)
중상	687	16.3 (1.7)	32.2 (2.3)	15.9 (1.7)	22.2 (1.7)	11.4 (1.5)	2.0 (0.6)
상	684	18.5 (1.9)	34.0 (2.2)	14.4 (1.6)	23.2 (1.9)	7.9 (1.4)	2.1 (0.7)

1) 평생음주자의 연간음주빈도 : 평생음주자의 최근 1년간 음주 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-12. 연간음주자의 일회음주량 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	4,490	31.0 (1.0)	21.1 (0.8)	16.2 (0.7)	14.9 (0.6)	16.9 (0.9)
연령(세)						
19-29	665	18.9 (1.9)	16.0 (1.5)	19.8 (2.0)	18.2 (1.9)	27.1 (2.4)
30-39	1,054	29.7 (1.5)	17.3 (1.4)	16.7 (1.5)	17.6 (1.3)	18.7 (1.5)
40-49	957	31.0 (1.7)	24.1 (1.6)	16.3 (1.4)	14.7 (1.2)	13.9 (1.6)
50-59	825	34.3 (2.0)	24.1 (1.7)	15.8 (1.6)	12.0 (1.4)	13.7 (1.7)
60-69	618	44.6 (2.4)	29.2 (2.3)	10.8 (1.4)	9.5 (1.5)	5.9 (1.2)
70+	371	58.4 (2.8)	24.3 (2.7)	6.6 (1.6)	6.4 (1.6)	4.3 (1.3)
19-64	3,831	28.9 (0.9)	20.6 (0.9)	16.9 (0.8)	15.6 (0.7)	18.0 (0.9)
65+	659	53.6 (2.3)	26.7 (1.9)	7.7 (1.3)	7.5 (1.2)	4.4 (1.0)
거주지역						
동	3,583	29.7 (1.0)	21.2 (0.9)	16.7 (0.8)	15.2 (0.7)	17.1 (0.9)
읍면	907	35.7 (2.3)	20.5 (2.0)	14.1 (1.5)	13.7 (1.4)	16.0 (2.2)
소득수준[1)]						
하	1,072	28.8 (1.7)	20.4 (1.6)	16.8 (1.4)	14.2 (1.4)	19.7 (2.0)
중하	1,109	30.7 (1.7)	22.8 (1.5)	15.7 (1.4)	15.4 (1.3)	15.4 (1.5)
중상	1,136	30.8 (1.6)	20.3 (1.4)	17.2 (1.2)	15.4 (1.2)	16.3 (1.4)
상	1,120	33.4 (1.8)	20.7 (1.5)	15.1 (1.4)	14.8 (1.6)	16.0 (1.4)
거주지역(표준화)[2)]						
동	3,583	31.4 (0.9)	21.6 (0.9)	16.1 (0.8)	14.8 (0.7)	16.2 (0.8)
읍면	907	34.1 (2.2)	18.6 (1.9)	15.3 (1.8)	14.6 (1.6)	17.4 (2.1)
소득수준(표준화)						
하	1,072	30.2 (1.5)	20.5 (1.6)	16.6 (1.4)	13.8 (1.3)	19.0 (1.8)
중하	1,109	31.6 (1.6)	22.8 (1.5)	15.1 (1.3)	15.3 (1.3)	15.1 (1.4)
중상	1,136	31.3 (1.5)	20.4 (1.4)	16.9 (1.2)	15.3 (1.2)	16.1 (1.4)
상	1,120	34.2 (1.7)	20.9 (1.5)	15.0 (1.5)	14.5 (1.5)	15.4 (1.3)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-13. 연간음주자의 일회음주량 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,264	14.9 (0.9)	18.1 (1.1)	19.4 (1.0)	21.7 (1.0)	25.8 (1.2)
연령(세)						
19-29	293	9.2 (1.8)	11.9 (2.0)	21.1 (2.7)	21.9 (2.8)	35.9 (3.2)
30-39	492	12.6 (1.8)	13.1 (1.6)	18.6 (2.1)	26.5 (2.1)	29.1 (2.4)
40-49	479	14.5 (1.9)	18.2 (2.1)	18.9 (2.0)	24.0 (2.2)	24.4 (2.5)
50-59	407	14.0 (1.8)	22.0 (2.5)	22.1 (2.6)	18.7 (2.0)	23.2 (2.7)
60-69	361	24.7 (2.8)	33.8 (2.8)	17.4 (2.3)	14.7 (2.5)	9.4 (2.0)
70+	232	40.4 (3.3)	30.2 (3.5)	11.1 (2.6)	10.8 (2.6)	7.5 (2.3)
19-64	1,866	13.1 (0.9)	16.9 (1.1)	20.0 (1.1)	22.6 (1.0)	27.5 (1.2)
65+	398	34.7 (2.7)	32.3 (2.6)	13.0 (2.1)	12.4 (2.0)	7.6 (1.7)
거주지역						
동	1,794	13.6 (0.9)	17.8 (1.2)	20.4 (1.2)	22.1 (1.1)	26.1 (1.2)
읍면	470	19.9 (2.4)	19.6 (2.7)	15.5 (1.7)	20.5 (2.2)	24.5 (3.1)
소득수준[1)]						
하	534	15.7 (1.8)	16.0 (1.8)	20.1 (2.2)	18.5 (2.0)	29.7 (2.9)
중하	558	15.0 (1.5)	19.0 (1.9)	19.4 (2.2)	24.2 (2.1)	22.4 (2.1)
중상	580	11.9 (1.7)	19.0 (2.0)	20.5 (1.9)	22.2 (1.9)	26.4 (2.4)
상	570	16.9 (1.9)	18.6 (2.0)	17.7 (2.0)	22.4 (2.4)	24.4 (2.1)
거주지역(표준화)[2)]						
동	1,794	15.0 (0.9)	18.6 (1.2)	19.9 (1.2)	21.6 (1.1)	24.9 (1.1)
읍면	470	19.6 (2.7)	17.7 (2.4)	16.0 (2.2)	21.1 (2.4)	25.6 (3.0)
소득수준(표준화)						
하	534	16.3 (1.7)	16.6 (1.8)	20.2 (2.2)	18.0 (1.9)	28.7 (2.8)
중하	558	15.9 (1.5)	19.6 (1.8)	18.7 (2.1)	24.0 (2.1)	21.7 (2.0)
중상	580	12.5 (1.7)	19.0 (1.9)	20.0 (1.9)	22.2 (1.9)	26.3 (2.3)
상	570	17.5 (1.9)	18.9 (1.9)	17.8 (2.1)	22.2 (2.4)	23.7 (2.0)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-14. 연간음주자의 일회음주량 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,226	51.3 (1.4)	24.8 (1.1)	12.1 (0.9)	6.2 (0.6)	5.6 (0.8)
연령(세)						
19-29	372	31.2 (3.3)	21.3 (2.1)	18.0 (2.6)	13.6 (2.1)	15.9 (2.8)
30-39	562	51.0 (2.4)	22.5 (2.2)	14.3 (1.8)	6.5 (1.3)	5.8 (1.4)
40-49	478	51.0 (2.6)	31.3 (2.3)	13.1 (2.0)	3.4 (1.0)	1.2 (0.6)
50-59	418	60.8 (3.0)	26.7 (2.7)	7.6 (1.5)	3.4 (1.0)	1.4 (0.8)
60-69	257	72.7 (3.6)	22.8 (3.4)	1.4 (0.7)	2.2 (1.1)	0.9 (0.5)
70+	139	82.0 (4.0)	16.5 (3.9)	0.7 (0.7)	0.8 (0.8)	0.0 (-)[3]
19-64	1,965	48.9 (1.4)	25.2 (1.1)	13.1 (1.0)	6.7 (0.7)	6.1 (0.9)
65+	261	78.0 (3.0)	19.6 (2.9)	0.9 (0.6)	1.2 (0.7)	0.3 (0.3)
거주지역						
동	1,789	50.0 (1.5)	25.6 (1.2)	12.0 (1.0)	6.6 (0.7)	5.8 (0.9)
읍면	437	56.3 (2.8)	21.6 (2.6)	12.4 (1.9)	4.8 (1.5)	5.0 (1.4)
소득수준[1]						
하	538	44.9 (2.7)	25.8 (2.3)	12.8 (1.7)	8.9 (1.7)	7.5 (1.5)
중하	551	50.5 (2.8)	27.5 (2.2)	11.1 (1.7)	4.3 (1.1)	6.6 (1.6)
중상	556	54.8 (2.6)	22.0 (2.3)	13.1 (1.7)	6.6 (1.4)	3.5 (1.0)
상	550	56.2 (2.5)	23.7 (2.2)	11.5 (1.7)	4.3 (1.2)	4.3 (1.2)
거주지역(표준화)[2]						
동	1,789	52.4 (1.4)	24.9 (1.2)	11.1 (0.9)	6.2 (0.6)	5.3 (0.8)
읍면	437	52.8 (2.6)	20.1 (2.2)	14.6 (2.2)	6.0 (1.9)	6.6 (1.6)
소득수준(표준화)						
하	538	47.1 (2.4)	25.2 (2.2)	12.2 (1.6)	8.5 (1.5)	7.1 (1.4)
중하	551	51.4 (2.5)	27.1 (2.3)	10.6 (1.6)	4.3 (1.1)	6.6 (1.5)
중상	556	55.1 (2.5)	21.8 (2.2)	12.8 (1.7)	6.7 (1.3)	3.5 (1.0)
상	550	57.0 (2.3)	23.3 (2.1)	11.2 (1.6)	4.2 (1.2)	4.3 (1.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-II-15. 연간음주자의 고위험음주율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	4,486	17.6 (0.8)	2,260	25.5 (1.2)	2,226	7.6 (0.8)
연령(세)						
19-29	665	14.7 (1.7)	293	18.6 (2.5)	372	9.8 (1.9)
30-39	1,054	21.0 (1.7)	492	29.4 (2.7)	562	10.5 (1.6)
40-49	956	20.3 (1.7)	478	29.9 (2.7)	478	8.7 (1.7)
50-59	823	18.6 (1.8)	405	30.0 (2.7)	418	3.9 (1.2)
60-69	617	11.0 (1.7)	360	18.5 (2.9)	257	0.6 (0.4)
70+	371	8.6 (1.8)	232	14.0 (2.9)	139	1.5 (1.1)
19-64	3,828	18.3 (0.9)	1,863	26.4 (1.3)	1,965	8.2 (0.9)
65+	658	9.4 (1.4)	397	15.7 (2.3)	261	1.2 (0.7)
거주지역						
동	3,581	17.3 (1.0)	1,792	25.0 (1.4)	1,789	7.6 (0.9)
읍면	905	18.7 (1.8)	468	27.3 (2.3)	437	7.5 (1.5)
소득수준[2]						
하	1,072	20.4 (1.5)	534	27.4 (2.2)	538	11.9 (1.7)
중하	1,108	17.2 (1.3)	557	26.0 (2.0)	551	6.2 (1.4)
중상	1,134	17.0 (1.7)	578	24.4 (2.4)	556	7.7 (1.7)
상	1,119	15.8 (1.4)	569	24.1 (2.0)	550	4.3 (1.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,581	16.8 (0.9)	1,792	24.4 (1.3)	1,789	7.2 (0.9)
읍면	905	18.3 (1.9)	468	25.7 (2.5)	437	8.8 (1.8)
소득수준(표준화)						
하	1,072	19.5 (1.4)	534	26.2 (2.1)	538	11.3 (1.5)
중하	1,108	16.8 (1.3)	557	25.1 (2.0)	551	6.2 (1.4)
중상	1,134	17.0 (1.7)	578	24.5 (2.4)	556	7.6 (1.6)
상	1,119	15.3 (1.4)	569	23.7 (2.0)	550	4.1 (1.1)

1) 연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-16. 연간음주자의 연간폭음빈도[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없다	한달에 1번미만	한달에 1번정도	일주일에 1번정도	거의매일
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	4,488	28.6 (0.9)	21.8 (0.9)	19.6 (0.7)	21.9 (0.7)	8.1 (0.6)
연령(세)						
19-29	665	16.8 (1.8)	27.9 (2.0)	29.0 (2.0)	20.4 (1.9)	6.0 (1.1)
30-39	1,054	26.5 (1.5)	19.6 (1.5)	21.6 (1.6)	25.5 (1.7)	6.8 (1.0)
40-49	956	29.0 (1.5)	20.6 (1.4)	17.1 (1.6)	24.9 (1.7)	8.4 (1.1)
50-59	825	30.7 (2.0)	20.3 (1.7)	14.6 (1.4)	22.7 (1.6)	11.7 (1.6)
60-69	617	43.0 (2.5)	23.1 (2.2)	11.6 (1.5)	13.7 (1.7)	8.6 (1.3)
70+	371	60.4 (3.2)	13.6 (1.9)	8.8 (1.8)	8.4 (1.9)	8.8 (1.8)
19-64	3,830	26.3 (0.9)	22.3 (0.9)	20.4 (0.8)	23.0 (0.8)	8.1 (0.6)
65+	658	54.2 (2.6)	16.9 (1.8)	10.1 (1.3)	10.2 (1.4)	8.5 (1.4)
거주지역						
동	3,583	27.5 (0.9)	22.5 (1.0)	20.5 (0.9)	22.3 (0.8)	7.2 (0.6)
읍면	905	33.0 (2.3)	18.9 (1.5)	15.9 (1.4)	20.6 (1.9)	11.6 (1.5)
소득수준[2]						
하	1,072	27.3 (1.7)	19.8 (1.7)	19.6 (1.6)	22.9 (1.4)	10.5 (1.2)
중하	1,108	28.3 (1.7)	23.8 (1.7)	20.6 (1.6)	19.8 (1.5)	7.5 (0.9)
중상	1,135	28.1 (1.6)	23.1 (1.5)	18.5 (1.4)	23.4 (1.6)	7.0 (0.9)
상	1,120	30.6 (1.7)	20.2 (1.5)	19.9 (1.8)	22.0 (1.6)	7.4 (1.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,583	29.3 (0.8)	22.3 (0.9)	19.7 (0.8)	21.5 (0.8)	7.2 (0.6)
읍면	905	31.5 (2.2)	18.9 (1.6)	17.2 (1.5)	21.9 (2.1)	10.5 (1.4)
소득수준(표준화)						
하	1,072	28.8 (1.5)	19.8 (1.6)	19.4 (1.5)	21.9 (1.3)	10.2 (1.1)
중하	1,108	29.2 (1.5)	23.8 (1.7)	20.4 (1.5)	19.1 (1.4)	7.5 (0.9)
중상	1,135	28.8 (1.5)	23.0 (1.5)	18.3 (1.4)	22.9 (1.6)	7.0 (0.9)
상	1,120	31.6 (1.6)	19.9 (1.5)	19.6 (1.6)	21.6 (1.7)	7.2 (1.1)

1) 연간음주자의 연간폭음빈도 : 연간음주자 중 최근 1년간 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-17. 연간음주자의 연간폭음빈도[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없다	한달에 1번미만	한달에 1번정도	일주일에 1번정도	거의매일
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,262	16.4 (1.0)	18.1 (1.1)	23.0 (1.1)	30.0 (1.0)	12.5 (0.9)
연령(세)						
19-29	293	11.3 (2.1)	23.5 (2.6)	31.7 (2.8)	24.1 (2.7)	9.3 (2.0)
30-39	492	13.8 (1.7)	14.7 (1.8)	26.7 (2.4)	35.0 (2.5)	9.8 (1.7)
40-49	478	15.1 (1.6)	16.3 (1.8)	20.8 (2.7)	35.5 (2.6)	12.4 (1.8)
50-59	407	15.2 (2.0)	16.9 (2.2)	16.8 (2.1)	32.0 (2.4)	19.1 (2.6)
60-69	360	27.0 (2.9)	22.0 (2.6)	14.9 (2.3)	21.7 (2.9)	14.3 (2.1)
70+	232	44.3 (4.2)	15.9 (2.5)	10.8 (2.4)	14.2 (3.0)	14.9 (3.0)
19-64	1,865	14.5 (0.9)	18.1 (1.1)	23.9 (1.2)	31.1 (1.1)	12.4 (1.0)
65+	397	37.4 (3.3)	18.1 (2.3)	13.0 (1.9)	17.1 (2.1)	14.5 (2.3)
거주지역						
동	1,794	15.2 (1.0)	19.1 (1.2)	23.7 (1.3)	30.9 (1.1)	11.1 (1.1)
읍면	468	21.2 (2.4)	14.4 (1.9)	20.1 (2.5)	26.3 (2.5)	18.0 (2.5)
소득수준[2]						
하	534	15.6 (1.8)	18.1 (2.0)	22.4 (2.5)	29.2 (2.0)	14.6 (1.9)
중하	557	16.5 (1.6)	20.3 (1.8)	22.5 (2.2)	28.0 (2.3)	12.8 (1.6)
중상	579	15.3 (1.9)	17.5 (2.0)	23.2 (2.1)	32.8 (2.5)	11.1 (1.5)
상	570	18.1 (2.0)	16.0 (2.0)	23.8 (2.5)	30.6 (2.5)	11.5 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,794	16.5 (1.0)	19.2 (1.2)	23.0 (1.2)	30.2 (1.1)	11.1 (1.0)
읍면	468	20.8 (2.9)	14.7 (2.3)	21.9 (2.9)	26.7 (2.8)	16.1 (2.3)
소득수준(표준화)						
하	534	16.7 (1.7)	18.4 (2.0)	22.6 (2.5)	28.1 (1.9)	14.2 (1.8)
중하	557	16.8 (1.5)	20.6 (1.8)	22.8 (2.1)	27.0 (2.2)	12.7 (1.6)
중상	579	16.2 (1.8)	17.4 (1.9)	23.0 (2.1)	32.4 (2.3)	11.0 (1.5)
상	570	19.0 (1.9)	15.8 (1.9)	23.5 (2.4)	30.4 (2.5)	11.3 (1.6)

1) 연간음주자의 연간폭음빈도 : 연간음주자 중 최근 1년간 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-II-18. 연간음주자의 연간폭음빈도[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀없다	한달에 1번미만	한달에 1번정도	일주일에 1번정도	거의매일
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,226	44.1 (1.3)	26.5 (1.2)	15.2 (1.0)	11.7 (0.9)	2.5 (0.4)
연령(세)						
19-29	372	23.7 (2.5)	33.4 (2.8)	25.4 (2.7)	15.7 (2.5)	1.8 (0.8)
30-39	562	42.4 (2.4)	25.8 (2.4)	15.1 (1.8)	13.6 (1.8)	3.1 (1.0)
40-49	478	45.9 (2.6)	25.7 (2.4)	12.7 (1.7)	12.0 (2.0)	3.6 (1.0)
50-59	418	50.9 (3.1)	24.7 (2.5)	11.6 (2.0)	10.7 (1.8)	2.2 (0.8)
60-69	257	65.4 (4.0)	24.6 (3.9)	7.0 (1.8)	2.4 (0.9)	0.6 (0.4)
70+	139	81.7 (3.6)	10.6 (2.3)	6.1 (3.0)	0.8 (0.8)	0.7 (0.7)
19-64	1,965	41.2 (1.3)	27.5 (1.2)	16.0 (1.0)	12.6 (1.0)	2.6 (0.5)
65+	261	75.9 (3.0)	15.4 (2.4)	6.4 (2.1)	1.4 (0.7)	0.8 (0.6)
거주지역						
동	1,789	43.0 (1.4)	26.9 (1.4)	16.4 (1.1)	11.4 (1.0)	2.3 (0.4)
읍면	437	48.3 (2.8)	24.8 (2.4)	10.4 (1.9)	13.1 (1.9)	3.3 (1.3)
소득수준[2]						
하	538	41.5 (2.6)	21.8 (2.2)	16.2 (2.1)	15.1 (1.9)	5.5 (1.3)
중하	551	43.2 (2.7)	28.2 (2.6)	18.2 (2.2)	9.5 (1.5)	0.9 (0.5)
중상	556	44.2 (2.7)	30.1 (2.3)	12.5 (1.7)	11.4 (1.5)	1.8 (0.7)
상	550	47.8 (2.6)	26.0 (2.4)	14.5 (1.8)	10.2 (1.8)	1.6 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,789	45.7 (1.2)	26.0 (1.3)	15.5 (1.0)	10.6 (0.9)	2.2 (0.4)
읍면	437	45.2 (2.4)	24.8 (2.3)	10.9 (1.9)	15.7 (2.2)	3.4 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	538	43.6 (2.3)	21.2 (2.0)	15.7 (2.0)	14.3 (1.8)	5.2 (1.2)
중하	551	44.5 (2.4)	27.8 (2.6)	17.6 (2.0)	9.1 (1.4)	0.9 (0.5)
중상	556	44.8 (2.5)	29.8 (2.3)	12.3 (1.6)	11.2 (1.5)	1.8 (0.7)
상	550	48.9 (2.4)	25.1 (2.2)	15.0 (1.8)	9.5 (1.7)	1.5 (0.8)

1) 연간음주자의 연간폭음빈도 : 연간음주자 중 최근 1년간 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-나-19. 평생음주자의 문제음주율[1], 알코올남용률[2], 알코올의존율[3] : 성별, 만19세이상 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체					남자					여자				
	N	정상음주율[4]	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율	N	정상음주율	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율	N	정상음주율	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	5,316	61.5(0.9)	24.5(0.8)	7.2(0.4)	6.9(0.5)	2,536	43.1(1.2)	34.1(1.2)	11.7(0.8)	11.1(0.9)	2,780	82.3(1.1)	13.6(0.9)	2.0(0.3)	2.1(0.4)
연령(세)															
19-29	733	56.6(2.3)	33.8(2.1)	4.7(0.9)	4.9(0.9)	299	44.7(3.1)	43.4(3.2)	5.6(1.4)	6.3(1.6)	434	69.7(3.2)	23.3(2.6)	3.7(1.0)	3.3(1.0)
30-39	1,195	59.2(1.7)	24.6(1.4)	9.2(1.1)	7.0(1.1)	510	38.7(2.5)	35.1(2.4)	15.5(1.9)	10.6(1.9)	685	81.4(1.9)	13.2(1.7)	2.4(0.7)	3.0(0.9)
40-49	1,062	59.4(1.9)	24.7(1.8)	8.2(1.0)	7.7(1.1)	511	37.9(2.7)	35.5(2.7)	13.8(1.7)	12.7(1.9)	551	83.6(2.0)	12.6(1.9)	1.8(0.7)	2.0(0.7)
50-59	973	60.5(1.9)	20.6(1.7)	8.8(1.1)	10.1(1.4)	454	39.0(2.5)	28.6(2.4)	14.9(1.9)	17.5(2.2)	519	87.0(2.0)	10.8(2.0)	1.2(0.5)	1.1(0.7)
60-69	779	70.3(2.2)	18.3(1.9)	4.9(0.9)	6.5(1.2)	432	53.3(3.4)	27.3(2.9)	8.5(1.5)	11.0(2.1)	347	92.3(2.1)	6.7(2.1)	0.3(0.3)	0.7(0.5)
70+	574	82.7(2.0)	11.2(1.6)	3.3(1.0)	2.8(0.8)	330	68.6(3.2)	19.5(2.5)	6.4(1.9)	5.5(1.6)	244	97.3(1.4)	2.7(1.4)	0.0(-)[7]	0.0(-)
19-64	4,370	59.5(1.0)	25.6(0.9)	7.6(0.5)	7.2(0.5)	1,998	41.0(1.3)	35.2(1.3)	12.3(0.9)	11.6(0.9)	2,372	80.7(1.2)	14.7(1.0)	2.3(0.4)	2.3(0.4)
65+	946	77.8(1.8)	14.8(1.3)	3.4(0.7)	4.0(0.9)	538	61.6(2.8)	24.6(2.1)	6.4(1.3)	7.4(1.7)	408	96.0(1.3)	3.7(1.3)	0.0(-)	0.2(0.2)
거주지역															
동	4,214	61.3(1.0)	25.0(0.8)	7.4(0.5)	6.3(0.5)	1,983	42.6(1.4)	35.4(1.3)	12.0(0.9)	10.0(0.9)	2,231	82.2(1.2)	13.5(1.0)	2.2(0.4)	2.1(0.4)
읍면	1,102	62.0(2.2)	22.3(2.0)	6.4(0.7)	9.3(1.6)	553	45.0(3.1)	29.1(2.3)	10.6(1.2)	15.2(2.5)	549	82.6(2.1)	14.0(2.5)	1.3(0.4)	2.1(0.9)
소득수준[5]															
하	1,308	60.6(1.8)	23.4(1.6)	7.4(0.9)	8.6(1.2)	624	44.3(2.3)	31.5(2.2)	11.1(1.4)	13.0(1.9)	684	78.7(2.3)	14.4(1.9)	3.2(0.9)	3.7(1.1)
중하	1,315	62.5(1.7)	23.3(1.5)	6.7(0.9)	7.5(0.8)	626	44.3(2.2)	32.3(2.3)	11.5(1.6)	11.9(1.5)	689	82.8(1.9)	13.3(1.6)	1.3(0.5)	2.6(0.8)
중상	1,326	60.2(1.8)	26.6(1.8)	7.5(1.0)	5.7(0.7)	639	40.6(2.6)	37.6(2.6)	12.5(1.7)	9.3(1.2)	687	82.4(2.0)	14.2(1.8)	1.7(0.6)	1.7(0.6)
상	1,304	62.1(1.9)	24.9(1.7)	7.4(0.8)	5.6(0.9)	621	42.6(2.6)	35.4(2.5)	12.1(1.4)	9.9(1.7)	683	86.1(1.9)	12.2(1.8)	1.6(0.6)	0.2(0.2)
거주지역(표준화)[6]															
동	4,214	62.1(0.9)	24.6(0.8)	7.2(0.5)	6.1(0.5)	1,983	43.5(1.3)	35.0(1.3)	11.8(0.9)	9.7(0.9)	2,231	82.9(1.1)	13.0(0.9)	2.1(0.3)	2.0(0.4)
읍면	1,102	59.9(2.5)	24.6(2.3)	6.2(0.8)	9.3(1.8)	553	44.6(3.5)	31.0(2.7)	9.7(1.3)	14.7(2.4)	549	79.0(2.2)	16.7(2.7)	1.6(0.5)	2.7(1.3)
소득수준(표준화)															
하	1,308	61.0(1.7)	23.5(1.6)	7.2(0.9)	8.3(1.1)	624	44.8(2.3)	32.2(2.2)	10.7(1.4)	12.3(1.6)	684	79.1(2.1)	14.1(1.8)	3.2(0.9)	3.6(1.1)
중하	1,315	62.8(1.6)	23.5(1.4)	6.6(0.8)	7.1(0.8)	626	45.1(2.2)	32.7(2.2)	11.1(1.6)	11.1(1.3)	689	82.7(1.8)	13.5(1.6)	1.3(0.5)	2.5(0.8)
중상	1,326	60.2(1.7)	26.8(1.7)	7.4(1.0)	5.6(0.7)	639	40.6(2.5)	37.8(2.5)	12.6(1.6)	9.0(1.2)	687	82.1(1.9)	14.4(1.7)	1.7(0.6)	1.8(0.7)
상	1,304	62.3(1.9)	24.9(1.7)	7.3(0.9)	5.5(0.9)	621	42.6(2.6)	35.8(2.4)	12.0(1.4)	9.6(1.6)	683	86.2(1.8)	12.0(1.7)	1.6(0.6)	0.2(0.2)

1) 평생음주자의 문제음주율 : 평생음주자 중 AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test) 점수가 총점 8점 이상 15점 이하에 해당하는 분율

2) 평생음주자의 알코올남용률 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 16점 이상 19점 이하에 해당하는 분율

3) 평생음주자의 알코올의존율 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 20점 이상에 해당하는 분율

4) 평생음주자의 정상음주율 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 7점 이하에 해당하는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-II-20. 평생음주자의 연간음주문제상담경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	평생음주자						알코올의존자[2]					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	5,386	1.3 (0.2)	2,568	1.6 (0.3)	2,818	1.0 (0.2)	314	4.5 (1.6)	277	5.2 (1.8)	37	0.0 (-)[5]
연령(세)												
19-29	745	0.9 (0.4)	302	0.4 (0.3)	443	1.4 (0.6)	31	0.0 (-)	19	--[6]	12	--
30-39	1,212	1.5 (0.4)	520	2.1 (0.7)	692	0.9 (0.3)	69	7.4 (3.6)	57	9.3 (4.4)	12	--
40-49	1,073	2.1 (0.6)	516	2.7 (0.8)	557	1.5 (0.6)	70	6.9 (4.2)	62	7.8 (4.7)	8	--
50-59	989	1.0 (0.4)	461	1.1 (0.6)	528	0.8 (0.4)	84	4.1 (3.0)	81	4.3 (3.2)	3	--
60-69	787	1.0 (0.5)	436	1.7 (0.8)	351	0.0 (-)	44	0.0 (-)	42	0.0 (-)	2	--
70+	580	0.2 (0.1)	333	0.4 (0.3)	247	0.0 (-)	16	--	16	--		--
19-64	4,432	1.4 (0.2)	2,026	1.6 (0.3)	2,406	1.1 (0.2)	279	4.8 (1.6)	243	5.6 (1.9)	36	0.0 (-)
65+	954	0.6 (0.3)	542	1.1 (0.6)	412	0.0 (-)	35	0.0 (-)	34	0.0 (-)	1	--
거주지역												
동	4,275	1.2 (0.2)	2,010	1.4 (0.3)	2,265	1.1 (0.2)	227	4.2 (1.7)	196	5.0 (2.0)	31	0.0 (-)
읍면	1,111	1.5 (0.5)	558	2.2 (0.9)	553	0.6 (0.3)	87	5.2 (3.4)	81	5.8 (3.8)	6	--
소득수준[3]												
하	1,325	1.8 (0.4)	630	2.3 (0.7)	695	1.3 (0.5)	92	6.6 (3.2)	77	8.3 (4.0)	15	--
중하	1,327	1.1 (0.4)	632	1.6 (0.6)	695	0.6 (0.2)	80	5.6 (3.9)	68	6.7 (4.6)	12	--
중상	1,347	1.0 (0.3)	651	1.0 (0.4)	696	1.1 (0.4)	71	2.6 (1.9)	63	3.1 (2.2)	8	--
상	1,323	1.1 (0.4)	629	1.3 (0.5)	694	1.0 (0.5)	66	1.2 (1.1)	64	1.3 (1.1)	2	--
거주지역(표준화)[4]												
동	4,275	1.2 (0.2)	2,010	1.4 (0.3)	2,265	1.0 (0.2)	227	--[7]	196	--	31	--
읍면	1,111	1.8 (0.6)	558	2.6 (1.0)	553	0.8 (0.5)	87	--	81	--	6	--
소득수준(표준화)												
하	1,325	1.8 (0.4)	630	2.2 (0.7)	695	1.3 (0.5)	92	--	77	--	15	--
중하	1,327	1.1 (0.4)	632	1.6 (0.6)	695	0.6 (0.2)	80	--	68	--	12	--
중상	1,347	1.1 (0.3)	651	1.0 (0.4)	696	1.1 (0.4)	71	--	63	--	8	--
상	1,323	1.2 (0.4)	629	1.3 (0.5)	694	1.0 (0.5)	66	--	64	--	2	--

1) 평생음주자의 연간음주문제상담경험률 : 평생음주자 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율

2) 알코올의존자의 연간음주문제상담경험률 : 알코올의존자(AUDIT 20점 이상) 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-II-21. 연간음주운전경험률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	자동차 또는 오토바이[1]		자동차[2]		오토바이[3]		자전거[4]	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	3,521	18.7 (1.0)	3,328	17.1 (0.9)	863	13.0 (1.7)	1,784	10.9 (1.0)
연령(세)								
19-29	414	15.1 (1.9)	386	13.2 (1.8)	144	11.9 (3.1)	269	6.4 (1.7)
30-39	953	16.7 (1.6)	938	16.3 (1.6)	178	6.3 (2.5)	391	9.4 (1.7)
40-49	877	19.7 (1.5)	856	18.7 (1.6)	200	10.4 (2.7)	370	9.7 (2.0)
50-59	689	22.1 (2.1)	661	20.2 (2.0)	139	17.1 (3.9)	326	14.0 (2.4)
60-69	427	20.2 (2.6)	380	16.5 (2.5)	127	19.6 (4.8)	285	18.2 (2.6)
70+	161	29.1 (5.0)	107	12.8 (5.1)	75	42.1 (7.1)	143	20.4 (3.5)
19-64	3,184	18.4 (1.0)	3,077	17.2 (0.9)	723	10.9 (1.6)	1,512	9.9 (1.0)
65+	337	25.3 (4.0)	251	13.5 (4.0)	140	36.3 (6.3)	272	23.0 (3.2)
거주지역								
동	2,763	15.7 (1.0)	2,677	14.6 (1.0)	565	8.4 (1.6)	1,376	9.3 (1.0)
읍면	758	29.5 (2.2)	651	26.7 (2.1)	298	21.9 (3.4)	408	16.1 (2.2)
소득수준[5]								
하	721	20.1 (1.7)	663	16.6 (1.5)	209	16.0 (3.6)	418	9.3 (1.7)
중하	841	17.1 (1.6)	791	16.3 (1.6)	208	13.1 (3.2)	435	11.5 (1.8)
중상	917	18.1 (1.5)	873	16.8 (1.6)	210	12.9 (2.8)	473	12.3 (1.9)
상	1,006	19.9 (2.1)	965	18.6 (2.0)	233	10.1 (2.3)	446	10.9 (1.7)
거주지역(표준화)[6]								
동	2,763	15.7 (1.2)	2,677	14.2 (1.2)	565	9.3 (1.7)	1,376	9.6 (1.0)
읍면	758	28.6 (2.1)	651	25.1 (1.9)	298	20.2 (3.5)	408	14.1 (2.0)
소득수준(표준화)								
하	721	20.0 (1.8)	663	- -[7]	209	- -	418	9.2 (1.6)
중하	841	16.8 (1.7)	791	- -	208	13.2 (3.0)	435	11.6 (1.7)
중상	917	19.4 (1.6)	873	16.6 (1.7)	210	- -	473	12.6 (1.9)
상	1,006	20.0 (2.3)	965	18.0 (2.3)	233	- -	446	11.4 (1.7)

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) 자동차 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율

3) 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

4) 자전거 운전자의 연간음주운전경험률 : 자전거 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-II-22. 연간음주운전경험률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	자동차 또는 오토바이[1]		자동차[2]		오토바이[3]		자전거[4]	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	2,179	23.8 (1.3)	2,050	21.3 (1.2)	656	15.7 (2.1)	1,143	15.0 (1.4)
연령(세)								
19-29	233	19.5 (2.5)	214	16.8 (2.5)	93	15.3 (4.0)	138	9.2 (2.6)
30-39	502	21.7 (2.3)	494	20.8 (2.3)	125	7.8 (3.2)	211	12.7 (2.6)
40-49	501	25.0 (2.2)	493	23.2 (2.2)	153	11.9 (3.1)	232	14.2 (2.8)
50-59	435	28.6 (2.7)	424	25.7 (2.5)	104	20.5 (4.9)	198	19.0 (3.4)
60-69	359	23.3 (3.1)	323	18.7 (2.9)	114	21.6 (5.1)	234	21.1 (3.2)
70+	149	30.9 (5.2)	102	13.2 (5.3)	67	46.2 (7.4)	130	22.6 (3.7)
19-64	1,871	23.6 (1.3)	1,816	21.7 (1.2)	529	13.2 (2.0)	899	13.7 (1.4)
65+	308	27.5 (4.3)	234	14.5 (4.2)	127	39.2 (6.6)	244	25.4 (3.8)
거주지역								
동	1,686	19.4 (1.3)	1,628	17.9 (1.2)	430	9.7 (1.9)	871	12.6 (1.3)
읍면	493	39.2 (3.3)	422	34.1 (2.9)	226	27.7 (4.2)	272	22.3 (3.4)
소득수준[5]								
하	483	24.7 (2.2)	438	20.2 (2.1)	160	18.8 (4.2)	273	13.2 (2.4)
중하	538	23.0 (2.2)	507	21.4 (2.1)	165	16.2 (3.9)	290	15.3 (2.4)
중상	553	23.5 (2.2)	525	21.7 (2.3)	157	15.4 (3.4)	292	17.7 (2.7)
상	584	24.6 (2.8)	559	22.4 (2.7)	171	12.6 (2.9)	281	14.2 (2.4)
거주지역(표준화)[6]								
동	1,686	19.2 (1.4)	1,628	17.3 (1.4)	430	10.7 (2.0)	871	12.7 (1.3)
읍면	493	37.7 (3.3)	422	32.4 (2.9)	226	- -[7]	272	- -
소득수준(표준화)								
하	483	24.0 (2.3)	438	- -	160	- -	273	13.0 (2.3)
중하	538	22.4 (2.2)	507	- -	165	- -	290	14.4 (2.2)
중상	553	24.3 (2.3)	525	21.3 (2.3)	157	- -	292	17.1 (2.7)
상	584	24.5 (3.0)	559	21.7 (3.0)	171	- -	281	14.4 (2.4)

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) 자동차 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율

3) 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

4) 자전거 운전자의 연간음주운전경험률 : 자전거 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-II-23. 연간음주운전경험률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	자동차 또는 오토바이[1]		자동차[2]		오토바이[3]		자전거[4]	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	1,342	7.8 (1.0)	1,278	7.9 (1.1)	207	2.1 (1.2)	641	2.5 (0.7)
연령(세)								
19-29	181	5.6 (1.9)	172	5.5 (2.0)	51	2.2 (1.6)	131	2.1 (1.5)
30-39	451	8.5 (1.5)	444	8.7 (1.6)	53	0.0 (-)[7]	180	3.7 (1.6)
40-49	376	10.7 (2.1)	363	10.6 (2.1)	47	4.2 (4.1)	138	1.1 (0.7)
50-59	254	4.6 (1.4)	237	4.5 (1.4)	35	2.7 (2.7)	128	3.3 (1.8)
60-69	68	1.2 (1.1)	57	1.4 (1.3)	13	- -[8]	51	4.1 (3.1)
70+	12	- -	5	- -	8	- -	13	- -
19-64	1,313	7.9 (1.0)	1,261	8.0 (1.1)	194	2.2 (1.2)	613	2.6 (0.7)
65+	29	0.0 (-)	17	- -	13	- -	28	0.0 (-)
거주지역								
동	1,077	7.8 (1.2)	1,049	7.7 (1.2)	135	2.8 (1.8)	505	2.5 (0.8)
읍면	265	7.8 (1.6)	229	8.9 (1.9)	72	1.1 (1.0)	136	2.6 (1.4)
소득수준[5]								
하	238	7.9 (2.0)	225	7.6 (2.1)	49	4.4 (2.5)	145	1.9 (1.1)
중하	303	4.2 (1.2)	284	4.6 (1.4)	43	0.0 (-)	145	2.6 (1.4)
중상	364	7.8 (1.6)	348	7.5 (1.6)	53	4.3 (4.2)	181	2.5 (1.2)
상	422	10.4 (2.3)	406	10.9 (2.4)	62	0.0 (-)	165	3.3 (1.9)
거주지역(표준화)[6]								
동	1,077	- -[9]	1,049	- -	135	- -	505	- -
읍면	265	- -	229	- -	72	- -	136	- -
소득수준(표준화)								
하	238	- -	225	- -	49	- -	145	- -
중하	303	- -	284	- -	43	- -	145	- -
중상	364	- -	348	- -	53	- -	181	- -
상	422	- -	406	- -	62	- -	165	- -

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) 자동차 운전자의 연간음주운전경험률 : 자동차 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율

3) 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

4) 자전거 운전자의 연간음주운전경험률 : 자전거 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

8) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

9) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-II-24. 연간음주운전차량동승률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,257	17.2 (0.8)	2,704	21.6 (1.2)	3,553	12.9 (0.8)
연령(세)						
19-29	771	21.8 (2.3)	307	23.2 (3.1)	464	20.4 (2.6)
30-39	1,254	19.8 (1.4)	527	22.2 (2.5)	727	17.2 (1.7)
40-49	1,162	17.3 (1.3)	532	21.8 (2.2)	630	12.7 (1.7)
50-59	1,174	19.5 (1.7)	481	26.5 (2.9)	693	12.6 (1.4)
60-69	1,027	10.1 (1.1)	473	18.4 (2.3)	554	2.6 (0.6)
70+	869	3.8 (0.9)	384	6.1 (1.6)	485	2.3 (1.2)
19-64	4,883	18.9 (0.9)	2,091	22.9 (1.3)	2,792	14.8 (0.9)
65+	1,374	6.1 (0.9)	613	11.3 (1.8)	761	2.4 (0.8)
거주지역						
동	4,891	15.8 (0.9)	2,109	19.6 (1.3)	2,782	12.1 (0.9)
읍면	1,366	22.1 (1.5)	595	29.0 (2.8)	771	15.6 (1.5)
소득수준[2]						
하	1,536	15.2 (1.0)	666	18.9 (1.5)	870	11.6 (1.2)
중하	1,543	16.4 (1.4)	670	20.3 (2.1)	873	12.5 (1.6)
중상	1,564	17.3 (1.2)	677	21.6 (1.9)	887	13.1 (1.4)
상	1,534	20.5 (1.8)	662	26.4 (2.9)	872	14.3 (1.6)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,891	15.8 (0.9)	2,109	19.3 (1.3)	2,782	12.4 (0.9)
읍면	1,366	24.0 (1.9)	595	28.1 (2.8)	771	19.8 (2.2)
소득수준(표준화)						
하	1,536	15.4 (1.0)	666	18.8 (1.5)	870	12.1 (1.2)
중하	1,543	16.4 (1.4)	670	19.6 (2.0)	873	13.1 (1.7)
중상	1,564	18.2 (1.3)	677	21.8 (1.9)	887	14.8 (1.6)
상	1,534	21.0 (1.9)	662	26.5 (3.0)	872	15.1 (1.7)

1) 연간음주운전차량동승률: 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-III-1. 중등도이상 신체활동실천율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,801	29.6 (1.3)	2,922	21.1 (1.0)	6,784	25.9 (0.8)	7,472	26.2 (0.8)	6,248	22.4 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	18.8 (1.9)	716	14.0 (1.4)	1,509	19.4 (1.7)	1,653	18.8 (1.4)	1,373	17.0 (1.4)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,801	29.6 (1.3)	2,922	21.1 (1.0)	6,784	25.9 (0.8)	7,472	26.3 (0.8)	6,248	22.4 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	26.6 (1.9)	334	21.2 (2.4)	890	25.5 (1.8)	1,046	27.8 (1.6)	771	24.6 (2.1)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	30.6 (1.8)	608	18.4 (1.7)	1,408	25.4 (1.3)	1,424	23.9 (1.3)	1,253	19.8 (1.4)
40-49	-	- -	-	- -	1,877	34.9 (1.8)	553	25.8 (2.2)	1,324	26.5 (1.3)	1,495	28.1 (1.3)	1,160	23.3 (1.5)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	34.1 (1.9)	499	22.8 (2.5)	1,132	31.4 (1.5)	1,247	30.8 (1.8)	1,172	25.4 (2.0)
60-69	-	- -	-	- -	970	27.8 (2.2)	482	22.3 (2.2)	1,076	25.6 (1.8)	1,204	24.9 (1.6)	1,024	22.4 (2.1)
70+	-	- -	-	- -	647	13.8 (2.0)	446	9.8 (1.7)	954	16.5 (2.0)	1,056	16.8 (1.5)	868	15.1 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	29.6 (1.4)	2,072	22.2 (1.2)	4,988	24.8 (0.9)	5,554	26.6 (0.9)	4,884	20.8 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	29.5 (2.8)	850	16.7 (1.9)	1,796	30.6 (2.2)	1,918	24.5 (1.7)	1,364	27.9 (2.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,997	26.9 (1.6)	703	19.5 (2.0)	1,627	24.0 (1.4)	1,863	23.9 (1.4)	1,535	20.0 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,987	28.7 (1.6)	683	20.5 (2.1)	1,633	27.1 (1.3)	1,859	27.8 (1.3)	1,537	24.2 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,858	32.0 (1.7)	715	19.0 (1.9)	1,658	25.2 (1.5)	1,817	26.9 (1.3)	1,563	20.4 (1.3)
상	-	- -	-	- -	1,872	31.5 (1.9)	684	24.8 (2.1)	1,656	28.2 (1.6)	1,852	26.6 (1.4)	1,533	25.8 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	29.3 (1.4)	2,072	22.0 (1.1)	4,988	24.7 (0.9)	5,554	26.5 (0.9)	4,884	20.7 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	30.5 (2.8)	850	17.4 (2.1)	1,796	31.5 (2.5)	1,918	24.4 (1.5)	1,364	28.7 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,997	26.9 (1.6)	703	19.5 (2.0)	1,627	24.0 (1.4)	1,863	24.1 (1.5)	1,535	20.1 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	1,987	28.8 (1.6)	683	20.2 (2.1)	1,633	26.8 (1.3)	1,859	27.6 (1.3)	1,537	24.2 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,858	31.9 (1.7)	715	19.1 (1.9)	1,658	25.2 (1.5)	1,817	27.1 (1.2)	1,563	20.2 (1.3)
상	-	- -	-	- -	1,872	31.6 (1.8)	684	24.7 (2.2)	1,656	28.3 (1.6)	1,852	26.3 (1.4)	1,533	25.9 (1.6)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,509	33.6 (1.4)	1,207	24.3 (1.5)	2,833	27.7 (1.1)	3,233	28.5 (1.0)	2,702	25.4 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	428	27.4 (2.6)	299	18.1 (2.2)	579	21.4 (2.3)	690	20.6 (1.7)	613	19.6 (2.5)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,509	33.3 (1.4)	1,207	24.3 (1.5)	2,833	27.5 (1.1)	3,233	28.4 (1.0)	2,702	25.4 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	30.9 (2.4)	138	26.3 (3.7)	366	30.7 (3.0)	483	31.9 (2.2)	307	30.8 (3.2)
30-39	-	- -	-	- -	812	33.9 (2.3)	230	24.2 (3.3)	597	25.9 (2.0)	595	26.0 (2.0)	526	23.6 (2.0)
40-49	-	- -	-	- -	871	36.2 (2.1)	241	25.8 (3.0)	577	26.1 (1.8)	642	28.8 (1.8)	532	23.0 (2.3)
50-59	-	- -	-	- -	579	38.2 (2.1)	203	21.0 (2.8)	489	32.5 (2.4)	543	32.7 (2.4)	481	26.7 (2.4)
60-69	-	- -	-	- -	445	32.4 (2.7)	213	27.7 (4.2)	439	27.1 (2.7)	539	24.2 (2.1)	472	26.3 (2.9)
70+	-	- -	-	- -	219	22.2 (3.2)	182	15.1 (3.0)	365	18.2 (2.9)	431	21.5 (2.3)	384	17.8 (2.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	33.1 (1.6)	844	25.6 (1.7)	2,076	26.1 (1.2)	2,388	29.1 (1.2)	2,108	23.5 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	714	35.5 (3.1)	363	19.5 (3.0)	757	34.8 (2.4)	845	26.3 (2.3)	594	32.3 (2.6)

1) 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 30분이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 중등도이상 신체활동실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	900	31.1 (1.9)	294	22.3 (3.0)	679	25.5 (2.0)	818	26.0 (1.8)	666	24.2 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	890	32.2 (2.0)	277	24.2 (3.4)	675	27.4 (2.0)	800	28.9 (1.8)	669	26.7 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	830	36.0 (2.2)	300	20.2 (2.8)	707	27.6 (1.9)	771	29.8 (2.0)	676	20.9 (1.8)
상	-	- -	-	- -	844	35.7 (2.1)	287	27.9 (3.4)	689	30.6 (2.4)	805	30.2 (2.0)	662	30.1 (2.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	32.7 (1.6)	844	25.5 (1.7)	2,076	25.8 (1.2)	2,388	28.8 (1.1)	2,108	23.3 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	714	35.9 (3.2)	363	20.2 (3.3)	757	35.0 (2.4)	845	26.4 (2.2)	594	32.6 (2.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	900	30.7 (1.9)	294	22.1 (2.9)	679	25.3 (1.9)	818	26.0 (1.8)	666	24.8 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	890	32.3 (1.9)	277	24.0 (3.4)	675	26.9 (2.0)	800	28.4 (1.8)	669	26.7 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	830	35.9 (2.2)	300	20.3 (2.8)	707	27.4 (1.9)	771	29.9 (1.9)	676	20.6 (1.8)
상	-	- -	-	- -	844	35.3 (2.1)	287	27.9 (3.4)	689	31.0 (2.5)	805	29.9 (2.0)	662	29.9 (2.3)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	25.8 (1.4)	1,715	18.0 (1.3)	3,951	24.1 (1.1)	4,239	24.0 (0.9)	3,546	19.4 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	669	13.0 (2.0)	417	11.2 (2.0)	930	18.1 (2.0)	963	17.5 (1.7)	760	15.2 (1.5)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	26.1 (1.4)	1,715	18.1 (1.2)	3,951	24.2 (1.1)	4,239	24.1 (0.9)	3,546	19.4 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	21.9 (2.4)	196	16.1 (2.7)	524	20.0 (2.4)	563	23.3 (2.2)	464	18.1 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	930	27.0 (1.9)	378	12.6 (1.8)	811	24.8 (1.8)	829	21.6 (1.6)	727	15.8 (1.8)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	33.6 (2.2)	312	25.9 (3.0)	747	26.9 (1.8)	853	27.4 (1.9)	628	23.7 (1.9)
50-59	-	- -	-	- -	650	30.0 (2.5)	296	24.7 (3.3)	643	30.4 (2.0)	704	28.9 (2.0)	691	24.1 (2.5)
60-69	-	- -	-	- -	525	23.8 (2.6)	269	17.5 (2.5)	637	24.3 (2.2)	665	25.5 (2.1)	552	18.9 (2.3)
70+	-	- -	-	- -	428	9.1 (2.0)	264	6.6 (1.8)	589	15.4 (2.3)	625	13.8 (1.7)	484	13.3 (1.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	26.2 (1.6)	1,228	19.0 (1.5)	2,912	23.6 (1.2)	3,166	24.3 (1.1)	2,776	18.2 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	849	23.7 (2.8)	487	13.9 (2.0)	1,039	26.6 (2.9)	1,073	22.7 (2.0)	770	23.7 (2.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	23.0 (1.9)	409	16.8 (2.5)	948	22.6 (1.8)	1,045	21.8 (1.8)	869	15.9 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,097	25.2 (1.8)	406	17.1 (2.3)	958	26.9 (1.8)	1,059	26.8 (1.7)	868	21.8 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,028	28.1 (1.8)	415	17.7 (2.2)	951	22.8 (2.0)	1,046	24.1 (1.7)	887	20.0 (1.6)
상	-	- -	-	- -	1,028	27.4 (2.1)	397	21.7 (2.7)	967	25.8 (1.8)	1,047	23.1 (1.6)	871	21.2 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	26.1 (1.6)	1,228	18.8 (1.4)	2,912	23.6 (1.2)	3,166	24.3 (1.1)	2,776	18.1 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	849	24.9 (2.7)	487	14.9 (2.4)	1,039	26.9 (3.6)	1,073	22.3 (2.1)	770	24.8 (2.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	23.4 (1.9)	409	17.0 (2.5)	948	22.7 (1.8)	1,045	22.2 (1.8)	869	15.9 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,097	25.6 (1.8)	406	17.1 (2.2)	958	26.7 (1.8)	1,059	26.8 (1.7)	868	21.7 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,028	28.4 (1.8)	415	18.0 (2.3)	951	22.9 (2.1)	1,046	24.5 (1.8)	887	19.8 (1.6)
상	-	- -	-	- -	1,028	27.8 (2.1)	397	21.4 (2.6)	967	25.6 (1.9)	1,047	22.9 (1.7)	871	21.2 (2.0)

표 1-III-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,800	68.5 (1.3)	2,875	54.7 (1.4)	6,763	56.9 (0.9)	7,471	56.2 (0.7)	6,242	50.6 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	58.5 (2.3)	711	52.2 (2.6)	1,506	55.8 (1.9)	1,653	54.9 (1.5)	1,370	47.9 (1.9)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,800	68.5 (1.3)	2,875	54.7 (1.4)	6,763	56.9 (0.9)	7,471	56.2 (0.7)	6,242	50.8 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	68.1 (1.8)	326	57.8 (3.1)	887	64.0 (2.0)	1,046	61.6 (1.7)	771	57.8 (2.2)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	67.4 (2.0)	586	50.3 (2.5)	1,401	53.1 (1.5)	1,424	51.7 (1.5)	1,251	48.4 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	1,877	72.0 (1.8)	546	55.0 (2.6)	1,317	50.6 (1.6)	1,494	53.7 (1.4)	1,160	46.8 (2.0)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	73.5 (1.8)	495	56.7 (3.1)	1,131	62.0 (1.8)	1,247	58.1 (1.9)	1,171	50.7 (2.0)
60-69	-	- -	-	- -	969	69.1 (2.2)	479	58.8 (2.8)	1,075	60.2 (2.0)	1,204	60.7 (1.8)	1,023	54.5 (2.1)
70+	-	- -	-	- -	647	52.6 (2.7)	443	49.1 (3.2)	952	53.1 (2.0)	1,056	52.7 (1.8)	866	44.9 (2.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,237	68.3 (1.5)	2,031	56.7 (1.5)	4,969	56.5 (1.1)	5,554	57.0 (0.9)	4,880	50.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	69.5 (2.9)	844	47.5 (2.6)	1,794	59.2 (2.2)	1,917	52.8 (1.6)	1,362	51.8 (2.4)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,996	64.9 (1.8)	692	52.7 (2.4)	1,621	54.6 (1.7)	1,863	56.3 (1.2)	1,533	50.8 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,987	69.7 (1.6)	672	55.1 (2.3)	1,625	58.5 (1.5)	1,859	57.9 (1.4)	1,536	51.2 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	1,858	72.4 (1.7)	702	53.9 (2.2)	1,656	57.1 (1.6)	1,816	55.3 (1.3)	1,563	49.6 (1.4)
상	-	- -	-	- -	1,872	67.7 (2.1)	672	56.9 (2.3)	1,653	58.3 (1.5)	1,852	55.4 (1.6)	1,531	51.4 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,237	68.0 (1.5)	2,031	56.6 (1.5)	4,969	56.4 (1.1)	5,554	57.0 (0.8)	4,880	50.4 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	71.1 (3.0)	844	48.0 (2.8)	1,794	59.1 (2.3)	1,917	52.4 (1.6)	1,362	52.8 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,996	64.9 (1.7)	692	52.6 (2.4)	1,621	54.7 (1.6)	1,863	56.6 (1.2)	1,533	51.2 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,987	69.8 (1.6)	672	55.1 (2.3)	1,625	58.5 (1.5)	1,859	57.9 (1.4)	1,536	51.1 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	1,858	72.3 (1.7)	702	53.8 (2.2)	1,656	57.0 (1.6)	1,816	55.5 (1.2)	1,563	49.9 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,872	67.8 (2.1)	672	57.0 (2.4)	1,653	58.4 (1.5)	1,852	55.0 (1.6)	1,531	51.7 (1.8)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,508	71.4 (1.4)	1,191	57.8 (1.9)	2,826	60.1 (1.1)	3,232	58.6 (1.0)	2,700	53.2 (1.2)
65세이상	-	- -	-	- -	428	65.6 (2.8)	296	56.6 (3.4)	579	66.1 (2.6)	690	61.9 (2.0)	613	53.4 (2.9)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,508	71.1 (1.4)	1,191	57.9 (1.9)	2,826	60.1 (1.1)	3,232	58.8 (0.9)	2,700	53.5 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	74.5 (2.1)	136	64.4 (4.2)	365	70.3 (2.7)	483	67.2 (2.2)	307	63.3 (3.3)
30-39	-	- -	-	- -	812	70.8 (2.2)	224	55.4 (3.8)	594	55.0 (2.2)	595	53.6 (2.3)	525	52.0 (2.4)
40-49	-	- -	-	- -	871	70.0 (2.2)	237	52.6 (3.3)	574	48.2 (2.3)	641	52.6 (2.0)	532	45.2 (2.7)
50-59	-	- -	-	- -	579	73.2 (2.3)	203	58.0 (4.3)	489	64.1 (2.5)	543	57.9 (2.5)	480	51.5 (2.6)
60-69	-	- -	-	- -	444	73.0 (2.5)	211	63.7 (4.5)	439	67.9 (2.6)	539	65.1 (2.4)	472	55.6 (3.1)
70+	-	- -	-	- -	219	58.2 (3.8)	180	54.1 (3.6)	365	63.6 (3.3)	431	61.6 (2.7)	384	54.3 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,794	71.0 (1.6)	830	59.6 (2.2)	2,069	59.3 (1.3)	2,388	59.4 (1.1)	2,107	52.2 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	714	73.1 (2.9)	361	51.5 (3.6)	757	63.4 (2.2)	844	55.3 (1.8)	593	57.2 (2.8)

1) 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율: 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	899	68.7 (1.9)	290	56.9 (3.7)	676	59.8 (2.3)	818	59.0 (1.8)	666	52.1 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	890	73.7 (1.8)	275	56.1 (3.5)	673	60.0 (2.1)	800	59.1 (2.0)	669	53.6 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	830	74.3 (1.9)	294	56.6 (3.5)	706	58.3 (2.3)	770	58.9 (2.1)	676	51.0 (2.2)
상	-	- -	-	- -	844	69.1 (2.4)	283	60.8 (3.3)	688	61.9 (1.9)	805	57.8 (2.0)	660	56.7 (2.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,794	70.6 (1.6)	830	59.6 (2.2)	2,069	59.6 (1.3)	2,388	59.7 (1.1)	2,107	52.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	714	73.6 (3.2)	361	52.0 (3.9)	757	62.2 (2.5)	844	55.4 (1.8)	593	59.0 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	899	68.3 (1.9)	290	56.8 (3.6)	676	59.8 (2.2)	818	59.1 (1.7)	666	53.4 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	890	73.5 (1.8)	275	56.2 (3.5)	673	59.9 (2.0)	800	59.2 (2.0)	669	53.6 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	830	74.1 (1.9)	294	56.4 (3.4)	706	58.6 (2.3)	770	59.2 (2.1)	676	51.4 (2.2)
상	-	- -	-	- -	844	68.9 (2.4)	283	60.9 (3.3)	688	62.5 (1.9)	805	57.6 (2.0)	660	56.6 (2.8)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	65.7 (1.5)	1,684	51.7 (1.5)	3,937	53.9 (1.2)	4,239	53.8 (0.9)	3,542	48.1 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	669	53.8 (2.6)	415	49.2 (2.9)	927	48.7 (2.3)	963	50.1 (2.0)	757	44.1 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	66.1 (1.6)	1,684	51.7 (1.4)	3,937	54.0 (1.3)	4,239	53.9 (0.9)	3,542	48.3 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	61.3 (2.6)	190	50.9 (4.3)	522	57.1 (2.7)	563	55.5 (2.3)	464	52.0 (2.7)
30-39	-	- -	-	- -	930	63.7 (2.5)	362	45.2 (2.8)	807	51.0 (2.2)	829	49.6 (1.9)	726	44.6 (2.4)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	74.0 (1.9)	309	57.4 (3.6)	743	53.1 (2.3)	853	54.8 (1.9)	628	48.4 (2.5)
50-59	-	- -	-	- -	650	73.8 (2.2)	292	55.3 (4.2)	642	59.9 (2.3)	704	58.2 (2.3)	691	49.8 (2.5)
60-69	-	- -	-	- -	525	65.8 (2.9)	268	54.6 (3.0)	636	53.4 (2.7)	665	56.8 (2.3)	551	53.6 (2.5)
70+	-	- -	-	- -	428	49.5 (2.8)	263	46.1 (3.9)	587	46.7 (2.6)	625	47.3 (2.4)	482	39.0 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	65.7 (1.7)	1,201	53.9 (1.7)	2,900	53.6 (1.4)	3,166	54.6 (1.0)	2,773	48.5 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	66.0 (3.4)	483	43.5 (2.4)	1,037	55.0 (2.8)	1,073	50.4 (2.4)	769	46.7 (3.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	61.3 (2.4)	402	48.6 (2.6)	945	49.6 (1.9)	1,045	53.6 (1.6)	867	49.6 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	1,097	65.7 (1.9)	397	54.2 (2.9)	952	57.0 (2.0)	1,059	56.7 (1.8)	867	48.9 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,028	70.5 (2.1)	408	51.2 (2.5)	950	55.8 (2.1)	1,046	51.8 (1.7)	887	48.3 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,028	66.4 (2.3)	389	52.8 (2.9)	965	54.8 (2.0)	1,047	53.0 (2.0)	871	45.8 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	65.7 (1.8)	1,201	53.7 (1.7)	2,900	53.6 (1.4)	3,166	54.7 (1.0)	2,773	48.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	68.4 (3.5)	483	44.1 (2.5)	1,037	56.0 (3.3)	1,073	49.1 (2.5)	769	46.4 (3.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	61.7 (2.3)	402	48.6 (2.5)	945	49.8 (1.9)	1,045	54.0 (1.6)	867	50.0 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	1,097	66.1 (1.9)	397	54.3 (3.0)	952	57.3 (2.0)	1,059	56.6 (1.9)	867	49.0 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	1,028	70.7 (2.1)	408	50.8 (2.5)	950	55.7 (2.1)	1,046	52.1 (1.7)	887	48.4 (2.1)
상	-	- -	-	- -	1,028	66.7 (2.3)	389	53.2 (3.0)	965	54.6 (2.1)	1,047	52.6 (2.1)	871	46.5 (2.0)

표 1-III-3. 격렬한 신체활동실천율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,801	15.2 (0.7)	2,950	13.8 (0.8)	6,792	17.0 (0.6)	7,477	17.7 (0.6)	6,250	15.9 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	7.0 (1.0)	718	7.0 (1.1)	1,511	10.4 (1.2)	1,655	8.9 (1.1)	1,374	8.9 (1.1)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,801	15.2 (0.7)	2,950	13.9 (0.8)	6,792	17.1 (0.6)	7,477	17.9 (0.6)	6,250	16.0 (0.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	14.2 (1.2)	338	15.7 (2.1)	892	18.2 (1.6)	1,048	20.8 (1.4)	771	18.6 (2.1)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	15.7 (1.2)	619	12.2 (1.6)	1,411	17.7 (1.1)	1,425	16.5 (1.2)	1,253	13.9 (1.1)
40-49	-	- -	-	- -	1,877	19.6 (1.3)	558	17.9 (1.6)	1,325	17.8 (1.2)	1,495	19.1 (1.2)	1,161	17.6 (1.1)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	17.8 (1.3)	502	13.1 (2.0)	1,132	19.9 (1.3)	1,247	20.5 (1.4)	1,172	18.5 (1.8)
60-69	-	- -	-	- -	970	11.5 (1.6)	487	12.4 (2.0)	1,078	13.9 (1.4)	1,206	15.5 (1.4)	1,024	14.7 (1.6)
70+	-	- -	-	- -	647	4.2 (1.0)	446	5.1 (1.3)	954	8.1 (1.3)	1,056	7.5 (1.1)	869	6.9 (1.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	15.1 (0.7)	2,091	14.8 (0.9)	4,994	16.2 (0.7)	5,557	18.7 (0.7)	4,885	15.8 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	16.0 (2.2)	859	10.3 (1.3)	1,798	20.6 (1.6)	1,920	13.6 (1.2)	1,365	16.3 (1.4)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,997	14.8 (1.1)	710	11.6 (1.6)	1,628	15.8 (1.1)	1,864	15.6 (1.1)	1,536	13.1 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	1,987	14.4 (1.1)	687	11.9 (1.6)	1,635	17.3 (1.0)	1,859	18.5 (1.1)	1,538	17.8 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	1,858	15.8 (1.1)	722	12.9 (1.6)	1,661	17.8 (1.4)	1,818	18.1 (1.1)	1,563	14.2 (1.1)
상	-	- -	-	- -	1,872	16.2 (1.1)	693	17.9 (1.7)	1,656	17.6 (1.3)	1,855	19.1 (1.3)	1,533	19.2 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	14.7 (0.7)	2,091	14.7 (0.9)	4,994	16.1 (0.7)	5,557	18.6 (0.7)	4,885	15.7 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	17.2 (2.2)	859	10.8 (1.4)	1,798	22.2 (1.9)	1,920	14.6 (1.2)	1,365	17.3 (1.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,997	14.8 (1.1)	710	11.7 (1.6)	1,628	15.9 (1.1)	1,864	15.9 (1.1)	1,536	13.2 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	1,987	14.5 (1.1)	687	11.8 (1.5)	1,635	17.2 (1.0)	1,859	18.5 (1.1)	1,538	18.0 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	1,858	15.7 (1.1)	722	13.1 (1.6)	1,661	17.9 (1.4)	1,818	18.5 (1.1)	1,563	14.0 (1.1)
상	-	- -	-	- -	1,872	16.2 (1.1)	693	18.1 (1.8)	1,656	17.7 (1.4)	1,855	18.8 (1.3)	1,533	19.5 (1.4)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,509	20.0 (1.0)	1,223	16.9 (1.3)	2,836	19.6 (1.0)	3,234	20.5 (0.9)	2,702	19.8 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	428	11.8 (1.8)	300	10.6 (1.8)	581	13.1 (1.8)	690	10.6 (1.3)	613	11.4 (1.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,509	19.7 (0.9)	1,223	16.9 (1.3)	2,836	19.5 (1.0)	3,234	20.4 (0.9)	2,702	19.7 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	18.2 (1.9)	141	20.6 (3.3)	366	22.8 (2.8)	484	24.7 (2.3)	307	24.8 (2.9)
30-39	-	- -	-	- -	812	20.7 (1.8)	237	16.1 (3.0)	597	20.0 (1.7)	595	17.7 (1.8)	526	17.1 (1.8)
40-49	-	- -	-	- -	871	23.9 (1.9)	244	18.9 (2.6)	578	18.2 (1.7)	642	21.3 (1.6)	532	19.3 (2.0)
50-59	-	- -	-	- -	579	22.8 (1.7)	203	13.0 (2.6)	489	22.6 (2.2)	543	23.5 (2.1)	481	22.7 (2.4)
60-69	-	- -	-	- -	445	15.4 (2.1)	216	18.2 (3.5)	441	15.6 (2.0)	539	17.8 (2.0)	472	19.7 (2.5)
70+	-	- -	-	- -	219	7.5 (2.0)	182	7.9 (2.4)	365	10.9 (2.1)	431	9.9 (1.6)	384	8.2 (1.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	19.7 (1.0)	854	18.0 (1.5)	2,079	18.5 (1.1)	2,389	21.7 (1.1)	2,108	19.3 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	714	21.2 (2.5)	369	13.2 (2.2)	757	24.6 (2.1)	845	15.5 (1.8)	594	21.7 (1.9)

1) 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 격렬한 신체활동실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	900	19.8 (1.5)	298	14.8 (2.4)	679	18.7 (1.9)	818	18.2 (1.7)	666	17.3 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	890	19.1 (1.6)	281	14.8 (2.5)	676	19.7 (1.8)	800	20.4 (1.5)	669	22.5 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	830	19.7 (1.6)	302	13.9 (2.4)	707	20.7 (1.8)	771	21.0 (1.7)	676	16.7 (1.8)
상	-	- -	-	- -	844	21.5 (1.6)	293	21.9 (3.0)	689	19.2 (2.0)	806	22.8 (1.9)	662	23.1 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	19.2 (1.0)	854	17.8 (1.5)	2,079	18.1 (1.0)	2,389	21.3 (1.0)	2,108	19.1 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	714	22.2 (2.6)	369	13.6 (2.5)	757	25.7 (2.4)	845	16.4 (1.8)	594	21.7 (2.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	900	19.3 (1.5)	298	14.8 (2.4)	679	18.7 (1.9)	818	18.2 (1.7)	666	17.6 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	890	19.0 (1.5)	281	14.6 (2.5)	676	19.2 (1.8)	800	19.9 (1.5)	669	22.4 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	830	19.4 (1.6)	302	14.2 (2.4)	707	20.6 (1.8)	771	21.3 (1.7)	676	16.3 (1.7)
상	-	- -	-	- -	844	21.3 (1.6)	293	22.0 (3.0)	689	19.5 (2.1)	806	22.3 (1.8)	662	23.1 (2.1)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	10.6 (0.7)	1,727	10.8 (1.0)	3,956	14.5 (0.8)	4,243	15.1 (0.7)	3,548	12.1 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	669	3.8 (0.9)	418	4.5 (1.3)	930	8.6 (1.2)	965	7.7 (1.2)	761	7.3 (1.3)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	10.8 (0.7)	1,727	10.9 (1.0)	3,956	14.7 (0.8)	4,243	15.4 (0.8)	3,548	12.3 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	9.8 (1.2)	197	10.5 (2.3)	526	13.3 (1.7)	564	16.6 (1.9)	464	12.1 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	930	10.3 (1.3)	382	8.2 (1.3)	814	15.4 (1.4)	830	15.2 (1.5)	727	10.6 (1.5)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	15.0 (1.4)	314	16.9 (2.6)	747	17.5 (1.5)	853	16.9 (1.6)	629	15.9 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	650	12.7 (1.6)	299	13.3 (2.5)	643	17.3 (1.6)	704	17.6 (1.7)	691	14.2 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	525	8.1 (1.8)	271	7.3 (2.0)	637	12.4 (1.8)	667	13.5 (1.5)	552	10.1 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	428	2.3 (0.8)	264	3.3 (1.4)	589	6.4 (1.2)	625	6.0 (1.1)	485	6.2 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	10.5 (0.7)	1,237	11.7 (1.2)	2,915	14.0 (0.8)	3,168	15.8 (0.8)	2,777	12.4 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	849	11.1 (2.2)	490	7.3 (1.5)	1,041	16.7 (2.1)	1,075	11.8 (1.3)	771	11.2 (1.5)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	10.0 (1.2)	412	8.5 (2.0)	949	13.0 (1.3)	1,046	13.1 (1.3)	870	9.1 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	1,097	9.8 (1.1)	406	9.3 (1.6)	959	15.0 (1.2)	1,059	16.7 (1.4)	869	13.2 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,028	12.0 (1.2)	420	11.8 (1.9)	954	14.8 (1.7)	1,047	15.3 (1.3)	887	11.9 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,028	10.9 (1.2)	400	13.8 (2.0)	967	16.1 (1.5)	1,049	15.5 (1.5)	871	15.1 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	10.4 (0.7)	1,237	11.6 (1.2)	2,915	14.0 (0.8)	3,168	15.9 (0.9)	2,777	12.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	849	11.8 (2.1)	490	8.1 (1.7)	1,041	17.7 (2.7)	1,075	12.6 (1.4)	771	12.6 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	10.1 (1.2)	412	8.6 (2.0)	949	13.2 (1.3)	1,046	13.7 (1.4)	870	9.2 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	1,097	10.1 (1.1)	406	9.4 (1.6)	959	15.1 (1.2)	1,059	17.0 (1.5)	869	13.5 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,028	12.2 (1.2)	420	12.0 (2.0)	954	15.1 (1.8)	1,047	15.8 (1.4)	887	11.7 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,028	11.0 (1.2)	400	13.9 (2.2)	967	16.0 (1.5)	1,049	15.4 (1.5)	871	15.6 (1.8)

표 1-III-4. 중등도 신체활동실천율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,802	18.7 (1.2)	2,942	9.9 (0.8)	6,788	14.6 (0.7)	7,474	13.5 (0.6)	6,252	10.9 (0.6)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	13.9 (1.8)	719	8.0 (1.1)	1,509	12.1 (1.4)	1,653	12.4 (1.0)	1,373	10.5 (1.1)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,802	18.7 (1.2)	2,942	9.9 (0.8)	6,788	14.5 (0.7)	7,474	13.4 (0.6)	6,252	10.9 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	15.8 (1.7)	334	10.8 (1.7)	890	13.4 (1.4)	1,047	12.2 (1.2)	771	11.9 (1.6)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	19.0 (1.5)	619	7.5 (1.2)	1,409	13.6 (1.2)	1,424	12.4 (0.9)	1,254	9.9 (1.1)
40-49	-	- -	-	- -	1,878	21.3 (1.6)	558	10.3 (1.6)	1,326	14.6 (1.0)	1,495	14.6 (1.1)	1,161	10.4 (1.2)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	21.8 (1.7)	500	12.9 (1.8)	1,133	18.4 (1.4)	1,248	16.5 (1.3)	1,173	12.1 (1.3)
60-69	-	- -	-	- -	970	19.9 (2.1)	483	12.0 (1.8)	1,076	16.7 (1.5)	1,204	13.0 (1.3)	1,025	11.7 (1.2)
70+	-	- -	-	- -	647	11.2 (1.9)	448	5.5 (1.1)	954	10.3 (1.6)	1,056	11.6 (1.1)	868	9.5 (1.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	18.7 (1.3)	2,090	10.2 (1.0)	4,992	14.1 (0.7)	5,556	13.1 (0.6)	4,887	9.1 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	18.7 (2.5)	852	9.0 (1.4)	1,796	17.0 (2.0)	1,918	15.2 (1.4)	1,365	17.4 (1.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,998	15.9 (1.4)	704	10.3 (1.4)	1,627	12.2 (1.1)	1,864	13.2 (1.1)	1,535	11.3 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,987	17.7 (1.4)	691	11.4 (1.6)	1,633	16.0 (1.1)	1,859	14.4 (1.0)	1,540	10.2 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	1,858	22.3 (1.6)	721	8.6 (1.3)	1,661	14.3 (1.2)	1,818	13.5 (1.0)	1,564	10.7 (1.0)
상	-	- -	-	- -	1,872	19.6 (1.6)	689	9.7 (1.3)	1,657	16.3 (1.3)	1,852	13.0 (0.8)	1,533	11.7 (1.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	18.5 (1.3)	2,090	10.1 (0.9)	4,992	14.0 (0.7)	5,556	13.1 (0.6)	4,887	9.1 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	18.9 (2.4)	852	9.4 (1.5)	1,796	16.4 (1.9)	1,918	14.4 (1.4)	1,365	17.7 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,998	15.9 (1.4)	704	10.3 (1.4)	1,627	12.0 (1.1)	1,864	13.2 (1.1)	1,535	11.5 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,987	17.7 (1.4)	691	11.3 (1.7)	1,633	15.7 (1.1)	1,859	14.1 (1.0)	1,540	10.2 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	1,858	22.2 (1.6)	721	8.6 (1.3)	1,661	14.3 (1.2)	1,818	13.3 (1.0)	1,564	10.8 (1.0)
상	-	- -	-	- -	1,872	19.6 (1.6)	689	9.5 (1.3)	1,657	16.4 (1.3)	1,852	12.9 (0.9)	1,533	11.5 (1.1)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,510	19.1 (1.2)	1,218	10.6 (1.1)	2,834	14.6 (0.8)	3,234	13.9 (0.8)	2,704	11.4 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	428	19.4 (2.4)	300	8.9 (1.7)	579	11.6 (1.7)	690	11.8 (1.3)	613	11.0 (1.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,510	19.1 (1.2)	1,218	10.7 (1.1)	2,834	14.4 (0.9)	3,234	13.8 (0.8)	2,704	11.5 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	17.0 (1.9)	138	13.8 (2.9)	366	16.3 (2.3)	484	14.4 (1.8)	307	14.8 (2.8)
30-39	-	- -	-	- -	812	18.4 (1.9)	237	9.6 (2.0)	597	13.1 (1.5)	595	13.8 (1.4)	527	11.9 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	872	19.2 (1.7)	243	7.9 (1.9)	578	12.6 (1.4)	642	14.0 (1.5)	532	8.7 (1.5)
50-59	-	- -	-	- -	579	22.0 (1.9)	204	11.5 (2.2)	489	18.4 (2.0)	543	15.5 (1.8)	481	10.5 (1.7)
60-69	-	- -	-	- -	445	21.7 (2.5)	213	12.2 (3.1)	439	15.5 (2.2)	539	9.9 (1.4)	473	11.3 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	219	17.6 (3.0)	183	9.3 (2.3)	365	9.6 (1.8)	431	14.0 (1.7)	384	11.2 (1.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	18.7 (1.3)	853	10.9 (1.3)	2,077	13.9 (0.9)	2,389	13.5 (0.8)	2,109	9.7 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	715	20.5 (2.7)	365	9.9 (2.1)	757	17.3 (2.1)	845	15.6 (1.9)	595	17.6 (2.1)

1) 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 중등도 신체활동실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	901	16.6 (1.6)	295	10.1 (2.0)	679	11.6 (1.4)	818	13.5 (1.3)	666	13.4 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	890	17.6 (1.7)	282	13.7 (2.7)	675	14.2 (1.4)	800	14.7 (1.4)	670	9.9 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	830	23.5 (2.1)	301	9.3 (1.9)	707	14.7 (1.5)	772	13.8 (1.3)	677	9.7 (1.4)
상	-	- -	-	- -	844	19.2 (1.8)	291	8.7 (1.7)	690	17.4 (1.9)	805	13.6 (1.3)	662	12.7 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	18.8 (1.3)	853	10.9 (1.3)	2,077	13.8 (0.9)	2,389	13.3 (0.8)	2,109	9.7 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	715	20.2 (2.7)	365	10.7 (2.3)	757	16.7 (2.0)	845	15.2 (2.0)	595	18.3 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	901	16.6 (1.6)	295	10.1 (1.9)	679	11.3 (1.3)	818	13.5 (1.3)	666	14.0 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	890	17.8 (1.7)	282	13.8 (2.8)	675	14.1 (1.4)	800	14.5 (1.4)	670	10.0 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	830	23.7 (2.1)	301	9.2 (1.9)	707	14.6 (1.5)	772	13.7 (1.3)	677	9.8 (1.5)
상	-	- -	-	- -	844	19.2 (1.7)	291	8.7 (1.8)	690	17.7 (2.0)	805	13.8 (1.3)	662	12.5 (1.6)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	18.3 (1.3)	1,724	9.3 (1.0)	3,954	14.7 (0.9)	4,240	13.2 (0.7)	3,548	10.5 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	669	10.2 (1.7)	419	7.4 (1.5)	930	12.4 (1.7)	963	12.8 (1.4)	760	10.2 (1.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	18.5 (1.3)	1,724	9.3 (0.9)	3,954	14.6 (0.9)	4,240	13.0 (0.7)	3,548	10.3 (0.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	14.5 (2.1)	196	7.8 (2.2)	524	10.2 (1.6)	563	9.7 (1.4)	464	8.8 (1.6)
30-39	-	- -	-	- -	930	19.6 (1.7)	382	5.3 (1.2)	812	14.2 (1.7)	829	11.0 (1.2)	727	7.8 (1.2)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	23.4 (2.1)	315	12.7 (2.6)	748	16.6 (1.5)	853	15.3 (1.5)	629	12.2 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	650	21.5 (2.3)	296	14.3 (2.3)	644	18.5 (1.7)	705	17.6 (1.5)	692	13.7 (1.8)
60-69	-	- -	-	- -	525	18.3 (2.4)	270	11.7 (2.2)	637	17.7 (1.9)	665	15.8 (1.8)	552	12.0 (1.6)
70+	-	- -	-	- -	428	7.5 (1.8)	265	3.2 (0.9)	589	10.7 (2.1)	625	10.1 (1.5)	484	8.4 (1.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	18.6 (1.5)	1,237	9.6 (1.2)	2,915	14.2 (1.0)	3,167	12.8 (0.8)	2,778	8.6 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	849	17.1 (2.5)	487	8.1 (1.3)	1,039	16.8 (2.3)	1,073	14.8 (1.6)	770	17.2 (2.1)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	15.2 (1.7)	409	10.5 (1.9)	948	12.7 (1.5)	1,046	12.9 (1.4)	869	9.3 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,097	17.7 (1.7)	409	9.3 (2.0)	958	17.6 (1.6)	1,059	14.1 (1.3)	870	10.6 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	1,028	21.0 (1.7)	420	7.9 (1.5)	954	13.9 (1.5)	1,046	13.2 (1.3)	887	11.7 (1.2)
상	-	- -	-	- -	1,028	19.9 (2.0)	398	10.6 (1.7)	967	15.2 (1.5)	1,047	12.4 (1.0)	871	10.8 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	18.5 (1.5)	1,237	9.4 (1.1)	2,915	14.2 (1.0)	3,167	12.8 (0.8)	2,778	8.5 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	849	17.6 (2.4)	487	8.5 (1.5)	1,039	15.8 (2.4)	1,073	13.8 (1.6)	770	17.5 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	15.5 (1.7)	409	10.7 (1.9)	948	12.7 (1.4)	1,046	12.7 (1.4)	869	9.3 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,097	17.9 (1.7)	409	9.2 (1.9)	958	17.4 (1.6)	1,059	13.8 (1.2)	870	10.4 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	1,028	21.3 (1.8)	420	7.9 (1.5)	954	13.9 (1.5)	1,046	13.1 (1.4)	887	11.7 (1.2)
상	-	- -	-	- -	1,028	20.2 (2.0)	398	10.3 (1.7)	967	15.0 (1.6)	1,047	12.1 (1.1)	871	10.3 (1.4)

표 1-III-5. 걷기실천율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,801	60.7 (1.5)	2,906	45.8 (1.3)	6,774	46.9 (0.9)	7,477	46.0 (0.7)	6,247	40.9 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	1,097	54.6 (2.4)	714	46.8 (2.7)	1,508	49.9 (1.9)	1,655	47.1 (1.4)	1,371	39.8 (1.8)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,801	60.7 (1.5)	2,906	45.7 (1.3)	6,774	46.9 (0.9)	7,477	46.1 (0.7)	6,247	41.1 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	61.2 (1.9)	329	50.9 (3.1)	888	55.1 (2.0)	1,048	53.0 (1.7)	771	50.9 (2.3)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	58.1 (2.1)	595	39.6 (2.3)	1,405	41.6 (1.5)	1,425	42.2 (1.5)	1,251	38.3 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	1,878	61.7 (2.0)	554	43.1 (2.5)	1,320	39.1 (1.6)	1,494	41.8 (1.4)	1,162	34.5 (1.8)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	66.0 (2.0)	499	48.6 (2.7)	1,132	50.3 (2.0)	1,248	44.8 (1.6)	1,172	40.1 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	969	63.8 (2.3)	484	50.9 (2.9)	1,077	52.4 (2.0)	1,206	51.3 (1.8)	1,024	44.5 (1.8)
70+	-	- -	-	- -	647	49.6 (2.7)	445	45.5 (3.2)	952	48.2 (2.0)	1,056	45.5 (1.7)	867	37.8 (2.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,237	60.1 (1.7)	2,050	47.3 (1.4)	4,978	46.7 (1.0)	5,558	46.5 (0.8)	4,883	41.0 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	63.3 (3.3)	856	40.4 (2.7)	1,796	48.0 (2.5)	1,919	43.5 (1.6)	1,364	40.4 (2.1)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,997	57.7 (2.0)	697	45.5 (2.4)	1,622	45.3 (1.6)	1,865	47.5 (1.3)	1,534	42.9 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	1,987	61.9 (1.7)	680	45.2 (2.6)	1,626	48.5 (1.6)	1,859	46.7 (1.4)	1,539	40.9 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,858	63.7 (1.9)	711	45.4 (2.2)	1,662	46.5 (1.6)	1,817	44.4 (1.2)	1,564	40.4 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,872	59.8 (2.2)	680	47.2 (2.5)	1,654	47.6 (1.5)	1,855	45.2 (1.5)	1,531	39.3 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,237	59.9 (1.7)	2,050	47.2 (1.3)	4,978	46.7 (1.0)	5,558	46.7 (0.8)	4,883	41.1 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,564	64.2 (3.4)	856	41.0 (2.8)	1,796	46.7 (2.7)	1,919	42.4 (1.7)	1,364	41.4 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,997	57.7 (2.0)	697	45.5 (2.4)	1,622	45.4 (1.5)	1,865	47.8 (1.3)	1,534	43.4 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,987	62.0 (1.7)	680	45.3 (2.6)	1,626	48.6 (1.6)	1,859	46.7 (1.4)	1,539	40.8 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,858	63.7 (1.9)	711	45.2 (2.2)	1,662	46.4 (1.6)	1,817	44.6 (1.2)	1,564	40.6 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,872	59.8 (2.2)	680	47.5 (2.6)	1,654	47.7 (1.5)	1,855	44.9 (1.5)	1,531	39.6 (1.9)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,509	62.5 (1.5)	1,210	47.5 (1.8)	2,830	49.9 (1.3)	3,233	47.8 (1.0)	2,701	42.5 (1.3)
65세이상	-	- -	-	- -	428	60.0 (2.9)	298	50.3 (3.4)	581	60.2 (2.6)	690	54.6 (1.9)	613	44.2 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,509	62.4 (1.5)	1,210	47.5 (1.7)	2,830	50.0 (1.2)	3,233	48.1 (1.0)	2,701	42.8 (1.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	67.0 (2.3)	138	56.0 (4.2)	365	60.4 (3.0)	484	57.9 (2.3)	307	55.8 (3.5)
30-39	-	- -	-	- -	812	60.4 (2.3)	232	40.0 (3.5)	594	43.9 (2.5)	595	43.2 (2.4)	525	40.7 (2.4)
40-49	-	- -	-	- -	872	59.2 (2.5)	240	39.6 (3.2)	576	36.4 (2.2)	641	40.2 (2.1)	532	32.6 (2.5)
50-59	-	- -	-	- -	579	64.4 (2.4)	204	53.2 (4.1)	489	54.1 (2.7)	543	43.8 (2.3)	480	40.2 (2.7)
60-69	-	- -	-	- -	444	67.6 (2.7)	215	54.8 (4.5)	441	59.1 (2.7)	539	56.5 (2.4)	473	43.1 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	219	52.9 (3.9)	181	49.3 (3.8)	365	59.5 (3.3)	431	54.4 (2.7)	384	45.8 (2.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,794	61.8 (1.7)	840	48.8 (1.9)	2,073	49.8 (1.4)	2,389	48.2 (1.2)	2,107	41.9 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	715	65.9 (3.2)	370	42.8 (3.7)	757	50.5 (3.0)	844	46.2 (1.9)	594	44.5 (2.7)

1) 걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 걷기실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	900	60.5 (2.2)	294	47.3 (3.4)	676	50.1 (2.3)	818	50.3 (2.0)	666	42.7 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	890	65.1 (2.0)	281	44.1 (3.4)	674	50.3 (2.0)	800	46.9 (2.1)	669	41.8 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	830	63.8 (2.1)	297	46.6 (3.3)	706	47.7 (2.5)	770	46.5 (2.0)	677	42.8 (2.3)
상	-	- -	-	- -	844	60.6 (2.6)	289	51.6 (3.6)	689	51.2 (2.0)	806	47.1 (2.1)	660	42.5 (2.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,794	61.4 (1.7)	840	48.8 (1.9)	2,073	50.2 (1.4)	2,389	48.6 (1.1)	2,107	42.1 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	715	65.9 (3.4)	370	43.3 (3.8)	757	48.4 (3.3)	844	45.9 (2.1)	594	47.4 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	900	60.3 (2.2)	294	47.5 (3.3)	676	50.1 (2.3)	818	50.6 (2.0)	666	44.0 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	890	64.9 (2.0)	281	44.1 (3.5)	674	50.4 (1.9)	800	47.3 (2.1)	669	42.0 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	830	63.8 (2.1)	297	46.3 (3.2)	706	48.2 (2.4)	770	46.9 (2.0)	677	43.0 (2.3)
상	-	- -	-	- -	844	60.5 (2.5)	289	51.8 (3.7)	689	51.8 (2.0)	806	47.0 (2.0)	660	42.4 (2.8)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,292	58.9 (1.7)	1,696	44.1 (1.5)	3,944	43.9 (1.1)	4,244	44.2 (0.9)	3,546	39.3 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	669	51.0 (2.7)	416	44.4 (3.0)	927	42.8 (2.2)	965	41.9 (1.9)	758	36.6 (2.5)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,292	59.0 (1.7)	1,696	44.1 (1.5)	3,944	44.0 (1.1)	4,244	44.3 (0.9)	3,546	39.6 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	55.0 (2.7)	191	45.6 (4.6)	523	49.4 (2.4)	564	47.6 (2.3)	464	45.7 (2.8)
30-39	-	- -	-	- -	930	55.6 (2.6)	363	39.1 (3.1)	811	39.2 (2.1)	830	41.2 (1.9)	726	35.7 (2.2)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	64.3 (2.2)	314	46.6 (3.6)	744	41.9 (2.3)	853	43.4 (2.0)	630	36.6 (2.6)
50-59	-	- -	-	- -	650	67.7 (2.5)	295	44.0 (3.4)	643	46.5 (2.3)	705	45.8 (2.2)	692	40.1 (2.5)
60-69	-	- -	-	- -	525	60.5 (3.0)	269	47.4 (3.1)	636	46.3 (2.5)	667	46.8 (2.3)	551	45.8 (2.7)
70+	-	- -	-	- -	428	47.7 (2.9)	264	43.2 (3.9)	587	41.4 (2.7)	625	40.1 (2.3)	483	32.7 (2.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	58.4 (1.9)	1,210	45.8 (1.8)	2,905	43.6 (1.2)	3,169	45.0 (1.0)	2,776	40.1 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	60.8 (3.8)	486	38.1 (2.3)	1,039	45.5 (2.8)	1,075	40.9 (2.2)	770	36.6 (2.9)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	55.0 (2.5)	403	43.8 (2.7)	946	40.7 (1.7)	1,047	44.7 (1.7)	868	43.1 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,097	58.8 (2.0)	399	46.2 (3.3)	952	46.7 (2.0)	1,059	46.4 (1.8)	870	39.9 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	1,028	63.5 (2.3)	414	44.2 (2.8)	956	45.3 (1.8)	1,047	42.3 (1.5)	887	38.2 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,028	58.9 (2.5)	391	42.7 (2.8)	965	44.0 (2.0)	1,049	43.4 (1.9)	871	36.0 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	58.4 (1.9)	1,210	45.6 (1.8)	2,905	43.6 (1.2)	3,169	45.1 (1.0)	2,776	40.2 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	849	62.5 (3.9)	486	38.6 (2.4)	1,039	45.4 (3.1)	1,075	38.7 (2.3)	770	35.4 (3.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	55.3 (2.4)	403	43.7 (2.7)	946	40.9 (1.7)	1,047	45.0 (1.7)	868	43.6 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	1,097	59.1 (2.1)	399	46.5 (3.3)	952	47.2 (2.0)	1,059	46.3 (1.9)	870	39.9 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,028	63.6 (2.3)	414	43.9 (2.8)	956	44.9 (1.8)	1,047	42.7 (1.5)	887	38.2 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,028	59.2 (2.5)	391	43.1 (3.0)	965	43.9 (2.0)	1,049	43.1 (2.0)	871	36.5 (1.9)

표 1-III-6. 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	중등도이상[1]						중등도이상(걷기포함)[2]					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,248	22.4(0.8)	2,702	25.4(1.1)	3,546	19.4(0.9)	6,242	50.6(0.8)	2,700	53.2(1.2)	3,542	48.1(1.1)
연령(세)												
19-29	771	24.6(2.1)	307	30.8(3.2)	464	18.1(2.0)	771	57.8(2.2)	307	63.3(3.3)	464	52.0(2.7)
30-39	1,253	19.8(1.4)	526	23.6(2.0)	727	15.8(1.8)	1,251	48.4(1.6)	525	52.0(2.4)	726	44.6(2.4)
40-49	1,160	23.3(1.5)	532	23.0(2.3)	628	23.7(1.9)	1,160	46.8(2.0)	532	45.2(2.7)	628	48.4(2.5)
50-59	1,172	25.4(2.0)	481	26.7(2.4)	691	24.1(2.5)	1,171	50.7(2.0)	480	51.5(2.6)	691	49.8(2.5)
60-69	1,024	22.4(2.1)	472	26.3(2.9)	552	18.9(2.3)	1,023	54.5(2.1)	472	55.6(3.1)	551	53.6(2.5)
70+	868	15.1(1.4)	384	17.8(2.4)	484	13.3(1.8)	866	44.9(2.2)	384	54.3(2.9)	482	39.0(2.9)
19-64	4,875	23.2(0.9)	2,089	26.1(1.1)	2,786	20.2(1.1)	4,872	51.1(0.9)	2,087	53.2(1.3)	2,785	48.8(1.2)
65+	1,373	17.0(1.4)	613	19.6(2.5)	760	15.2(1.5)	1,370	47.9(1.9)	613	53.4(2.9)	757	44.1(2.4)
거주지역												
동	4,884	20.8(0.9)	2,108	23.5(1.2)	2,776	18.2(1.1)	4,880	50.3(0.9)	2,107	52.2(1.4)	2,773	48.5(1.2)
읍면	1,364	27.9(2.3)	594	32.3(2.6)	770	23.7(2.7)	1,362	51.8(2.4)	593	57.2(2.8)	769	46.7(3.3)
소득수준[3]												
하	1,535	20.0(1.4)	666	24.2(2.3)	869	15.9(1.4)	1,533	50.8(1.4)	666	52.1(2.2)	867	49.6(2.1)
중하	1,537	24.2(1.5)	669	26.7(2.2)	868	21.8(1.7)	1,536	51.2(1.6)	669	53.6(2.4)	867	48.9(2.0)
중상	1,563	20.4(1.3)	676	20.9(1.8)	887	20.0(1.6)	1,563	49.6(1.4)	676	51.0(2.2)	887	48.3(2.0)
상	1,533	25.8(1.6)	662	30.1(2.3)	871	21.2(1.9)	1,531	51.4(1.7)	660	56.7(2.7)	871	45.8(2.0)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,884	20.7(0.9)	2,108	23.3(1.1)	2,776	18.1(1.0)	4,880	50.4(0.9)	2,107	52.3(1.3)	2,773	48.6(1.2)
읍면	1,364	28.7(2.1)	594	32.6(2.6)	770	24.8(2.8)	1,362	52.8(2.3)	593	59.0(2.9)	769	46.4(3.7)
소득수준(표준화)												
하	1,535	20.1(1.3)	666	24.8(2.1)	869	15.9(1.4)	1,533	51.2(1.4)	666	53.4(2.2)	867	50.0(2.1)
중하	1,537	24.2(1.5)	669	26.7(2.3)	868	21.7(1.7)	1,536	51.1(1.6)	669	53.6(2.4)	867	49.0(2.1)
중상	1,563	20.2(1.3)	676	20.6(1.8)	887	19.8(1.6)	1,563	49.9(1.5)	676	51.4(2.2)	887	48.4(2.1)
상	1,533	25.9(1.6)	662	29.9(2.3)	871	21.2(2.0)	1,531	51.7(1.8)	660	56.6(2.8)	871	46.5(2.0)

1) 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율: 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-III-7. 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	격렬한[1]						중등도[2]					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,250	15.9(0.7)	2,702	19.8(1.0)	3,548	12.1(0.8)	6,252	10.9(0.6)	2,704	11.4(0.8)	3,548	10.5(0.7)
연령(세)												
19-29	771	18.6(2.1)	307	24.8(2.9)	464	12.1(2.0)	771	11.9(1.6)	307	14.8(2.8)	464	8.8(1.6)
30-39	1,253	13.9(1.1)	526	17.1(1.8)	727	10.6(1.5)	1,254	9.9(1.1)	527	11.9(1.6)	727	7.8(1.2)
40-49	1,161	17.6(1.1)	532	19.3(2.0)	629	15.9(1.7)	1,161	10.4(1.2)	532	8.7(1.5)	629	12.2(1.6)
50-59	1,172	18.5(1.8)	481	22.7(2.4)	691	14.2(2.1)	1,173	12.1(1.3)	481	10.5(1.7)	692	13.7(1.8)
60-69	1,024	14.7(1.6)	472	19.7(2.5)	552	10.1(1.7)	1,025	11.7(1.2)	473	11.3(1.7)	552	12.0(1.6)
70+	869	6.9(1.1)	384	8.2(1.6)	485	6.2(1.4)	868	9.5(1.1)	384	11.2(1.9)	484	8.4(1.3)
19-64	4,876	17.0(0.8)	2,089	20.9(1.1)	2,787	13.0(0.9)	4,879	11.0(0.6)	2,091	11.5(0.8)	2,788	10.5(0.8)
65+	1,374	8.9(1.1)	613	11.4(1.7)	761	7.3(1.3)	1,373	10.5(1.1)	613	11.0(1.7)	760	10.2(1.1)
거주지역												
동	4,885	15.8(0.8)	2,108	19.3(1.2)	2,777	12.4(0.9)	4,887	9.1(0.6)	2,109	9.7(0.8)	2,778	8.6(0.7)
읍면	1,365	16.3(1.4)	594	21.7(1.9)	771	11.2(1.5)	1,365	17.4(1.8)	595	17.6(2.1)	770	17.2(2.1)
소득수준[3]												
하	1,536	13.1(1.2)	666	17.3(2.0)	870	9.1(1.2)	1,535	11.3(1.0)	666	13.4(1.8)	869	9.3(1.0)
중하	1,538	17.8(1.2)	669	22.5(2.1)	869	13.2(1.5)	1,540	10.2(1.1)	670	9.9(1.4)	870	10.6(1.3)
중상	1,563	14.2(1.1)	676	16.7(1.8)	887	11.9(1.5)	1,564	10.7(1.0)	677	9.7(1.4)	887	11.7(1.2)
상	1,533	19.2(1.4)	662	23.1(2.1)	871	15.1(1.7)	1,533	11.7(1.1)	662	12.7(1.6)	871	10.8(1.5)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,885	15.7(0.8)	2,108	19.1(1.2)	2,777	12.3(0.9)	4,887	9.1(0.6)	2,109	9.7(0.8)	2,778	8.5(0.7)
읍면	1,365	17.3(1.4)	594	21.7(2.0)	771	12.6(1.9)	1,365	17.7(1.6)	595	18.3(2.4)	770	17.5(2.2)
소득수준(표준화)												
하	1,536	13.2(1.2)	666	17.6(1.9)	870	9.2(1.2)	1,535	11.5(1.0)	666	14.0(2.0)	869	9.3(1.0)
중하	1,538	18.0(1.2)	669	22.4(2.1)	869	13.5(1.5)	1,540	10.2(1.1)	670	10.0(1.5)	870	10.4(1.3)
중상	1,563	14.0(1.1)	676	16.3(1.7)	887	11.7(1.5)	1,564	10.8(1.0)	677	9.8(1.5)	887	11.7(1.2)
상	1,533	19.5(1.4)	662	23.1(2.1)	871	15.6(1.8)	1,533	11.5(1.1)	662	12.5(1.6)	871	10.3(1.4)

1) 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

2) 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-III-8. 청소년 신체활동실천율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	중등도이상[1]						격렬한[2]						중등도[3]					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)	N	분율(표준화)
12-18세	729	29.2(1.8)	396	37.4(2.3)	333	19.3(2.5)	730	26.6(1.8)	396	35.0(2.4)	334	16.3(2.4)	729	6.6(1.0)	396	8.0(1.6)	333	4.8(1.4)
연령(세)																		
12-14	370	34.1(2.8)	203	45.3(3.9)	167	21.3(3.8)	371	31.6(2.9)	203	42.2(4.3)	168	19.5(3.7)	370	6.6(1.6)	203	8.8(2.8)	167	4.0(1.4)
15-18	359	25.9(2.5)	193	32.1(3.1)	166	17.7(3.6)	359	23.2(2.5)	193	30.3(3.2)	166	14.0(3.6)	359	6.6(1.3)	193	7.5(2.0)	166	5.4(2.1)
거주지역																		
동	609	29.2(2.0)	333	38.1(2.7)	276	17.9(2.7)	610	26.3(2.0)	333	35.5(2.7)	277	14.5(2.4)	609	6.5(1.1)	333	8.1(1.8)	276	4.4(1.4)
읍면	120	29.3(4.0)	63	34.3(4.6)	57	24.1(6.2)	120	27.9(4.1)	63	33.0(4.9)	57	22.5(6.3)	120	6.9(1.6)	63	7.6(3.1)	57	6.2(3.6)
소득수준[4]																		
하	175	27.0(2.9)	95	34.5(4.2)	80	17.2(3.5)	176	24.9(2.6)	95	33.1(4.1)	81	14.2(3.4)	175	4.4(1.7)	95	5.6(2.6)	80	2.8(2.7)
중하	168	31.2(5.4)	90	37.1(6.4)	78	23.9(6.6)	168	29.8(5.4)	90	37.1(6.4)	78	20.7(6.6)	168	6.6(2.3)	90	5.0(2.9)	78	8.5(3.5)
중상	174	29.8(3.3)	94	38.7(4.9)	80	18.1(4.7)	174	24.7(3.8)	94	31.1(5.4)	80	16.1(4.8)	174	9.8(2.6)	94	14.3(4.1)	80	4.0(1.9)
상	195	28.1(4.1)	107	37.8(5.6)	88	18.0(5.4)	195	25.5(3.9)	107	36.2(5.7)	88	14.4(4.6)	195	6.5(2.0)	107	8.4(3.1)	88	4.5(2.4)

1) 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 30분이상, 주5일이상 실천한 분율

2) 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

3) 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-III-9. 걷기실천율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,247	40.9 (0.9)	2,701	42.5 (1.3)	3,546	39.3 (1.1)
연령(세)						
19-29	771	50.9 (2.3)	307	55.8 (3.5)	464	45.7 (2.8)
30-39	1,251	38.3 (1.6)	525	40.7 (2.4)	726	35.7 (2.2)
40-49	1,162	34.5 (1.8)	532	32.6 (2.5)	630	36.6 (2.6)
50-59	1,172	40.1 (1.9)	480	40.2 (2.7)	692	40.1 (2.5)
60-69	1,024	44.5 (1.8)	473	43.1 (2.6)	551	45.8 (2.7)
70+	867	37.8 (2.2)	384	45.8 (2.8)	483	32.7 (2.8)
19-64	4,876	41.1 (1.0)	2,088	42.3 (1.4)	2,788	39.8 (1.2)
65+	1,371	39.8 (1.8)	613	44.2 (2.4)	758	36.6 (2.5)
거주지역						
동	4,883	41.0 (1.0)	2,107	41.9 (1.4)	2,776	40.1 (1.2)
읍면	1,364	40.4 (2.1)	594	44.5 (2.7)	770	36.6 (2.9)
소득수준[2]						
하	1,534	42.9 (1.3)	666	42.7 (2.3)	868	43.1 (2.0)
중하	1,539	40.9 (1.7)	669	41.8 (2.6)	870	39.9 (1.9)
중상	1,564	40.4 (1.5)	677	42.8 (2.3)	887	38.2 (2.0)
상	1,531	39.3 (1.8)	660	42.5 (2.8)	871	36.0 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,883	41.1 (0.9)	2,107	42.1 (1.4)	2,776	40.2 (1.2)
읍면	1,364	41.4 (2.2)	594	47.4 (3.0)	770	35.4 (3.1)
소득수준(표준화)						
하	1,534	43.4 (1.4)	666	44.0 (2.3)	868	43.6 (2.1)
중하	1,539	40.8 (1.7)	669	42.0 (2.6)	870	39.9 (2.0)
중상	1,564	40.6 (1.5)	677	43.0 (2.3)	887	38.2 (2.0)
상	1,531	39.6 (1.9)	660	42.4 (2.8)	871	36.5 (1.9)

1) 걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-III-10. 근력운동실천율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,253	20.7 (0.8)	2,703	30.1 (1.3)	3,550	11.5 (0.6)
연령(세)						
19-29	771	25.0 (2.0)	307	40.7 (3.4)	464	8.6 (1.7)
30-39	1,254	19.1 (1.4)	527	26.3 (2.3)	727	11.4 (1.5)
40-49	1,162	21.5 (1.6)	532	27.5 (2.4)	630	15.2 (1.7)
50-59	1,172	22.5 (1.5)	480	30.2 (2.7)	692	14.8 (1.7)
60-69	1,025	22.2 (1.7)	473	32.3 (2.7)	552	13.0 (1.8)
70+	869	8.3 (1.0)	384	16.4 (2.2)	485	3.2 (0.8)
19-64	4,879	22.1 (0.9)	2,090	31.4 (1.5)	2,789	12.6 (0.8)
65+	1,374	11.9 (1.0)	613	20.6 (2.0)	761	5.8 (0.9)
거주지역						
동	4,887	22.4 (0.9)	2,108	32.6 (1.5)	2,779	12.3 (0.7)
읍면	1,366	14.9 (1.4)	595	21.0 (2.2)	771	8.9 (1.4)
소득수준[2]						
하	1,536	19.4 (1.4)	666	29.3 (2.2)	870	10.0 (1.2)
중하	1,541	20.3 (1.3)	670	29.5 (2.3)	871	11.3 (1.2)
중상	1,564	19.5 (1.3)	677	26.7 (2.2)	887	12.6 (1.3)
상	1,532	24.3 (1.8)	661	35.4 (2.7)	871	12.7 (1.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,887	22.3 (0.8)	2,108	32.4 (1.4)	2,779	12.1 (0.7)
읍면	1,366	17.7 (1.4)	595	23.3 (2.2)	771	11.8 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	1,536	19.7 (1.3)	666	30.0 (2.1)	870	10.1 (1.3)
중하	1,541	20.5 (1.3)	670	29.4 (2.2)	871	11.5 (1.2)
중상	1,564	19.6 (1.3)	677	26.5 (2.1)	887	12.5 (1.3)
상	1,532	24.6 (1.9)	661	35.4 (2.7)	871	12.8 (1.6)

1) 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-III-11. 청소년 근력운동실천율[1] : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
12-18세	730	12.8 (1.5)	396	20.2 (2.6)	334	3.8 (1.2)
연령(세)						
12-14	371	12.6 (2.0)	203	18.1 (3.4)	168	6.4 (2.4)
15-18	359	12.9 (2.3)	193	21.6 (3.8)	166	1.8 (1.3)
거주지역						
동	610	12.6 (1.7)	333	19.4 (2.9)	277	3.9 (1.4)
읍면	120	13.8 (3.4)	63	23.7 (5.8)	57	3.4 (2.6)
소득수준[2]						
하	176	11.9 (3.0)	95	18.5 (4.7)	81	3.5 (2.4)
중하	168	13.5 (3.3)	90	20.9 (5.0)	78	4.4 (3.2)
중상	174	19.6 (3.4)	94	30.0 (4.9)	80	5.9 (3.1)
상	195	5.8 (1.7)	107	9.4 (3.2)	88	2.0 (1.1)

1) 청소년 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 3일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-IV-1. 스트레스인지율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	36.6 (0.6)	8,066	34.6 (0.7)	7,802	35.1 (0.6)	2,978	27.1 (0.9)	6,799	28.9 (0.7)	7,480	31.0 (0.6)	6,256	28.2 (0.8)
65세이상	1,044	31.8 (1.7)	978	30.5 (1.7)	1,097	31.2 (1.5)	720	26.8 (2.1)	1,509	24.9 (1.7)	1,656	25.5 (1.4)	1,373	22.0 (1.6)
19세이상(표준화)[2]	8,991	36.5 (0.6)	8,066	34.6 (0.7)	7,802	35.1 (0.6)	2,978	27.1 (1.0)	6,799	29.1 (0.7)	7,480	31.4 (0.7)	6,256	28.7 (0.8)
연령(세)														
19-29	1,959	32.8 (1.1)	1,625	33.7 (1.4)	1,336	33.0 (1.4)	339	28.0 (2.6)	892	32.6 (1.8)	1,049	34.6 (1.7)	771	32.1 (2.2)
30-39	2,213	38.8 (1.1)	1,998	37.0 (1.2)	1,742	36.4 (1.3)	635	28.0 (2.6)	1,413	33.6 (1.3)	1,425	36.4 (1.3)	1,254	32.9 (1.6)
40-49	1,804	38.6 (1.2)	1,870	36.6 (1.4)	1,878	35.9 (1.1)	564	28.4 (2.1)	1,329	27.4 (1.1)	1,495	30.4 (1.3)	1,162	27.4 (1.5)
50-59	1,338	39.2 (1.5)	1,114	33.3 (1.6)	1,229	36.3 (1.7)	504	22.9 (2.1)	1,134	25.8 (1.6)	1,248	27.3 (1.3)	1,174	25.7 (1.4)
60-69	1,066	34.9 (1.6)	878	32.0 (1.8)	970	38.5 (1.7)	489	27.1 (2.3)	1,079	21.7 (1.5)	1,207	26.9 (1.7)	1,027	22.4 (1.6)
70+	611	31.3 (2.3)	581	29.1 (2.4)	647	28.6 (1.9)	447	26.3 (2.5)	952	26.1 (2.1)	1,056	23.1 (1.5)	868	22.7 (1.8)
거주지역														
동	5,848	36.7 (0.7)	6,415	34.4 (0.8)	6,238	35.4 (0.7)	2,115	27.7 (1.1)	5,001	29.4 (0.8)	5,560	31.7 (0.8)	4,890	28.3 (0.9)
읍면	3,143	35.9 (1.1)	1,651	35.6 (1.4)	1,564	34.1 (1.5)	863	24.9 (1.8)	1,798	26.7 (1.3)	1,920	28.0 (1.1)	1,366	27.9 (1.6)
소득수준[3]														
하	2,141	42.5 (1.4)	1,701	38.3 (1.3)	1,998	39.6 (1.2)	713	29.0 (2.4)	1,629	32.3 (1.6)	1,865	33.7 (1.2)	1,536	31.5 (1.6)
중하	2,309	35.9 (1.2)	1,847	36.2 (1.5)	1,987	34.6 (1.2)	696	29.3 (2.1)	1,635	30.2 (1.4)	1,860	32.2 (1.4)	1,543	26.7 (1.6)
중상	2,224	34.7 (1.4)	1,995	34.4 (1.3)	1,858	34.3 (1.3)	731	26.0 (2.1)	1,665	28.0 (1.3)	1,819	29.8 (1.3)	1,564	25.4 (1.3)
상	2,317	34.2 (1.2)	2,051	29.6 (1.1)	1,872	31.5 (1.2)	700	24.3 (1.8)	1,657	25.1 (1.3)	1,855	28.4 (1.2)	1,533	28.6 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	5,848	36.5 (0.8)	6,415	34.2 (0.8)	6,238	35.3 (0.7)	2,115	27.7 (1.1)	5,001	29.3 (0.8)	5,560	31.8 (0.8)	4,890	28.4 (0.9)
읍면	3,143	35.5 (1.2)	1,651	35.7 (1.4)	1,564	34.4 (1.7)	863	25.0 (2.1)	1,798	28.7 (1.6)	1,920	29.4 (1.2)	1,366	28.9 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	2,141	42.7 (1.4)	1,701	38.0 (1.3)	1,998	39.6 (1.2)	713	28.9 (2.4)	1,629	32.4 (1.5)	1,865	33.9 (1.2)	1,536	31.7 (1.6)
중하	2,309	36.0 (1.2)	1,847	36.1 (1.5)	1,987	34.7 (1.2)	696	29.4 (2.1)	1,635	30.6 (1.4)	1,860	32.8 (1.4)	1,543	27.3 (1.6)
중상	2,224	34.5 (1.3)	1,995	34.2 (1.3)	1,858	34.2 (1.3)	731	26.1 (2.2)	1,665	28.0 (1.3)	1,819	30.1 (1.4)	1,564	25.6 (1.4)
상	2,317	34.1 (1.2)	2,051	29.5 (1.1)	1,872	31.5 (1.2)	700	24.4 (1.9)	1,657	25.5 (1.3)	1,855	29.1 (1.2)	1,533	29.3 (1.7)
남자														
19세이상	4,180	36.7 (0.9)	3,677	34.6 (0.9)	3,510	35.0 (0.9)	1,241	23.7 (1.4)	2,840	26.8 (1.0)	3,236	28.6 (0.8)	2,704	25.1 (1.2)
65세이상	411	25.9 (2.3)	379	25.1 (2.3)	428	22.8 (2.3)	301	16.3 (2.5)	581	16.4 (1.9)	691	18.0 (1.5)	613	11.4 (1.6)
19세이상(표준화)	4,180	36.0 (0.8)	3,677	34.2 (0.9)	3,510	34.7 (0.9)	1,241	23.6 (1.4)	2,840	26.8 (1.0)	3,236	28.7 (0.8)	2,704	25.2 (1.2)
연령(세)														
19-29	886	32.0 (1.6)	715	29.7 (1.9)	583	29.2 (2.2)	141	21.3 (3.4)	366	26.2 (2.4)	485	27.5 (2.2)	307	25.8 (3.6)
30-39	1,091	44.6 (1.7)	944	42.3 (1.8)	812	40.3 (2.0)	247	27.0 (3.5)	598	36.5 (2.2)	595	37.8 (2.1)	527	32.3 (2.4)
40-49	888	38.1 (1.8)	910	40.0 (1.8)	872	40.7 (1.8)	248	28.3 (3.0)	580	27.0 (1.8)	642	31.2 (1.9)	532	28.3 (2.3)
50-59	616	36.7 (2.3)	521	29.5 (2.0)	579	33.1 (2.3)	205	22.0 (3.2)	490	24.3 (2.1)	543	25.4 (1.9)	481	21.8 (2.1)
60-69	476	27.3 (2.2)	381	26.9 (2.6)	445	32.4 (2.5)	217	17.3 (2.9)	441	14.7 (1.9)	540	17.9 (1.7)	473	15.5 (2.2)
70+	223	24.8 (3.1)	206	23.1 (3.2)	219	21.1 (3.0)	183	16.5 (3.3)	365	17.9 (2.5)	431	17.1 (1.8)	384	11.2 (1.9)
거주지역														
동	2,746	37.5 (1.0)	2,932	35.2 (1.0)	2,795	35.4 (1.0)	868	23.9 (1.6)	2,082	27.4 (1.1)	2,391	29.4 (1.0)	2,109	26.2 (1.4)
읍면	1,434	33.8 (1.5)	745	32.2 (2.2)	715	33.3 (2.0)	373	22.9 (2.7)	758	23.7 (1.9)	845	25.5 (1.5)	595	21.0 (2.3)

1) 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 스트레스인지율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	1,005	39.8 (1.8)	763	35.7 (1.7)	901	39.4 (1.8)	300	25.1 (3.3)	680	27.8 (2.3)	818	30.7 (1.9)	666	24.1 (2.3)
중하	1,053	35.9 (1.8)	853	36.1 (2.3)	890	34.1 (1.7)	286	25.5 (2.9)	676	29.3 (2.3)	801	27.9 (1.8)	670	23.4 (2.3)
중상	1,063	36.6 (1.8)	918	37.2 (1.8)	830	33.4 (1.9)	307	25.1 (3.3)	707	25.6 (1.8)	772	26.9 (1.9)	677	24.7 (2.1)
상	1,059	35.0 (1.8)	943	29.2 (1.5)	844	32.6 (1.8)	299	19.8 (2.9)	691	24.8 (2.0)	806	29.2 (1.7)	662	28.1 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	2,746	36.0 (1.0)	2,932	34.3 (1.0)	2,795	34.8 (1.0)	868	23.7 (1.5)	2,082	26.9 (1.1)	2,391	28.9 (1.0)	2,109	25.9 (1.3)
읍면	1,434	34.3 (1.6)	745	33.3 (2.0)	715	34.2 (2.2)	373	23.7 (2.9)	758	26.0 (2.3)	845	26.8 (2.0)	595	22.5 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	1,005	40.0 (1.7)	763	35.6 (1.8)	901	39.0 (1.7)	300	24.8 (3.2)	680	27.7 (2.2)	818	30.7 (1.8)	666	23.7 (2.2)
중하	1,053	35.1 (1.8)	853	36.0 (2.1)	890	34.2 (1.7)	286	25.2 (2.9)	676	29.7 (2.3)	801	27.9 (1.8)	670	23.8 (2.3)
중상	1,063	35.3 (1.7)	918	36.3 (1.8)	830	32.8 (1.8)	307	24.7 (3.2)	707	25.2 (1.9)	772	26.8 (1.9)	677	24.7 (2.1)
상	1,059	34.5 (1.8)	943	28.7 (1.5)	844	31.9 (1.7)	299	19.7 (2.9)	691	24.7 (2.0)	806	29.6 (1.7)	662	28.4 (2.5)
여자														
19세이상	4,811	36.4 (0.9)	4,389	34.6 (0.9)	4,292	35.2 (0.8)	1,737	30.3 (1.3)	3,959	31.0 (0.9)	4,244	33.3 (0.9)	3,552	31.4 (1.1)
65세이상	633	35.4 (2.2)	599	33.9 (2.3)	669	36.8 (1.9)	419	33.9 (3.2)	928	30.7 (2.2)	965	30.6 (1.9)	760	29.4 (2.3)
19세이상(표준화)	4,811	36.6 (0.8)	4,389	34.6 (0.9)	4,292	35.2 (0.8)	1,737	30.4 (1.4)	3,959	31.3 (1.0)	4,244	34.0 (0.9)	3,552	31.7 (1.1)
연령(세)														
19-29	1,073	33.5 (1.6)	910	36.8 (1.7)	753	37.0 (1.9)	198	34.9 (4.1)	526	39.6 (2.4)	564	42.4 (2.4)	464	38.8 (2.9)
30-39	1,122	33.2 (1.6)	1,054	32.6 (1.7)	930	32.2 (1.6)	388	29.0 (2.7)	815	30.5 (1.9)	830	34.9 (1.7)	727	33.4 (2.2)
40-49	916	39.0 (1.8)	960	33.6 (1.9)	1,006	30.8 (1.6)	316	28.4 (2.7)	749	27.9 (1.5)	853	29.6 (1.8)	630	26.3 (2.3)
50-59	722	41.6 (1.9)	593	36.5 (2.3)	650	39.5 (2.2)	299	23.9 (3.1)	644	27.3 (2.1)	705	29.1 (1.9)	693	29.6 (2.0)
60-69	590	41.1 (2.2)	497	35.9 (2.4)	525	43.7 (2.3)	272	35.8 (3.5)	638	28.0 (2.2)	667	35.0 (2.2)	554	28.5 (2.4)
70+	388	34.6 (3.0)	375	32.4 (3.1)	428	32.9 (2.4)	264	32.0 (3.7)	587	31.1 (2.5)	625	26.7 (2.1)	484	29.9 (2.6)
거주지역														
동	3,102	36.1 (1.0)	3,483	33.8 (1.1)	3,443	35.3 (0.9)	1,247	31.2 (1.6)	2,919	31.3 (1.1)	3,169	34.0 (1.0)	2,781	30.5 (1.2)
읍면	1,709	37.6 (1.2)	906	38.3 (1.7)	849	34.8 (2.0)	490	26.9 (2.2)	1,040	29.6 (2.0)	1,075	30.3 (1.7)	771	34.5 (2.2)
소득수준														
하	1,136	44.9 (1.7)	938	40.4 (1.7)	1,097	39.8 (1.6)	413	32.8 (2.9)	949	36.7 (2.0)	1,047	36.7 (1.7)	870	38.6 (2.1)
중하	1,256	35.9 (1.5)	994	36.2 (1.8)	1,097	35.2 (1.6)	410	32.8 (3.0)	959	31.1 (1.6)	1,059	36.3 (1.9)	873	29.9 (2.0)
중상	1,161	32.8 (1.8)	1,077	32.1 (1.6)	1,028	35.1 (1.9)	424	27.0 (2.3)	958	30.4 (1.9)	1,047	32.6 (1.7)	887	26.1 (1.8)
상	1,258	33.6 (1.4)	1,108	30.0 (1.6)	1,028	30.5 (1.5)	401	29.1 (2.6)	966	25.3 (1.7)	1,049	27.7 (1.6)	871	29.0 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	3,102	36.4 (1.1)	3,483	33.8 (1.1)	3,443	35.5 (0.9)	1,247	31.3 (1.6)	2,919	31.3 (1.0)	3,169	34.4 (1.0)	2,781	30.7 (1.2)
읍면	1,709	36.2 (1.4)	906	37.9 (1.8)	849	34.2 (2.3)	490	26.6 (2.7)	1,040	32.6 (3.0)	1,075	32.2 (1.9)	771	35.4 (2.7)
소득수준(표준화)														
하	1,136	45.3 (1.7)	938	39.9 (1.6)	1,097	39.7 (1.6)	413	32.8 (2.9)	949	37.0 (2.0)	1,047	37.5 (1.7)	870	38.5 (2.1)
중하	1,256	36.4 (1.4)	994	36.2 (1.7)	1,097	35.1 (1.6)	410	32.7 (3.0)	959	31.4 (1.7)	1,059	37.3 (2.0)	873	30.2 (2.1)
중상	1,161	32.9 (1.7)	1,077	32.1 (1.6)	1,028	35.2 (1.8)	424	27.6 (2.4)	958	30.3 (1.9)	1,047	32.9 (1.8)	887	26.4 (1.9)
상	1,258	33.9 (1.4)	1,108	30.0 (1.6)	1,028	30.6 (1.5)	401	29.6 (2.8)	966	26.1 (1.7)	1,049	28.5 (1.7)	871	30.0 (2.1)

표 1-IV-2. 우울증상경험률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,801	15.4 (0.6)	2,980	12.7 (0.6)	6,800	14.5 (0.6)	7,480	15.0 (0.5)	6,255	12.8 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	1,096	22.3 (1.5)	721	21.3 (1.8)	1,511	21.9 (1.4)	1,656	21.8 (1.3)	1,373	16.3 (1.2)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,801	15.4 (0.5)	2,980	12.5 (0.7)	6,800	14.3 (0.6)	7,480	14.7 (0.5)	6,255	12.4 (0.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,336	12.4 (1.0)	339	9.7 (1.9)	892	12.4 (1.3)	1,049	13.3 (1.0)	771	11.8 (1.2)
30-39	-	- -	-	- -	1,742	12.5 (0.9)	635	9.3 (1.3)	1,413	10.8 (1.0)	1,425	11.9 (0.9)	1,254	9.1 (0.9)
40-49	-	- -	-	- -	1,878	14.8 (1.0)	565	11.7 (1.2)	1,329	13.4 (1.1)	1,495	13.4 (1.1)	1,162	11.0 (1.1)
50-59	-	- -	-	- -	1,229	18.0 (1.3)	504	13.8 (1.6)	1,133	17.4 (1.2)	1,248	17.8 (1.2)	1,174	16.9 (1.3)
60-69	-	- -	-	- -	970	22.8 (1.5)	489	20.4 (2.1)	1,079	19.2 (1.6)	1,207	17.9 (1.3)	1,026	15.5 (1.3)
70+	-	- -	-	- -	646	21.2 (1.9)	448	20.2 (2.0)	954	21.6 (1.8)	1,056	21.5 (1.5)	868	16.9 (1.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,238	15.3 (0.6)	2,117	12.7 (0.8)	5,001	14.1 (0.7)	5,560	15.1 (0.6)	4,889	12.4 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	15.8 (1.2)	863	12.6 (1.0)	1,799	16.7 (1.3)	1,920	14.4 (0.9)	1,366	14.1 (1.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,998	21.5 (1.2)	713	14.8 (1.3)	1,628	17.7 (1.3)	1,865	19.6 (1.0)	1,536	16.3 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	1,987	15.1 (0.9)	696	13.8 (1.5)	1,635	15.0 (1.0)	1,860	14.6 (0.9)	1,543	11.7 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	1,857	12.6 (0.9)	732	11.6 (1.1)	1,665	13.7 (1.0)	1,819	14.2 (0.9)	1,564	11.5 (0.9)
상	-	- -	-	- -	1,872	11.9 (1.1)	701	8.9 (1.1)	1,658	11.5 (1.0)	1,855	11.4 (0.8)	1,532	11.5 (1.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,238	15.7 (0.6)	2,117	12.7 (0.8)	5,001	14.2 (0.7)	5,560	15.1 (0.6)	4,889	12.3 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	1,563	14.7 (1.2)	863	11.8 (0.9)	1,799	15.2 (1.5)	1,920	12.3 (0.9)	1,366	13.1 (1.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,998	21.5 (1.2)	713	14.9 (1.3)	1,628	17.4 (1.3)	1,865	19.1 (1.0)	1,536	15.8 (1.1)
중하	-	- -	-	- -	1,987	15.0 (0.8)	696	13.6 (1.5)	1,635	14.7 (1.0)	1,860	14.4 (0.9)	1,543	11.4 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	1,857	12.6 (0.9)	732	11.5 (1.2)	1,665	13.6 (1.0)	1,819	14.0 (0.9)	1,564	11.2 (1.0)
상	-	- -	-	- -	1,872	11.9 (1.1)	701	8.7 (1.1)	1,658	11.4 (1.0)	1,855	11.0 (0.8)	1,532	11.4 (1.1)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,510	11.3 (0.7)	1,241	8.1 (0.8)	2,839	10.1 (0.6)	3,236	10.1 (0.6)	2,704	8.1 (0.6)
65세이상	-	- -	-	- -	428	15.2 (1.9)	301	13.0 (2.3)	581	12.0 (1.5)	691	13.0 (1.3)	613	11.8 (1.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,510	11.5 (0.7)	1,241	8.1 (0.8)	2,839	10.1 (0.6)	3,236	10.0 (0.6)	2,704	7.9 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	583	7.8 (1.2)	141	5.0 (1.9)	366	8.4 (1.6)	485	7.9 (1.2)	307	5.8 (1.7)
30-39	-	- -	-	- -	812	10.2 (1.1)	247	6.5 (1.4)	598	8.6 (1.3)	595	9.3 (1.3)	527	5.6 (1.0)
40-49	-	- -	-	- -	872	12.6 (1.2)	248	9.7 (2.1)	580	10.3 (1.4)	642	9.1 (1.1)	532	7.8 (1.4)
50-59	-	- -	-	- -	579	12.9 (1.5)	205	8.5 (2.0)	489	12.5 (1.6)	543	13.3 (1.6)	481	11.7 (1.8)
60-69	-	- -	-	- -	445	15.1 (2.0)	217	12.5 (2.5)	441	11.0 (1.9)	540	11.0 (1.3)	473	10.0 (1.6)
70+	-	- -	-	- -	219	15.8 (2.8)	183	11.6 (2.9)	365	13.7 (2.0)	431	13.1 (1.8)	384	11.8 (2.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,795	11.8 (0.8)	868	7.9 (1.0)	2,081	9.5 (0.7)	2,391	10.4 (0.7)	2,109	7.3 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	715	9.4 (1.1)	373	8.9 (1.4)	758	13.2 (1.6)	845	8.8 (1.0)	595	11.1 (1.7)

1) 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 우울증상경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	901	18.2 (1.4)	300	7.6 (1.7)	679	12.7 (1.4)	818	15.0 (1.3)	666	9.8 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	890	10.7 (1.1)	286	8.8 (1.8)	676	10.9 (1.4)	801	9.7 (1.2)	670	7.1 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	830	7.8 (1.0)	307	8.5 (1.8)	707	9.6 (1.3)	772	8.1 (1.0)	677	7.0 (1.3)
상	-	- -	-	- -	844	8.3 (1.1)	299	5.8 (1.3)	691	7.5 (1.1)	806	7.0 (0.9)	662	8.4 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,795	12.1 (0.8)	868	7.9 (1.0)	2,081	9.5 (0.7)	2,391	10.4 (0.7)	2,109	7.3 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	715	8.7 (1.1)	373	8.3 (1.4)	758	13.4 (2.0)	845	7.3 (1.1)	595	10.6 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	901	18.1 (1.4)	300	7.8 (1.8)	679	12.7 (1.4)	818	14.8 (1.3)	666	9.3 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	890	10.9 (1.1)	286	8.7 (1.8)	676	10.9 (1.4)	801	9.6 (1.2)	670	7.1 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	830	8.1 (1.0)	307	8.7 (1.8)	707	9.6 (1.2)	772	8.0 (1.0)	677	6.9 (1.3)
상	-	- -	-	- -	844	8.4 (1.1)	299	5.7 (1.3)	691	7.5 (1.1)	806	6.9 (0.9)	662	8.3 (1.5)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,291	19.4 (0.7)	1,739	17.1 (0.9)	3,961	18.9 (0.9)	4,244	19.8 (0.7)	3,551	17.4 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	668	27.0 (1.9)	420	26.9 (2.5)	930	28.7 (1.9)	965	27.8 (1.8)	760	19.4 (1.6)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,291	19.2 (0.7)	1,739	16.6 (0.9)	3,961	18.3 (0.9)	4,244	19.2 (0.7)	3,551	16.9 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	753	17.3 (1.6)	198	14.6 (2.9)	526	16.6 (2.0)	564	19.1 (1.7)	464	18.1 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	930	14.9 (1.2)	388	12.3 (2.0)	815	13.1 (1.2)	830	14.6 (1.4)	727	12.8 (1.4)
40-49	-	- -	-	- -	1,006	17.1 (1.2)	317	13.9 (2.0)	749	16.6 (1.6)	853	17.8 (1.6)	630	14.3 (1.5)
50-59	-	- -	-	- -	650	23.2 (1.9)	299	19.1 (2.7)	644	22.4 (1.9)	705	22.4 (1.9)	693	22.0 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	525	29.5 (2.2)	272	27.3 (2.9)	638	26.6 (2.2)	667	24.1 (2.0)	553	20.5 (2.1)
70+	-	- -	-	- -	427	24.3 (2.4)	265	25.3 (3.2)	589	26.4 (2.4)	625	26.6 (2.1)	484	20.1 (1.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,443	18.8 (0.8)	1,249	17.3 (1.1)	2,920	18.6 (1.0)	3,169	19.7 (0.9)	2,780	17.5 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	848	22.0 (1.6)	490	16.3 (1.7)	1,041	20.1 (1.7)	1,075	19.9 (1.3)	771	17.0 (2.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,097	24.6 (1.6)	413	22.0 (1.9)	949	22.6 (1.9)	1,047	24.1 (1.5)	870	22.5 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,097	19.3 (1.3)	410	18.3 (2.2)	959	19.0 (1.6)	1,059	19.4 (1.3)	873	16.3 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,027	17.2 (1.4)	425	14.7 (1.8)	958	17.8 (1.5)	1,047	20.1 (1.4)	887	15.8 (1.4)
상	-	- -	-	- -	1,028	15.4 (1.5)	402	12.2 (1.8)	967	15.4 (1.6)	1,049	15.7 (1.2)	870	14.7 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,443	19.1 (0.8)	1,249	17.0 (1.1)	2,920	18.5 (1.0)	3,169	19.6 (0.8)	2,780	17.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	848	20.8 (1.7)	490	15.8 (1.7)	1,041	16.8 (1.8)	1,075	17.6 (1.3)	771	15.5 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,097	24.4 (1.5)	413	21.8 (1.9)	949	22.1 (1.9)	1,047	23.5 (1.5)	870	21.9 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,097	19.1 (1.3)	410	17.8 (2.1)	959	18.4 (1.5)	1,059	18.9 (1.3)	873	15.7 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,027	17.1 (1.3)	425	14.5 (1.8)	958	17.3 (1.5)	1,047	19.8 (1.4)	887	15.4 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,028	15.3 (1.5)	402	11.4 (1.7)	967	15.2 (1.5)	1,049	15.1 (1.2)	870	14.7 (1.5)

표 1-IV-3. 자살생각률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	24.2 (0.7)	8,065	19.1 (0.6)	7,802	18.5 (0.6)	2,973	15.0 (0.9)	6,796	17.4 (0.6)	7,478	16.4 (0.6)	6,252	15.0 (0.6)
65세이상	1,044	32.8 (1.8)	976	27.7 (1.9)	1,097	30.0 (1.7)	720	30.6 (2.0)	1,508	31.1 (1.7)	1,656	27.6 (1.4)	1,372	25.1 (1.8)
19세이상(표준화)[2]	8,991	24.4 (0.6)	8,065	19.1 (0.6)	7,802	18.5 (0.6)	2,973	14.7 (0.9)	6,796	17.1 (0.6)	7,478	16.1 (0.6)	6,252	14.6 (0.6)
연령(세)														
19-29	1,959	24.0 (1.0)	1,626	18.9 (1.2)	1,336	12.5 (0.9)	339	11.3 (1.9)	892	14.6 (1.3)	1,049	14.8 (1.2)	771	14.7 (1.4)
30-39	2,213	21.2 (1.1)	1,997	16.0 (0.9)	1,742	14.3 (0.9)	635	10.6 (1.5)	1,412	13.1 (1.0)	1,425	13.4 (0.9)	1,254	10.9 (1.1)
40-49	1,804	23.3 (1.1)	1,868	16.5 (1.1)	1,878	18.2 (1.0)	562	11.3 (1.6)	1,329	15.1 (1.2)	1,495	14.1 (1.0)	1,161	11.9 (1.4)
50-59	1,338	25.0 (1.5)	1,117	20.6 (1.4)	1,229	23.3 (1.4)	503	16.6 (2.0)	1,133	17.6 (1.4)	1,248	16.6 (1.4)	1,174	15.2 (1.4)
60-69	1,066	26.2 (1.4)	877	22.8 (1.8)	970	26.3 (1.7)	487	24.5 (2.1)	1,078	23.7 (1.5)	1,205	18.7 (1.4)	1,025	18.6 (1.5)
70+	611	35.3 (2.4)	580	29.5 (2.5)	647	31.1 (2.1)	447	31.6 (2.3)	952	33.5 (2.0)	1,056	30.6 (1.7)	867	27.8 (2.2)
거주지역														
동	5,848	22.8 (0.8)	6,414	18.6 (0.7)	6,238	18.3 (0.6)	2,113	14.7 (1.1)	4,998	16.9 (0.7)	5,558	16.0 (0.7)	4,886	14.0 (0.7)
읍면	3,143	29.2 (1.1)	1,651	21.4 (1.3)	1,564	19.2 (1.6)	860	16.0 (2.1)	1,798	19.8 (1.3)	1,920	18.1 (1.2)	1,366	18.3 (1.3)
소득수준[3]														
하	2,141	34.6 (1.3)	1,701	26.9 (1.4)	1,998	25.8 (1.1)	711	20.0 (1.8)	1,627	23.2 (1.4)	1,864	20.6 (1.2)	1,535	18.7 (1.4)
중하	2,309	23.1 (1.0)	1,845	18.2 (1.0)	1,987	18.9 (1.0)	693	17.5 (2.1)	1,633	16.9 (1.0)	1,860	17.2 (1.0)	1,541	16.5 (1.3)
중상	2,224	21.5 (1.1)	1,997	16.9 (1.0)	1,858	15.0 (1.0)	731	11.2 (1.1)	1,665	16.3 (1.1)	1,818	16.5 (1.1)	1,564	12.8 (1.1)
상	2,317	19.5 (1.0)	2,051	14.3 (0.9)	1,872	13.3 (0.8)	701	9.8 (1.1)	1,657	12.3 (0.9)	1,855	11.1 (0.9)	1,532	11.4 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	5,848	23.2 (0.8)	6,414	18.9 (0.7)	6,238	18.9 (0.6)	2,113	14.7 (1.1)	4,998	17.1 (0.7)	5,558	16.1 (0.7)	4,886	14.1 (0.7)
읍면	3,143	28.2 (1.2)	1,651	19.5 (1.2)	1,564	16.9 (1.3)	860	14.6 (2.0)	1,798	17.0 (1.5)	1,920	15.4 (1.2)	1,366	16.5 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	2,141	34.7 (1.3)	1,701	26.1 (1.2)	1,998	25.9 (1.1)	711	19.9 (1.8)	1,627	23.1 (1.3)	1,864	20.2 (1.2)	1,535	18.4 (1.3)
중하	2,309	23.5 (1.0)	1,845	18.3 (1.0)	1,987	18.8 (1.0)	693	17.4 (2.0)	1,633	16.6 (1.0)	1,860	16.8 (0.9)	1,541	16.2 (1.3)
중상	2,224	21.7 (1.1)	1,997	17.2 (1.0)	1,858	15.1 (1.0)	731	11.1 (1.1)	1,665	16.1 (1.1)	1,818	16.4 (1.1)	1,564	12.4 (1.1)
상	2,317	19.6 (1.0)	2,051	14.5 (0.9)	1,872	13.4 (0.8)	701	9.5 (1.1)	1,657	12.0 (0.9)	1,855	10.8 (0.9)	1,532	11.1 (1.1)
남자														
19세이상	4,180	18.7 (0.8)	3,676	14.4 (0.7)	3,510	13.9 (0.6)	1,236	9.4 (1.1)	2,837	11.8 (0.7)	3,234	10.5 (0.7)	2,704	9.5 (0.7)
65세이상	411	23.6 (2.2)	378	23.0 (2.9)	428	22.7 (2.4)	300	16.1 (2.2)	579	19.2 (2.2)	691	15.8 (1.4)	613	15.3 (1.8)
19세이상(표준화)	4,180	19.0 (0.8)	3,676	14.6 (0.7)	3,510	14.2 (0.7)	1,236	9.4 (1.1)	2,837	11.8 (0.7)	3,234	10.5 (0.7)	2,704	9.4 (0.7)
연령(세)														
19-29	886	16.8 (1.3)	715	13.0 (1.3)	583	7.8 (1.2)	141	7.0 (2.7)	366	8.7 (1.4)	485	8.5 (1.4)	307	9.1 (2.0)
30-39	1,091	17.6 (1.3)	943	12.0 (1.1)	812	11.2 (1.2)	247	7.6 (2.0)	598	8.7 (1.3)	595	9.5 (1.2)	527	6.2 (1.0)
40-49	888	19.2 (1.4)	910	13.8 (1.3)	872	15.4 (1.2)	245	7.5 (1.6)	580	11.3 (1.5)	642	10.1 (1.4)	532	8.3 (1.7)
50-59	616	20.7 (1.9)	522	15.9 (1.7)	579	17.5 (1.7)	204	13.8 (2.8)	489	14.8 (1.9)	543	11.6 (1.6)	481	11.2 (1.6)
60-69	476	18.6 (1.8)	381	16.7 (2.5)	445	21.0 (2.1)	217	13.8 (2.3)	440	14.8 (2.1)	538	10.7 (1.4)	473	11.7 (1.7)
70+	223	26.5 (3.5)	205	24.4 (3.7)	219	23.6 (3.3)	182	14.1 (2.8)	364	22.4 (2.7)	431	19.1 (1.9)	384	17.5 (2.6)
거주지역														
동	2,746	17.3 (0.9)	2,931	14.1 (0.7)	2,795	13.6 (0.7)	865	9.1 (1.2)	2,080	11.2 (0.8)	2,389	10.4 (0.8)	2,109	8.7 (0.8)
읍면	1,434	23.8 (1.4)	745	15.8 (1.8)	715	14.9 (1.7)	371	10.7 (2.4)	757	14.5 (1.5)	845	11.1 (1.2)	595	12.3 (1.5)

1) 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 자살생각률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	1,005	29.2 (1.7)	762	22.5 (1.8)	901	21.7 (1.4)	298	12.0 (2.3)	679	17.1 (1.7)	817	15.1 (1.6)	666	11.7 (1.4)
중하	1,053	18.6 (1.3)	852	12.3 (1.1)	890	14.6 (1.3)	284	13.9 (2.4)	675	10.8 (1.2)	801	9.7 (1.1)	670	10.6 (1.5)
중상	1,063	16.1 (1.2)	919	13.5 (1.3)	830	9.9 (1.2)	307	6.5 (1.4)	707	11.5 (1.4)	771	10.2 (1.3)	677	8.4 (1.1)
상	1,059	12.8 (1.2)	943	9.4 (1.1)	844	8.3 (1.0)	299	4.4 (1.3)	690	8.0 (1.1)	806	6.8 (1.1)	662	7.1 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	2,746	17.6 (0.9)	2,931	14.5 (0.8)	2,795	14.1 (0.7)	865	9.0 (1.2)	2,080	11.5 (0.8)	2,389	10.5 (0.8)	2,109	8.8 (0.8)
읍면	1,434	23.4 (1.4)	745	15.7 (1.8)	715	13.2 (1.4)	371	10.3 (2.6)	757	13.6 (1.8)	845	9.7 (1.2)	595	12.1 (2.0)
소득수준(표준화)														
하	1,005	29.7 (1.7)	762	21.9 (1.7)	901	22.1 (1.4)	298	12.0 (2.3)	679	17.1 (1.7)	817	15.0 (1.5)	666	11.6 (1.3)
중하	1,053	18.9 (1.3)	852	12.8 (1.2)	890	14.8 (1.3)	284	13.8 (2.4)	675	10.9 (1.2)	801	9.6 (1.1)	670	10.6 (1.5)
중상	1,063	16.0 (1.2)	919	14.2 (1.3)	830	10.2 (1.2)	307	6.6 (1.4)	707	11.5 (1.4)	771	10.2 (1.3)	677	8.3 (1.2)
상	1,059	13.1 (1.2)	943	9.6 (1.1)	844	8.5 (1.0)	299	4.4 (1.2)	690	8.0 (1.1)	806	7.0 (1.1)	662	7.1 (1.4)
여자														
19세이상	4,811	29.1 (0.8)	4,389	22.8 (0.8)	4,292	23.0 (0.8)	1,737	20.4 (1.3)	3,959	22.9 (0.9)	4,244	22.2 (0.9)	3,548	20.3 (0.9)
65세이상	633	38.4 (2.2)	598	30.7 (2.1)	669	34.9 (2.1)	420	40.3 (2.9)	929	39.3 (2.0)	965	35.7 (2.0)	759	31.9 (2.4)
19세이상(표준화)	4,811	29.1 (0.8)	4,389	22.7 (0.8)	4,292	22.6 (0.8)	1,737	19.4 (1.2)	3,959	22.2 (0.9)	4,244	21.5 (0.8)	3,548	19.7 (1.0)
연령(세)														
19-29	1,073	30.0 (1.5)	911	23.5 (1.7)	753	17.5 (1.5)	198	15.7 (2.6)	526	21.0 (2.2)	564	21.7 (2.0)	464	20.7 (2.5)
30-39	1,122	24.7 (1.4)	1,054	19.3 (1.2)	930	17.5 (1.4)	388	13.7 (2.2)	814	17.6 (1.5)	830	17.5 (1.5)	727	15.9 (1.7)
40-49	916	27.6 (1.5)	958	19.0 (1.5)	1,006	21.1 (1.5)	317	15.3 (2.6)	749	19.1 (1.7)	853	18.2 (1.4)	629	15.8 (1.9)
50-59	722	29.2 (2.0)	595	24.3 (2.1)	650	29.1 (2.0)	299	19.5 (2.8)	644	20.3 (1.8)	705	21.5 (2.0)	693	19.1 (1.9)
60-69	590	32.5 (2.1)	496	27.5 (2.2)	525	30.8 (2.3)	270	34.0 (3.2)	638	31.7 (2.1)	667	25.8 (2.0)	552	24.9 (2.2)
70+	388	39.8 (3.0)	375	32.3 (2.8)	428	35.4 (2.7)	265	41.9 (3.6)	588	40.2 (2.3)	625	37.6 (2.5)	483	34.3 (2.8)
거주지역														
동	3,102	27.7 (1.0)	3,483	22.1 (0.9)	3,443	22.9 (0.8)	1,248	20.1 (1.4)	2,918	22.5 (1.0)	3,169	21.5 (0.9)	2,777	19.3 (1.1)
읍면	1,709	34.0 (1.3)	906	25.8 (1.5)	849	23.3 (2.1)	489	21.4 (2.7)	1,041	24.9 (1.9)	1,075	25.0 (2.0)	771	24.0 (2.0)
소득수준														
하	1,136	39.4 (1.6)	939	30.3 (1.8)	1,097	29.7 (1.6)	413	27.8 (2.4)	948	29.3 (2.0)	1,047	26.1 (1.6)	869	25.2 (2.0)
중하	1,256	27.1 (1.5)	993	23.2 (1.5)	1,097	23.1 (1.4)	409	20.9 (2.9)	958	22.6 (1.5)	1,059	24.5 (1.5)	871	22.3 (1.9)
중상	1,161	26.7 (1.4)	1,078	19.6 (1.4)	1,028	19.9 (1.5)	424	15.9 (2.1)	958	21.2 (1.7)	1,047	22.7 (1.5)	887	17.0 (1.6)
상	1,258	25.1 (1.4)	1,108	18.3 (1.3)	1,028	18.3 (1.4)	402	15.5 (1.9)	967	16.4 (1.4)	1,049	15.2 (1.4)	870	15.8 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	3,102	28.0 (1.0)	3,483	22.3 (0.9)	3,443	23.2 (0.8)	1,248	19.6 (1.5)	2,918	22.4 (1.0)	3,169	21.4 (0.9)	2,777	19.2 (1.1)
읍면	1,709	32.5 (1.4)	906	22.5 (1.5)	849	20.8 (1.8)	489	18.8 (2.3)	1,041	20.1 (2.1)	1,075	21.2 (2.0)	771	20.8 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	1,136	39.0 (1.6)	939	29.1 (1.6)	1,097	29.6 (1.5)	413	27.4 (2.4)	948	28.8 (2.0)	1,047	25.5 (1.7)	869	24.9 (2.0)
중하	1,256	27.3 (1.5)	993	23.1 (1.5)	1,097	22.5 (1.3)	409	20.4 (2.7)	958	22.3 (1.5)	1,059	23.6 (1.5)	871	21.3 (1.9)
중상	1,161	26.6 (1.4)	1,078	19.6 (1.4)	1,028	19.6 (1.4)	424	15.4 (1.9)	958	20.5 (1.7)	1,047	22.0 (1.5)	887	16.3 (1.6)
상	1,258	25.1 (1.4)	1,108	18.3 (1.3)	1,028	18.1 (1.4)	402	14.4 (1.8)	967	15.8 (1.5)	1,049	14.5 (1.3)	870	15.2 (1.5)

표 1-Ⅳ-4. 자살생각자의 자살시도율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	2,246	4.1 (0.4)	1,496	4.7 (0.7)	1,507	3.4 (0.5)	498	5.3 (1.0)	1,314	6.3 (0.8)	1,348	6.6 (0.8)	943	5.7 (0.9)
65세이상	351	1.4 (0.7)	255	2.3 (0.9)	333	1.2 (0.6)	189	7.6 (2.2)	461	6.8 (1.3)	457	5.5 (1.1)	314	4.8 (1.3)
19세이상(표준화)[2]	2,246	4.2 (0.5)	1,496	5.0 (0.8)	1,507	3.8 (0.6)	498	5.3 (1.1)	1,314	6.4 (0.9)	1,348	6.7 (0.9)	943	5.4 (0.8)
연령(세)														
19-29	478	4.9 (1.0)	294	5.8 (1.9)	178	4.9 (1.9)	41	0.0 (-)[4]	144	7.9 (2.5)	157	6.1 (1.8)	114	2.9 (1.6)
30-39	469	5.8 (1.1)	323	6.3 (1.4)	262	4.8 (1.5)	72	10.8 (3.8)	195	3.4 (1.4)	200	3.5 (1.3)	130	3.0 (1.4)
40-49	433	4.4 (1.0)	307	5.3 (1.5)	330	4.3 (1.1)	72	6.0 (2.7)	207	10.3 (2.1)	222	11.0 (2.4)	133	7.7 (2.6)
50-59	350	3.8 (1.0)	225	3.0 (1.2)	279	1.7 (0.9)	84	2.2 (1.8)	201	3.0 (1.2)	209	8.5 (2.2)	168	11.0 (3.1)
60-69	303	1.5 (0.8)	189	3.7 (1.4)	250	2.7 (1.2)	108	7.8 (2.9)	256	4.7 (1.8)	236	5.3 (1.7)	176	4.2 (1.7)
70+	213	1.1 (0.9)	158	2.3 (1.2)	208	0.9 (0.5)	121	5.2 (1.9)	311	7.7 (1.6)	324	4.5 (1.2)	222	4.5 (1.5)
거주지역														
동	1,331	4.0 (0.5)	1,170	4.4 (0.8)	1,194	3.1 (0.5)	340	3.4 (0.9)	930	5.6 (0.8)	942	7.2 (1.0)	683	6.6 (1.1)
읍면	915	4.5 (0.8)	326	5.8 (1.3)	313	4.6 (1.7)	158	11.5 (2.4)	384	9.3 (2.3)	406	4.6 (1.2)	260	3.1 (1.1)
소득수준[3]														
하	751	5.3 (0.9)	440	5.4 (1.2)	543	3.8 (0.8)	158	7.9 (2.3)	418	7.5 (1.5)	417	10.8 (1.7)	294	9.5 (2.0)
중하	550	4.2 (1.0)	327	5.6 (1.6)	404	3.4 (1.0)	134	4.1 (1.9)	309	5.8 (1.4)	353	6.4 (1.6)	266	5.1 (1.6)
중상	489	4.6 (1.0)	333	5.8 (1.4)	284	1.7 (0.7)	97	0.8 (0.8)	300	7.5 (1.8)	332	3.0 (1.0)	202	2.4 (0.9)
상	456	2.0 (0.7)	284	3.1 (1.0)	257	3.9 (1.6)	80	3.8 (1.8)	227	3.0 (1.3)	232	4.2 (1.6)	171	3.4 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	1,331	3.8 (0.5)	1,170	4.5 (0.8)	1,194	3.2 (0.6)	340	3.5 (1.0)	930	5.5 (0.8)	942	7.2 (1.0)	683	6.4 (1.0)
읍면	915	5.4 (1.0)	326	8.2 (2.2)	313	7.2 (2.9)	158	- -[5]	384	- -	406	- -	260	- -
소득수준(표준화)														
하	751	5.6 (0.9)	440	6.0 (1.5)	543	3.7 (0.8)	158	- -	418	7.4 (1.6)	417	10.4 (1.8)	294	8.3 (1.7)
중하	550	4.2 (0.9)	327	5.9 (1.7)	404	3.9 (1.3)	134	- -	309	5.4 (1.5)	353	6.7 (1.7)	266	5.1 (1.8)
중상	489	4.5 (1.0)	333	6.1 (1.5)	284	2.1 (0.9)	97	- -	300	7.6 (1.9)	332	2.8 (1.0)	202	2.1 (0.9)
상	456	2.0 (0.7)	284	3.1 (1.1)	257	4.3 (1.8)	80	- -	227	2.8 (1.3)	232	4.7 (2.0)	171	4.1 (1.9)
남자														
19세이상	809	4.8 (0.8)	515	7.0 (1.4)	511	5.7 (1.2)	138	3.5 (1.7)	367	7.9 (1.7)	371	6.6 (1.3)	272	8.3 (2.1)
65세이상	105	2.1 (1.2)	75	2.9 (1.7)	103	2.3 (1.4)	49	7.3 (3.2)	116	6.2 (2.6)	115	11.4 (3.7)	94	14.7 (4.4)
19세이상(표준화)	809	4.7 (0.8)	515	7.6 (1.5)	511	5.6 (1.3)	138	- -	367	8.2 (2.0)	371	6.2 (1.3)	272	7.4 (1.9)
연령(세)														
19-29	149	4.5 (1.8)	98	12.1 (4.1)	43	4.2 (3.0)	10	- -[6]	34	10.2 (5.7)	39	4.4 (3.1)	28	4.6 (4.6)
30-39	196	4.4 (1.4)	112	8.4 (2.7)	91	6.8 (3.1)	19	- -	52	6.0 (3.4)	58	4.3 (2.5)	36	6.1 (3.6)
40-49	173	6.7 (2.0)	125	8.5 (2.5)	129	8.2 (2.5)	21	11.8 (8.1)	66	12.4 (3.8)	65	7.4 (3.4)	38	6.4 (4.8)
50-59	132	5.4 (1.9)	80	3.2 (2.2)	97	3.9 (2.1)	30	0.0 (-)	68	5.1 (2.5)	60	5.8 (2.6)	48	11.6 (5.8)
60-69	98	3.5 (2.1)	57	2.8 (2.0)	94	5.5 (3.0)	30	4.6 (3.5)	61	5.5 (3.3)	65	8.9 (4.7)	56	8.9 (3.6)
70+	61	1.0 (1.0)	43	3.3 (2.4)	57	1.9 (1.3)	28	7.6 (4.0)	86	6.5 (2.9)	84	11.2 (3.8)	66	13.6 (5.3)
거주지역														
동	471	4.1 (1.0)	405	6.6 (1.6)	394	4.8 (1.2)	90	1.9 (1.2)	257	7.1 (1.6)	258	6.8 (1.5)	194	9.5 (2.6)
읍면	338	6.8 (1.3)	110	8.9 (3.2)	117	9.0 (3.5)	48	8.1 (5.7)	110	10.6 (4.8)	113	5.6 (2.1)	78	5.4 (2.4)

1) 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 자살생각자의 자살시도율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	302	6.9 (1.6)	161	7.9 (2.4)	208	6.3 (1.8)	42	5.6 (4.8)	127	6.0 (2.5)	137	9.4 (2.4)	94	13.9 (4.5)
중하	191	4.8 (1.6)	104	7.9 (2.8)	139	7.4 (2.5)	45	0.5 (0.6)	85	8.0 (3.0)	87	8.2 (3.3)	71	8.6 (3.6)
중상	179	4.5 (1.5)	124	8.5 (2.7)	83	1.0 (1.0)	24	0.0 (-)	84	12.6 (4.4)	82	0.7 (0.7)	60	5.0 (2.6)
상	137	1.3 (1.0)	84	4.8 (2.3)	73	4.4 (2.7)	19	- -	59	3.4 (2.3)	61	4.5 (2.6)	46	1.9 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	471	4.0 (1.0)	405	6.8 (1.7)	394	4.4 (1.1)	90	- -	257	6.8 (1.7)	258	6.9 (1.6)	194	8.6 (2.4)
읍면	338	7.0 (1.4)	110	- -	117	- -	48	- -	110	- -	113	- -	78	- -
소득수준(표준화)														
하	302	6.4 (1.4)	161	- -	208	- -	42	- -	127	- -	137	- -	94	- -
중하	191	- -	104	- -	139	- -	45	- -	85	- -	87	- -	71	- -
중상	179	- -	124	- -	83	- -	24	- -	84	- -	82	- -	60	- -
상	137	- -	84	- -	73	- -	19	- -	59	- -	61	- -	46	- -
여자														
19세이상	1,437	3.8 (0.5)	981	3.5 (0.7)	996	2.0 (0.5)	360	6.1 (1.4)	947	5.5 (0.9)	977	6.6 (1.0)	671	4.4 (0.9)
65세이상	246	1.2 (0.9)	180	2.0 (1.0)	230	0.7 (0.5)	140	7.7 (2.7)	345	7.0 (1.6)	342	3.7 (1.0)	220	1.5 (0.8)
19세이상(표준화)	1,437	3.9 (0.5)	981	3.6 (0.8)	996	2.5 (0.6)	360	6.5 (1.6)	947	5.3 (0.9)	977	7.1 (1.1)	671	4.7 (1.0)
연령(세)														
19-29	329	5.1 (1.2)	196	3.2 (1.6)	135	5.2 (2.3)	31	0.0 (-)	110	6.9 (2.7)	118	6.8 (2.2)	86	2.1 (1.1)
30-39	273	6.7 (1.6)	211	5.1 (1.7)	171	3.4 (1.4)	53	17.0 (6.3)	143	2.0 (1.0)	142	3.0 (1.5)	94	1.8 (1.3)
40-49	260	2.8 (1.0)	182	3.3 (1.5)	201	1.3 (0.8)	51	3.1 (1.9)	141	9.0 (2.7)	157	13.0 (3.2)	95	8.5 (3.5)
50-59	218	2.7 (1.1)	145	2.9 (1.5)	182	0.3 (0.3)	54	3.8 (3.0)	133	1.5 (1.1)	149	9.9 (3.0)	120	10.7 (3.9)
60-69	205	0.5 (0.5)	132	4.1 (1.9)	156	0.9 (0.7)	78	9.0 (4.0)	195	4.3 (1.5)	171	4.0 (1.5)	120	2.3 (1.8)
70+	152	1.2 (1.2)	115	1.9 (1.4)	151	0.5 (0.5)	93	4.7 (2.2)	225	8.1 (2.0)	240	2.5 (0.9)	156	1.6 (1.0)
거주지역														
동	860	4.0 (0.7)	765	3.3 (0.9)	800	2.0 (0.6)	250	4.1 (1.3)	673	4.8 (0.9)	684	7.3 (1.2)	489	5.3 (1.1)
읍면	577	3.1 (0.8)	216	4.2 (1.3)	196	1.9 (0.9)	110	13.2 (3.3)	274	8.6 (2.6)	293	4.2 (1.6)	182	1.9 (1.2)
소득수준														
하	449	4.2 (1.1)	279	3.9 (1.1)	335	2.0 (0.7)	116	8.8 (3.0)	291	8.3 (2.0)	280	11.7 (2.4)	200	7.5 (2.0)
중하	359	3.9 (1.1)	223	4.6 (2.1)	265	0.8 (0.6)	89	6.3 (3.1)	224	4.7 (1.5)	266	5.7 (1.7)	195	3.4 (1.8)
중상	310	4.7 (1.4)	209	4.2 (1.4)	201	2.0 (1.0)	73	1.1 (1.1)	216	4.6 (1.3)	250	4.1 (1.4)	142	1.2 (0.7)
상	319	2.3 (0.9)	200	2.4 (1.1)	184	3.6 (1.9)	61	3.3 (2.0)	168	2.8 (1.6)	171	4.1 (2.0)	125	4.2 (2.7)
거주지역(표준화)														
동	860	3.8 (0.6)	765	3.4 (0.9)	800	2.3 (0.7)	250	4.5 (1.5)	673	4.6 (0.9)	684	7.6 (1.2)	489	5.5 (1.2)
읍면	577	4.3 (1.1)	216	- -	196	- -	110	- -	274	- -	293	- -	182	- -
소득수준(표준화)														
하	449	4.6 (1.1)	279	4.0 (1.2)	335	2.5 (0.9)	116	- -	291	8.1 (2.1)	280	11.6 (2.3)	200	7.3 (1.9)
중하	359	4.0 (1.1)	223	4.7 (2.1)	265	1.1 (0.8)	89	- -	224	4.3 (1.4)	266	5.4 (1.6)	195	- -
중상	310	4.6 (1.3)	209	4.6 (1.6)	201	2.4 (1.3)	73	- -	216	4.3 (1.3)	250	3.7 (1.4)	142	- -
상	319	2.3 (0.9)	200	- -	184	3.9 (2.1)	61	- -	168	2.6 (1.7)	171	- -	125	- -

표 1-IV-5. 하루수면시간 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	6,253	6.9 (0.0)	0.9 (0.1)	12.7 (0.5)	55.4 (0.8)	31.0 (0.8)
연령(세)						
19-29	771	7.2 (0.1)	0.7 (0.4)	6.5 (1.0)	54.6 (2.3)	38.2 (2.2)
30-39	1,253	6.9 (0.0)	0.1 (0.1)	8.7 (1.0)	61.1 (1.6)	30.2 (1.4)
40-49	1,162	6.9 (0.0)	0.2 (0.2)	9.4 (1.0)	61.8 (1.6)	28.6 (1.5)
50-59	1,174	6.7 (0.1)	1.1 (0.4)	15.5 (1.3)	54.3 (1.8)	29.1 (1.7)
60-69	1,027	6.6 (0.1)	1.3 (0.4)	23.5 (1.9)	46.4 (2.1)	28.8 (1.8)
70+	866	6.5 (0.1)	3.9 (0.7)	26.4 (1.7)	40.7 (2.0)	29.0 (2.0)
19-64	4,882	6.9 (0.0)	0.5 (0.1)	10.6 (0.5)	57.6 (0.9)	31.3 (0.9)
65+	1,371	6.5 (0.1)	3.1 (0.5)	26.6 (1.5)	41.7 (1.7)	28.6 (1.8)
거주지역						
동	4,889	6.8 (0.0)	0.9 (0.2)	12.7 (0.6)	56.9 (0.9)	29.5 (0.9)
읍면	1,364	7.0 (0.1)	1.0 (0.3)	12.8 (1.3)	49.9 (2.0)	36.4 (1.9)
소득수준[1)]						
하	1,535	6.9 (0.0)	0.8 (0.2)	15.4 (1.1)	51.3 (1.5)	32.5 (1.7)
중하	1,542	6.9 (0.0)	0.8 (0.3)	11.1 (1.0)	55.0 (1.5)	33.2 (1.4)
중상	1,562	6.8 (0.0)	0.9 (0.3)	11.5 (1.0)	58.1 (1.5)	29.4 (1.5)
상	1,534	6.8 (0.0)	1.1 (0.4)	12.8 (0.9)	57.6 (1.7)	28.5 (1.6)
거주지역(표준화)[2)]						
동	4,889	6.8 (0.0)	0.9 (0.2)	12.6 (0.5)	57.0 (0.9)	29.5 (0.9)
읍면	1,364	7.1 (0.1)	0.5 (0.1)	9.8 (1.2)	52.1 (2.2)	37.5 (2.3)
소득수준(표준화)						
하	1,535	6.9 (0.0)	0.7 (0.2)	14.9 (1.1)	51.5 (1.5)	32.9 (1.7)
중하	1,542	7.0 (0.0)	0.7 (0.2)	10.5 (0.9)	55.5 (1.6)	33.3 (1.5)
중상	1,562	6.9 (0.0)	0.8 (0.3)	10.7 (0.9)	59.0 (1.5)	29.5 (1.5)
상	1,534	6.8 (0.1)	1.0 (0.4)	12.1 (1.0)	58.0 (1.8)	28.9 (1.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-6. 하루수면시간 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,703	6.9 (0.0)	0.6 (0.2)	11.0 (0.8)	59.0 (1.2)	29.5 (1.2)
연령(세)						
19-29	307	7.0 (0.1)	1.3 (0.8)	6.5 (1.7)	61.7 (3.0)	30.5 (2.9)
30-39	526	6.8 (0.1)	0.0 (-)[3]	9.9 (1.7)	66.4 (2.3)	23.7 (2.1)
40-49	532	6.9 (0.1)	0.2 (0.2)	8.4 (1.3)	62.9 (2.4)	28.4 (2.3)
50-59	481	6.9 (0.1)	0.2 (0.1)	12.4 (1.7)	56.4 (2.8)	31.0 (2.7)
60-69	473	6.8 (0.1)	0.0 (-)	18.6 (2.4)	47.6 (3.0)	33.9 (2.5)
70+	384	6.8 (0.1)	3.1 (1.1)	20.8 (2.1)	37.9 (2.9)	38.1 (3.4)
19-64	2,090	6.9 (0.0)	0.4 (0.2)	9.5 (0.8)	61.3 (1.3)	28.8 (1.3)
65+	613	6.8 (0.1)	1.9 (0.7)	22.3 (1.9)	40.6 (2.4)	35.1 (2.7)
거주지역						
동	2,108	6.8 (0.0)	0.6 (0.2)	11.4 (0.9)	61.0 (1.2)	27.0 (1.2)
읍면	595	7.1 (0.1)	0.5 (0.2)	9.2 (1.4)	51.8 (2.5)	38.5 (2.8)
소득수준[1]						
하	666	7.0 (0.1)	0.2 (0.1)	11.4 (1.4)	55.6 (2.1)	32.9 (2.4)
중하	669	6.9 (0.1)	0.6 (0.3)	9.0 (1.4)	59.4 (2.1)	31.0 (2.1)
중상	677	6.8 (0.1)	0.9 (0.5)	10.3 (1.3)	62.7 (2.3)	26.2 (2.1)
상	662	6.7 (0.1)	0.7 (0.6)	13.0 (1.5)	58.6 (2.8)	27.8 (2.4)
거주지역(표준화)[2]						
동	2,108	6.8 (0.0)	0.6 (0.2)	11.6 (0.9)	60.6 (1.2)	27.2 (1.2)
읍면	595	7.1 (0.1)	0.3 (0.2)	8.2 (1.7)	54.3 (2.9)	37.2 (3.4)
소득수준(표준화)						
하	666	7.0 (0.1)	0.2 (0.1)	11.0 (1.3)	55.8 (2.1)	33.0 (2.5)
중하	669	6.9 (0.1)	0.6 (0.3)	9.2 (1.4)	59.4 (2.1)	30.8 (2.1)
중상	677	6.8 (0.1)	0.9 (0.5)	10.0 (1.3)	63.6 (2.3)	25.5 (2.1)
상	662	6.7 (0.1)	0.7 (0.6)	12.7 (1.5)	58.8 (2.8)	27.8 (2.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-IV-7. 하루수면시간 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	3,550	6.9 (0.0)	1.2 (0.2)	14.5 (0.6)	51.9 (1.1)	32.4 (1.1)
연령(세)						
19-29	464	7.4 (0.1)	0.0 (-)[3]	6.6 (1.3)	47.1 (3.1)	46.3 (3.2)
30-39	727	7.1 (0.1)	0.2 (0.2)	7.4 (1.1)	55.4 (2.1)	37.0 (2.1)
40-49	630	6.9 (0.1)	0.3 (0.2)	10.4 (1.5)	60.7 (2.0)	28.7 (1.8)
50-59	693	6.6 (0.1)	2.1 (0.7)	18.6 (1.8)	52.3 (2.2)	27.1 (2.0)
60-69	554	6.4 (0.1)	2.5 (0.8)	28.0 (2.4)	45.3 (2.6)	24.2 (2.3)
70+	482	6.3 (0.1)	4.4 (1.0)	29.9 (2.5)	42.5 (2.7)	23.3 (2.1)
19-64	2,792	7.0 (0.0)	0.7 (0.2)	11.6 (0.7)	53.7 (1.3)	34.0 (1.2)
65+	758	6.3 (0.1)	3.8 (0.8)	29.6 (2.0)	42.5 (2.2)	24.1 (1.9)
거주지역						
동	2,781	6.9 (0.0)	1.1 (0.2)	14.0 (0.7)	53.0 (1.3)	31.9 (1.3)
읍면	769	6.9 (0.1)	1.4 (0.4)	16.3 (1.7)	48.0 (2.4)	34.3 (2.1)
소득수준[1]						
하	869	6.8 (0.1)	1.4 (0.4)	19.2 (1.6)	47.2 (2.0)	32.1 (1.9)
중하	873	7.0 (0.1)	1.0 (0.4)	13.1 (1.3)	50.7 (2.1)	35.2 (2.0)
중상	885	6.9 (0.1)	1.0 (0.3)	12.8 (1.5)	53.7 (2.0)	32.5 (1.9)
상	872	6.8 (0.1)	1.5 (0.5)	12.6 (1.4)	56.6 (2.2)	29.4 (2.2)
거주지역(표준화)[2]						
동	2,781	6.9 (0.0)	1.1 (0.2)	13.6 (0.7)	53.1 (1.3)	32.3 (1.3)
읍면	769	7.1 (0.1)	0.7 (0.2)	11.0 (1.4)	49.9 (3.3)	38.4 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	869	6.9 (0.1)	1.3 (0.4)	18.2 (1.6)	47.7 (2.0)	32.8 (1.9)
중하	873	7.0 (0.1)	0.8 (0.3)	11.7 (1.2)	51.3 (2.1)	36.3 (2.1)
중상	885	6.9 (0.1)	0.8 (0.2)	11.2 (1.3)	54.1 (2.1)	34.0 (2.0)
상	872	6.9 (0.1)	1.1 (0.4)	11.5 (1.4)	56.7 (2.2)	30.6 (2.3)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-IV-8. 청소년 하루수면시간 : 전체, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체						
12-18세	712	7.3 (0.1)	0.3 (0.3)	9.0 (1.4)	46.6 (2.5)	44.2 (2.6)
연령(세)						
12-14	359	7.7 (0.1)	0.7 (0.7)	2.4 (0.9)	37.9 (3.0)	59.0 (3.1)
15-18	353	7.0 (0.1)	0.0 (-)[2]	13.5 (2.2)	52.6 (3.3)	34.0 (3.7)
거주지역						
동	598	7.3 (0.1)	0.0 (-)	9.8 (1.6)	47.1 (3.0)	43.1 (3.3)
읍면	114	7.3 (0.1)	1.4 (1.4)	5.7 (2.7)	44.6 (3.4)	48.3 (3.6)
소득수준[1]						
하	168	7.4 (0.1)	0.0 (-)	11.2 (2.7)	40.5 (4.4)	48.4 (4.2)
중하	166	7.2 (0.1)	1.1 (1.1)	7.9 (2.1)	45.2 (4.8)	45.8 (4.9)
중상	168	7.2 (0.1)	0.0 (-)	6.7 (2.4)	53.8 (4.6)	39.5 (4.8)
상	193	7.2 (0.1)	0.0 (-)	8.0 (2.1)	50.7 (4.6)	41.2 (4.2)
남자						
12-18세	384	7.3 (0.1)	0.0 (-)	8.0 (1.8)	48.3 (3.3)	43.7 (3.5)
연령(세)						
12-14	196	7.7 (0.1)	0.0 (-)	2.8 (1.4)	36.0 (4.2)	61.2 (4.5)
15-18	188	7.0 (0.1)	0.0 (-)	11.5 (3.0)	56.4 (4.2)	32.1 (4.5)
거주지역						
동	327	7.2 (0.1)	0.0 (-)	9.6 (2.2)	47.9 (3.5)	42.5 (3.7)
읍면	57	7.6 (0.2)	0.0 (-)	1.3 (0.9)	50.2 (8.6)	48.5 (8.7)
소득수준						
하	91	7.4 (0.2)	0.0 (-)	10.4 (3.9)	44.5 (5.5)	45.1 (5.6)
중하	88	7.3 (0.2)	0.0 (-)	5.2 (2.4)	51.5 (6.6)	43.3 (6.8)
중상	90	7.1 (0.2)	0.0 (-)	5.8 (3.3)	50.6 (7.4)	43.6 (7.4)
상	105	7.3 (0.1)	0.0 (-)	8.1 (2.9)	49.9 (5.9)	42.0 (5.7)
여자						
12-18세	328	7.3 (0.1)	0.6 (0.6)	10.1 (2.0)	44.5 (3.5)	44.8 (3.8)
연령(세)						
12-14	163	7.7 (0.1)	1.5 (1.5)	1.9 (1.0)	40.2 (4.5)	56.4 (4.4)
15-18	165	7.0 (0.2)	0.0 (-)	16.0 (3.1)	47.6 (4.7)	36.3 (5.3)
거주지역						
동	271	7.3 (0.1)	0.0 (-)	10.0 (2.1)	46.2 (4.5)	43.8 (4.6)
읍면	57	7.1 (0.2)	2.8 (2.9)	10.4 (4.8)	38.7 (5.2)	48.1 (7.4)
소득수준						
하	77	7.5 (0.2)	0.0 (-)	12.2 (3.8)	35.2 (7.0)	52.6 (7.6)
중하	78	7.1 (0.2)	2.4 (2.4)	11.2 (3.5)	37.5 (5.9)	48.9 (6.1)
중상	78	7.4 (0.3)	0.0 (-)	8.0 (3.2)	58.1 (7.3)	34.0 (7.2)
상	88	7.1 (0.2)	0.0 (-)	7.9 (3.0)	51.6 (6.1)	40.4 (5.6)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-IV-9. 스트레스인지율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,256	28.2 (0.8)	2,704	25.1 (1.2)	3,552	31.4 (1.1)
연령(세)						
19-29	771	32.1 (2.2)	307	25.8 (3.6)	464	38.8 (2.9)
30-39	1,254	32.9 (1.6)	527	32.3 (2.4)	727	33.4 (2.2)
40-49	1,162	27.4 (1.5)	532	28.3 (2.3)	630	26.3 (2.3)
50-59	1,174	25.7 (1.4)	481	21.8 (2.1)	693	29.6 (2.0)
60-69	1,027	22.4 (1.6)	473	15.5 (2.2)	554	28.5 (2.4)
70+	868	22.7 (1.8)	384	11.2 (1.9)	484	29.9 (2.6)
19-64	4,883	29.2 (0.9)	2,091	26.8 (1.4)	2,792	31.7 (1.2)
65+	1,373	22.0 (1.6)	613	11.4 (1.6)	760	29.4 (2.3)
거주지역						
동	4,890	28.3 (0.9)	2,109	26.2 (1.4)	2,781	30.5 (1.2)
읍면	1,366	27.9 (1.6)	595	21.0 (2.3)	771	34.5 (2.2)
소득수준[2]						
하	1,536	31.5 (1.6)	666	24.1 (2.3)	870	38.6 (2.1)
중하	1,543	26.7 (1.6)	670	23.4 (2.3)	873	29.9 (2.0)
중상	1,564	25.4 (1.3)	677	24.7 (2.1)	887	26.1 (1.8)
상	1,533	28.6 (1.6)	662	28.1 (2.5)	871	29.0 (2.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,890	28.4 (0.9)	2,109	25.9 (1.3)	2,781	30.7 (1.2)
읍면	1,366	28.9 (2.1)	595	22.5 (3.0)	771	35.4 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	1,536	31.7 (1.6)	666	23.7 (2.2)	870	38.5 (2.1)
중하	1,543	27.3 (1.6)	670	23.8 (2.3)	873	30.2 (2.1)
중상	1,564	25.6 (1.4)	677	24.7 (2.1)	887	26.4 (1.9)
상	1,533	29.3 (1.7)	662	28.4 (2.5)	871	30.0 (2.1)

1) 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-10. 청소년 스트레스인지율[1] : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
12-18세	730	24.5 (2.1)	396	18.7 (2.4)	334	31.5 (3.1)
연령(세)						
12-14	371	20.9 (2.8)	203	15.4 (3.2)	168	27.2 (4.3)
15-18	359	27.0 (2.7)	193	21.0 (3.2)	166	34.7 (4.3)
거주지역						
동	610	25.4 (2.4)	333	20.5 (2.7)	277	31.8 (3.7)
읍면	120	20.7 (4.7)	63	11.4 (6.0)	57	30.5 (5.5)
소득수준[2]						
하	176	25.8 (3.9)	95	13.3 (3.8)	81	41.9 (6.1)
중하	168	20.4 (5.1)	90	15.2 (5.5)	78	26.7 (5.7)
중상	174	26.7 (3.9)	94	27.5 (5.2)	80	25.7 (6.1)
상	195	25.0 (4.3)	107	22.0 (5.1)	88	28.1 (7.0)

1) 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-IV-11. 스트레스인지정도 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	대단히많이느낀다	많이느끼는편이다	조금느끼는편이다	거의느끼지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	6,256	4.0 (0.3)	24.3 (0.7)	58.8 (0.8)	13.0 (0.6)
연령(세)					
19-29	771	3.2 (0.6)	28.9 (2.2)	58.7 (2.4)	9.2 (1.4)
30-39	1,254	4.5 (0.7)	28.3 (1.6)	61.0 (1.7)	6.2 (0.8)
40-49	1,162	4.0 (0.7)	23.3 (1.5)	63.1 (1.7)	9.5 (1.0)
50-59	1,174	4.1 (0.6)	21.7 (1.4)	60.8 (1.8)	13.4 (1.2)
60-69	1,027	4.1 (0.8)	18.2 (1.4)	56.4 (1.8)	21.2 (1.5)
70+	868	4.0 (0.8)	18.6 (1.7)	41.9 (2.0)	35.5 (1.9)
19-64	4,883	4.0 (0.3)	25.2 (0.8)	61.0 (0.8)	9.8 (0.5)
65+	1,373	3.6 (0.6)	18.4 (1.5)	44.8 (1.8)	33.2 (1.6)
거주지역					
동	4,890	3.9 (0.3)	24.5 (0.9)	59.5 (0.9)	12.2 (0.6)
읍면	1,366	4.4 (0.6)	23.5 (1.4)	56.3 (1.9)	15.8 (1.2)
소득수준[1)]					
하	1,536	5.0 (0.6)	26.5 (1.5)	55.1 (1.5)	13.3 (1.2)
중하	1,543	2.8 (0.5)	23.8 (1.4)	60.6 (1.7)	12.7 (1.0)
중상	1,564	3.3 (0.5)	22.1 (1.3)	61.9 (1.5)	12.7 (1.0)
상	1,533	4.7 (0.7)	23.8 (1.4)	58.0 (1.6)	13.4 (1.1)
거주지역(표준화)[2)]					
동	4,890	3.9 (0.3)	24.5 (0.8)	59.3 (0.9)	12.3 (0.6)
읍면	1,366	4.1 (0.6)	24.8 (1.9)	59.3 (2.3)	11.8 (1.0)
소득수준(표준화)					
하	1,536	4.9 (0.6)	26.7 (1.6)	55.4 (1.5)	13.0 (1.2)
중하	1,543	2.8 (0.5)	24.4 (1.5)	60.4 (1.7)	12.3 (1.0)
중상	1,564	3.3 (0.5)	22.3 (1.3)	62.7 (1.5)	11.7 (0.8)
상	1,533	4.8 (0.8)	24.5 (1.5)	58.1 (1.7)	12.5 (1.0)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-12. 스트레스인지정도 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	대단히많이느낀다	많이느끼는편이다	조금느끼는편이다	거의느끼지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,704	3.3 (0.4)	21.8 (1.1)	62.0 (1.2)	13.0 (0.9)
연령(세)					
19-29	307	2.1 (0.7)	23.7 (3.4)	63.2 (3.4)	11.0 (2.3)
30-39	527	3.8 (0.9)	28.5 (2.2)	62.3 (2.5)	5.4 (1.1)
40-49	532	4.1 (1.0)	24.3 (2.3)	63.1 (2.3)	8.6 (1.5)
50-59	481	3.7 (0.9)	18.1 (1.9)	64.3 (2.7)	13.8 (1.9)
60-69	473	3.0 (1.1)	12.5 (1.8)	60.1 (2.7)	24.4 (2.3)
70+	384	1.9 (1.0)	9.2 (1.6)	50.3 (3.4)	38.6 (3.2)
19-64	2,091	3.5 (0.4)	23.3 (1.3)	63.2 (1.3)	10.0 (0.9)
65+	613	1.5 (0.6)	9.9 (1.5)	52.3 (2.8)	36.3 (2.5)
거주지역					
동	2,109	3.1 (0.4)	23.1 (1.3)	61.5 (1.2)	12.3 (1.0)
읍면	595	4.2 (1.0)	16.8 (2.0)	63.5 (2.7)	15.5 (1.8)
소득수준[1)]					
하	666	4.1 (0.9)	20.0 (2.1)	60.9 (2.4)	15.0 (1.8)
중하	670	2.2 (0.6)	21.1 (2.1)	63.9 (2.3)	12.7 (1.4)
중상	677	2.8 (0.7)	21.8 (2.0)	63.3 (2.4)	12.0 (1.4)
상	662	4.1 (0.9)	23.9 (2.2)	59.7 (2.4)	12.2 (1.5)
거주지역(표준화)[2)]					
동	2,109	3.0 (0.4)	22.9 (1.3)	61.2 (1.2)	12.9 (1.0)
읍면	595	4.0 (1.0)	18.5 (2.8)	65.6 (3.1)	12.0 (1.3)
소득수준(표준화)					
하	666	3.7 (0.8)	20.0 (2.1)	60.8 (2.4)	15.4 (1.8)
중하	670	2.3 (0.6)	21.5 (2.2)	63.2 (2.4)	13.0 (1.3)
중상	677	2.7 (0.7)	22.0 (2.1)	63.8 (2.3)	11.4 (1.2)
상	662	4.1 (1.0)	24.3 (2.2)	59.7 (2.5)	11.9 (1.5)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-13. 스트레스인지정도 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	대단히많이느낀다	많이느끼는편이다	조금느끼는편이다	거의느끼지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	3,552	4.7 (0.4)	26.7 (1.1)	55.7 (1.1)	13.0 (0.7)
연령(세)					
19-29	464	4.4 (0.9)	34.4 (3.0)	54.0 (3.1)	7.2 (1.3)
30-39	727	5.3 (1.1)	28.1 (2.0)	59.6 (2.2)	7.0 (1.2)
40-49	630	4.0 (0.9)	22.4 (2.0)	63.1 (2.4)	10.5 (1.3)
50-59	693	4.4 (0.8)	25.2 (1.9)	57.4 (2.2)	13.1 (1.4)
60-69	554	5.1 (1.0)	23.4 (2.1)	53.2 (2.4)	18.3 (2.0)
70+	484	5.4 (1.2)	24.6 (2.4)	36.5 (2.4)	33.5 (2.8)
19-64	2,792	4.6 (0.4)	27.1 (1.2)	58.7 (1.2)	9.6 (0.7)
65+	760	5.0 (0.9)	24.4 (2.1)	39.6 (2.1)	31.0 (2.2)
거주지역					
동	2,781	4.7 (0.4)	25.8 (1.2)	57.4 (1.2)	12.1 (0.8)
읍면	771	4.6 (0.7)	29.9 (2.0)	49.4 (2.2)	16.0 (1.6)
소득수준[1)]					
하	870	5.9 (0.8)	32.7 (2.0)	49.7 (1.9)	11.7 (1.2)
중하	873	3.4 (0.7)	26.5 (1.8)	57.3 (2.2)	12.8 (1.5)
중상	887	3.8 (0.7)	22.3 (1.7)	60.6 (2.0)	13.3 (1.4)
상	871	5.4 (1.0)	23.7 (1.9)	56.2 (2.2)	14.8 (1.6)
거주지역(표준화)[2)]					
동	2,781	4.7 (0.4)	26.0 (1.2)	57.5 (1.2)	11.8 (0.8)
읍면	771	4.1 (0.8)	31.3 (2.6)	52.8 (2.6)	11.8 (1.5)
소득수준(표준화)					
하	870	6.0 (0.9)	32.6 (2.1)	50.5 (1.9)	11.0 (1.2)
중하	873	3.2 (0.7)	26.9 (1.9)	57.9 (2.2)	11.9 (1.4)
중상	887	3.8 (0.7)	22.6 (1.8)	61.6 (2.0)	11.9 (1.2)
상	871	5.5 (1.0)	24.5 (2.0)	57.0 (2.2)	13.0 (1.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-14. 청소년 스트레스인지정도 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	대단히많이느낀다	많이느끼는편이다	조금느끼는편이다	거의느끼지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체					
12-18세	730	4.1 (1.0)	20.3 (2.0)	59.8 (2.2)	15.7 (1.8)
연령(세)					
12-14	371	4.5 (1.4)	16.4 (2.3)	64.2 (3.3)	14.9 (2.1)
15-18	359	3.9 (1.4)	23.0 (2.8)	56.7 (2.8)	16.3 (2.7)
거주지역					
동	610	2.8 (0.8)	22.6 (2.2)	58.1 (2.4)	16.4 (1.8)
읍면	120	9.1 (2.9)	11.6 (4.2)	66.3 (4.9)	13.0 (4.7)
소득수준[1)]					
하	176	6.7 (2.5)	19.0 (4.4)	59.2 (4.1)	15.1 (2.9)
중하	168	2.8 (1.5)	17.5 (4.1)	57.5 (5.3)	22.1 (5.4)
중상	174	4.7 (2.1)	22.1 (3.6)	59.1 (4.8)	14.2 (3.1)
상	195	0.9 (0.7)	24.0 (4.3)	63.9 (4.9)	11.1 (2.4)
남자					
12-18세	396	1.9 (0.8)	16.8 (2.2)	63.2 (2.9)	18.0 (2.6)
연령(세)					
12-14	203	3.0 (1.9)	12.4 (2.7)	70.9 (4.4)	13.7 (2.8)
15-18	193	1.3 (0.7)	19.7 (3.1)	58.2 (3.8)	20.9 (3.8)
거주지역					
동	333	1.2 (0.6)	19.3 (2.5)	61.7 (3.0)	17.8 (2.7)
읍면	63	5.2 (3.1)	6.2 (3.4)	69.8 (8.3)	18.8 (6.7)
소득수준					
하	95	2.2 (1.3)	11.1 (3.8)	69.2 (5.0)	17.5 (4.2)
중하	90	3.0 (2.3)	12.2 (3.9)	55.9 (7.6)	28.9 (7.6)
중상	94	0.5 (0.5)	27.0 (5.1)	57.5 (7.4)	15.0 (4.4)
상	107	0.0 (-)[2)]	22.0 (5.1)	68.9 (5.1)	9.1 (3.1)
여자					
12-18세	334	6.8 (2.0)	24.7 (3.0)	55.6 (3.2)	12.9 (2.2)
연령(세)					
12-14	168	6.2 (2.2)	21.0 (3.8)	56.6 (4.6)	16.3 (2.9)
15-18	166	7.3 (3.0)	27.4 (4.3)	54.9 (4.2)	10.4 (2.6)
거주지역					
동	277	5.0 (1.7)	26.8 (3.4)	53.6 (3.8)	14.6 (2.2)
읍면	57	13.3 (5.5)	17.3 (5.5)	62.5 (4.8)	6.9 (4.1)
소득수준					
하	81	12.6 (5.2)	29.3 (7.3)	46.2 (5.7)	11.9 (3.6)
중하	78	2.6 (2.0)	24.0 (5.6)	59.6 (4.7)	13.7 (4.3)
중상	80	10.2 (4.7)	15.5 (4.4)	61.2 (6.7)	13.1 (5.0)
상	88	1.9 (1.5)	26.2 (7.0)	58.8 (8.1)	13.1 (3.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-IV-15. 우울증상경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,255	12.8 (0.5)	2,704	8.1 (0.6)	3,551	17.4 (0.8)
연령(세)						
19-29	771	11.8 (1.2)	307	5.8 (1.7)	464	18.1 (2.0)
30-39	1,254	9.1 (0.9)	527	5.6 (1.0)	727	12.8 (1.4)
40-49	1,162	11.0 (1.1)	532	7.8 (1.4)	630	14.3 (1.5)
50-59	1,174	16.9 (1.3)	481	11.7 (1.8)	693	22.0 (2.1)
60-69	1,026	15.5 (1.3)	473	10.0 (1.6)	553	20.5 (2.1)
70+	868	16.9 (1.5)	384	11.8 (2.1)	484	20.1 (1.9)
19-64	4,882	12.2 (0.6)	2,091	7.6 (0.7)	2,791	17.0 (0.9)
65+	1,373	16.3 (1.2)	613	11.8 (1.7)	760	19.4 (1.6)
거주지역						
동	4,889	12.4 (0.5)	2,109	7.3 (0.6)	2,780	17.5 (0.9)
읍면	1,366	14.1 (1.3)	595	11.1 (1.7)	771	17.0 (2.0)
소득수준[2]						
하	1,536	16.3 (1.2)	666	9.8 (1.5)	870	22.5 (1.7)
중하	1,543	11.7 (1.0)	670	7.1 (1.2)	873	16.3 (1.5)
중상	1,564	11.5 (0.9)	677	7.0 (1.3)	887	15.8 (1.4)
상	1,532	11.5 (1.1)	662	8.4 (1.5)	870	14.7 (1.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,889	12.3 (0.5)	2,109	7.3 (0.6)	2,780	17.3 (0.9)
읍면	1,366	13.1 (1.4)	595	10.6 (1.8)	771	15.5 (2.2)
소득수준(표준화)						
하	1,536	15.8 (1.1)	666	9.3 (1.3)	870	21.9 (1.7)
중하	1,543	11.4 (1.0)	670	7.1 (1.2)	873	15.7 (1.5)
중상	1,564	11.2 (1.0)	677	6.9 (1.3)	887	15.4 (1.5)
상	1,532	11.4 (1.1)	662	8.3 (1.5)	870	14.7 (1.5)

1) 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-IV-16. 청소년 우울증상경험률[1] : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
12-18세	730	10.4 (1.4)	396	8.7 (1.9)	334	12.4 (2.3)
연령(세)						
12-14	371	7.2 (2.2)	203	4.9 (2.2)	168	9.9 (3.0)
15-18	359	12.6 (2.0)	193	11.3 (3.0)	166	14.3 (3.3)
거주지역						
동	610	10.5 (1.5)	333	8.7 (1.8)	277	12.8 (2.7)
읍면	120	10.1 (3.1)	63	9.1 (6.5)	57	11.1 (4.3)
소득수준[2]						
하	176	13.3 (2.6)	95	9.3 (4.1)	81	18.3 (3.8)
중하	168	11.9 (2.7)	90	11.4 (3.7)	78	12.5 (4.9)
중상	174	11.8 (4.1)	94	8.8 (3.9)	80	15.7 (5.9)
상	195	3.0 (1.1)	107	3.2 (1.5)	88	2.9 (1.4)

1) 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-IV-17. 자살생각률[1], 자살생각자의 자살시도율[2] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	자살생각률						자살생각자의 자살시도율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,252	15.0 (0.6)	2,704	9.5 (0.7)	3,548	20.3 (0.9)	943	5.7 (0.9)	272	8.3 (2.1)	671	4.4 (0.9)
연령(세)												
19-29	771	14.7 (1.4)	307	9.1 (2.0)	464	20.7 (2.5)	114	2.9 (1.6)	28	4.6 (4.6)	86	2.1 (1.1)
30-39	1,254	10.9 (1.1)	527	6.2 (1.0)	727	15.9 (1.7)	130	3.0 (1.4)	36	6.1 (3.6)	94	1.8 (1.3)
40-49	1,161	11.9 (1.4)	532	8.3 (1.7)	629	15.8 (1.9)	133	7.7 (2.6)	38	6.4 (4.8)	95	8.5 (3.5)
50-59	1,174	15.2 (1.4)	481	11.2 (1.6)	693	19.1 (1.9)	168	11.0 (3.1)	48	11.6 (5.8)	120	10.7 (3.9)
60-69	1,025	18.6 (1.5)	473	11.7 (1.7)	552	24.9 (2.2)	176	4.2 (1.7)	56	8.9 (3.6)	120	2.3 (1.8)
70+	867	27.8 (2.2)	384	17.5 (2.6)	483	34.3 (2.8)	222	4.5 (1.5)	66	13.6 (5.3)	156	1.6 (1.0)
19-64	4,880	13.4 (0.6)	2,091	8.7 (0.7)	2,789	18.1 (1.0)	629	5.9 (1.0)	178	6.9 (2.3)	451	5.4 (1.2)
65+	1,372	25.1 (1.8)	613	15.3 (1.8)	759	31.9 (2.4)	314	4.8 (1.3)	94	14.7 (4.4)	220	1.5 (0.8)
거주지역												
동	4,886	14.0 (0.7)	2,109	8.7 (0.8)	2,777	19.3 (1.1)	683	6.6 (1.1)	194	9.5 (2.6)	489	5.3 (1.1)
읍면	1,366	18.3 (1.3)	595	12.3 (1.5)	771	24.0 (2.0)	260	3.1 (1.1)	78	5.4 (2.4)	182	1.9 (1.2)
소득수준[3]												
하	1,535	18.7 (1.4)	666	11.7 (1.4)	869	25.2 (2.0)	294	9.5 (2.0)	94	13.9 (4.5)	200	7.5 (2.0)
중하	1,541	16.5 (1.3)	670	10.6 (1.5)	871	22.3 (1.9)	266	5.1 (1.6)	71	8.6 (3.6)	195	3.4 (1.8)
중상	1,564	12.8 (1.1)	677	8.4 (1.1)	887	17.0 (1.6)	202	2.4 (0.9)	60	5.0 (2.6)	142	1.2 (0.7)
상	1,532	11.4 (1.0)	662	7.1 (1.4)	870	15.8 (1.5)	171	3.4 (1.8)	46	1.9 (1.4)	125	4.2 (2.7)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,886	14.1 (0.7)	2,109	8.8 (0.8)	2,777	19.2 (1.1)	683	6.4 (1.0)	194	8.6 (2.4)	489	5.5 (1.2)
읍면	1,366	16.5 (1.6)	595	12.1 (2.0)	771	20.8 (2.4)	260	- -[5]	78	- -	182	- -
소득수준(표준화)												
하	1,535	18.4 (1.3)	666	11.6 (1.3)	869	24.9 (2.0)	294	8.3 (1.7)	94	- -	200	7.3 (1.9)
중하	1,541	16.2 (1.3)	670	10.6 (1.5)	871	21.3 (1.9)	266	5.1 (1.8)	71	- -	195	- -
중상	1,564	12.4 (1.1)	677	8.3 (1.2)	887	16.3 (1.6)	202	2.1 (0.9)	60	- -	142	- -
상	1,532	11.1 (1.1)	662	7.1 (1.4)	870	15.2 (1.5)	171	4.1 (1.9)	46	- -	125	- -

1) 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-IV-18. 청소년 자살생각률[1], 자살생각자의 자살시도율[2] : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	자살생각률						자살생각자의 자살시도율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
12-18세	729	12.5 (1.5)	396	6.8 (1.4)	333	19.5 (2.7)	92	7.9 (4.6)	31	6.4 (6.1)	61	8.5 (4.6)
연령(세)												
12-14	370	12.8 (2.2)	203	7.0 (1.9)	167	19.4 (4.0)	46	11.8 (9.1)	18	- -[5]	28	10.3 (7.5)
15-18	359	12.3 (1.9)	193	6.6 (2.0)	166	19.5 (3.2)	46	4.9 (4.5)	13	- -	33	7.2 (6.3)
거주지역												
동	609	12.4 (1.6)	333	7.1 (1.5)	276	19.3 (3.1)	81	6.4 (5.0)	29	7.6 (7.2)	52	5.9 (4.2)
읍면	120	12.7 (3.9)	63	5.6 (3.7)	57	20.1 (5.2)	11	- -	2	- -	9	- -
소득수준[3]												
하	176	14.6 (3.1)	95	7.1 (2.8)	81	24.3 (5.2)	26	19.1 (10.0)	8	- -	18	- -
중하	167	7.4 (2.6)	90	3.7 (2.4)	77	12.0 (3.9)	15	- -	4	- -	11	- -
중상	174	13.3 (4.1)	94	5.0 (3.4)	80	24.4 (6.8)	19	- -	4	- -	15	- -
상	195	16.1 (3.4)	107	12.7 (3.6)	88	19.6 (6.1)	31	0.0 (-)[4]	14	- -	17	- -

1) 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 1-IV-19. 정신문제상담경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	정신문제상담경험률						우울증상경험자의 정신문제상담경험률[2]					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,255	2.2 (0.2)	2,704	1.3 (0.2)	3,551	3.0 (0.4)	825	9.4 (1.3)	220	6.2 (1.9)	605	10.8 (1.6)
연령(세)												
19-29	771	3.0 (0.6)	307	0.8 (0.5)	464	5.2 (1.2)	90	13.5 (4.0)	16	- -[5]	74	15.6 (4.7)
30-39	1,254	2.2 (0.5)	527	1.7 (0.7)	727	2.8 (0.8)	120	12.1 (3.5)	36	7.3 (4.4)	84	14.3 (4.8)
40-49	1,162	1.9 (0.5)	532	1.7 (0.6)	630	2.2 (0.7)	134	11.0 (3.2)	35	13.7 (6.5)	99	9.5 (3.8)
50-59	1,174	2.1 (0.5)	481	0.5 (0.2)	693	3.8 (0.9)	185	8.5 (2.4)	44	0.3 (0.2)	141	12.9 (3.7)
60-69	1,025	1.7 (0.4)	473	1.7 (0.7)	552	1.6 (0.6)	151	4.7 (1.8)	43	2.7 (1.7)	108	5.6 (2.4)
70+	869	1.3 (0.4)	384	0.9 (0.5)	485	1.5 (0.5)	145	3.5 (1.7)	46	6.6 (4.1)	99	2.4 (1.7)
19-64	4,881	2.3 (0.3)	2,091	1.3 (0.3)	2,790	3.3 (0.4)	606	10.5 (1.5)	152	6.6 (2.3)	454	12.3 (2.0)
65+	1,374	1.4 (0.3)	613	1.3 (0.5)	761	1.6 (0.5)	219	4.1 (1.5)	68	4.6 (2.6)	151	3.9 (1.8)
거주지역												
동	4,889	2.4 (0.2)	2,109	1.2 (0.3)	2,780	3.5 (0.4)	628	10.9 (1.5)	163	8.0 (2.6)	465	12.1 (1.9)
읍면	1,366	1.4 (0.4)	595	1.5 (0.6)	771	1.3 (0.5)	197	4.4 (2.1)	57	2.0 (1.3)	140	5.9 (2.8)
소득수준[3]												
하	1,536	3.0 (0.5)	666	1.5 (0.5)	870	4.4 (0.9)	264	13.5 (2.7)	73	8.7 (4.3)	191	15.5 (3.5)
중하	1,542	2.7 (0.5)	670	1.6 (0.6)	872	3.7 (0.9)	199	8.5 (2.5)	48	8.3 (4.8)	151	8.5 (3.0)
중상	1,564	1.4 (0.3)	677	0.8 (0.3)	887	2.0 (0.6)	189	6.3 (1.9)	52	3.0 (2.0)	137	7.7 (2.5)
상	1,533	1.5 (0.3)	662	1.2 (0.4)	871	1.8 (0.6)	167	7.0 (2.3)	45	4.1 (2.7)	122	8.7 (3.5)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,889	2.3 (0.2)	2,109	1.2 (0.3)	2,780	3.5 (0.4)	628	11.5 (1.5)	163	- -[6]	465	12.1 (1.9)
읍면	1,366	1.7 (0.6)	595	1.8 (0.8)	771	1.5 (0.8)	197	- -	57	- -	140	- -
소득수준(표준화)												
하	1,536	3.1 (0.6)	666	1.3 (0.5)	870	4.6 (0.9)	264	17.2 (3.3)	73	- -	191	18.2 (3.8)
중하	1,542	2.7 (0.6)	670	1.7 (0.6)	872	3.6 (0.9)	199	7.3 (2.4)	48	- -	151	- -
중상	1,564	1.4 (0.3)	677	0.8 (0.3)	887	2.0 (0.6)	189	- -	52	- -	137	- -
상	1,533	1.5 (0.4)	662	1.2 (0.4)	871	1.9 (0.6)	167	9.4 (3.2)	45	- -	122	- -

1) 정신문제상담경험률 : 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적 있는 분율

2) 우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률 : 우울증상 경험자 중 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

6) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-1. 연간손상경험률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	25,211	6.8 (0.2)	2,979	5.9 (0.5)	6,800	7.3 (0.4)	7,471	6.7 (0.3)	6,249	7.5 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	3,706	7.2 (0.5)	721	6.1 (0.9)	1,516	7.3 (0.8)	1,648	6.2 (0.6)	1,378	8.0 (0.9)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	25,211	6.8 (0.2)	2,979	5.9 (0.5)	6,800	7.3 (0.4)	7,471	6.7 (0.4)	6,249	7.4 (0.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	4,559	6.5 (0.4)	339	5.2 (1.3)	891	8.2 (1.1)	1,049	8.0 (0.8)	767	7.4 (1.1)
30-39	-	- -	-	- -	5,522	7.0 (0.4)	635	6.5 (1.1)	1,410	6.4 (0.7)	1,425	6.1 (0.7)	1,253	7.4 (1.0)
40-49	-	- -	-	- -	5,812	6.2 (0.3)	563	6.5 (1.1)	1,328	7.6 (0.8)	1,495	6.5 (0.7)	1,162	7.3 (0.8)
50-59	-	- -	-	- -	3,935	7.1 (0.4)	505	4.6 (1.0)	1,133	7.6 (0.8)	1,246	6.5 (0.7)	1,170	7.2 (0.9)
60-69	-	- -	-	- -	3,189	8.0 (0.5)	489	7.0 (1.6)	1,079	5.2 (0.8)	1,205	7.5 (0.8)	1,025	7.0 (0.9)
70+	-	- -	-	- -	2,194	6.1 (0.5)	448	5.9 (1.1)	959	8.7 (1.1)	1,051	5.2 (0.7)	872	9.2 (1.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	20,245	6.8 (0.2)	2,118	6.0 (0.5)	5,000	7.0 (0.4)	5,555	6.7 (0.4)	4,881	6.9 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	4,966	6.5 (0.4)	861	5.8 (0.7)	1,800	8.7 (0.9)	1,916	6.9 (0.7)	1,368	9.4 (1.0)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	6,287	7.3 (0.4)	712	7.0 (1.3)	1,632	8.5 (0.9)	1,859	7.6 (0.7)	1,538	7.5 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	6,293	6.9 (0.4)	696	5.1 (1.0)	1,633	7.1 (0.7)	1,862	6.4 (0.7)	1,539	7.8 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	6,190	6.5 (0.3)	733	6.7 (1.2)	1,665	6.3 (0.8)	1,819	6.4 (0.8)	1,560	6.9 (0.9)
상	-	- -	-	- -	6,137	6.3 (0.3)	700	5.6 (0.9)	1,658	7.5 (0.7)	1,851	6.5 (0.7)	1,532	7.5 (0.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	20,245	6.9 (0.2)	2,118	6.0 (0.6)	5,000	7.0 (0.4)	5,555	6.7 (0.4)	4,881	6.9 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	4,966	6.5 (0.4)	861	5.8 (0.8)	1,800	8.1 (1.2)	1,916	6.9 (0.9)	1,368	9.9 (1.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	6,287	7.3 (0.4)	712	7.0 (1.3)	1,632	8.4 (1.0)	1,859	7.7 (0.7)	1,538	7.4 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	6,293	6.9 (0.4)	696	5.2 (1.0)	1,633	7.1 (0.8)	1,862	6.4 (0.7)	1,539	7.7 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	6,190	6.5 (0.3)	733	6.8 (1.2)	1,665	6.2 (0.8)	1,819	6.5 (0.8)	1,560	7.0 (1.0)
상	-	- -	-	- -	6,137	6.3 (0.3)	700	5.4 (0.9)	1,658	7.6 (0.8)	1,851	6.4 (0.7)	1,532	7.6 (0.9)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	11,723	7.8 (0.3)	1,240	7.4 (0.8)	2,834	8.3 (0.7)	3,233	8.0 (0.6)	2,698	8.3 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	1,481	5.9 (0.6)	301	6.2 (1.3)	581	6.4 (1.3)	687	5.7 (0.9)	615	7.7 (1.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,723	7.7 (0.3)	1,240	7.4 (0.8)	2,834	8.3 (0.7)	3,233	8.0 (0.6)	2,698	8.3 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,051	8.8 (0.7)	141	6.9 (2.1)	366	11.4 (1.8)	485	9.8 (1.4)	306	8.5 (1.9)
30-39	-	- -	-	- -	2,684	8.8 (0.6)	247	9.5 (2.0)	594	7.7 (1.1)	595	8.0 (1.2)	525	9.2 (1.7)
40-49	-	- -	-	- -	2,822	7.0 (0.5)	247	8.4 (1.9)	579	8.6 (1.2)	642	8.2 (1.2)	531	7.9 (1.3)
50-59	-	- -	-	- -	1,918	7.2 (0.6)	205	4.8 (1.8)	489	7.0 (1.2)	542	7.1 (1.1)	478	8.0 (1.5)
60-69	-	- -	-	- -	1,449	6.8 (0.7)	217	4.8 (1.7)	440	5.3 (1.2)	541	7.4 (1.2)	473	7.3 (1.3)
70+	-	- -	-	- -	799	4.5 (0.7)	183	7.4 (1.9)	366	6.9 (1.8)	428	4.5 (0.9)	385	8.1 (1.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	9,410	7.8 (0.3)	868	7.5 (0.9)	2,079	7.9 (0.8)	2,390	8.0 (0.6)	2,102	7.5 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	7.7 (0.6)	372	6.8 (1.6)	755	10.1 (1.6)	843	7.7 (1.2)	596	11.1 (1.9)

1) 연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간손상경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,949	8.8 (0.6)	300	7.1 (1.8)	681	9.8 (1.6)	817	9.4 (1.1)	666	7.7 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	2,863	8.3 (0.6)	285	6.7 (1.7)	673	7.1 (1.2)	801	8.6 (1.1)	668	9.4 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,894	7.6 (0.5)	308	9.6 (2.0)	707	7.2 (1.3)	774	7.0 (1.2)	675	7.3 (1.4)
상	-	- -	-	- -	2,866	6.0 (0.5)	298	6.8 (1.5)	689	8.9 (1.3)	803	6.8 (1.0)	661	8.4 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	9,410	7.6 (0.3)	868	7.6 (0.9)	2,079	7.8 (0.8)	2,390	7.9 (0.6)	2,102	7.5 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	7.9 (0.6)	372	6.8 (1.7)	755	9.8 (2.1)	843	7.7 (1.4)	596	12.6 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,949	8.7 (0.6)	300	6.8 (1.7)	681	9.8 (1.5)	817	9.5 (1.1)	666	7.4 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	2,863	8.2 (0.6)	285	6.8 (1.7)	673	7.2 (1.2)	801	8.6 (1.1)	668	9.5 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,894	7.6 (0.5)	308	9.8 (2.0)	707	7.1 (1.2)	774	7.0 (1.2)	675	7.4 (1.5)
상	-	- -	-	- -	2,866	6.0 (0.5)	298	6.8 (1.5)	689	8.9 (1.3)	803	6.8 (1.0)	661	8.4 (1.6)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	13,488	5.8 (0.2)	1,739	4.5 (0.6)	3,966	6.4 (0.5)	4,238	5.5 (0.4)	3,551	6.7 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	2,225	8.1 (0.6)	420	6.0 (1.2)	935	7.8 (1.0)	961	6.5 (0.9)	763	8.2 (1.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,488	5.7 (0.2)	1,739	4.4 (0.6)	3,966	6.2 (0.4)	4,238	5.4 (0.4)	3,551	6.5 (0.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,508	4.1 (0.4)	198	3.3 (1.6)	525	4.7 (1.0)	564	6.2 (1.1)	461	6.2 (1.3)
30-39	-	- -	-	- -	2,838	5.2 (0.4)	388	3.3 (1.0)	816	5.2 (0.9)	830	4.1 (0.7)	728	5.5 (1.0)
40-49	-	- -	-	- -	2,990	5.4 (0.4)	316	4.4 (1.2)	749	6.6 (1.0)	853	4.7 (0.8)	631	6.8 (1.2)
50-59	-	- -	-	- -	2,017	7.0 (0.6)	300	4.4 (1.4)	644	8.2 (1.2)	704	5.9 (0.9)	692	6.5 (1.1)
60-69	-	- -	-	- -	1,740	9.0 (0.7)	272	8.9 (1.9)	639	5.2 (1.0)	664	7.6 (1.3)	552	6.8 (1.3)
70+	-	- -	-	- -	1,395	7.0 (0.7)	265	5.1 (1.5)	593	9.7 (1.4)	623	5.6 (0.9)	487	9.8 (1.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	10,835	5.9 (0.3)	1,250	4.5 (0.7)	2,921	6.2 (0.5)	3,165	5.3 (0.4)	2,779	6.4 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	5.3 (0.5)	489	4.7 (0.9)	1,045	7.4 (0.8)	1,073	6.1 (0.7)	772	7.8 (1.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	3,338	5.7 (0.4)	412	7.0 (1.7)	951	7.1 (1.0)	1,042	5.7 (0.7)	872	7.3 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	3,430	5.5 (0.4)	411	3.7 (1.1)	960	7.1 (1.0)	1,061	4.4 (0.7)	871	6.2 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	3,296	5.4 (0.4)	425	3.8 (1.0)	958	5.4 (0.8)	1,045	5.9 (0.8)	885	6.6 (1.1)
상	-	- -	-	- -	3,271	6.6 (0.5)	402	4.2 (1.0)	969	6.2 (0.8)	1,048	6.1 (0.8)	871	6.6 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	10,835	6.0 (0.3)	1,250	4.4 (0.7)	2,921	6.1 (0.5)	3,165	5.3 (0.4)	2,779	6.3 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	4.8 (0.5)	489	4.9 (1.0)	1,045	5.7 (0.8)	1,073	6.0 (1.0)	772	6.7 (1.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	3,338	5.7 (0.4)	412	7.1 (1.6)	951	7.0 (0.9)	1,042	5.7 (0.8)	872	7.3 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	3,430	5.4 (0.4)	411	3.6 (1.1)	960	7.0 (1.0)	1,061	4.2 (0.7)	871	5.9 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	3,296	5.3 (0.4)	425	3.9 (0.9)	958	5.1 (0.8)	1,045	5.8 (0.8)	885	6.5 (1.2)
상	-	- -	-	- -	3,271	6.5 (0.5)	402	3.8 (0.8)	969	5.9 (0.8)	1,048	6.2 (0.8)	871	6.4 (1.0)

표 1-V-2. 소아청소년 연간손상경험률[1] 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1-18세	-	- -	-	- -	8,291	7.6 (0.3)	1,163	8.2 (0.9)	2,464	7.7 (0.6)	2,539	8.2 (0.7)	2,116	7.7 (0.7)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	1,964	8.4 (0.6)	315	6.8 (1.4)	656	7.9 (1.2)	664	9.2 (1.2)	604	10.8 (1.7)
6-11	-	- -	-	- -	3,025	6.8 (0.5)	477	7.9 (1.5)	972	7.0 (0.9)	894	8.9 (1.0)	780	7.8 (1.2)
12-14	-	- -	-	- -	1,592	7.6 (0.7)	192	9.1 (2.4)	429	4.9 (1.1)	470	8.9 (1.7)	371	6.4 (1.3)
15-18	-	- -	-	- -	1,710	7.9 (0.7)	179	9.3 (2.4)	407	10.6 (1.7)	511	6.1 (1.1)	361	6.0 (1.6)
남자														
1-18세	-	- -	-	- -	4,275	10.0 (0.5)	622	10.2 (1.2)	1,278	8.8 (0.9)	1,337	10.6 (1.1)	1,102	10.7 (1.1)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	987	10.0 (1.0)	178	7.3 (2.0)	329	7.9 (1.6)	367	11.5 (1.8)	297	14.0 (2.3)
6-11	-	- -	-	- -	1,561	8.6 (0.8)	246	8.8 (2.0)	507	6.9 (1.3)	460	9.8 (1.5)	408	10.6 (1.9)
12-14	-	- -	-	- -	826	11.5 (1.1)	107	11.8 (3.6)	230	7.7 (1.9)	245	12.6 (2.8)	203	9.3 (2.2)
15-18	-	- -	-	- -	901	10.9 (1.1)	91	13.0 (3.9)	212	13.0 (2.6)	265	9.3 (1.9)	194	9.4 (2.4)
여자														
1-18세	-	- -	-	- -	4,016	5.0 (0.3)	541	6.0 (1.1)	1,186	6.5 (0.9)	1,202	5.6 (0.7)	1,014	4.3 (0.7)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	977	6.8 (0.8)	137	6.3 (2.2)	327	7.9 (1.7)	297	6.7 (1.7)	307	7.2 (2.2)
6-11	-	- -	-	- -	1,464	4.8 (0.6)	231	7.0 (1.8)	465	7.1 (1.4)	434	8.0 (1.5)	372	4.9 (1.2)
12-14	-	- -	-	- -	766	3.2 (0.6)	85	5.6 (2.9)	199	1.8 (0.9)	225	4.7 (1.4)	168	3.1 (1.7)
15-18	-	- -	-	- -	809	4.5 (0.8)	88	4.7 (2.2)	195	8.0 (2.4)	246	2.6 (1.0)	167	1.7 (1.0)

1) 연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

표 1-V-3. 운전자의 안전벨트착용률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	2,886	51.0 (1.5)	3,249	85.1 (0.7)	3,851	82.6 (0.8)	1,439	73.7 (1.8)	3,334	72.6 (1.2)	3,624	70.2 (1.1)	3,538	72.8 (1.2)
65세이상	33	87.0 (5.5)	56	97.3 (1.9)	100	87.0 (3.8)	95	83.1 (4.8)	175	86.0 (2.8)	218	78.2 (3.2)	302	77.6 (3.0)
19세이상(표준화)[3]	2,886	- -[5]	3,249	- -	3,851	83.1 (0.9)	1,439	74.7 (1.7)	3,334	73.9 (1.2)	3,624	71.1 (1.0)	3,538	72.8 (1.3)
연령(세)														
19-29	591	50.1 (2.5)	561	84.6 (1.8)	666	77.2 (2.0)	190	63.8 (4.6)	470	70.7 (2.5)	524	64.7 (2.2)	409	68.5 (3.1)
30-39	1,069	46.4 (2.1)	1,143	84.0 (1.3)	1,198	83.0 (1.2)	458	73.4 (2.6)	1,004	71.6 (1.8)	966	71.6 (1.9)	977	75.0 (1.9)
40-49	805	50.6 (2.3)	1,016	84.0 (1.3)	1,188	83.1 (1.3)	381	74.6 (3.1)	909	71.8 (1.8)	1,032	71.1 (1.7)	887	72.3 (1.8)
50-59	327	63.7 (2.9)	389	87.6 (2.1)	550	86.6 (1.6)	241	82.0 (3.1)	603	74.2 (2.2)	658	68.2 (2.2)	710	71.7 (2.0)
60-69	90	70.4 (5.4)	128	94.8 (1.8)	218	94.0 (1.8)	121	89.3 (2.8)	285	81.7 (2.7)	357	80.4 (2.6)	412	81.4 (2.3)
70+	4	- -[6]	12	- -	31	80.6 (6.9)	48	79.0 (7.0)	63	86.9 (4.6)	87	82.4 (4.1)	143	71.6 (5.3)
거주지역														
동	2,068	54.6 (1.7)	2,682	85.8 (0.8)	3,214	83.8 (0.8)	1,083	75.5 (1.8)	2,640	74.5 (1.2)	2,828	72.4 (1.2)	2,852	75.0 (1.3)
읍면	818	33.0 (2.2)	567	81.2 (2.1)	637	76.4 (2.9)	356	66.9 (5.1)	694	62.9 (3.6)	796	60.6 (3.0)	686	64.2 (3.0)
소득수준[4]														
하	482	40.8 (2.8)	511	85.8 (1.6)	767	81.7 (1.7)	260	62.2 (3.4)	629	67.7 (2.3)	754	66.8 (2.2)	722	69.2 (2.1)
중하	683	47.6 (2.3)	663	84.7 (1.5)	915	83.2 (1.4)	320	73.2 (3.4)	755	71.9 (2.0)	806	66.1 (1.9)	838	73.4 (2.1)
중상	750	51.5 (2.3)	827	83.6 (1.5)	982	82.2 (1.4)	381	76.7 (3.0)	897	72.4 (1.9)	928	73.3 (1.8)	916	75.1 (2.1)
상	971	57.3 (2.2)	1,070	85.9 (1.1)	1,140	83.8 (1.4)	443	78.6 (2.6)	984	76.9 (1.8)	1,102	72.9 (1.8)	1,024	73.3 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	2,068	- -	2,682	- -	3,214	84.5 (0.9)	1,083	76.7 (1.8)	2,640	76.1 (1.2)	2,828	73.6 (1.2)	2,852	75.0 (1.5)
읍면	818	- -	567	- -	637	- -	356	- -	694	64.0 (3.7)	796	61.5 (3.1)	686	64.8 (3.1)
소득수준(표준화)														
하	482	- -	511	- -	767	- -	260	- -	629	- -	754	- -	722	69.2 (2.3)
중하	683	- -	663	- -	915	- -	320	- -	755	- -	806	- -	838	74.5 (2.0)
중상	750	- -	827	- -	982	- -	381	- -	897	- -	928	- -	916	74.4 (2.1)
상	971	- -	1,070	- -	1,140	- -	443	78.3 (2.3)	984	77.6 (1.8)	1,102	73.6 (1.8)	1,024	72.6 (2.4)
남자														
19세이상	2,326	48.8 (1.6)	2,419	82.8 (0.8)	2,570	81.0 (0.9)	861	70.9 (2.1)	2,049	70.1 (1.3)	2,294	66.6 (1.2)	2,125	69.9 (1.6)
65세이상	32	88.6 (5.4)	55	97.2 (2.0)	91	90.0 (3.8)	87	83.5 (4.5)	158	86.1 (3.0)	198	77.7 (3.3)	275	77.6 (3.0)
19세이상(표준화)	2,326	- -	2,419	- -	2,570	81.9 (1.0)	861	71.8 (2.1)	2,049	71.6 (1.4)	2,294	67.7 (1.2)	2,125	70.2 (1.7)
연령(세)														
19-29	468	48.0 (2.9)	413	81.9 (2.2)	415	77.2 (2.3)	101	62.4 (6.3)	256	70.1 (3.3)	322	60.8 (2.9)	219	67.0 (4.1)
30-39	833	43.3 (2.2)	801	81.4 (1.5)	740	79.9 (1.4)	233	68.9 (3.5)	565	69.4 (2.2)	547	68.4 (2.4)	499	71.8 (2.4)
40-49	640	47.3 (2.5)	740	80.8 (1.5)	761	80.6 (1.6)	223	70.8 (3.6)	525	66.7 (2.3)	593	67.0 (2.3)	500	67.4 (2.7)
50-59	295	62.8 (3.2)	331	86.2 (2.3)	429	84.9 (1.9)	154	77.5 (3.7)	400	70.2 (2.6)	454	63.2 (2.7)	437	68.3 (2.6)
60-69	86	70.7 (5.5)	122	94.6 (1.9)	197	94.6 (1.8)	108	88.3 (3.0)	245	82.6 (2.8)	296	78.0 (2.9)	337	80.9 (2.6)
70+	4	- -	12	- -	28	83.9 (6.8)	42	80.1 (6.5)	58	86.2 (4.9)	82	83.8 (4.1)	133	71.8 (5.5)
거주지역														
동	1,650	52.4 (1.9)	1,981	83.5 (0.9)	2,120	82.4 (0.9)	647	72.9 (2.3)	1,591	72.5 (1.4)	1,764	69.5 (1.3)	1,689	72.4 (1.7)
읍면	676	31.7 (2.3)	438	79.4 (2.3)	450	74.1 (2.9)	214	63.2 (4.7)	458	58.0 (3.8)	530	53.9 (3.6)	436	60.6 (3.9)

1) 운전자의 안전벨트착용률 : 운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 운전자의 안전벨트착용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	419	39.9 (2.9)	413	84.5 (1.8)	557	81.7 (1.9)	164	61.2 (4.7)	417	65.5 (2.7)	502	61.9 (2.7)	460	66.5 (2.6)
중하	579	45.4 (2.4)	522	82.8 (1.7)	636	82.2 (1.8)	198	70.4 (4.2)	487	68.5 (2.5)	552	62.2 (2.4)	525	69.6 (2.6)
중상	621	50.3 (2.3)	639	81.1 (1.8)	644	79.5 (1.6)	230	74.8 (3.6)	543	69.6 (2.4)	571	70.4 (2.1)	540	72.6 (2.6)
상	707	54.6 (2.4)	722	83.6 (1.3)	699	81.6 (1.7)	247	74.5 (3.4)	553	75.6 (2.1)	645	70.5 (2.3)	579	70.2 (3.0)
거주지역(표준화)														
동	1,650	- -	1,981	- -	2,120	- -	647	74.0 (2.2)	1,591	74.3 (1.4)	1,764	70.8 (1.3)	1,689	72.7 (1.8)
읍면	676	- -	438	- -	450	- -	214	- -	458	58.8 (4.3)	530	55.4 (3.6)	436	60.8 (4.0)
소득수준(표준화)														
하	419	- -	413	- -	557	- -	164	- -	417	- -	502	- -	460	67.0 (2.7)
중하	579	- -	522	- -	636	- -	198	- -	487	- -	552	- -	525	71.0 (2.5)
중상	621	- -	639	- -	644	- -	230	- -	543	- -	571	- -	540	72.4 (2.7)
상	707	- -	722	- -	699	- -	247	- -	553	76.6 (2.1)	645	71.3 (2.3)	579	69.6 (3.1)
여자														
19세이상	560	60.3 (2.1)	830	91.5 (1.2)	1,281	86.4 (1.2)	578	79.5 (2.4)	1,285	77.8 (1.4)	1,330	78.4 (1.4)	1,413	78.6 (1.4)
65세이상	1	- -	1	- -	9	- -	8	- -	17	- -	20	84.7 (8.6)	27	77.9 (9.3)
19세이상(표준화)	560	- -	830	- -	1,281	- -	578	- -	1,285	- -	1,330	- -	1,413	- -
연령(세)														
19-29	123	58.3 (4.4)	148	92.3 (2.2)	251	77.3 (3.1)	89	66.1 (5.9)	214	71.7 (3.3)	202	72.7 (3.2)	190	71.4 (3.7)
30-39	236	57.4 (3.3)	342	89.6 (2.1)	458	89.0 (1.7)	225	81.4 (3.3)	439	75.7 (2.5)	419	78.1 (2.3)	478	79.9 (2.2)
40-49	165	63.6 (4.1)	276	92.2 (1.7)	427	88.8 (1.4)	158	82.1 (3.8)	384	81.5 (2.1)	439	78.9 (2.2)	387	80.5 (2.4)
50-59	32	72.9 (9.3)	58	94.9 (4.0)	121	93.3 (2.2)	87	93.0 (3.2)	203	83.9 (3.1)	204	83.6 (2.7)	273	80.1 (3.4)
60-69	4	- -	6	- -	21	88.3 (7.3)	13	- -	40	75.8 (8.9)	61	93.3 (3.0)	75	83.9 (5.9)
70+	0	- -	0	- -	3	- -	6	- -	5	- -	5	- -	10	- -
거주지역														
동	418	63.7 (2.3)	701	92.2 (1.1)	1,094	87.0 (1.1)	436	81.0 (2.4)	1,049	78.5 (1.6)	1,064	78.8 (1.7)	1,163	80.1 (1.4)
읍면	142	39.7 (4.0)	129	87.0 (4.4)	187	82.5 (4.3)	142	73.9 (7.6)	236	73.9 (3.5)	266	76.6 (3.2)	250	72.3 (4.1)
소득수준														
하	63	46.6 (6.8)	98	91.0 (2.7)	210	81.5 (3.0)	96	64.7 (5.4)	212	73.4 (3.6)	252	79.3 (2.6)	262	75.4 (3.2)
중하	104	60.1 (5.2)	141	91.4 (2.9)	279	86.1 (2.1)	122	79.4 (4.8)	268	80.1 (3.0)	254	77.2 (3.1)	313	81.8 (2.5)
중상	129	57.4 (5.0)	188	91.8 (2.1)	338	88.2 (1.9)	151	80.6 (4.2)	354	77.9 (2.6)	357	79.6 (2.4)	376	79.6 (2.3)
상	264	64.7 (3.2)	348	90.4 (1.7)	441	87.7 (2.0)	196	85.5 (2.8)	431	79.1 (2.1)	457	77.3 (2.4)	445	79.0 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	418	- -	701	- -	1,094	- -	436	- -	1,049	- -	1,064	- -	1,163	- -
읍면	142	- -	129	- -	187	- -	142	- -	236	- -	266	- -	250	- -
소득수준(표준화)														
하	63	- -	98	- -	210	- -	96	- -	212	- -	252	- -	262	- -
중하	104	- -	141	- -	279	- -	122	- -	268	- -	254	- -	313	- -
중상	129	- -	188	- -	338	- -	151	- -	354	- -	357	- -	376	- -
상	264	- -	348	- -	441	- -	196	- -	431	- -	457	- -	445	- -

표 1-V-4. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	30.7 (1.0)	7,173	78.4 (0.8)	6,909	76.6 (0.7)	2,645	67.2 (1.5)	6,193	65.3 (1.0)	6,936	61.8 (0.9)	5,860	62.4 (1.0)
65세이상	1,044	40.1 (1.9)	544	83.3 (2.2)	691	81.7 (2.1)	527	82.8 (2.1)	1,147	84.3 (1.3)	1,300	76.6 (1.5)	1,121	81.3 (1.4)
19세이상(표준화)[2]	8,991	31.0 (0.9)	7,173	78.5 (0.8)	6,909	76.8 (0.8)	2,645	67.3 (1.4)	6,193	65.3 (0.9)	6,936	61.6 (0.9)	5,860	62.3 (1.0)
연령(세)														
19-29	1,959	20.2 (1.2)	1,556	71.5 (1.6)	1,272	67.9 (1.5)	326	55.1 (3.3)	874	55.5 (2.1)	1,023	51.4 (1.8)	755	51.6 (2.4)
30-39	2,213	28.7 (1.6)	1,920	77.1 (1.4)	1,652	75.2 (1.2)	611	62.0 (2.5)	1,367	60.4 (1.7)	1,409	59.3 (1.8)	1,231	62.8 (1.9)
40-49	1,804	31.9 (1.4)	1,787	79.4 (1.1)	1,771	78.7 (1.2)	532	67.1 (2.6)	1,277	63.7 (1.6)	1,463	60.7 (1.7)	1,147	59.1 (1.9)
50-59	1,338	39.1 (1.6)	985	83.1 (1.5)	1,100	84.0 (1.3)	464	77.6 (2.4)	1,063	70.5 (1.7)	1,186	66.3 (1.8)	1,129	63.5 (1.8)
60-69	1,066	42.7 (1.9)	650	85.1 (1.8)	761	86.4 (1.6)	382	82.7 (2.6)	925	81.0 (1.5)	1,073	74.0 (1.7)	911	76.9 (2.0)
70+	611	37.1 (2.2)	275	84.0 (2.7)	353	76.6 (2.8)	330	81.4 (2.5)	687	85.3 (1.7)	782	77.2 (1.8)	687	80.7 (1.9)
거주지역														
동	5,848	31.5 (1.2)	5,809	78.3 (0.9)	5,610	76.7 (0.8)	1,892	67.8 (1.7)	4,611	66.0 (1.0)	5,211	62.4 (1.0)	4,581	63.0 (1.1)
읍면	3,143	27.8 (1.3)	1,364	78.9 (2.1)	1,299	76.1 (2.0)	753	64.8 (3.1)	1,582	62.0 (2.3)	1,725	59.2 (1.9)	1,279	60.5 (2.4)
소득수준[3]														
하	2,141	26.4 (1.4)	1,460	79.1 (1.6)	1,688	75.6 (1.3)	624	63.9 (2.5)	1,445	61.2 (1.8)	1,677	57.8 (1.5)	1,416	60.6 (1.7)
중하	2,309	28.1 (1.3)	1,616	77.4 (1.4)	1,737	76.7 (1.3)	615	66.8 (2.8)	1,490	63.1 (1.6)	1,728	60.6 (1.3)	1,447	62.8 (1.7)
중상	2,224	31.0 (1.5)	1,786	77.8 (1.3)	1,681	76.2 (1.3)	659	68.5 (2.3)	1,540	67.4 (1.6)	1,695	64.6 (1.4)	1,465	63.6 (2.0)
상	2,317	36.2 (1.4)	1,900	78.9 (1.2)	1,726	78.5 (1.3)	633	69.6 (2.8)	1,541	68.4 (1.7)	1,761	64.5 (1.5)	1,465	63.5 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	5,848	32.5 (1.1)	5,809	78.8 (0.8)	5,610	77.2 (0.8)	1,892	68.2 (1.6)	4,611	66.9 (1.0)	5,211	62.8 (1.0)	4,581	63.6 (1.1)
읍면	3,143	25.3 (1.2)	1,364	78.3 (1.9)	1,299	74.9 (2.0)	753	63.4 (3.1)	1,582	58.6 (2.7)	1,725	56.3 (2.3)	1,279	57.1 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	2,141	26.4 (1.4)	1,460	78.9 (1.6)	1,688	76.0 (1.3)	624	64.4 (2.4)	1,445	61.6 (1.7)	1,677	57.9 (1.5)	1,416	60.8 (1.5)
중하	2,309	28.4 (1.2)	1,616	78.1 (1.3)	1,737	77.0 (1.3)	615	67.1 (2.7)	1,490	62.9 (1.6)	1,728	60.5 (1.4)	1,447	62.6 (1.7)
중상	2,224	31.3 (1.4)	1,786	77.8 (1.3)	1,681	76.3 (1.3)	659	69.2 (2.2)	1,540	67.9 (1.5)	1,695	64.3 (1.4)	1,465	63.4 (2.0)
상	2,317	36.3 (1.4)	1,900	79.2 (1.2)	1,726	78.6 (1.3)	633	68.8 (2.7)	1,541	68.2 (1.7)	1,761	64.0 (1.5)	1,465	62.8 (1.9)
남자														
19세이상	4,180	28.7 (1.0)	3,484	76.0 (1.0)	3,287	73.5 (0.9)	1,164	61.7 (1.9)	2,744	59.6 (1.3)	3,139	55.4 (1.1)	2,640	56.9 (1.3)
65세이상	411	43.6 (2.8)	277	86.3 (2.7)	341	87.4 (2.0)	257	83.6 (2.8)	532	84.5 (1.8)	622	72.0 (2.1)	577	76.5 (2.3)
19세이상(표준화)	4,180	29.3 (1.0)	3,484	76.3 (1.0)	3,287	74.2 (0.9)	1,164	62.1 (1.8)	2,744	59.9 (1.2)	3,139	55.5 (1.1)	2,640	57.0 (1.4)
연령(세)														
19-29	886	19.0 (1.5)	700	71.8 (2.2)	573	67.0 (2.0)	137	49.9 (4.7)	361	51.7 (3.0)	482	45.7 (2.6)	304	49.7 (3.6)
30-39	1,091	25.3 (1.6)	926	72.7 (1.8)	789	67.8 (1.7)	242	55.3 (3.7)	590	54.3 (2.2)	592	53.6 (2.3)	520	58.1 (2.6)
40-49	888	27.6 (1.8)	892	75.3 (1.5)	835	75.4 (1.7)	239	58.4 (3.4)	571	56.2 (2.4)	637	53.8 (2.4)	529	51.7 (2.4)
50-59	616	37.8 (2.2)	501	79.2 (2.0)	540	79.8 (1.8)	195	74.7 (3.7)	475	62.8 (2.6)	526	56.3 (2.6)	474	54.7 (2.8)
60-69	476	43.8 (2.7)	335	85.2 (2.2)	388	87.8 (1.9)	192	81.0 (3.9)	424	77.4 (2.4)	523	70.6 (2.3)	455	71.8 (2.7)
70+	223	43.5 (3.6)	130	87.0 (3.5)	162	84.7 (3.1)	159	83.0 (3.3)	323	85.4 (2.1)	379	74.7 (2.7)	358	77.0 (2.6)
거주지역														
동	2,746	29.8 (1.2)	2,800	75.8 (1.0)	2,650	73.4 (1.0)	816	61.7 (2.2)	2,020	60.5 (1.4)	2,326	56.3 (1.2)	2,056	58.3 (1.5)
읍면	1,434	24.6 (1.4)	684	76.8 (2.4)	637	74.2 (2.2)	348	61.8 (3.9)	724	55.4 (3.1)	813	51.6 (2.7)	584	51.7 (2.8)

1) 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	1,005	25.0 (1.7)	701	78.1 (2.0)	819	72.5 (1.9)	286	60.9 (3.6)	654	57.7 (2.4)	777	52.3 (2.1)	638	53.8 (2.5)
중하	1,053	24.7 (1.5)	806	75.0 (1.7)	819	75.3 (1.8)	265	60.4 (3.3)	653	56.0 (2.2)	777	53.5 (2.0)	659	58.6 (2.4)
중상	1,063	29.6 (1.7)	878	74.1 (1.8)	794	72.9 (1.6)	286	63.6 (3.9)	692	60.8 (2.4)	757	59.4 (2.1)	661	58.2 (2.7)
상	1,059	34.5 (1.8)	913	76.6 (1.6)	812	74.5 (1.8)	281	62.9 (3.4)	665	62.7 (2.3)	791	56.7 (2.1)	655	56.8 (2.8)
거주지역(표준화)														
동	2,746	31.4 (1.2)	2,800	76.5 (1.0)	2,650	74.5 (1.0)	816	62.4 (2.0)	2,020	61.8 (1.3)	2,326	57.0 (1.2)	2,056	59.0 (1.5)
읍면	1,434	22.2 (1.3)	684	76.0 (2.4)	637	73.0 (2.2)	348	60.6 (4.1)	724	52.0 (3.5)	813	49.3 (3.0)	584	49.6 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	1,005	25.7 (1.6)	701	78.2 (2.0)	819	73.3 (1.8)	286	61.6 (3.5)	654	58.2 (2.3)	777	52.7 (2.1)	638	54.7 (2.4)
중하	1,053	25.4 (1.5)	806	- -[4]	819	76.0 (1.7)	265	60.9 (3.3)	653	55.8 (2.1)	777	53.9 (2.0)	659	59.0 (2.4)
중상	1,063	29.8 (1.7)	878	74.7 (1.8)	794	73.6 (1.6)	286	64.8 (3.6)	692	61.7 (2.3)	757	59.1 (2.0)	661	58.6 (2.7)
상	1,059	35.0 (1.8)	913	76.9 (1.5)	812	75.1 (1.7)	281	62.4 (3.2)	665	62.9 (2.2)	791	56.6 (2.1)	655	56.2 (2.7)
여자														
19세이상	4,811	32.5 (1.1)	3,689	80.5 (1.0)	3,622	79.9 (0.9)	1,481	72.9 (1.6)	3,449	71.4 (1.1)	3,797	68.6 (1.0)	3,220	68.3 (1.2)
65세이상	633	38.0 (2.2)	267	80.4 (2.8)	350	75.8 (3.0)	270	82.2 (2.6)	615	84.1 (1.7)	678	80.6 (1.7)	544	85.8 (1.9)
19세이상(표준화)	4,811	32.8 (1.1)	3,689	80.5 (1.0)	3,622	79.7 (0.9)	1,481	72.8 (1.6)	3,449	71.2 (1.1)	3,797	68.1 (1.0)	3,220	67.7 (1.2)
연령(세)														
19-29	1,073	21.2 (1.5)	856	71.3 (2.1)	699	69.1 (1.9)	189	60.5 (3.9)	513	59.5 (2.5)	541	57.9 (2.3)	451	53.8 (2.5)
30-39	1,122	32.0 (1.9)	994	80.9 (1.6)	863	83.3 (1.4)	369	69.3 (2.6)	777	67.2 (2.0)	817	65.3 (2.1)	711	67.7 (2.1)
40-49	916	36.3 (1.9)	895	83.1 (1.3)	936	82.3 (1.3)	293	76.6 (2.9)	706	71.8 (1.9)	826	67.9 (2.0)	618	66.9 (2.5)
50-59	722	40.3 (2.1)	484	86.9 (1.9)	560	88.7 (1.6)	269	80.6 (3.0)	588	78.7 (1.9)	660	76.6 (1.9)	655	72.6 (2.1)
60-69	590	41.8 (2.5)	315	85.0 (2.4)	373	85.0 (2.2)	190	84.4 (2.9)	501	85.0 (1.9)	550	77.6 (2.3)	456	82.4 (2.3)
70+	388	33.9 (2.6)	145	81.3 (3.6)	191	68.7 (4.2)	171	80.1 (3.4)	364	85.2 (2.0)	403	79.2 (2.1)	329	83.8 (2.4)
거주지역														
동	3,102	33.0 (1.3)	3,009	80.4 (1.1)	2,960	80.3 (0.9)	1,076	74.2 (1.8)	2,591	71.8 (1.2)	2,885	68.9 (1.2)	2,525	67.9 (1.4)
읍면	1,709	30.6 (1.4)	680	80.9 (2.4)	662	78.2 (2.6)	405	68.0 (3.6)	858	69.4 (1.9)	912	67.7 (1.8)	695	69.5 (3.0)
소득수준														
하	1,136	27.7 (1.7)	759	79.9 (1.9)	869	79.0 (1.7)	338	67.1 (3.2)	791	65.1 (2.2)	900	63.8 (1.9)	778	67.5 (2.2)
중하	1,256	31.1 (1.7)	810	79.7 (1.9)	918	78.3 (1.5)	350	73.2 (3.3)	837	70.4 (2.1)	951	68.0 (1.7)	788	67.2 (1.9)
중상	1,161	32.3 (1.7)	908	81.1 (1.6)	887	79.6 (1.6)	373	73.8 (2.1)	848	74.6 (1.8)	938	70.0 (1.7)	804	69.1 (2.3)
상	1,258	37.6 (1.6)	987	81.0 (1.5)	914	82.7 (1.7)	352	77.1 (3.3)	876	74.4 (2.0)	970	72.5 (1.7)	810	70.8 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	3,102	34.0 (1.3)	3,009	80.9 (1.0)	2,960	80.1 (0.9)	1,076	74.3 (1.8)	2,591	72.5 (1.2)	2,885	68.9 (1.2)	2,525	68.4 (1.3)
읍면	1,709	28.3 (1.4)	680	80.6 (2.2)	662	77.3 (2.4)	405	67.5 (3.2)	858	66.1 (2.1)	912	64.4 (2.3)	695	65.6 (3.3)
소득수준(표준화)														
하	1,136	27.7 (1.6)	759	79.6 (1.9)	869	79.2 (1.7)	338	67.6 (3.0)	791	65.4 (2.1)	900	63.6 (1.8)	778	67.3 (2.1)
중하	1,256	31.3 (1.7)	810	79.8 (1.8)	918	77.9 (1.5)	350	73.3 (3.2)	837	70.3 (2.0)	951	67.4 (1.7)	788	66.6 (1.9)
중상	1,161	32.7 (1.6)	908	81.0 (1.6)	887	79.3 (1.6)	373	74.0 (2.1)	848	74.7 (1.7)	938	69.6 (1.7)	804	68.2 (2.3)
상	1,258	37.9 (1.5)	987	81.1 (1.5)	914	82.3 (1.6)	352	76.2 (3.4)	876	73.7 (2.0)	970	71.6 (1.8)	810	70.2 (2.1)

표 1-V-5. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률[1] 추이 : 성별, 만12-18세, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
12-18세	1,438	10.1 (0.9)	968	52.9 (1.5)	798	50.8 (2.1)	339	42.6 (3.3)	781	39.1 (2.3)	929	34.0 (1.8)	704	27.4 (2.1)
연령(세)														
12-14	554	9.7 (1.3)	400	54.1 (2.8)	366	56.1 (3.0)	168	35.1 (4.6)	387	39.2 (3.1)	436	35.4 (2.9)	354	25.2 (3.0)
15-18	884	10.4 (1.1)	568	52.1 (1.9)	432	46.0 (2.7)	171	47.5 (4.5)	394	39.1 (2.8)	493	33.0 (2.2)	350	28.9 (3.0)
남자														
12-18세	729	9.5 (1.2)	504	54.6 (2.2)	443	53.5 (2.9)	177	42.3 (4.0)	415	39.6 (3.3)	489	36.8 (2.5)	388	25.5 (2.7)
연령(세)														
12-14	285	9.9 (1.9)	207	55.3 (3.4)	201	57.4 (4.1)	90	33.0 (6.4)	210	41.2 (3.9)	231	37.7 (3.5)	197	24.4 (3.9)
15-18	444	9.2 (1.4)	297	54.1 (2.8)	242	50.1 (3.7)	87	48.2 (5.6)	205	38.5 (4.0)	258	36.1 (3.2)	191	26.3 (4.2)
여자														
12-18세	709	10.8 (1.2)	464	51.1 (2.5)	355	47.4 (3.1)	162	43.1 (4.5)	366	38.7 (3.1)	440	30.7 (2.8)	316	29.7 (2.9)
연령(세)														
12-14	269	9.4 (1.7)	193	52.9 (4.1)	165	54.6 (4.0)	78	37.7 (5.4)	177	36.9 (4.4)	205	32.6 (4.5)	157	26.1 (3.8)
15-18	440	11.7 (1.7)	271	49.8 (3.1)	190	41.1 (4.0)	84	46.6 (6.9)	189	39.9 (3.9)	235	29.5 (3.3)	159	32.3 (4.0)

1) 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

표 1-V-6. 자동차 탑승 경험 소아의 자동차보호장구이용률[1] 추이 : 성별, 만1-5세, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체	-	- -	-	- -	1,913	8.8 (0.8)	295	15.4 (2.2)	604	18.4 (2.0)	644	17.9 (2.0)	587	21.8 (2.0)
남자	-	- -	-	- -	960	9.3 (1.2)	166	20.5 (3.5)	303	17.4 (2.6)	358	19.9 (2.6)	292	23.3 (2.9)
여자	-	- -	-	- -	953	8.3 (1.0)	129	9.7 (2.8)	301	19.5 (2.7)	286	15.7 (2.5)	295	20.0 (2.2)

1) 자동차 탑승 경험 소아의 자동차보호장구이용률 : 자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율

표 1-V-7. 자전거 탑승 소아의 헬멧착용률[1] 추이 : 성별, 만3-11세, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
3-11세	-	- -	-	- -	2,680	2.1 (0.3)	421	1.4 (0.6)	925	3.3 (0.9)	788	3.2 (0.7)	762	2.8 (0.9)
연령(세)														
3-5	-	- -	-	- -	695	2.7 (0.7)	95	2.5 (1.8)	229	5.3 (1.7)	191	3.1 (1.3)	195	4.0 (2.0)
6-11	-	- -	-	- -	1,985	1.8 (0.3)	326	1.1 (0.6)	696	2.7 (0.9)	597	3.2 (0.8)	567	2.5 (1.0)
남자														
3-11세	-	- -	-	- -	1,473	1.9 (0.4)	232	2.0 (1.0)	506	2.2 (0.7)	464	2.5 (0.7)	433	2.7 (1.3)
연령(세)														
3-5	-	- -	-	- -	380	1.8 (0.7)	51	1.9 (1.8)	125	5.3 (2.3)	120	1.3 (1.0)	118	4.8 (3.0)
6-11	-	- -	-	- -	1,093	2.0 (0.4)	181	2.0 (1.0)	381	1.2 (0.6)	344	2.9 (0.9)	315	2.0 (1.3)
여자														
3-11세	-	- -	-	- -	1,207	2.2 (0.5)	189	0.7 (0.7)	419	4.5 (1.6)	324	4.2 (1.2)	329	3.0 (1.2)
연령(세)														
3-5	-	- -	-	- -	315	3.9 (1.2)	44	3.1 (3.1)	104	5.2 (2.3)	71	5.7 (2.9)	77	2.9 (1.7)
6-11	-	- -	-	- -	892	1.6 (0.5)	145	0.0 (-)[2]	315	4.4 (1.8)	253	3.7 (1.3)	252	3.0 (1.4)

1) 자전거 탑승 소아의 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율
2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-8. 연간손상경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	20,520	7.2 (0.2)	8,765	8.2 (0.4)	11,755	6.2 (0.3)
연령(세)						
19-29	2,707	7.9 (0.6)	1,157	9.9 (1.0)	1,550	5.7 (0.7)
30-39	4,088	6.6 (0.5)	1,714	8.3 (0.8)	2,374	4.9 (0.5)
40-49	3,985	7.1 (0.4)	1,752	8.2 (0.7)	2,233	6.0 (0.6)
50-59	3,549	7.1 (0.5)	1,509	7.4 (0.8)	2,040	6.9 (0.6)
60-69	3,309	6.6 (0.5)	1,454	6.6 (0.7)	1,855	6.5 (0.7)
70+	2,882	7.7 (0.6)	1,179	6.5 (0.9)	1,703	8.4 (0.8)
19-64	15,978	7.2 (0.3)	6,882	8.4 (0.4)	9,096	5.9 (0.3)
65+	4,542	7.2 (0.5)	1,883	6.6 (0.7)	2,659	7.5 (0.6)
거주지역						
동	15,436	6.9 (0.3)	6,571	7.8 (0.4)	8,865	5.9 (0.3)
읍면	5,084	8.4 (0.5)	2,194	9.7 (1.0)	2,890	7.1 (0.5)
소득수준[2]						
하	5,029	7.8 (0.5)	2,164	9.0 (0.7)	2,865	6.7 (0.5)
중하	5,034	7.1 (0.4)	2,142	8.4 (0.8)	2,892	5.9 (0.5)
중상	5,044	6.5 (0.5)	2,156	7.2 (0.7)	2,888	5.9 (0.5)
상	5,041	7.1 (0.5)	2,153	8.0 (0.8)	2,888	6.3 (0.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	15,436	6.9 (0.3)	6,571	7.7 (0.4)	8,865	5.9 (0.3)
읍면	5,084	8.4 (0.7)	2,194	10.1 (1.3)	2,890	6.3 (0.6)
소득수준(표준화)						
하	5,029	7.8 (0.5)	2,164	8.9 (0.7)	2,865	6.7 (0.5)
중하	5,034	7.1 (0.5)	2,142	8.4 (0.8)	2,892	5.7 (0.5)
중상	5,044	6.5 (0.5)	2,156	7.2 (0.8)	2,888	5.8 (0.5)
상	5,041	7.2 (0.5)	2,153	8.1 (0.8)	2,888	6.1 (0.5)

1) 연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-9. 소아청소년 연간손상경험률[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	7,119	7.9 (0.4)	3,717	10.0 (0.6)	3,402	5.5 (0.4)
연령(세)						
1-5	1,924	9.3 (0.8)	993	11.1 (1.1)	931	7.2 (1.1)
6-11	2,646	7.9 (0.6)	1,375	9.0 (0.9)	1,271	6.7 (0.8)
12-14	1,270	6.8 (0.8)	678	9.9 (1.4)	592	3.2 (0.8)
15-18	1,279	7.6 (0.9)	671	10.5 (1.3)	608	4.1 (1.0)
1-11	4,570	8.4 (0.5)	2,368	9.8 (0.7)	2,202	6.9 (0.7)
12-18	2,549	7.2 (0.6)	1,349	10.3 (1.0)	1,200	3.7 (0.6)
거주지역						
동	5,965	7.9 (0.4)	3,107	10.2 (0.7)	2,858	5.3 (0.5)
읍면	1,154	7.7 (1.0)	610	9.0 (1.5)	544	6.2 (1.1)
소득수준[2]						
하	1,719	8.1 (0.7)	907	9.8 (1.1)	812	6.2 (0.9)
중하	1,748	8.2 (0.8)	893	11.1 (1.3)	855	5.2 (0.9)
중상	1,771	7.4 (0.7)	934	10.5 (1.1)	837	3.6 (0.7)
상	1,781	7.6 (0.8)	932	8.6 (1.1)	849	6.6 (1.1)

1) 소아청소년 연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-V-10. 계절별[1]손상경험률[2] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,524	23.6 (1.4)	27.5 (1.5)	27.6 (1.5)	21.4 (1.4)
연령(세)					
19-29	218	23.5 (3.4)	32.8 (3.7)	23.2 (3.3)	20.5 (3.4)
30-39	271	22.9 (2.6)	26.8 (3.1)	28.8 (3.3)	21.4 (2.8)
40-49	275	23.8 (2.9)	25.1 (3.2)	29.4 (3.2)	21.7 (2.7)
50-59	292	20.2 (2.8)	27.0 (2.9)	32.1 (3.2)	20.7 (2.7)
60-69	233	23.6 (3.4)	30.6 (3.6)	21.6 (3.4)	24.3 (3.6)
70+	235	30.7 (3.8)	18.2 (3.1)	29.7 (3.6)	21.4 (3.5)
19-64	1,176	22.9 (1.6)	28.1 (1.7)	27.7 (1.6)	21.4 (1.5)
65+	348	28.2 (2.9)	23.7 (2.8)	26.4 (2.9)	21.7 (2.9)
거주지역					
동	1,087	22.1 (1.5)	26.9 (1.7)	29.1 (1.7)	21.9 (1.6)
읍면	437	28.2 (3.1)	29.5 (3.5)	22.6 (2.9)	19.7 (2.9)
소득수준[3]					
하	422	20.4 (2.4)	28.2 (2.7)	30.2 (2.8)	21.3 (2.3)
중하	358	22.1 (2.5)	26.9 (2.8)	28.8 (3.0)	22.1 (2.9)
중상	361	25.6 (2.9)	30.2 (3.2)	25.2 (3.1)	18.9 (3.0)
상	359	25.7 (3.0)	24.6 (2.9)	26.4 (2.7)	23.3 (2.5)
거주지역(표준화)[4]					
동	1,087	22.3 (1.5)	26.8 (1.7)	28.9 (1.7)	22.0 (1.6)
읍면	437	28.6 (3.5)	29.7 (3.2)	22.7 (2.7)	19.0 (3.2)
소득수준(표준화)					
하	422	19.6 (2.2)	28.9 (2.8)	30.1 (2.8)	21.4 (2.4)
중하	358	22.5 (2.4)	26.7 (3.0)	28.5 (3.0)	22.3 (2.9)
중상	361	24.7 (2.5)	30.0 (3.0)	25.8 (2.7)	19.5 (2.8)
상	359	26.0 (2.9)	25.5 (2.9)	25.2 (2.6)	23.2 (2.5)

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-11. 계절별[1]손상경험률[2] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	714	25.0 (2.0)	28.6 (2.1)	27.1 (2.0)	19.3 (1.8)
연령(세)					
19-29	124	22.6 (4.4)	37.1 (4.7)	22.3 (4.4)	18.0 (4.2)
30-39	140	26.4 (3.7)	25.4 (3.9)	27.8 (4.3)	20.4 (3.8)
40-49	144	28.3 (4.1)	23.5 (4.0)	29.5 (4.3)	18.7 (3.2)
50-59	128	23.8 (4.5)	26.1 (4.3)	31.0 (4.3)	19.1 (3.8)
60-69	99	19.8 (4.1)	33.6 (5.1)	26.3 (5.6)	20.3 (4.6)
70+	79	30.4 (6.1)	17.3 (4.7)	29.0 (6.0)	23.2 (6.6)
19-64	588	24.9 (2.1)	29.0 (2.2)	27.2 (2.2)	18.9 (2.0)
65+	126	26.3 (4.1)	24.7 (4.5)	25.3 (5.2)	23.7 (4.8)
거주지역					
동	501	23.1 (2.1)	27.7 (2.2)	29.2 (2.3)	19.9 (2.0)
읍면	213	30.9 (4.4)	31.4 (4.6)	20.5 (3.9)	17.3 (4.0)
소득수준[3]					
하	205	24.7 (3.6)	28.2 (3.8)	30.7 (3.8)	16.4 (2.9)
중하	174	23.1 (3.3)	24.8 (4.0)	28.9 (4.1)	23.2 (3.8)
중상	163	25.9 (4.2)	33.8 (4.3)	23.1 (4.5)	17.3 (4.3)
상	159	24.9 (4.3)	28.1 (4.6)	26.0 (3.7)	21.1 (3.4)
거주지역(표준화)[4]					
동	501	23.3 (2.0)	27.1 (2.1)	29.3 (2.2)	20.4 (2.0)
읍면	213	30.8 (4.8)	29.3 (3.9)	22.5 (3.4)	17.5 (4.2)
소득수준(표준화)					
하	205	24.1 (3.3)	28.4 (3.8)	30.7 (3.8)	16.8 (3.0)
중하	174	- -[5]	- -	- -	- -
중상	163	- -	- -	- -	- -
상	159	- -	- -	- -	- -

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-12. 계절별[1]손상경험률[2] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	810	21.7 (1.8)	26.0 (2.0)	28.2 (2.0)	24.1 (1.9)
연령(세)					
19-29	94	25.3 (5.4)	24.2 (4.9)	25.1 (4.8)	25.4 (5.0)
30-39	131	16.8 (3.4)	29.2 (4.6)	30.7 (5.0)	23.3 (4.3)
40-49	131	17.8 (3.9)	27.3 (5.4)	29.3 (4.7)	25.6 (4.5)
50-59	164	16.5 (3.1)	28.0 (4.0)	33.2 (4.3)	22.3 (3.6)
60-69	134	27.0 (5.2)	27.9 (4.9)	17.4 (3.4)	27.8 (4.7)
70+	156	30.8 (4.8)	18.6 (3.8)	30.0 (4.5)	20.6 (4.1)
19-64	588	19.9 (2.0)	26.7 (2.3)	28.5 (2.2)	25.0 (2.1)
65+	222	29.2 (3.9)	23.2 (3.5)	27.1 (3.6)	20.5 (3.4)
거주지역					
동	586	20.9 (2.1)	25.8 (2.3)	28.9 (2.3)	24.4 (2.2)
읍면	224	24.4 (3.8)	26.8 (4.2)	25.7 (3.6)	23.1 (3.7)
소득수준[3]					
하	217	14.9 (2.6)	28.1 (3.9)	29.6 (4.1)	27.3 (3.7)
중하	184	20.8 (3.8)	29.7 (3.8)	28.7 (4.0)	20.7 (3.8)
중상	198	25.3 (3.9)	25.5 (4.7)	28.1 (3.6)	21.2 (3.7)
상	200	26.7 (4.1)	20.5 (3.1)	26.9 (3.7)	25.9 (3.5)
거주지역(표준화)[4]					
동	586	20.7 (2.0)	25.9 (2.3)	28.6 (2.3)	24.8 (2.2)
읍면	224	- -[5]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	217	14.4 (2.7)	29.7 (4.2)	27.9 (3.9)	27.9 (4.0)
중하	184	- -	- -	- -	- -
중상	198	- -	- -	- -	- -
상	200	27.6 (4.3)	21.2 (3.2)	25.9 (3.6)	25.3 (3.6)

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-13. 소아청소년 계절별[1]손상경험률[2] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1-18세	587	26.0 (2.0)	31.5 (2.3)	25.9 (2.2)	16.6 (1.7)
성별					
남자	394	24.8 (2.3)	33.7 (2.7)	25.8 (2.7)	15.7 (2.2)
여자	193	28.5 (3.6)	26.7 (3.5)	26.1 (3.7)	18.6 (3.2)
연령(세)					
1-5	180	20.7 (3.1)	26.5 (3.7)	33.1 (4.6)	19.7 (3.2)
6-11	215	29.8 (3.4)	35.0 (3.7)	24.0 (3.3)	11.2 (2.3)
12-14	93	30.2 (4.7)	39.1 (5.6)	18.5 (4.2)	12.2 (3.9)
15-18	99	23.9 (4.7)	27.4 (5.0)	25.7 (5.4)	23.0 (4.8)
1-11	395	25.7 (2.3)	31.2 (2.7)	28.1 (2.9)	15.0 (1.9)
12-18	192	26.3 (3.4)	31.8 (3.8)	22.9 (3.7)	18.9 (3.5)
거주지역					
동	495	24.6 (2.1)	32.5 (2.4)	25.2 (2.3)	17.7 (1.9)
읍면	92	33.6 (5.6)	25.8 (5.5)	29.9 (6.4)	10.8 (3.5)
소득수준[3]					
하	153	25.5 (3.9)	35.6 (4.6)	24.5 (4.4)	14.4 (3.4)
중하	142	20.7 (3.3)	30.4 (4.4)	33.7 (5.1)	15.2 (3.9)
중상	143	26.7 (4.3)	27.0 (4.7)	30.3 (4.6)	15.9 (3.3)
상	137	30.1 (4.7)	33.0 (5.0)	15.2 (3.5)	21.8 (4.1)

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-V-14. 연간손상원인 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/미끄러짐	부딪힘	열상/자상/절단/관통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,528	32.9 (1.6)	30.6 (1.5)	15.9 (1.2)	6.8 (0.8)	2.7 (0.6)	7.0 (1.4)	4.1 (0.6)
연령(세)								
19-29	218	33.3 (4.2)	24.3 (3.3)	17.1 (3.2)	7.4 (2.2)	4.0 (1.8)	10.5 (5.4)	3.4 (1.3)
30-39	271	42.5 (3.6)	22.2 (2.8)	14.9 (2.5)	6.1 (1.6)	2.8 (1.1)	6.5 (1.9)	4.8 (1.4)
40-49	275	36.8 (3.4)	28.2 (3.1)	15.3 (2.5)	7.1 (1.7)	2.3 (1.1)	6.1 (1.4)	4.2 (1.4)
50-59	290	31.7 (3.3)	31.4 (3.5)	14.6 (2.3)	9.3 (2.0)	3.7 (1.5)	6.3 (1.6)	3.1 (1.2)
60-69	234	23.4 (3.5)	42.7 (4.1)	18.4 (3.2)	5.3 (1.6)	1.2 (0.6)	4.8 (1.5)	4.3 (1.4)
70+	240	14.2 (2.7)	55.7 (4.3)	16.5 (3.4)	3.2 (1.1)	0.2 (0.2)	4.5 (1.5)	5.6 (2.5)
19-64	1,174	35.6 (1.8)	26.9 (1.6)	15.6 (1.3)	7.4 (0.9)	3.1 (0.7)	7.4 (1.6)	4.0 (0.7)
65+	354	15.1 (2.2)	54.2 (3.6)	17.8 (2.9)	3.2 (0.9)	0.3 (0.2)	4.4 (1.3)	4.9 (1.8)
거주지역								
동	1,092	34.9 (1.8)	29.9 (1.7)	15.3 (1.2)	6.8 (1.0)	3.3 (0.8)	6.4 (1.2)	3.4 (0.6)
읍면	436	26.1 (3.4)	32.8 (2.9)	18.1 (2.8)	6.9 (1.4)	0.8 (0.4)	8.9 (4.4)	6.3 (1.6)
소득수준[1)]								
하	422	36.5 (3.0)	31.4 (2.7)	14.4 (1.9)	6.7 (1.4)	2.2 (0.7)	4.0 (1.1)	5.0 (1.3)
중하	359	31.0 (2.9)	31.5 (3.1)	17.1 (2.4)	7.1 (1.5)	3.1 (1.2)	5.3 (1.4)	4.9 (1.5)
중상	365	31.1 (3.6)	26.9 (3.0)	16.8 (2.6)	5.1 (1.3)	1.7 (0.9)	14.6 (5.0)	3.8 (1.3)
상	358	32.2 (2.9)	32.8 (2.7)	14.4 (2.4)	8.7 (2.2)	4.3 (1.7)	4.9 (1.3)	2.7 (0.9)
거주지역(표준화)[2)]								
동	1,092	34.7 (1.8)	30.2 (1.6)	15.3 (1.3)	6.7 (0.9)	3.2 (0.8)	6.4 (1.2)	3.5 (0.6)
읍면	436	31.4 (3.4)	27.1 (2.3)	18.7 (3.6)	6.6 (1.5)	0.9 (0.5)	9.7 (3.4)	5.5 (1.6)
소득수준(표준화)								
하	422	37.3 (3.1)	31.2 (2.7)	14.5 (2.0)	6.3 (1.3)	2.2 (0.7)	3.7 (1.1)	4.8 (1.2)
중하	359	31.8 (2.9)	29.9 (2.9)	17.3 (2.4)	7.6 (1.6)	3.3 (1.3)	5.2 (1.4)	4.8 (1.4)
중상	365	32.5 (3.2)	26.0 (2.8)	17.0 (2.5)	5.0 (1.2)	1.8 (0.9)	13.8 (3.4)	3.9 (1.3)
상	358	33.7 (2.9)	32.4 (2.6)	14.1 (2.3)	8.1 (1.9)	4.1 (1.6)	5.2 (1.4)	2.6 (0.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-15. 연간손상원인 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/미끄러짐	부딪힘	열상/자상/절단/관통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	714	34.5 (2.3)	26.1 (1.9)	16.8 (1.6)	8.3 (1.2)	2.2 (0.7)	8.2 (2.4)	3.9 (0.8)
연령(세)								
19-29	124	32.5 (5.7)	23.3 (4.1)	16.2 (4.1)	8.4 (3.0)	2.0 (1.4)	14.9 (7.6)	2.8 (1.5)
30-39	140	37.8 (4.8)	20.7 (3.7)	18.2 (3.5)	8.9 (2.4)	1.1 (0.8)	8.0 (2.9)	5.3 (2.0)
40-49	144	38.8 (4.5)	28.7 (4.2)	17.5 (3.7)	5.8 (1.9)	2.3 (1.5)	3.8 (1.6)	3.2 (1.6)
50-59	128	32.4 (4.6)	25.5 (4.4)	15.9 (3.5)	13.3 (3.4)	5.0 (2.5)	4.5 (2.0)	3.4 (2.0)
60-69	99	30.4 (4.6)	29.3 (5.0)	21.4 (4.8)	7.3 (2.8)	1.2 (0.8)	5.2 (2.3)	5.2 (2.2)
70+	79	26.4 (5.6)	51.6 (6.7)	6.1 (3.2)	2.7 (1.9)	0.7 (0.7)	6.4 (3.9)	6.1 (2.7)
19-64	588	35.3 (2.5)	24.5 (2.0)	17.0 (1.8)	8.7 (1.3)	2.3 (0.8)	8.4 (2.6)	3.7 (0.8)
65+	126	26.6 (4.2)	43.1 (5.4)	14.3 (4.6)	3.7 (1.6)	0.9 (0.7)	5.8 (3.2)	5.5 (1.9)
거주지역								
동	501	37.0 (2.6)	26.6 (2.2)	15.4 (1.7)	8.3 (1.5)	2.7 (1.0)	6.7 (2.1)	3.4 (0.8)
읍면	213	27.0 (5.0)	24.7 (3.8)	21.0 (4.4)	8.4 (2.1)	0.7 (0.4)	12.7 (6.9)	5.5 (1.9)
소득수준[1]								
하	205	38.7 (4.1)	30.1 (4.0)	13.8 (2.7)	6.4 (1.8)	1.9 (0.9)	4.1 (1.6)	5.1 (1.6)
중하	174	35.6 (3.9)	25.2 (3.9)	18.2 (3.5)	10.1 (2.3)	2.7 (1.7)	5.3 (2.1)	3.0 (1.4)
중상	163	28.2 (5.0)	20.1 (3.6)	18.3 (4.0)	7.2 (2.1)	0.0 (-)[3]	20.2 (8.1)	5.9 (2.3)
상	159	34.6 (4.4)	29.0 (3.9)	16.1 (3.7)	10.1 (3.5)	4.6 (2.0)	4.2 (1.7)	1.5 (0.9)
거주지역(표준화)[2]								
동	501	36.5 (2.5)	28.1 (2.1)	15.2 (1.6)	7.8 (1.3)	2.6 (0.9)	6.4 (1.7)	3.4 (0.8)
읍면	213	30.7 (4.7)	23.2 (3.4)	21.5 (4.6)	7.9 (2.1)	0.6 (0.3)	11.4 (3.7)	4.8 (1.6)
소득수준(표준화)								
하	205	39.0 (4.1)	30.7 (4.0)	13.5 (2.4)	5.8 (1.6)	1.8 (0.8)	4.2 (1.7)	5.1 (1.5)
중하	174	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	163	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	159	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-16. 연간손상원인 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/미끄러짐	부딪힘	열상/자상/절단/관통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	814	30.7 (2.1)	36.3 (2.1)	14.9 (1.5)	4.9 (0.9)	3.4 (1.1)	5.4 (0.9)	4.4 (1.0)
연령(세)								
19-29	94	35.0 (5.4)	26.2 (5.2)	19.0 (4.3)	5.5 (2.5)	7.9 (4.3)	1.8 (1.5)	4.6 (2.6)
30-39	131	50.8 (5.1)	24.9 (4.4)	9.2 (2.7)	1.3 (0.7)	5.8 (2.5)	3.9 (1.8)	4.1 (1.9)
40-49	131	34.2 (5.0)	27.7 (4.4)	12.4 (3.2)	8.9 (3.0)	2.2 (1.8)	9.2 (2.6)	5.5 (2.5)
50-59	162	31.0 (4.5)	37.3 (5.1)	13.2 (2.9)	5.2 (1.9)	2.4 (1.2)	8.2 (2.5)	2.7 (1.2)
60-69	135	17.2 (5.0)	54.4 (5.9)	15.6 (4.0)	3.6 (1.7)	1.2 (0.9)	4.4 (2.3)	3.5 (1.5)
70+	161	8.8 (2.7)	57.6 (5.4)	21.1 (4.3)	3.4 (1.4)	0.0 (-)[3]	3.6 (1.6)	5.5 (3.3)
19-64	586	36.1 (2.5)	30.3 (2.4)	13.7 (1.6)	5.5 (1.1)	4.2 (1.3)	5.9 (1.1)	4.3 (1.0)
65+	228	8.7 (2.2)	60.5 (4.5)	19.8 (3.5)	2.9 (1.1)	0.0 (-)	3.5 (1.3)	4.6 (2.6)
거주지역								
동	591	32.3 (2.5)	33.9 (2.4)	15.2 (1.7)	5.0 (1.1)	4.1 (1.4)	6.0 (1.1)	3.5 (0.9)
읍면	223	24.9 (4.1)	44.8 (4.3)	13.9 (2.4)	4.7 (1.3)	0.9 (0.5)	3.3 (1.4)	7.6 (3.1)
소득수준[1]								
하	217	33.7 (4.1)	33.0 (3.8)	15.1 (2.9)	7.0 (2.3)	2.5 (1.2)	3.8 (1.4)	4.9 (2.0)
중하	185	25.0 (4.1)	39.8 (4.8)	15.6 (2.9)	3.3 (1.3)	3.6 (1.8)	5.3 (1.8)	7.5 (2.9)
중상	202	34.8 (4.8)	35.7 (4.1)	14.9 (3.1)	2.3 (1.1)	3.9 (2.0)	7.4 (2.0)	1.0 (0.6)
상	199	29.4 (3.7)	37.4 (3.8)	12.3 (2.6)	7.1 (2.2)	3.9 (2.9)	5.8 (2.1)	4.1 (1.5)
거주지역(표준화)[2]								
동	591	34.0 (2.5)	32.4 (2.4)	14.7 (1.7)	5.0 (1.1)	4.5 (1.5)	5.7 (1.0)	3.7 (1.0)
읍면	223	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	217	36.3 (4.3)	31.6 (3.7)	15.1 (3.1)	5.9 (1.7)	3.0 (1.3)	3.7 (1.2)	4.4 (1.7)
중하	185	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	202	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	199	33.0 (4.0)	33.9 (3.7)	12.5 (2.7)	6.4 (2.0)	3.7 (2.7)	5.9 (2.1)	4.6 (1.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-17. 소아청소년 연간손상원인 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/미끄러짐	부딪힘	열상/자상/절단/관통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1-18세	585	14.9 (2.0)	32.8 (2.4)	36.2 (2.3)	6.9 (1.2)	1.3 (0.7)	2.8 (0.7)	5.2 (1.1)
성별								
남자	392	13.2 (2.4)	32.7 (3.0)	39.5 (2.8)	7.3 (1.4)	0.3 (0.2)	2.7 (0.9)	4.3 (1.2)
여자	193	18.5 (3.3)	33.0 (3.9)	29.2 (4.2)	6.0 (2.1)	3.2 (1.9)	2.8 (1.4)	7.2 (2.2)
연령(세)								
1-5	180	10.4 (3.9)	33.3 (3.9)	33.4 (3.8)	8.3 (2.1)	2.1 (1.4)	1.2 (0.8)	11.3 (2.8)
6-11	214	17.9 (3.1)	35.3 (3.8)	33.7 (3.5)	6.9 (1.8)	0.0 (-)[2]	2.8 (1.3)	3.4 (1.5)
12-14	93	11.0 (3.6)	24.3 (5.0)	52.8 (5.8)	7.8 (3.3)	1.3 (1.2)	0.9 (0.9)	2.0 (1.4)
15-18	98	17.9 (4.2)	34.5 (6.3)	31.9 (5.5)	4.8 (2.6)	2.0 (2.0)	5.4 (2.2)	3.5 (2.0)
1-11	394	14.6 (2.4)	34.4 (2.6)	33.6 (2.5)	7.5 (1.4)	0.9 (0.6)	2.1 (0.8)	6.9 (1.5)
12-18	191	15.3 (3.0)	30.6 (4.4)	39.8 (4.2)	6.0 (2.0)	1.7 (1.3)	3.7 (1.4)	2.9 (1.4)
거주지역								
동	494	13.9 (1.9)	32.4 (2.7)	36.5 (2.5)	7.8 (1.3)	1.4 (0.8)	2.8 (0.8)	5.2 (1.2)
읍면	91	20.2 (6.5)	35.0 (5.4)	34.2 (5.9)	1.7 (1.3)	0.5 (0.6)	2.8 (1.9)	5.5 (2.9)
소득수준[1]								
하	152	25.6 (4.9)	26.1 (3.9)	29.7 (4.4)	8.7 (2.9)	0.3 (0.3)	4.7 (1.8)	5.0 (2.0)
중하	140	8.7 (2.8)	36.3 (5.5)	38.3 (4.9)	6.9 (2.5)	0.8 (0.8)	2.5 (1.3)	6.5 (2.3)
중상	143	13.4 (3.8)	34.4 (5.0)	37.0 (4.6)	7.0 (2.0)	2.1 (1.6)	0.6 (0.6)	5.5 (2.0)
상	138	9.9 (2.8)	36.6 (5.1)	40.5 (5.1)	4.5 (1.5)	2.3 (2.2)	3.2 (1.8)	3.1 (1.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-18. 연간의도성손상 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,528	98.2 (0.7)	0.8 (0.4)	1.0 (0.4)	712	98.0 (1.1)	1.0 (0.8)	1.0 (0.5)	816	98.4 (0.6)	0.5 (0.2)	1.0 (0.6)
연령(세)												
19-29	217	96.0 (2.4)	2.4 (1.7)	1.6 (0.9)	123	95.0 (3.4)	3.4 (2.5)	1.6 (1.1)	94	97.8 (1.7)	0.6 (0.6)	1.6 (1.6)
30-39	270	99.3 (0.4)	0.7 (0.4)	0.0 (-)[3]	139	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	131	98.2 (1.1)	1.8 (1.1)	0.0 (-)
40-49	275	97.4 (1.4)	0.0 (-)	2.6 (1.4)	144	98.0 (1.8)	0.0 (-)	2.0 (1.8)	131	96.7 (2.2)	0.0 (-)	3.3 (2.2)
50-59	292	99.6 (0.3)	0.0 (-)	0.4 (0.3)	128	99.3 (0.7)	0.0 (-)	0.7 (0.7)	164	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)
60-69	234	98.9 (0.5)	0.6 (0.4)	0.5 (0.3)	99	99.0 (0.7)	0.5 (0.5)	0.5 (0.5)	135	98.9 (0.8)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)
70+	240	99.8 (0.2)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	79	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	161	99.7 (0.3)	0.3 (0.3)	0.0 (-)
19-64	1,174	98.0 (0.8)	0.8 (0.5)	1.2 (0.4)	586	97.8 (1.2)	1.0 (0.8)	1.1 (0.6)	588	98.2 (0.7)	0.6 (0.3)	1.2 (0.7)
65+	354	99.5 (0.3)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)	126	99.5 (0.5)	0.5 (0.5)	0.0 (-)	228	99.5 (0.3)	0.2 (0.2)	0.3 (0.3)
거주지역												
동	1,091	99.0 (0.3)	0.4 (0.2)	0.7 (0.3)	499	99.3 (0.3)	0.3 (0.2)	0.4 (0.3)	592	98.6 (0.6)	0.4 (0.2)	1.0 (0.6)
읍면	437	95.6 (2.4)	2.1 (1.7)	2.3 (1.2)	213	94.0 (3.9)	3.0 (2.7)	2.9 (1.8)	224	97.9 (1.4)	0.8 (0.6)	1.3 (1.3)
소득수준[1]												
하	422	98.0 (0.9)	0.4 (0.2)	1.7 (0.9)	205	99.8 (0.2)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	217	95.7 (2.0)	0.6 (0.4)	3.7 (2.0)
중하	358	98.1 (1.0)	0.4 (0.4)	1.4 (0.9)	173	96.9 (1.8)	0.7 (0.7)	2.4 (1.7)	185	99.8 (0.2)	0.0 (-)	0.2 (0.2)
중상	366	96.8 (2.3)	2.1 (1.6)	1.0 (0.7)	163	95.0 (3.8)	3.1 (2.8)	1.9 (1.2)	203	99.2 (0.6)	0.8 (0.6)	0.0 (-)
상	358	99.8 (0.2)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	158	100.0 (0.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	200	99.5 (0.5)	0.5 (0.5)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[2]												
동	1,091	99.0 (0.3)	0.4 (0.2)	0.7 (0.3)	499	99.3 (0.3)	0.3 (0.2)	0.4 (0.2)	592	98.5 (0.7)	0.5 (0.3)	1.0 (0.6)
읍면	437	94.6 (2.1)	2.9 (1.6)	2.5 (1.1)	213	94.8 (2.6)	2.6 (1.6)	2.6 (1.5)	224	- -[4]	- -	- -
소득수준(표준화)												
하	422	98.0 (0.9)	0.4 (0.3)	1.6 (0.9)	205	99.8 (0.2)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	217	95.7 (2.0)	0.8 (0.6)	3.5 (1.9)
중하	358	98.1 (1.1)	0.4 (0.4)	1.5 (1.0)	173	- -	- -	- -	185	- -	- -	- -
중상	366	97.1 (1.6)	2.0 (1.2)	0.9 (0.5)	163	- -	- -	- -	203	- -	- -	- -
상	358	99.7 (0.3)	0.3 (0.3)	0.0 (-)	158	- -	- -	- -	200	99.3 (0.6)	0.7 (0.6)	0.0 (-)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-19. 연간손상치료처 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	응급실/병의원외래	병의원 입원	기타	N	응급실/병의원외래	병의원 입원	기타	N	응급실/병의원외래	병의원 입원	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,524	68.5 (1.6)	31.3 (1.6)	0.2 (0.1)	710	68.4 (2.2)	31.3 (2.2)	0.3 (0.2)	814	68.5 (2.0)	31.4 (2.0)	0.1 (0.1)
연령(세)												
19-29	217	72.8 (3.7)	27.2 (3.7)	0.0 (-)[3]	123	75.9 (4.5)	24.1 (4.5)	0.0 (-)	94	66.5 (5.5)	33.5 (5.4)	0.0 (-)
30-39	268	67.2 (3.7)	32.5 (3.7)	0.3 (0.3)	138	67.4 (4.7)	32.1 (4.7)	0.5 (0.5)	130	66.9 (4.9)	33.1 (4.9)	0.0 (-)
40-49	275	68.1 (3.3)	31.2 (3.3)	0.7 (0.5)	144	64.6 (4.5)	34.6 (4.5)	0.8 (0.8)	131	72.6 (4.4)	26.8 (4.4)	0.6 (0.6)
50-59	290	64.1 (3.3)	35.9 (3.3)	0.0 (-)	127	63.3 (5.0)	36.7 (5.0)	0.0 (-)	163	64.8 (4.3)	35.2 (4.5)	0.0 (-)
60-69	234	67.6 (3.6)	32.4 (3.6)	0.0 (-)	99	67.8 (5.2)	32.2 (5.2)	0.0 (-)	135	67.5 (5.4)	32.5 (5.4)	0.0 (-)
70+	240	69.6 (3.7)	30.4 (3.7)	0.0 (-)	79	63.4 (6.7)	36.6 (6.7)	0.0 (-)	161	72.3 (4.4)	27.7 (4.4)	0.0 (-)
19-64	1,170	68.3 (1.8)	31.5 (1.8)	0.2 (0.1)	584	68.7 (2.3)	31.0 (2.3)	0.3 (0.2)	586	67.7 (2.3)	32.1 (2.3)	0.2 (0.2)
65+	354	69.5 (3.1)	30.5 (3.1)	0.0 (-)	126	65.3 (5.1)	34.7 (5.1)	0.0 (-)	228	71.8 (3.8)	28.2 (3.8)	0.0 (-)
거주지역												
동	1,088	67.8 (1.8)	31.9 (1.8)	0.3 (0.2)	498	67.0 (2.4)	32.6 (2.4)	0.4 (0.3)	590	68.8 (2.3)	31.1 (2.3)	0.2 (0.2)
읍면	436	70.6 (3.2)	29.4 (3.2)	0.0 (-)	212	72.6 (4.2)	27.4 (4.2)	0.0 (-)	224	67.6 (3.7)	32.4 (3.7)	0.0 (-)
소득수준[1]												
하	420	63.2 (2.9)	36.2 (2.9)	0.6 (0.4)	203	64.2 (3.8)	34.7 (3.8)	1.1 (0.8)	217	61.9 (4.1)	38.1 (4.1)	0.0 (-)
중하	358	67.8 (3.0)	32.2 (3.0)	0.0 (-)	174	69.1 (3.9)	30.9 (3.9)	0.0 (-)	184	66.0 (4.1)	34.0 (4.1)	0.0 (-)
중상	364	72.1 (3.1)	27.9 (3.1)	0.0 (-)	161	70.5 (4.6)	29.5 (4.6)	0.0 (-)	203	74.2 (3.8)	25.8 (3.8)	0.0 (-)
상	358	72.5 (2.5)	27.3 (2.6)	0.2 (0.2)	159	72.4 (3.8)	27.6 (3.8)	0.0 (-)	199	72.5 (3.4)	27.0 (3.4)	0.5 (0.5)
거주지역(표준화)[2]												
동	1,088	67.8 (1.8)	31.9 (1.8)	0.3 (0.2)	498	66.5 (2.4)	33.1 (2.3)	0.4 (0.3)	590	68.8 (2.3)	31.0 (2.3)	0.2 (0.2)
읍면	436	69.3 (3.9)	30.7 (3.9)	0.0 (-)	212	70.1 (5.0)	29.9 (5.0)	0.0 (-)	224	- -[4]	- -	- -
소득수준(표준화)												
하	420	62.4 (2.9)	37.0 (2.9)	0.6 (0.4)	203	64.2 (3.8)	34.7 (3.8)	1.0 (0.7)	217	60.4 (4.2)	39.6 (4.2)	0.0 (-)
중하	358	67.7 (3.1)	32.3 (3.1)	0.0 (-)	174	- -	- -	- -	184	- -	- -	- -
중상	364	71.6 (3.0)	28.4 (3.0)	0.0 (-)	161	- -	- -	- -	203	- -	- -	- -
상	358	72.7 (2.6)	27.0 (2.6)	0.3 (0.3)	159	- -	- -	- -	199	74.0 (3.4)	25.3 (3.3)	0.7 (0.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-20. 연간손상 와병경험률[1], 결근결석경험률[2] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	와병경험률						결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	1,529	47.5 (1.7)	713	44.6 (2.4)	816	51.2 (2.2)	1,370	44.7 (1.9)	681	49.5 (2.6)	689	37.6 (2.4)
연령(세)												
19-29	218	43.0 (4.6)	124	41.1 (5.9)	94	46.8 (6.0)	213	42.7 (4.6)	122	42.4 (6.1)	91	43.3 (5.7)
30-39	271	43.3 (3.5)	140	42.5 (4.6)	131	44.5 (5.2)	246	45.6 (3.7)	137	52.5 (4.8)	109	31.7 (5.3)
40-49	275	44.7 (3.5)	144	43.3 (4.6)	131	46.5 (5.4)	258	50.8 (3.7)	143	52.8 (4.7)	115	47.8 (6.0)
50-59	291	52.0 (3.5)	127	48.0 (5.0)	164	56.1 (4.9)	263	50.6 (3.7)	119	55.9 (5.2)	144	44.6 (5.0)
60-69	234	54.5 (4.3)	99	53.8 (6.1)	135	55.1 (5.6)	202	33.8 (4.0)	91	48.4 (6.0)	111	19.5 (4.2)
70+	240	59.2 (4.1)	79	55.0 (6.7)	161	61.1 (5.0)	188	31.0 (4.7)	69	44.6 (7.9)	119	24.4 (4.9)
19-64	1,175	45.8 (2.0)	587	43.8 (2.6)	588	48.7 (2.6)	1,083	46.4 (2.1)	569	50.0 (2.9)	514	40.5 (2.7)
65+	354	58.4 (3.4)	126	53.4 (5.3)	228	61.2 (4.3)	287	31.4 (3.6)	112	42.6 (5.8)	175	24.3 (4.0)
거주지역												
동	1,092	47.4 (2.0)	500	45.0 (2.8)	592	50.4 (2.6)	965	43.6 (2.1)	474	50.2 (2.8)	491	34.5 (2.7)
읍면	437	47.9 (3.7)	213	43.6 (5.0)	224	54.1 (4.1)	405	47.9 (4.4)	207	47.3 (6.2)	198	49.0 (4.5)
소득수준[3]												
하	421	50.5 (2.9)	204	49.7 (3.9)	217	51.4 (4.1)	373	46.2 (3.2)	188	49.6 (4.1)	185	41.6 (4.6)
중하	359	49.9 (3.3)	174	41.3 (4.5)	185	61.0 (4.2)	323	46.7 (3.6)	169	49.6 (4.7)	154	42.2 (5.0)
중상	366	40.2 (3.7)	163	38.0 (5.7)	203	43.1 (4.6)	331	40.7 (4.2)	158	45.4 (6.4)	173	33.9 (5.5)
상	359	46.9 (3.1)	159	46.3 (5.0)	200	47.7 (4.2)	321	43.2 (3.3)	153	51.4 (4.9)	168	31.7 (3.7)
거주지역(표준화)[4]												
동	1,092	47.4 (1.9)	500	45.4 (2.6)	592	49.3 (2.6)	965	42.9 (2.0)	474	49.9 (2.7)	491	34.6 (2.6)
읍면	437	45.7 (3.1)	213	44.6 (3.4)	224	- -[5]	405	50.2 (3.8)	207	50.6 (4.4)	198	- -
소득수준(표준화)												
하	421	50.1 (2.9)	204	50.3 (3.8)	217	48.6 (4.1)	373	46.4 (3.1)	188	49.5 (4.0)	185	42.3 (4.5)
중하	359	49.2 (3.4)	174	- -	185	- -	323	47.1 (3.6)	169	- -	154	- -
중상	366	40.6 (3.1)	163	- -	203	- -	331	41.7 (3.6)	158	- -	173	- -
상	359	46.7 (3.1)	159	- -	200	45.6 (4.4)	321	43.7 (3.2)	153	- -	168	34.0 (4.0)

1) 연간손상 와병경험률 : 최근 1년간 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 연간손상 결근결석경험률 : 최근 1년간 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-21. 소아청소년 연간의도성손상 : 성별, 만1-18세, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	불의의사고 분율 (표준오차)	의도적자해 분율 (표준오차)	타인의폭력 분율 (표준오차)	N	불의의사고 분율 (표준오차)	의도적자해 분율 (표준오차)	타인의폭력 분율 (표준오차)	N	불의의사고 분율 (표준오차)	의도적자해 분율 (표준오차)	타인의폭력 분율 (표준오차)
1-18세	586	94.9 (1.0)	1.3 (0.6)	3.8 (0.9)	393	94.8 (1.2)	0.3 (0.2)	4.9 (1.2)	193	95.2 (2.0)	3.4 (1.9)	1.4 (0.8)
연령(세)												
1-5	180	97.4 (1.2)	1.0 (0.8)	1.6 (1.0)	123	97.1 (1.5)	0.4 (0.4)	2.5 (1.5)	57	97.9 (2.1)	2.1 (2.1)	0.0 (-)[1]
6-11	214	98.0 (1.0)	0.6 (0.6)	1.4 (0.8)	126	98.4 (1.2)	0.0 (-)	1.6 (1.2)	88	97.4 (1.8)	1.5 (1.5)	1.1 (1.1)
12-14	93	86.9 (4.0)	2.0 (1.5)	11.1 (3.8)	71	86.2 (4.7)	1.0 (1.0)	12.8 (4.6)	22	89.4 (7.2)	5.7 (5.5)	4.9 (4.9)
15-18	99	93.6 (2.8)	2.0 (2.0)	4.4 (2.1)	73	94.8 (2.7)	0.0 (-)	5.2 (2.7)	26	90.2 (7.7)	7.9 (7.5)	2.0 (2.0)
1-11	394	97.7 (0.8)	0.8 (0.5)	1.5 (0.6)	249	97.8 (0.9)	0.2 (0.2)	2.0 (0.9)	145	97.6 (1.4)	1.8 (1.2)	0.6 (0.6)
12-18	192	91.1 (2.3)	2.0 (1.4)	6.9 (1.9)	144	91.4 (2.4)	0.4 (0.4)	8.2 (2.3)	48	89.9 (5.6)	7.1 (5.3)	3.0 (2.1)

1) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-22. 소아청소년 연간손상치료처 : 성별, 만1-18세, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체			남자			여자		
	N	응급실/병의원외래 분율 (표준오차)	병의원 입원 분율 (표준오차)	N	응급실/병의원외래 분율 (표준오차)	병의원 입원 분율 (표준오차)	N	응급실/병의원외래 분율 (표준오차)	병의원 입원 분율 (표준오차)
1-18세	578	89.6 (1.4)	10.4 (1.4)	392	89.1 (1.8)	10.9 (1.8)	186	90.6 (2.2)	9.4 (2.2)
연령(세)									
1-5	177	96.6 (1.5)	3.4 (1.5)	122	96.1 (2.1)	3.9 (2.1)	55	97.4 (1.6)	2.6 (1.6)
6-11	212	91.9 (1.8)	8.1 (1.8)	126	93.4 (2.1)	6.6 (2.1)	86	89.7 (3.2)	10.3 (3.2)
12-14	93	85.4 (4.0)	14.6 (4.0)	71	87.3 (4.5)	12.7 (4.5)	22	78.5 (9.8)	21.5 (9.8)
15-18	96	81.9 (4.1)	18.1 (4.1)	73	79.8 (5.0)	20.2 (5.0)	23	88.9 (6.4)	11.1 (6.4)
1-11	389	94.0 (1.3)	6.0 (1.3)	248	94.6 (1.5)	5.4 (1.5)	141	93.0 (2.1)	7.0 (2.1)
12-18	189	83.2 (2.9)	16.8 (2.9)	144	82.7 (3.4)	17.3 (3.4)	45	84.9 (5.4)	15.1 (5.4)

표 1-V-23. 소아청소년 연간손상 와병경험률[1], 결근결석경험률[2] : 성별, 만1-18세, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	와병경험률						결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1-18세	587	21.3 (2.0)	394	20.8 (2.5)	193	22.5 (3.8)	569	23.5 (2.2)	381	22.8 (2.5)	188	24.8 (3.9)
연령(세)												
1-5	180	16.8 (3.4)	123	12.5 (3.3)	57	24.1 (7.6)	162	20.0 (4.8)	110	18.3 (4.5)	52	22.8 (7.8)
6-11	215	17.6 (2.6)	127	17.3 (3.5)	88	18.1 (4.0)	215	24.8 (3.1)	127	24.4 (4.5)	88	25.4 (4.8)
12-14	93	16.6 (4.1)	71	14.2 (4.6)	22	24.9 (9.9)	93	16.6 (4.1)	71	15.2 (4.5)	22	21.5 (9.9)
15-18	99	33.6 (5.5)	73	35.7 (6.5)	26	27.5 (11.6)	99	29.1 (5.0)	73	29.4 (5.7)	26	28.4 (11.2)
1-11	395	17.2 (2.1)	250	15.1 (2.5)	145	20.7 (4.1)	377	22.8 (2.7)	237	21.8 (3.2)	140	24.3 (4.3)
12-18	192	27.1 (3.8)	144	27.3 (4.4)	48	26.6 (8.3)	192	24.4 (3.5)	144	23.8 (3.9)	48	26.0 (8.1)

1) 소아청소년 연간손상 와병경험률 : 최근 1년간 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 소아청소년 연간손상 결근결석경험률 : 최근 1년간 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

표 1-V-24. 운전자의 안전벨트착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	3,538	1.0 (0.3)	2.4 (0.3)	7.5 (0.7)	16.3 (0.9)	72.8 (1.2)
연령(세)						
19-29	409	1.7 (0.9)	4.6 (1.4)	7.8 (1.5)	17.4 (2.5)	68.5 (3.0)
30-39	977	0.4 (0.2)	2.6 (0.6)	6.4 (1.2)	15.7 (1.4)	75.0 (1.9)
40-49	887	1.0 (0.4)	1.7 (0.6)	7.4 (1.2)	17.7 (1.4)	72.3 (1.8)
50-59	710	1.1 (0.5)	1.7 (0.6)	9.3 (1.5)	16.4 (1.6)	71.7 (2.0)
60-69	412	0.7 (0.4)	0.9 (0.5)	7.0 (1.7)	10.0 (1.6)	81.4 (2.4)
70+	143	4.5 (2.0)	2.5 (1.7)	5.2 (2.0)	16.3 (4.9)	71.6 (5.3)
19-64	3,236	0.9 (0.3)	2.4 (0.4)	7.6 (0.7)	16.4 (0.9)	72.6 (1.2)
65+	302	2.8 (1.0)	2.0 (1.1)	5.1 (1.5)	12.4 (2.4)	77.6 (3.0)
거주지역						
동	2,852	0.7 (0.2)	2.0 (0.3)	6.6 (0.6)	15.6 (1.0)	75.0 (1.3)
읍면	686	2.1 (1.0)	4.0 (1.1)	10.7 (2.1)	19.0 (1.9)	64.2 (3.0)
소득수준[1)]						
하	722	1.4 (0.6)	1.8 (0.6)	9.9 (1.4)	17.7 (1.6)	69.2 (2.1)
중하	838	1.7 (0.6)	2.3 (0.6)	7.1 (1.1)	15.5 (1.6)	73.4 (2.1)
중상	916	0.2 (0.1)	2.3 (0.6)	5.7 (0.9)	16.7 (1.5)	75.1 (2.1)
상	1,024	0.8 (0.4)	3.0 (0.9)	7.1 (1.2)	15.8 (1.4)	73.3 (2.2)
거주지역(표준화)[2)]						
동	2,852	0.9 (0.2)	2.0 (0.3)	6.6 (0.6)	15.4 (1.0)	75.0 (1.5)
읍면	686	2.7 (1.3)	4.5 (1.3)	9.5 (1.8)	18.4 (2.2)	64.8 (3.1)
소득수준(표준화)						
하	722	1.7 (0.7)	2.1 (0.7)	9.7 (1.4)	17.3 (1.8)	69.2 (2.3)
중하	838	2.5 (0.9)	2.2 (0.6)	6.3 (1.0)	14.5 (1.5)	74.5 (2.0)
중상	916	0.2 (0.1)	2.5 (0.7)	5.8 (0.9)	17.1 (1.7)	74.4 (2.1)
상	1,024	0.9 (0.4)	3.2 (1.0)	7.5 (1.2)	15.8 (1.5)	72.6 (2.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-25. 운전자의 안전벨트착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,125	1.3 (0.3)	2.9 (0.5)	8.4 (0.9)	17.5 (1.2)	69.9 (1.6)
연령(세)						
19-29	219	2.6 (1.4)	6.0 (1.9)	8.4 (2.1)	16.0 (3.2)	67.0 (4.1)
30-39	499	0.6 (0.3)	2.6 (0.7)	7.7 (1.6)	17.3 (1.7)	71.8 (2.4)
40-49	500	1.5 (0.7)	2.2 (0.9)	8.4 (1.6)	20.4 (2.2)	67.4 (2.7)
50-59	437	0.5 (0.3)	2.3 (0.8)	10.8 (1.8)	18.2 (2.1)	68.3 (2.6)
60-69	337	0.9 (0.4)	0.9 (0.6)	6.4 (1.7)	11.0 (2.0)	80.9 (2.6)
70+	133	3.4 (1.7)	2.6 (1.8)	4.9 (2.1)	17.3 (5.1)	71.8 (5.5)
19-64	1,850	1.2 (0.3)	2.9 (0.5)	8.7 (0.9)	17.7 (1.3)	69.5 (1.6)
65+	275	2.4 (0.9)	2.2 (1.2)	4.2 (1.4)	13.5 (2.6)	77.6 (3.0)
거주지역						
동	1,689	0.9 (0.3)	2.5 (0.4)	7.5 (0.9)	16.6 (1.3)	72.4 (1.7)
읍면	436	2.6 (1.1)	4.4 (1.4)	11.8 (2.5)	20.6 (2.9)	60.6 (3.9)
소득수준[1)]						
하	460	1.9 (0.8)	2.0 (0.8)	11.2 (1.8)	18.3 (2.2)	66.5 (2.6)
중하	525	2.1 (0.9)	2.6 (0.7)	8.3 (1.3)	17.4 (2.2)	69.6 (2.6)
중상	540	0.3 (0.2)	3.1 (1.0)	6.2 (1.1)	17.8 (2.1)	72.6 (2.6)
상	579	0.8 (0.3)	3.8 (1.3)	8.4 (1.7)	16.9 (1.8)	70.2 (3.0)
거주지역(표준화)[2)]						
동	1,689	1.0 (0.3)	2.5 (0.5)	7.4 (0.9)	16.4 (1.3)	72.7 (1.8)
읍면	436	3.8 (1.7)	5.1 (1.9)	10.4 (2.3)	19.9 (3.1)	60.8 (4.0)
소득수준(표준화)						
하	460	2.4 (1.0)	2.3 (0.9)	10.9 (1.9)	17.4 (2.3)	67.0 (2.7)
중하	525	2.7 (1.2)	2.6 (0.7)	7.3 (1.2)	16.4 (2.0)	71.0 (2.5)
중상	540	0.3 (0.2)	3.4 (1.1)	5.9 (1.1)	18.0 (2.2)	72.4 (2.7)
상	579	0.8 (0.4)	4.0 (1.4)	8.7 (1.7)	17.0 (1.9)	69.6 (3.1)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-26. 운전자의 안전벨트착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,413	0.5 (0.3)	1.5 (0.4)	5.5 (0.7)	13.9 (1.0)	78.6 (1.4)
연령(세)						
19-29	190	0.0 (-)[3]	1.9 (1.3)	6.5 (2.0)	20.1 (3.4)	71.4 (3.7)
30-39	478	0.0 (-)	2.7 (1.0)	4.3 (1.1)	13.1 (1.8)	79.9 (2.2)
40-49	387	0.0 (-)	0.8 (0.3)	5.7 (1.6)	13.0 (1.9)	80.5 (2.4)
50-59	273	2.4 (1.5)	0.2 (0.2)	5.5 (1.8)	11.8 (2.4)	80.1 (3.4)
60-69	75	0.0 (-)	0.9 (0.9)	10.5 (5.4)	4.7 (2.7)	83.9 (5.9)
70+	10	- -[4]	- -	- -	- -	- -
19-64	1,386	0.4 (0.3)	1.5 (0.4)	5.4 (0.7)	14.0 (1.0)	78.6 (1.4)
65+	27	6.2 (4.5)	0.0 (-)	14.3 (8.2)	1.6 (1.7)	77.9 (9.3)
거주지역						
동	1,163	0.3 (0.2)	1.2 (0.4)	4.9 (0.7)	13.6 (1.1)	80.1 (1.4)
읍면	250	1.2 (1.1)	3.1 (1.5)	8.2 (2.2)	15.2 (2.2)	72.3 (4.1)
소득수준[1]						
하	262	0.0 (-)	1.3 (0.8)	6.8 (1.7)	16.4 (2.6)	75.4 (3.2)
중하	313	0.8 (0.6)	1.6 (0.9)	4.4 (1.4)	11.4 (2.0)	81.8 (2.5)
중상	376	0.0 (-)	0.9 (0.5)	4.8 (1.3)	14.7 (2.0)	79.6 (2.3)
상	445	1.0 (0.8)	1.5 (0.8)	4.7 (1.3)	13.7 (2.1)	79.0 (2.4)
거주지역(표준화)[2]						
동	1,163	- -[5]	- -	- -	- -	- -
읍면	250	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	262	- -	- -	- -	- -	- -
중하	313	- -	- -	- -	- -	- -
중상	376	- -	- -	- -	- -	- -
상	445	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-27. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	5,860	3.2 (0.3)	5.7 (0.4)	10.4 (0.6)	18.2 (0.8)	62.4 (1.0)
연령(세)						
19-29	755	5.6 (1.0)	9.4 (1.2)	12.5 (1.3)	20.8 (1.9)	51.6 (2.4)
30-39	1,231	1.9 (0.6)	6.2 (0.8)	10.8 (1.3)	18.3 (1.5)	62.8 (1.9)
40-49	1,147	3.1 (0.7)	5.2 (0.8)	10.7 (0.9)	21.9 (1.6)	59.1 (1.9)
50-59	1,129	3.3 (0.7)	4.8 (0.8)	9.9 (1.1)	18.5 (1.2)	63.5 (1.8)
60-69	911	1.3 (0.4)	3.2 (0.7)	6.6 (1.1)	11.9 (1.5)	76.9 (2.0)
70+	687	2.2 (0.6)	1.4 (0.5)	8.9 (1.4)	6.9 (1.2)	80.7 (1.9)
19-64	4,739	3.3 (0.4)	6.2 (0.5)	10.8 (0.7)	19.6 (0.8)	60.0 (1.1)
65+	1,121	1.9 (0.4)	1.8 (0.5)	7.8 (1.1)	7.3 (1.0)	81.3 (1.4)
거주지역						
동	4,581	2.9 (0.3)	5.8 (0.5)	9.7 (0.6)	18.7 (0.9)	63.0 (1.1)
읍면	1,279	4.3 (0.9)	5.6 (0.9)	13.0 (1.8)	16.6 (1.8)	60.5 (2.4)
소득수준[1)]						
하	1,416	3.1 (0.7)	6.2 (0.8)	12.4 (1.0)	17.7 (1.4)	60.6 (1.7)
중하	1,447	3.7 (0.7)	5.5 (0.7)	9.3 (0.9)	18.8 (1.3)	62.8 (1.7)
중상	1,465	3.3 (0.7)	4.8 (0.8)	11.3 (1.2)	17.0 (1.3)	63.6 (2.0)
상	1,465	2.6 (0.6)	6.0 (0.9)	8.3 (1.1)	19.6 (1.6)	63.5 (1.9)
거주지역(표준화)[2)]						
동	4,581	2.8 (0.3)	5.7 (0.5)	9.6 (0.5)	18.3 (0.8)	63.6 (1.1)
읍면	1,279	5.0 (1.1)	6.9 (1.2)	13.7 (2.3)	17.3 (1.9)	57.1 (2.4)
소득수준(표준화)						
하	1,416	3.1 (0.7)	6.1 (0.8)	12.5 (1.0)	17.4 (1.3)	60.8 (1.5)
중하	1,447	3.6 (0.6)	5.7 (0.7)	9.4 (0.9)	18.6 (1.3)	62.6 (1.7)
중상	1,465	3.5 (0.7)	4.9 (0.8)	11.2 (1.2)	17.0 (1.3)	63.4 (2.0)
상	1,465	2.6 (0.6)	6.2 (1.0)	8.3 (1.1)	20.1 (1.6)	62.8 (1.9)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-28. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,640	4.0 (0.5)	6.8 (0.7)	11.8 (0.8)	20.6 (1.2)	56.9 (1.3)
연령(세)						
19-29	304	5.5 (1.4)	9.6 (1.9)	14.8 (2.1)	20.5 (3.2)	49.7 (3.6)
30-39	520	2.7 (1.1)	7.7 (1.2)	11.7 (1.9)	19.7 (2.0)	58.1 (2.6)
40-49	529	4.6 (1.2)	6.3 (1.4)	11.5 (1.3)	25.9 (2.2)	51.7 (2.4)
50-59	474	5.1 (1.1)	6.5 (1.4)	11.9 (1.6)	21.9 (2.1)	54.7 (2.8)
60-69	455	1.6 (0.7)	4.0 (1.1)	7.8 (1.8)	14.8 (2.3)	71.8 (2.7)
70+	358	2.0 (0.7)	1.2 (0.6)	10.1 (1.6)	9.7 (2.4)	77.0 (2.6)
19-64	2,063	4.3 (0.6)	7.4 (0.7)	12.1 (0.8)	21.7 (1.3)	54.5 (1.4)
65+	577	1.6 (0.5)	1.4 (0.5)	9.6 (1.5)	10.8 (1.9)	76.5 (2.3)
거주지역						
동	2,056	3.5 (0.5)	6.8 (0.7)	10.7 (0.7)	20.7 (1.4)	58.3 (1.5)
읍면	584	5.6 (1.5)	6.6 (1.6)	15.9 (2.4)	20.1 (2.2)	51.7 (2.8)
소득수준[1)]						
하	638	4.2 (1.2)	7.0 (1.2)	14.1 (1.6)	20.9 (2.1)	53.8 (2.5)
중하	659	5.2 (1.1)	6.7 (1.1)	9.8 (1.3)	19.7 (2.0)	58.6 (2.4)
중상	661	3.3 (0.9)	6.1 (1.3)	14.1 (1.8)	18.3 (1.9)	58.2 (2.7)
상	655	3.2 (0.9)	7.6 (1.5)	9.0 (1.7)	23.5 (2.6)	56.8 (2.8)
거주지역(표준화)[2)]						
동	2,056	3.4 (0.5)	6.6 (0.7)	10.6 (0.7)	20.3 (1.3)	59.0 (1.5)
읍면	584	6.2 (1.9)	8.0 (2.2)	16.7 (2.9)	19.5 (2.1)	49.6 (3.0)
소득수준(표준화)						
하	638	4.1 (1.2)	6.9 (1.1)	14.2 (1.7)	20.1 (2.1)	54.7 (2.4)
중하	659	5.1 (1.0)	6.9 (1.1)	9.8 (1.3)	19.2 (2.0)	59.0 (2.4)
중상	661	3.3 (0.9)	6.0 (1.3)	13.9 (1.7)	18.1 (1.9)	58.6 (2.7)
상	655	3.1 (0.9)	7.6 (1.5)	9.2 (1.8)	23.9 (2.5)	56.2 (2.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-29. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	3,220	2.3 (0.4)	4.7 (0.5)	9.0 (0.7)	15.8 (0.9)	68.3 (1.2)
연령(세)						
19-29	451	5.8 (1.6)	9.2 (1.7)	10.1 (1.5)	21.1 (2.1)	53.8 (2.5)
30-39	711	1.1 (0.4)	4.6 (1.0)	9.8 (1.3)	16.7 (1.7)	67.7 (2.1)
40-49	618	1.6 (0.6)	4.0 (1.0)	9.9 (1.4)	17.6 (2.2)	66.9 (2.5)
50-59	655	1.5 (0.6)	3.1 (0.8)	7.9 (1.3)	14.9 (1.6)	72.6 (2.1)
60-69	456	1.0 (0.5)	2.3 (1.0)	5.4 (1.3)	8.9 (1.8)	82.4 (2.3)
70+	329	2.4 (1.0)	1.5 (0.7)	7.8 (2.0)	4.5 (1.0)	83.8 (2.4)
19-64	2,676	2.4 (0.4)	5.0 (0.6)	9.3 (0.8)	17.4 (1.0)	65.9 (1.3)
65+	544	2.1 (0.7)	2.0 (0.8)	6.1 (1.4)	4.0 (0.7)	85.8 (1.9)
거주지역						
동	2,525	2.2 (0.4)	4.7 (0.6)	8.7 (0.8)	16.6 (0.9)	67.9 (1.4)
읍면	695	3.0 (0.8)	4.6 (1.1)	9.9 (1.6)	12.9 (2.5)	69.5 (3.0)
소득수준[1)]						
하	778	2.1 (0.7)	5.3 (1.2)	10.6 (1.3)	14.5 (1.6)	67.5 (2.2)
중하	788	2.0 (0.6)	4.3 (0.9)	8.7 (1.1)	17.8 (1.7)	67.2 (1.9)
중상	804	3.3 (1.1)	3.6 (0.9)	8.4 (1.4)	15.6 (1.6)	69.1 (2.3)
상	810	2.0 (0.7)	4.3 (0.9)	7.5 (1.2)	15.3 (1.7)	70.8 (2.1)
거주지역(표준화)[2)]						
동	2,525	2.2 (0.4)	4.6 (0.6)	8.6 (0.8)	16.2 (0.9)	68.4 (1.3)
읍면	695	3.6 (1.2)	5.8 (1.5)	10.3 (2.1)	14.7 (3.0)	65.6 (3.3)
소득수준(표준화)						
하	778	2.1 (0.7)	5.3 (1.2)	10.8 (1.3)	14.5 (1.6)	67.3 (2.1)
중하	788	2.1 (0.6)	4.5 (0.9)	9.0 (1.1)	17.9 (1.7)	66.6 (1.9)
중상	804	3.6 (1.2)	3.9 (0.9)	8.4 (1.3)	15.9 (1.6)	68.2 (2.3)
상	810	2.0 (0.7)	4.6 (1.0)	7.3 (1.2)	15.9 (1.7)	70.2 (2.1)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-30. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상맨다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체						
12-18세	704	9.7 (1.3)	17.8 (1.6)	22.6 (2.0)	22.4 (1.9)	27.4 (2.1)
연령(세)						
12-14	354	12.0 (2.1)	15.5 (2.3)	23.0 (2.7)	24.3 (2.9)	25.2 (3.0)
15-18	350	8.1 (1.6)	19.4 (2.4)	22.4 (2.7)	21.2 (2.3)	28.9 (3.0)
거주지역						
동	588	9.8 (1.4)	17.4 (1.8)	22.9 (2.0)	22.7 (2.0)	27.3 (2.4)
읍면	116	9.5 (3.3)	19.5 (4.0)	21.5 (5.4)	21.6 (5.1)	27.8 (4.5)
소득수준[1)]						
하	170	12.0 (2.9)	18.8 (3.4)	27.9 (4.2)	19.6 (3.5)	21.7 (4.1)
중하	163	9.5 (2.7)	19.5 (3.8)	18.6 (4.0)	21.6 (4.5)	30.8 (3.9)
중상	169	8.9 (2.5)	19.2 (3.5)	22.6 (4.0)	26.0 (4.6)	23.2 (5.2)
상	186	6.2 (2.0)	13.4 (3.1)	20.2 (4.6)	26.0 (4.2)	34.2 (4.3)
남자						
12-18세	388	10.9 (1.8)	19.0 (2.5)	22.2 (2.3)	22.3 (2.3)	25.5 (2.7)
연령(세)						
12-14	197	14.4 (3.1)	17.5 (3.1)	22.9 (3.6)	20.8 (3.3)	24.4 (3.9)
15-18	191	8.7 (2.2)	20.1 (3.7)	21.8 (3.2)	23.2 (3.5)	26.3 (4.2)
거주지역						
동	327	11.2 (2.0)	19.5 (2.6)	22.2 (2.3)	22.7 (2.5)	24.5 (2.9)
읍면	61	9.9 (4.2)	17.2 (7.3)	22.4 (6.7)	20.4 (5.1)	30.1 (6.9)
소득수준						
하	93	12.1 (3.5)	18.7 (5.1)	30.8 (5.5)	18.7 (5.0)	19.7 (5.3)
중하	90	13.8 (4.4)	20.1 (5.2)	15.3 (4.9)	18.0 (4.5)	32.8 (5.5)
중상	92	7.6 (3.0)	18.1 (4.7)	26.4 (5.3)	28.8 (5.8)	19.1 (4.8)
상	104	5.5 (2.3)	19.2 (4.9)	14.7 (4.2)	27.9 (6.0)	32.7 (5.3)
여자						
12-18세	316	8.2 (1.7)	16.3 (2.4)	23.2 (3.2)	22.7 (3.0)	29.7 (2.9)
연령(세)						
12-14	157	9.3 (2.7)	13.1 (3.1)	23.2 (4.3)	28.3 (4.8)	26.1 (3.8)
15-18	159	7.3 (2.4)	18.6 (4.0)	23.2 (4.5)	18.6 (3.9)	32.3 (4.0)
거주지역						
동	261	7.9 (1.9)	14.5 (2.5)	24.0 (3.0)	22.6 (2.8)	31.0 (3.6)
읍면	55	9.1 (4.6)	22.0 (5.7)	20.7 (9.2)	22.8 (9.1)	25.4 (5.2)
소득수준						
하	77	11.8 (4.5)	19.0 (3.7)	23.9 (5.7)	20.9 (4.5)	24.5 (4.9)
중하	73	3.9 (2.0)	18.6 (4.8)	22.8 (5.7)	26.3 (6.2)	28.3 (5.6)
중상	77	10.8 (4.1)	20.8 (6.1)	17.4 (5.2)	22.2 (6.5)	28.8 (9.2)
상	82	7.0 (2.7)	7.0 (2.7)	26.2 (8.5)	23.8 (5.7)	36.0 (6.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-V-31. 자전거 헬멧착용률 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,775	5.7 (0.7)	1.9 (0.4)	2.3 (0.4)	17.9 (1.2)	72.1 (1.6)
연령(세)						
19-29	266	2.4 (0.9)	1.8 (1.3)	1.4 (0.8)	11.9 (1.9)	82.5 (2.7)
30-39	390	6.1 (1.5)	1.2 (0.6)	2.7 (1.0)	21.6 (2.5)	68.5 (3.1)
40-49	365	6.5 (1.7)	2.5 (1.0)	2.6 (0.8)	23.6 (2.6)	64.7 (3.1)
50-59	326	6.8 (1.5)	2.6 (0.9)	2.1 (0.8)	20.3 (3.0)	68.1 (3.4)
60-69	285	10.2 (2.9)	1.5 (0.6)	3.1 (1.3)	11.8 (2.5)	73.4 (4.0)
70+	143	2.2 (1.1)	1.5 (1.5)	2.7 (1.2)	3.0 (1.2)	90.6 (2.3)
19-64	1,503	5.6 (0.7)	1.9 (0.4)	2.3 (0.5)	18.9 (1.3)	71.3 (1.6)
65+	272	6.3 (2.6)	2.1 (1.0)	2.8 (0.9)	6.7 (1.4)	82.1 (3.0)
거주지역						
동	1,368	6.3 (0.8)	2.1 (0.5)	2.9 (0.6)	19.3 (1.4)	69.5 (1.7)
읍면	407	3.8 (1.1)	1.5 (0.7)	0.7 (0.4)	13.6 (2.7)	80.5 (3.8)
소득수준[1)]						
하	414	3.9 (1.0)	3.3 (1.0)	2.8 (0.9)	18.1 (2.5)	71.9 (2.9)
중하	431	4.8 (1.3)	1.1 (0.5)	2.4 (0.7)	18.7 (2.5)	73.1 (2.8)
중상	476	5.4 (1.3)	0.8 (0.4)	1.9 (0.7)	19.0 (2.0)	72.9 (2.3)
상	442	9.0 (1.6)	2.6 (1.1)	2.3 (0.8)	15.4 (1.9)	70.7 (2.9)
거주지역(표준화)[2)]						
동	1,368	6.4 (0.8)	2.0 (0.5)	3.0 (0.5)	18.6 (1.3)	70.0 (1.6)
읍면	407	4.0 (1.3)	1.5 (0.9)	0.7 (0.4)	14.6 (2.8)	79.2 (4.1)
소득수준(표준화)						
하	414	3.9 (1.0)	3.3 (1.0)	2.7 (0.8)	17.6 (2.5)	72.4 (2.8)
중하	431	4.5 (1.2)	1.1 (0.5)	2.4 (0.7)	18.4 (2.3)	73.6 (2.7)
중상	476	5.0 (1.2)	0.7 (0.4)	2.0 (0.7)	17.7 (1.9)	74.5 (2.2)
상	442	9.0 (1.5)	2.4 (1.0)	2.3 (0.8)	15.2 (1.8)	71.2 (2.9)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-V-32. 자전거 헬멧착용률 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,137	6.7 (0.9)	2.4 (0.6)	2.6 (0.6)	18.9 (1.4)	69.4 (1.7)
연령(세)						
19-29	138	3.5 (1.4)	3.0 (2.0)	2.1 (1.2)	10.8 (2.5)	80.6 (3.9)
30-39	209	8.8 (2.2)	1.4 (0.8)	2.8 (1.3)	22.4 (3.4)	64.6 (3.9)
40-49	228	6.5 (2.0)	2.9 (1.2)	3.5 (1.2)	25.8 (3.2)	61.4 (3.8)
50-59	199	6.3 (1.6)	2.9 (1.2)	1.9 (0.9)	24.2 (3.9)	64.7 (4.2)
60-69	233	11.2 (3.5)	1.8 (0.7)	2.6 (1.1)	13.9 (3.0)	70.5 (4.7)
70+	130	2.4 (1.2)	1.7 (1.6)	2.7 (1.3)	2.5 (1.1)	90.8 (2.5)
19-64	893	6.7 (0.9)	2.4 (0.6)	2.6 (0.6)	20.4 (1.5)	67.9 (1.9)
65+	244	7.0 (2.8)	2.3 (1.1)	2.5 (0.9)	6.9 (1.5)	81.3 (3.2)
거주지역						
동	865	7.5 (1.1)	2.6 (0.7)	3.3 (0.7)	20.6 (1.6)	66.0 (1.9)
읍면	272	4.2 (1.3)	1.9 (1.0)	0.6 (0.5)	13.9 (3.0)	79.5 (4.3)
소득수준[1)]						
하	274	4.2 (1.4)	4.0 (1.4)	3.6 (1.2)	18.8 (3.0)	69.4 (3.6)
중하	286	6.7 (1.8)	1.4 (0.7)	1.7 (0.7)	20.9 (3.4)	69.3 (3.7)
중상	293	6.7 (1.5)	1.2 (0.6)	2.0 (1.0)	19.9 (2.4)	70.1 (2.7)
상	277	9.4 (2.0)	2.9 (1.5)	3.0 (1.1)	15.4 (2.1)	69.2 (3.3)
거주지역(표준화)[2)]						
동	865	7.4 (1.0)	2.5 (0.7)	3.4 (0.7)	19.9 (1.6)	66.8 (1.8)
읍면	272	- -[3)]	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	274	4.1 (1.4)	4.0 (1.3)	3.5 (1.2)	18.3 (2.9)	70.1 (3.5)
중하	286	6.2 (1.8)	1.4 (0.8)	1.8 (0.7)	21.4 (3.3)	69.2 (3.6)
중상	293	6.3 (1.4)	1.1 (0.6)	2.1 (1.1)	17.7 (2.2)	72.8 (2.5)
상	277	9.7 (1.9)	2.8 (1.3)	3.0 (1.1)	15.3 (2.2)	69.3 (3.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-33. 자전거 헬멧착용률 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	638	3.6 (0.9)	1.0 (0.4)	1.8 (0.5)	15.8 (1.8)	77.9 (2.2)
연령(세)						
19-29	128	0.5 (0.5)	0.0 (-)[3]	0.4 (0.4)	13.6 (3.2)	85.5 (3.2)
30-39	181	1.3 (0.9)	0.8 (0.8)	2.4 (1.1)	20.3 (3.1)	75.2 (3.5)
40-49	137	6.5 (2.5)	1.8 (1.4)	1.1 (0.8)	19.5 (4.3)	71.2 (4.9)
50-59	127	8.1 (2.9)	2.0 (1.2)	2.6 (1.7)	11.7 (4.0)	75.5 (5.1)
60-69	52	5.1 (3.9)	0.0 (-)	5.7 (3.3)	1.6 (1.2)	87.6 (5.2)
70+	13	- -[4]	- -	- -	- -	- -
19-64	610	3.7 (0.9)	1.0 (0.5)	1.7 (0.5)	16.0 (1.8)	77.6 (2.2)
65+	28	0.0 (-)	0.0 (-)	5.4 (4.2)	5.2 (4.3)	89.3 (6.2)
거주지역						
동	503	3.9 (1.0)	1.1 (0.6)	2.0 (0.7)	16.6 (2.0)	76.4 (2.4)
읍면	135	2.9 (1.5)	0.6 (0.6)	1.0 (0.7)	12.8 (4.2)	82.7 (4.7)
소득수준[1]						
하	140	3.4 (1.5)	1.8 (1.0)	1.0 (0.8)	16.7 (3.7)	77.2 (4.2)
중하	145	0.3 (0.3)	0.4 (0.4)	3.9 (1.7)	13.6 (3.0)	81.7 (3.5)
중상	183	3.1 (1.4)	0.0 (-)	1.7 (0.8)	17.3 (3.1)	78.0 (3.5)
상	165	8.0 (2.8)	1.8 (1.5)	0.7 (0.5)	15.5 (3.4)	74.1 (4.4)
거주지역(표준화)[2]						
동	503	- -[5]	- -	- -	- -	- -
읍면	135	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	140	- -	- -	- -	- -	- -
중하	145	- -	- -	- -	- -	- -
중상	183	- -	- -	- -	- -	- -
상	165	- -	- -	- -	- -	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-34. 청소년 자전거 헬멧착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체						
12-18세	398	0.2 (0.2)	0.5 (0.3)	1.7 (0.6)	15.8 (2.4)	81.9 (2.5)
연령(세)						
12-14	233	0.4 (0.4)	0.1 (0.1)	3.7 (1.2)	21.8 (3.4)	74.0 (3.5)
15-18	165	0.0 (-)[2]	0.8 (0.6)	0.0 (-)	10.6 (3.2)	88.6 (3.3)
거주지역						
동	328	0.0 (-)	0.6 (0.4)	1.8 (0.7)	15.1 (2.5)	82.5 (2.6)
읍면	70	0.8 (0.8)	0.0 (-)	1.5 (1.1)	18.2 (7.0)	79.6 (7.5)
소득수준[1]						
하	95	0.0 (-)	0.8 (0.8)	2.0 (1.2)	3.5 (1.7)	93.7 (2.2)
중하	89	0.6 (0.6)	0.0 (-)	0.5 (0.5)	17.7 (5.3)	81.2 (5.5)
중상	98	0.0 (-)	0.0 (-)	3.8 (1.9)	24.0 (5.9)	72.2 (6.3)
상	107	0.0 (-)	1.2 (1.0)	0.7 (0.7)	21.3 (4.5)	76.8 (4.5)
남자						
12-18세	253	0.3 (0.3)	0.8 (0.5)	2.0 (0.8)	12.2 (2.7)	84.8 (2.8)
연령(세)						
12-14	141	0.6 (0.6)	0.2 (0.3)	4.8 (1.9)	14.6 (3.3)	79.7 (3.7)
15-18	112	0.0 (-)	1.1 (0.8)	0.0 (-)	10.5 (3.9)	88.4 (4.0)
거주지역						
동	214	0.0 (-)	0.9 (0.6)	2.4 (1.0)	13.0 (2.9)	83.7 (3.1)
읍면	39	1.4 (1.5)	0.0 (-)	0.0 (-)	8.8 (6.6)	89.8 (6.8)
소득수준						
하	67	0.0 (-)	1.1 (1.1)	2.7 (1.7)	3.6 (2.1)	92.6 (2.7)
중하	49	1.1 (1.1)	0.0 (-)	0.0 (-)	13.0 (7.0)	85.8 (7.1)
중상	63	0.0 (-)	0.0 (-)	3.7 (2.5)	21.7 (7.3)	74.6 (7.7)
상	67	0.0 (-)	2.1 (1.6)	1.2 (1.1)	13.4 (5.0)	83.4 (5.1)
여자						
12-18세	145	0.0 (-)	0.0 (-)	1.2 (0.7)	22.3 (4.1)	76.5 (4.2)
연령(세)						
12-14	92	0.0 (-)	0.0 (-)	2.2 (1.3)	31.5 (5.8)	66.3 (5.8)
15-18	53	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	10.9 (4.6)	89.1 (4.6)
거주지역						
동	114	0.0 (-)	0.0 (-)	0.4 (0.4)	19.5 (4.1)	80.0 (4.1)
읍면	31	0.0 (-)	0.0 (-)	3.3 (2.4)	29.7 (10.6)	67.0 (11.3)
소득수준						
하	28	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	3.2 (2.5)	96.8 (2.5)
중하	40	0.0 (-)	0.0 (-)	1.1 (1.1)	23.7 (7.5)	75.3 (7.7)
중상	35	0.0 (-)	0.0 (-)	3.8 (2.8)	28.2 (9.4)	68.0 (9.6)
상	40	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	32.8 (7.8)	67.2 (7.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-35. 소아 자동차보호장구이용률[1], 자전거헬멧착용률[2] : 성별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	항상사용	자주사용	가끔사용	거의사용하지않음	전혀사용하지않음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
자동차보호장구(1-5세)						
전체	587	21.8 (2.0)	5.9 (1.3)	7.4 (1.2)	9.0 (1.3)	56.0 (2.5)
남자	292	23.3 (2.9)	5.1 (1.4)	6.8 (1.7)	9.8 (1.9)	54.9 (3.4)
여자	295	20.0 (2.2)	6.6 (1.8)	8.1 (1.9)	8.1 (1.8)	57.1 (3.2)
자전거헬멧(3-11세)						
전체	762	2.8 (0.9)	2.2 (0.6)	7.7 (1.2)	22.2 (1.8)	65.1 (2.3)
남자	433	2.7 (1.3)	2.3 (0.8)	7.4 (1.4)	21.2 (2.4)	66.3 (2.7)
여자	329	3.0 (1.2)	2.0 (0.8)	8.1 (1.9)	23.3 (3.1)	63.7 (3.7)

1) 자동차 탑승 경험 소아의 자동차보호장구이용률 : 자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율

2) 자전거 탑승 소아의 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율

표 1-VI-1. 건강검진수진율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,823	48.8 (0.8)	8,062	47.5 (0.8)	7,800	47.4 (0.9)	2,978	48.6 (1.3)	6,803	48.8 (0.9)	7,472	51.2 (0.9)	6,251	54.1 (0.9)
65세이상	1,044	37.7 (2.1)	978	41.1 (2.0)	1,097	49.8 (2.1)	721	44.9 (2.4)	1,516	49.9 (1.7)	1,648	56.6 (1.7)	1,378	60.2 (2.1)
19세이상(표준화)[3]	8,823	48.9 (0.8)	8,062	47.1 (0.8)	7,800	47.4 (0.8)	2,978	47.9 (1.2)	6,803	48.0 (0.8)	7,472	50.1 (0.8)	6,251	52.8 (0.9)
연령(세)														
19-29	1,791	40.4 (1.2)	1,622	36.6 (1.5)	1,336	31.1 (1.4)	339	24.5 (2.5)	891	25.0 (1.7)	1,049	28.0 (1.7)	767	31.1 (2.1)
30-39	2,213	46.2 (1.4)	1,996	46.3 (1.5)	1,741	46.0 (1.5)	634	44.7 (2.5)	1,411	43.8 (1.7)	1,425	43.1 (1.7)	1,253	46.3 (1.8)
40-49	1,804	59.5 (1.5)	1,870	54.9 (1.5)	1,878	55.7 (1.6)	564	60.3 (2.4)	1,328	61.0 (1.5)	1,495	62.5 (1.5)	1,162	64.4 (1.7)
50-59	1,338	56.7 (1.5)	1,115	56.5 (1.8)	1,229	58.3 (1.8)	503	67.9 (2.8)	1,134	63.3 (2.0)	1,247	64.6 (1.7)	1,170	66.7 (1.8)
60-69	1,066	50.0 (1.9)	878	49.7 (2.1)	969	55.4 (2.0)	490	56.2 (3.0)	1,080	62.2 (1.9)	1,205	68.2 (1.9)	1,027	69.0 (1.7)
70+	611	33.4 (2.4)	581	36.5 (2.5)	647	44.3 (2.5)	448	42.8 (3.1)	959	43.9 (2.0)	1,051	49.9 (2.0)	872	55.8 (2.6)
거주지역														
동	5,716	49.8 (1.0)	6,411	48.1 (0.9)	6,236	46.7 (1.0)	2,116	47.5 (1.4)	5,002	47.8 (1.1)	5,556	49.8 (1.0)	4,883	53.8 (1.0)
읍면	3,107	44.9 (1.4)	1,651	45.1 (1.7)	1,564	50.2 (1.6)	862	52.6 (2.5)	1,801	53.5 (1.7)	1,916	57.1 (1.7)	1,368	55.1 (2.3)
소득수준[4]														
하	2,107	38.5 (1.3)	1,699	36.9 (1.3)	1,998	36.5 (1.3)	711	38.9 (2.4)	1,632	39.9 (1.6)	1,860	41.7 (1.7)	1,538	44.8 (1.5)
중하	2,266	44.3 (1.4)	1,846	44.6 (1.5)	1,986	44.4 (1.4)	697	44.3 (2.3)	1,634	45.9 (1.6)	1,862	48.9 (1.3)	1,540	55.4 (1.8)
중상	2,179	52.4 (1.3)	1,994	49.9 (1.2)	1,858	51.9 (1.5)	731	51.9 (2.2)	1,665	51.2 (1.4)	1,819	53.4 (1.3)	1,561	58.1 (1.6)
상	2,271	57.6 (1.3)	2,051	58.4 (1.3)	1,871	58.2 (1.3)	700	59.9 (2.8)	1,660	59.3 (1.8)	1,851	62.0 (1.4)	1,532	59.7 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	5,716	50.0 (0.9)	6,411	47.8 (0.9)	6,236	46.9 (1.0)	2,116	46.8 (1.3)	5,002	47.7 (1.0)	5,556	49.4 (0.9)	4,883	53.4 (0.9)
읍면	3,107	45.1 (1.4)	1,651	45.7 (2.0)	1,564	48.7 (1.4)	862	52.3 (2.6)	1,801	48.1 (1.9)	1,916	52.3 (1.8)	1,368	49.5 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	2,107	38.8 (1.3)	1,699	36.2 (1.3)	1,998	36.6 (1.2)	711	38.7 (2.1)	1,632	39.2 (1.4)	1,860	40.7 (1.4)	1,538	43.4 (1.4)
중하	2,266	44.5 (1.4)	1,846	44.4 (1.4)	1,986	44.5 (1.4)	697	43.7 (1.9)	1,634	44.9 (1.6)	1,862	47.4 (1.3)	1,540	53.9 (1.7)
중상	2,179	52.5 (1.3)	1,994	49.2 (1.2)	1,858	51.8 (1.5)	731	51.5 (2.1)	1,665	50.7 (1.3)	1,819	52.4 (1.3)	1,561	57.0 (1.7)
상	2,271	57.4 (1.2)	2,051	58.1 (1.3)	1,871	58.2 (1.3)	700	58.5 (2.8)	1,660	58.1 (1.8)	1,851	61.2 (1.4)	1,532	58.7 (1.8)
남자														
19세이상	4,110	56.2 (1.1)	3,674	54.0 (1.0)	3,509	52.8 (1.2)	1,241	52.9 (1.9)	2,836	52.6 (1.3)	3,233	54.2 (1.2)	2,698	57.8 (1.3)
65세이상	411	43.7 (2.8)	379	51.1 (2.9)	428	58.0 (3.0)	302	50.2 (3.5)	581	58.3 (2.5)	687	62.8 (2.3)	615	64.1 (2.5)
19세이상(표준화)	4,110	55.7 (1.0)	3,674	53.4 (1.0)	3,509	53.0 (1.1)	1,241	52.2 (1.7)	2,836	52.1 (1.1)	3,233	53.6 (1.1)	2,698	57.0 (1.2)
연령(세)														
19-29	816	44.6 (2.0)	714	42.2 (2.1)	583	30.3 (2.0)	141	22.9 (3.3)	366	23.3 (2.4)	485	27.9 (2.7)	306	30.7 (3.3)
30-39	1,091	58.1 (2.0)	942	56.2 (2.0)	812	57.6 (2.1)	247	57.9 (3.7)	595	57.8 (2.7)	595	54.8 (2.5)	525	60.6 (2.5)
40-49	888	64.0 (1.9)	909	59.1 (1.9)	872	62.9 (2.0)	247	61.0 (3.2)	579	61.0 (2.2)	642	63.3 (2.0)	531	67.1 (2.4)
50-59	616	62.9 (2.1)	522	57.9 (2.2)	579	61.4 (2.5)	205	71.8 (3.3)	490	63.1 (2.6)	542	63.1 (2.5)	478	65.9 (2.8)
60-69	476	54.7 (2.7)	381	54.6 (3.0)	444	57.7 (2.6)	217	59.5 (4.4)	440	65.1 (2.7)	541	70.7 (2.5)	473	71.2 (2.6)
70+	223	40.7 (4.1)	206	52.0 (4.0)	219	55.8 (4.1)	184	49.4 (4.7)	366	56.0 (2.8)	428	57.0 (2.9)	385	58.6 (3.4)
거주지역														
동	2,685	57.3 (1.2)	2,929	54.0 (1.1)	2,794	52.1 (1.4)	868	50.3 (2.2)	2,080	52.2 (1.4)	2,390	52.8 (1.4)	2,102	57.8 (1.4)
읍면	1,425	52.0 (1.8)	745	54.0 (2.4)	715	56.1 (2.2)	373	62.5 (3.8)	756	54.3 (2.4)	843	60.2 (2.2)	596	58.0 (3.0)

1) 건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 건강검진수진율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	992	43.5 (1.7)	760	43.1 (1.9)	901	38.4 (1.6)	300	39.3 (3.5)	681	42.1 (2.2)	817	41.2 (2.3)	666	46.4 (2.3)
중하	1,033	54.2 (1.8)	852	51.5 (2.1)	889	52.5 (2.0)	286	49.6 (3.9)	673	49.9 (2.1)	801	53.9 (1.8)	668	62.0 (2.5)
중상	1,046	62.5 (1.8)	919	56.6 (1.8)	830	58.4 (2.0)	307	56.8 (3.6)	707	55.2 (2.3)	774	58.0 (2.1)	675	61.2 (2.4)
상	1,039	62.2 (1.8)	943	64.6 (1.8)	844	64.5 (1.9)	299	65.8 (3.6)	691	64.5 (2.5)	803	65.5 (2.2)	661	62.9 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	2,685	56.6 (1.2)	2,929	53.7 (1.1)	2,794	52.4 (1.3)	868	50.0 (1.8)	2,080	52.1 (1.3)	2,390	52.8 (1.3)	2,102	57.8 (1.3)
읍면	1,425	52.0 (1.8)	745	54.0 (2.5)	715	55.1 (2.2)	373	61.0 (3.6)	756	49.9 (2.8)	843	56.4 (2.5)	596	53.2 (3.7)
소득수준(표준화)														
하	992	43.3 (1.7)	760	42.4 (1.9)	901	38.6 (1.6)	300	38.7 (3.1)	681	41.9 (2.1)	817	40.8 (2.0)	666	45.4 (2.2)
중하	1,033	54.2 (1.8)	852	51.4 (2.0)	889	53.0 (1.9)	286	48.8 (3.2)	673	49.3 (2.0)	801	53.6 (1.8)	668	60.9 (2.3)
중상	1,046	61.5 (1.8)	919	55.7 (1.8)	830	58.5 (1.9)	307	56.5 (3.1)	707	55.1 (1.9)	774	57.1 (2.1)	675	60.9 (2.3)
상	1,039	61.0 (1.6)	943	64.1 (1.8)	844	64.2 (1.7)	299	64.7 (3.4)	691	63.1 (2.2)	803	64.7 (2.1)	661	62.4 (2.2)
여자														
19세이상	4,713	42.1 (0.9)	4,388	42.4 (0.9)	4,291	42.0 (1.0)	1,737	44.3 (1.6)	3,967	45.2 (1.1)	4,239	48.2 (1.0)	3,553	50.5 (1.2)
65세이상	633	34.1 (2.4)	599	34.7 (2.2)	669	44.4 (2.4)	419	41.3 (2.8)	935	44.1 (2.0)	961	52.3 (2.0)	763	57.5 (2.6)
19세이상(표준화)	4,713	42.8 (0.9)	4,388	42.2 (0.9)	4,291	41.9 (1.0)	1,737	43.7 (1.5)	3,967	44.2 (1.0)	4,239	46.7 (0.9)	3,553	48.5 (1.1)
연령(세)														
19-29	975	36.8 (1.8)	908	32.2 (2.0)	753	31.9 (2.1)	198	26.1 (3.8)	525	26.9 (2.3)	564	28.0 (1.9)	461	31.6 (2.6)
30-39	1,122	34.5 (1.5)	1,054	38.2 (1.9)	929	33.9 (1.8)	387	30.7 (2.2)	816	29.2 (1.9)	830	30.6 (1.8)	728	31.3 (2.1)
40-49	916	54.7 (1.7)	961	51.1 (2.0)	1,006	48.2 (2.0)	317	59.5 (3.2)	749	61.0 (1.9)	853	61.7 (1.9)	631	61.6 (2.4)
50-59	722	50.7 (2.1)	593	55.3 (2.5)	650	55.2 (2.1)	298	63.9 (3.6)	644	63.5 (2.2)	705	66.1 (2.1)	692	67.5 (2.1)
60-69	590	46.3 (2.3)	497	46.0 (2.3)	525	53.5 (2.6)	273	53.3 (4.3)	640	59.6 (2.3)	664	66.0 (2.3)	554	67.1 (2.1)
70+	388	29.7 (2.5)	375	28.0 (2.7)	428	37.7 (2.7)	264	38.9 (3.6)	593	36.6 (2.4)	623	45.7 (2.3)	487	54.0 (3.0)
거주지역														
동	3,031	43.0 (1.1)	3,482	43.4 (1.1)	3,442	41.4 (1.1)	1,248	44.8 (1.9)	2,922	43.5 (1.2)	3,166	46.9 (1.2)	2,781	49.9 (1.3)
읍면	1,682	38.7 (1.5)	906	38.1 (1.9)	849	44.6 (2.3)	489	42.5 (2.6)	1,045	52.7 (1.9)	1,073	54.1 (1.9)	772	52.4 (2.5)
소득수준														
하	1,115	33.9 (1.6)	939	32.1 (1.6)	1,097	34.7 (1.7)	411	38.4 (3.4)	951	37.8 (1.9)	1,043	42.2 (1.9)	872	43.2 (2.0)
중하	1,233	35.6 (1.7)	994	38.9 (1.8)	1,097	36.3 (1.6)	411	39.5 (2.8)	961	42.0 (1.9)	1,061	44.0 (1.6)	872	48.8 (2.4)
중상	1,133	42.6 (1.6)	1,075	44.3 (1.7)	1,028	45.6 (1.9)	424	46.9 (2.9)	958	47.1 (1.9)	1,045	48.9 (1.6)	886	55.0 (2.2)
상	1,232	53.7 (1.6)	1,108	53.4 (1.7)	1,027	52.1 (1.7)	401	53.7 (2.9)	969	54.3 (2.0)	1,048	58.6 (1.8)	871	56.2 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	3,031	43.9 (1.1)	3,482	43.2 (1.0)	3,442	41.6 (1.1)	1,248	43.8 (1.6)	2,922	43.5 (1.1)	3,166	46.1 (1.0)	2,781	49.1 (1.2)
읍면	1,682	38.4 (1.5)	906	38.5 (2.5)	849	41.8 (2.1)	489	43.3 (3.5)	1,045	47.0 (2.0)	1,073	47.6 (1.9)	772	45.5 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	1,115	34.5 (1.6)	939	31.7 (1.6)	1,097	34.2 (1.6)	411	38.7 (3.1)	951	36.9 (1.6)	1,043	40.7 (1.7)	872	41.3 (2.0)
중하	1,233	36.3 (1.7)	994	38.7 (1.8)	1,097	36.4 (1.6)	411	38.9 (2.3)	961	40.8 (1.8)	1,061	41.1 (1.5)	872	47.0 (2.3)
중상	1,133	43.5 (1.6)	1,075	44.1 (1.6)	1,028	45.4 (1.8)	424	46.4 (2.8)	958	46.6 (1.8)	1,045	47.7 (1.6)	886	52.9 (2.2)
상	1,232	54.3 (1.5)	1,108	53.2 (1.6)	1,027	52.4 (1.7)	401	52.0 (2.9)	969	53.4 (2.1)	1,048	58.0 (1.7)	871	55.0 (2.3)

표 1-VI-2. 암검진수진율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,966	36.2 (1.5)	6,795	42.9 (0.9)	7,471	46.1 (0.8)	6,251	46.6 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	716	30.1 (2.2)	1,515	43.3 (1.6)	1,648	50.0 (1.6)	1,378	54.3 (2.3)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,966	35.6 (1.3)	6,795	42.0 (0.8)	7,471	44.7 (0.7)	6,251	44.7 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	337	13.7 (2.1)	890	14.4 (1.1)	1,048	17.2 (1.2)	767	11.9 (1.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	632	34.5 (2.7)	1,411	38.2 (1.5)	1,425	39.0 (1.7)	1,253	39.2 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	562	47.9 (2.5)	1,324	58.1 (1.6)	1,495	58.7 (1.4)	1,162	59.1 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	505	52.5 (3.2)	1,134	59.4 (1.8)	1,247	63.0 (1.7)	1,170	66.2 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	485	43.5 (3.4)	1,077	57.1 (1.9)	1,205	64.2 (1.7)	1,027	67.1 (1.8)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	445	25.9 (2.4)	959	36.1 (1.7)	1,051	43.1 (1.9)	872	47.6 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,109	36.0 (1.7)	4,994	42.0 (1.1)	5,556	45.0 (0.9)	4,883	46.2 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	857	36.8 (3.3)	1,801	47.1 (1.6)	1,915	50.6 (1.9)	1,368	47.9 (2.0)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	707	30.1 (2.5)	1,632	36.2 (1.6)	1,860	38.8 (1.6)	1,538	40.2 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	694	34.6 (2.6)	1,633	40.7 (1.5)	1,862	43.7 (1.4)	1,540	48.1 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	730	36.8 (2.4)	1,662	44.9 (1.4)	1,819	48.2 (1.4)	1,561	48.0 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	696	44.7 (2.4)	1,659	50.9 (1.8)	1,850	54.5 (1.5)	1,532	50.9 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,109	35.3 (1.5)	4,994	41.8 (0.9)	5,556	44.4 (0.8)	4,883	45.6 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	857	36.8 (3.2)	1,801	41.0 (1.8)	1,915	45.4 (2.0)	1,368	41.2 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	707	29.8 (2.4)	1,632	35.4 (1.3)	1,860	37.8 (1.3)	1,538	38.7 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	694	34.0 (2.2)	1,633	39.7 (1.5)	1,862	42.0 (1.4)	1,540	46.0 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	730	36.4 (2.3)	1,662	44.4 (1.3)	1,819	46.9 (1.2)	1,561	45.9 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	696	43.1 (2.3)	1,659	49.3 (1.6)	1,850	53.2 (1.4)	1,532	49.4 (1.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,233	27.4 (1.9)	2,833	33.7 (1.2)	3,232	35.8 (1.3)	2,698	37.6 (1.2)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	301	30.4 (3.6)	580	47.8 (2.6)	687	50.0 (2.3)	615	56.0 (2.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,233	26.9 (1.8)	2,833	33.0 (1.0)	3,232	34.7 (1.0)	2,698	35.8 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	139	6.1 (2.1)	366	3.5 (0.9)	484	7.0 (1.3)	306	1.9 (0.8)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	245	21.9 (3.5)	595	23.8 (2.1)	595	23.6 (2.1)	525	24.1 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	247	35.1 (3.5)	577	47.3 (2.4)	642	47.9 (2.1)	531	49.3 (2.4)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	205	45.1 (4.5)	490	52.4 (2.7)	542	53.2 (2.6)	478	60.5 (2.8)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	213	41.4 (4.1)	439	52.4 (2.6)	541	61.4 (2.4)	473	66.3 (2.8)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	184	26.3 (4.7)	366	45.0 (3.1)	428	44.2 (3.1)	385	47.6 (3.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	862	27.0 (2.1)	2,077	32.6 (1.4)	2,390	34.1 (1.3)	2,102	36.6 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	371	29.1 (3.7)	756	38.7 (2.1)	842	42.9 (3.1)	596	41.3 (2.9)

1) 암검진수진율 : 최근 2년 동안 암검진을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 암검진수진율 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	297	20.8 (3.2)	681	27.5 (1.9)	817	28.4 (2.1)	666	30.0 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	285	26.3 (3.2)	673	29.2 (1.9)	801	32.2 (1.9)	668	41.5 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	305	26.2 (3.1)	706	34.9 (2.0)	774	39.2 (1.9)	675	38.8 (2.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	297	37.7 (3.4)	690	43.4 (2.5)	802	44.9 (2.3)	661	41.6 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	862	26.7 (2.0)	2,077	32.9 (1.2)	2,390	34.3 (1.1)	2,102	36.5 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	371	28.0 (3.8)	756	31.6 (2.3)	842	36.3 (2.7)	596	32.8 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	297	20.3 (2.8)	681	27.0 (1.6)	817	27.9 (1.9)	666	28.4 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	285	25.7 (2.9)	673	28.3 (1.8)	801	30.9 (1.7)	668	39.1 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	305	26.3 (3.0)	706	35.1 (1.7)	774	38.0 (1.7)	675	37.2 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	297	36.7 (3.3)	690	41.9 (1.8)	802	43.5 (2.0)	661	40.6 (2.1)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,733	44.6 (1.7)	3,962	52.0 (1.1)	4,239	56.1 (1.0)	3,553	55.3 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	415	30.0 (2.5)	935	40.2 (1.8)	961	50.0 (2.0)	763	53.0 (2.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,733	44.6 (1.5)	3,962	51.7 (1.0)	4,239	55.2 (0.9)	3,553	53.9 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	198	21.4 (3.3)	524	26.1 (2.1)	564	28.4 (2.0)	461	22.4 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	387	47.6 (3.0)	816	53.2 (2.1)	830	55.4 (1.9)	728	55.0 (2.2)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	315	61.2 (3.3)	747	69.3 (1.8)	853	69.8 (1.7)	631	69.3 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	300	59.8 (3.6)	644	66.4 (2.2)	705	72.9 (2.1)	692	71.8 (2.2)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	272	45.2 (4.8)	638	61.3 (2.4)	664	66.8 (2.2)	554	67.8 (2.4)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	261	25.6 (3.1)	593	30.7 (2.0)	623	42.4 (2.3)	487	47.5 (3.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	44.6 (2.0)	2,917	51.3 (1.3)	3,166	55.7 (1.1)	2,781	55.7 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	486	44.7 (3.7)	1,045	55.3 (1.8)	1,073	58.0 (1.8)	772	54.1 (2.5)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	410	39.3 (3.1)	951	44.7 (2.1)	1,043	49.4 (1.8)	872	49.9 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	409	42.1 (2.8)	960	51.7 (1.8)	1,061	54.7 (1.8)	872	54.5 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	47.5 (3.0)	956	54.9 (2.0)	1,045	57.0 (1.7)	886	56.9 (2.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	399	52.1 (3.1)	969	58.3 (1.9)	1,048	63.8 (1.7)	871	60.7 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	44.1 (1.8)	2,917	51.3 (1.2)	3,166	55.0 (1.0)	2,781	54.8 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	486	46.7 (3.4)	1,045	52.2 (2.3)	1,073	55.6 (2.2)	772	50.8 (2.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	410	39.6 (3.0)	951	44.3 (1.9)	1,043	48.0 (1.7)	872	48.8 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	409	42.0 (2.4)	960	50.9 (1.8)	1,061	53.4 (1.9)	872	53.3 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	47.2 (2.8)	956	55.0 (1.9)	1,045	56.2 (1.6)	886	54.7 (1.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	399	50.4 (2.7)	969	57.9 (1.8)	1,048	63.5 (1.6)	871	59.7 (1.9)

표 1-VI-3. 인플루엔자예방접종률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	7,747	35.1 (0.8)	2,982	29.1 (1.1)	6,801	29.3 (0.9)	7,472	27.7 (0.8)	6,251	29.6 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	1,096	77.3 (1.5)	721	70.2 (2.4)	1,516	73.6 (1.6)	1,648	74.3 (1.5)	1,378	77.1 (1.6)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	7,747	35.0 (0.7)	2,982	28.3 (1.0)	6,801	28.1 (0.7)	7,472	26.3 (0.6)	6,251	28.3 (0.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,303	22.6 (1.4)	339	16.8 (2.0)	890	14.0 (1.4)	1,049	12.9 (1.3)	767	16.6 (1.7)
30-39	-	- -	-	- -	1,735	24.9 (1.3)	635	22.9 (2.0)	1,411	20.3 (1.3)	1,425	18.5 (1.3)	1,253	25.4 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	1,868	25.6 (1.2)	565	15.0 (1.6)	1,328	17.7 (1.3)	1,495	16.2 (1.2)	1,162	16.9 (1.2)
50-59	-	- -	-	- -	1,227	41.1 (1.9)	505	34.1 (2.7)	1,133	32.3 (1.8)	1,247	28.8 (1.6)	1,170	23.5 (1.5)
60-69	-	- -	-	- -	968	68.3 (1.9)	490	55.6 (3.6)	1,080	60.5 (2.1)	1,205	55.5 (2.1)	1,027	55.5 (2.0)
70+	-	- -	-	- -	646	78.0 (1.7)	448	74.0 (2.8)	959	76.1 (1.9)	1,051	78.4 (1.6)	872	80.6 (1.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,185	32.3 (0.8)	2,119	26.7 (1.2)	5,002	26.5 (0.9)	5,556	25.1 (0.8)	4,883	27.9 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,562	47.4 (2.1)	863	37.8 (2.3)	1,799	41.9 (3.2)	1,916	38.6 (2.3)	1,368	35.7 (2.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	1,980	32.8 (1.5)	713	26.2 (2.1)	1,632	25.9 (1.6)	1,860	25.3 (1.4)	1,538	27.0 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,972	35.1 (1.5)	696	28.6 (2.3)	1,634	30.1 (1.4)	1,862	27.8 (1.4)	1,540	30.7 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,848	34.3 (1.4)	733	28.8 (2.2)	1,663	28.8 (1.4)	1,819	27.2 (1.2)	1,561	28.5 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,860	38.3 (1.5)	701	32.2 (2.0)	1,660	31.0 (1.7)	1,851	30.4 (1.5)	1,532	32.3 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,185	33.9 (0.8)	2,119	26.9 (1.1)	5,002	27.0 (0.7)	5,556	25.5 (0.7)	4,883	28.2 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,562	39.5 (1.6)	863	34.4 (1.9)	1,799	32.2 (2.2)	1,916	28.7 (1.6)	1,368	27.6 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,980	32.9 (1.2)	713	26.0 (1.7)	1,632	25.4 (1.2)	1,860	24.4 (1.1)	1,538	26.1 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	1,972	34.7 (1.3)	696	28.7 (2.3)	1,634	29.1 (1.1)	1,862	26.5 (1.1)	1,540	29.8 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	1,848	34.4 (1.2)	733	28.6 (1.9)	1,663	28.3 (1.2)	1,819	25.9 (1.1)	1,561	27.0 (1.4)
상	-	- -	-	- -	1,860	38.4 (1.5)	701	30.8 (2.0)	1,660	29.5 (1.4)	1,851	28.2 (1.3)	1,532	30.5 (1.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	3,484	28.8 (0.9)	1,242	24.7 (1.3)	2,836	25.8 (1.1)	3,233	24.2 (0.9)	2,698	25.3 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	428	75.0 (2.4)	302	68.3 (3.2)	581	74.2 (2.3)	687	72.0 (2.1)	615	74.8 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,484	30.1 (0.8)	1,242	25.1 (1.2)	2,836	26.0 (1.0)	3,233	24.3 (0.8)	2,698	25.3 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	566	18.7 (1.9)	141	11.4 (3.1)	366	14.2 (1.9)	485	11.6 (1.7)	306	13.4 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	810	19.7 (1.5)	247	17.7 (2.8)	595	16.2 (1.7)	595	15.8 (1.6)	525	21.9 (2.0)
40-49	-	- -	-	- -	868	20.1 (1.4)	248	13.3 (2.3)	579	15.9 (1.5)	642	15.9 (1.7)	531	15.5 (2.0)
50-59	-	- -	-	- -	578	34.4 (2.3)	205	32.3 (3.6)	490	29.9 (2.3)	542	25.0 (2.1)	478	19.3 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	443	59.0 (2.5)	217	56.2 (5.0)	440	54.3 (3.1)	541	50.7 (2.6)	473	50.7 (2.7)
70+	-	- -	-	- -	219	81.8 (3.0)	184	71.6 (4.1)	366	79.3 (3.0)	428	79.0 (2.2)	385	80.0 (2.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	2,771	26.1 (0.9)	869	21.8 (1.5)	2,080	23.2 (1.1)	2,390	22.0 (0.9)	2,102	24.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	713	40.3 (2.3)	373	34.8 (2.9)	756	37.4 (3.3)	843	33.4 (2.5)	596	29.6 (2.9)

1) 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 인플루엔자접종률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	892	25.9 (1.7)	300	18.8 (2.4)	681	22.3 (2.1)	817	21.6 (1.8)	666	21.6 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	883	27.6 (1.7)	286	25.0 (3.1)	673	26.6 (1.9)	801	24.0 (1.7)	668	25.5 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	822	29.0 (1.7)	308	26.6 (2.9)	707	26.0 (1.8)	774	23.2 (1.5)	675	25.3 (2.2)
상	-	- -	-	- -	842	33.0 (2.0)	299	28.1 (2.5)	691	27.3 (2.1)	803	28.1 (1.9)	661	29.0 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	2,771	28.9 (1.0)	869	23.3 (1.4)	2,080	24.9 (1.0)	2,390	23.6 (0.9)	2,102	25.2 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	713	35.3 (1.7)	373	32.2 (2.9)	756	29.8 (2.5)	843	26.7 (2.1)	596	24.2 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	892	27.6 (1.5)	300	19.5 (1.9)	681	23.0 (1.8)	817	21.8 (1.6)	666	22.0 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	883	28.5 (1.5)	286	25.9 (2.9)	673	26.7 (1.7)	801	24.2 (1.5)	668	25.8 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	822	30.7 (1.6)	308	27.7 (2.6)	707	27.0 (1.7)	774	23.4 (1.4)	675	24.8 (2.1)
상	-	- -	-	- -	842	34.3 (1.9)	299	28.0 (2.4)	691	27.4 (1.7)	803	27.6 (1.8)	661	28.7 (1.9)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	4,263	41.4 (0.9)	1,740	33.3 (1.4)	3,965	32.7 (1.1)	4,239	31.2 (1.0)	3,553	33.9 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	668	78.8 (1.7)	419	71.5 (3.1)	935	73.2 (1.8)	961	75.8 (1.8)	763	78.8 (1.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,263	40.1 (0.9)	1,740	31.5 (1.3)	3,965	30.2 (0.8)	4,239	28.3 (0.8)	3,553	31.3 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	737	26.9 (1.8)	198	22.3 (2.8)	524	13.8 (1.7)	564	14.3 (1.8)	461	20.0 (2.3)
30-39	-	- -	-	- -	925	30.2 (1.8)	388	28.4 (3.3)	816	24.5 (1.7)	830	21.3 (1.7)	728	29.1 (2.1)
40-49	-	- -	-	- -	1,000	31.2 (1.6)	317	16.8 (2.6)	749	19.5 (1.7)	853	16.6 (1.4)	631	18.4 (1.7)
50-59	-	- -	-	- -	649	47.9 (2.4)	300	35.8 (3.2)	643	34.8 (2.3)	705	32.7 (2.1)	692	27.6 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	525	76.3 (2.5)	273	55.0 (4.8)	640	66.0 (2.1)	664	59.8 (2.3)	554	59.8 (2.4)
70+	-	- -	-	- -	427	75.8 (2.1)	264	75.4 (3.3)	593	74.3 (2.3)	623	78.0 (1.9)	487	81.1 (2.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,414	38.4 (0.9)	1,250	31.3 (1.6)	2,922	29.6 (1.1)	3,166	28.2 (1.0)	2,781	31.7 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	849	54.1 (2.3)	490	40.9 (2.7)	1,043	46.3 (3.5)	1,073	43.7 (2.6)	772	41.5 (2.5)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,088	39.5 (1.8)	413	33.4 (2.8)	951	29.4 (1.8)	1,043	29.2 (1.6)	872	32.1 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	1,089	42.5 (1.9)	410	31.9 (2.9)	961	33.5 (1.9)	1,061	31.5 (1.9)	872	35.8 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,026	39.4 (1.8)	425	31.1 (2.9)	956	31.8 (1.8)	1,045	31.0 (1.7)	886	31.7 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,018	43.6 (1.7)	402	36.6 (3.1)	969	34.6 (2.1)	1,048	32.6 (1.8)	871	35.8 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,414	39.1 (1.0)	1,250	30.5 (1.5)	2,922	29.1 (0.9)	3,166	27.4 (0.8)	2,781	31.2 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	849	43.9 (2.1)	490	36.4 (2.5)	1,043	33.7 (2.4)	1,073	30.9 (2.0)	772	31.4 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,088	38.2 (1.6)	413	32.5 (2.4)	951	28.0 (1.5)	1,043	27.0 (1.3)	872	29.9 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,089	41.1 (1.8)	410	31.1 (3.0)	961	31.4 (1.5)	1,061	28.9 (1.6)	872	33.7 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,026	38.4 (1.7)	425	29.9 (2.6)	956	29.8 (1.5)	1,045	28.4 (1.5)	886	29.1 (1.8)
상	-	- -	-	- -	1,018	42.7 (1.7)	402	33.9 (3.0)	969	32.0 (1.8)	1,048	28.8 (1.6)	871	32.9 (2.1)

표 1-VI-4. 소아청소년 인플루엔자예방접종률[1] 추이 : 성별, 만1-18세, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1-18	-	- -	-	- -	-	- -	1,160	36.6 (2.2)	2,462	36.6 (1.4)	2,539	39.5 (1.7)	2,115	45.2 (1.9)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	-	- -	315	63.8 (3.8)	656	66.8 (2.1)	664	65.8 (2.0)	604	73.9 (2.2)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	476	46.2 (3.9)	971	43.7 (2.0)	894	46.7 (2.4)	780	57.4 (2.6)
12-14	-	- -	-	- -	-	- -	191	19.8 (3.5)	428	21.0 (2.4)	470	30.0 (2.6)	371	31.7 (3.1)
15-18	-	- -	-	- -	-	- -	178	12.8 (3.7)	407	13.1 (2.4)	511	17.0 (2.7)	360	16.3 (2.5)
남자														
1-18	-	- -	-	- -	-	- -	620	35.9 (2.4)	1,277	34.7 (1.8)	1,337	38.3 (1.9)	1,101	44.4 (2.1)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	-	- -	178	67.2 (4.5)	329	64.0 (3.0)	367	67.7 (2.7)	297	71.5 (3.4)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	245	43.2 (4.6)	506	41.5 (2.8)	460	46.5 (3.1)	408	53.7 (3.2)
12-14	-	- -	-	- -	-	- -	106	20.4 (4.5)	230	20.4 (3.1)	245	25.3 (2.9)	203	32.1 (3.7)
15-18	-	- -	-	- -	-	- -	91	13.0 (4.7)	212	11.6 (3.0)	265	15.4 (3.0)	193	21.4 (3.4)
여자														
1-18	-	- -	-	- -	-	- -	540	37.4 (3.0)	1,185	38.7 (1.8)	1,202	40.8 (2.1)	1,014	46.2 (2.6)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	-	- -	137	60.0 (5.0)	327	69.9 (2.9)	297	63.8 (2.9)	307	76.5 (2.5)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	231	49.3 (5.0)	465	46.2 (2.6)	434	46.8 (3.1)	372	61.3 (3.5)
12-14	-	- -	-	- -	-	- -	85	19.0 (4.9)	198	21.7 (3.2)	225	35.4 (4.2)	168	31.3 (4.7)
15-18	-	- -	-	- -	-	- -	87	12.5 (4.1)	195	14.8 (3.6)	246	18.9 (3.3)	167	9.8 (2.6)

1) 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

표 1-VI-5. 건강검진수진율[1], 암검진수진율[2] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	건강검진수진율						암검진수진율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,251	54.1 (0.9)	2,698	57.8 (1.3)	3,553	50.5 (1.2)	6,251	46.6 (0.9)	2,698	37.6 (1.2)	3,553	55.4 (1.1)
연령(세)												
19-29	767	31.1 (2.1)	306	30.7 (3.3)	461	31.6 (2.6)	767	11.9 (1.3)	306	1.9 (0.8)	461	22.4 (2.4)
30-39	1,253	46.3 (1.8)	525	60.6 (2.5)	728	31.3 (2.1)	1,253	39.2 (1.6)	525	24.1 (1.9)	728	55.0 (2.2)
40-49	1,162	64.4 (1.7)	531	67.1 (2.4)	631	61.6 (2.4)	1,162	59.1 (1.7)	531	49.3 (2.4)	631	69.3 (2.1)
50-59	1,170	66.7 (1.8)	478	65.9 (2.8)	692	67.5 (2.1)	1,170	66.3 (1.9)	478	60.5 (2.8)	692	72.0 (2.2)
60-69	1,027	69.0 (1.7)	473	71.2 (2.6)	554	67.1 (2.1)	1,027	67.1 (1.8)	473	66.3 (2.8)	554	67.8 (2.4)
70+	872	55.8 (2.6)	385	58.6 (3.4)	487	54.0 (3.0)	872	47.6 (2.7)	385	47.6 (3.5)	487	47.5 (3.3)
19-64	4,873	53.1 (1.0)	2,083	57.0 (1.4)	2,790	49.1 (1.3)	4,873	45.4 (0.9)	2,083	35.2 (1.2)	2,790	55.8 (1.2)
65+	1,378	60.2 (2.1)	615	64.1 (2.5)	763	57.5 (2.6)	1,378	54.3 (2.3)	615	56.0 (2.8)	763	53.0 (2.7)
거주지역												
동	4,883	53.8 (1.0)	2,102	57.8 (1.4)	2,781	49.9 (1.3)	4,883	46.2 (1.0)	2,102	36.6 (1.3)	2,781	55.7 (1.2)
읍면	1,368	55.1 (2.3)	596	58.0 (3.0)	772	52.4 (2.5)	1,368	47.9 (2.0)	596	41.3 (2.9)	772	54.1 (2.5)
소득수준[3]												
하	1,538	44.8 (1.5)	666	46.4 (2.3)	872	43.2 (2.0)	1,538	40.2 (1.7)	666	30.0 (2.2)	872	49.9 (2.1)
중하	1,540	55.4 (1.8)	668	62.0 (2.5)	872	48.8 (2.4)	1,540	48.1 (1.7)	668	41.5 (2.6)	872	54.7 (2.1)
중상	1,561	58.1 (1.6)	675	61.2 (2.4)	886	55.0 (2.2)	1,561	48.0 (1.6)	675	38.8 (2.2)	886	56.9 (2.1)
상	1,532	59.7 (1.8)	661	62.9 (2.4)	871	56.2 (2.4)	1,532	50.9 (1.8)	661	41.6 (2.5)	871	60.7 (2.0)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,883	53.4 (0.9)	2,102	57.8 (1.3)	2,781	49.1 (1.2)	4,883	45.6 (0.8)	2,102	36.5 (1.0)	2,781	54.9 (1.1)
읍면	1,368	49.5 (2.9)	596	53.2 (3.7)	772	45.5 (3.0)	1,368	41.2 (1.8)	596	32.8 (2.2)	772	50.8 (2.7)
소득수준(표준화)												
하	1,538	43.4 (1.4)	666	45.4 (2.2)	872	41.3 (2.0)	1,538	38.7 (1.5)	666	28.4 (1.6)	872	48.8 (2.1)
중하	1,540	53.9 (1.7)	668	60.9 (2.3)	872	47.0 (2.3)	1,540	46.0 (1.4)	668	39.1 (1.9)	872	53.4 (2.0)
중상	1,561	57.0 (1.7)	675	60.9 (2.3)	886	52.9 (2.2)	1,561	45.9 (1.4)	675	37.2 (1.9)	886	54.7 (1.8)
상	1,532	58.7 (1.8)	661	62.4 (2.2)	871	55.0 (2.3)	1,532	49.4 (1.5)	661	40.6 (2.1)	871	59.7 (1.9)

1) 건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강검진을 받은 분율

2) 암검진수진율 : 최근 2년 동안 암검진을 받은 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VI-6. 건강검진 종류 : 전체, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 종합건강검진	산업장 특수건강검진	건강보험 건강검진	무료건강검진	기타[1]
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,593	11.5 (0.8)	1.0 (0.2)	82.2 (1.0)	2.0 (0.5)	8.7 (0.9)
연령(세)						
19-29	239	7.1 (1.8)	0.9 (0.8)	63.4 (3.6)	3.9 (1.5)	26.3 (3.5)
30-39	571	15.4 (1.8)	2.3 (0.8)	76.0 (2.4)	1.5 (0.8)	10.4 (1.6)
40-49	774	12.8 (1.6)	1.0 (0.5)	83.5 (1.7)	1.9 (0.8)	8.1 (1.6)
50-59	809	11.6 (1.4)	0.8 (0.5)	88.3 (1.5)	0.9 (0.4)	4.6 (0.9)
60-69	721	9.4 (1.5)	0.0 (-)[4]	89.9 (1.5)	1.9 (0.9)	3.2 (0.9)
70+	479	8.3 (1.5)	0.0 (-)	88.7 (1.7)	3.2 (0.9)	2.7 (1.1)
19-64	2,763	12.1 (0.9)	1.1 (0.3)	80.9 (1.1)	1.9 (0.5)	9.6 (1.0)
65+	830	7.9 (1.1)	0.0 (-)	89.8 (1.3)	2.5 (0.7)	3.4 (0.9)
거주지역						
동	2,792	12.0 (1.0)	0.8 (0.2)	81.6 (1.1)	1.9 (0.6)	9.4 (1.0)
읍면	801	9.5 (1.3)	1.6 (0.7)	84.4 (1.6)	2.0 (0.7)	6.1 (1.5)
소득수준[2]						
하	738	10.5 (1.6)	0.5 (0.4)	81.3 (1.9)	2.9 (0.9)	8.0 (1.5)
중하	882	11.1 (1.4)	1.3 (0.6)	83.7 (1.6)	1.9 (0.6)	8.3 (1.5)
중상	955	10.6 (1.3)	1.2 (0.5)	83.4 (1.9)	0.8 (0.4)	9.1 (1.4)
상	977	13.2 (1.5)	0.8 (0.3)	81.2 (1.7)	1.7 (0.6)	9.5 (1.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,792	11.7 (1.0)	0.8 (0.3)	79.0 (1.3)	2.2 (0.6)	11.5 (1.2)
읍면	801	9.1 (1.2)	2.6 (1.0)	77.3 (2.9)	3.3 (1.6)	11.4 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	738	10.9 (1.9)	1.1 (0.9)	75.9 (2.6)	2.9 (1.0)	11.8 (2.1)
중하	882	11.2 (1.4)	1.5 (0.6)	78.9 (2.1)	2.2 (0.8)	12.0 (2.0)
중상	955	10.4 (1.4)	1.1 (0.5)	81.6 (2.2)	0.8 (0.4)	11.0 (1.7)
상	977	12.5 (1.5)	0.8 (0.3)	78.3 (2.2)	2.5 (1.0)	11.5 (1.9)

1) 기타 : 직장건강검진 등

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VI-7. 건강검진 종류 : 남자, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 종합건강검진	산업장 특수건강검진	건강보험 건강검진	무료건강검진	기타[1]
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,692	10.5 (1.0)	1.7 (0.4)	82.5 (1.4)	1.7 (0.5)	9.5 (1.1)
연령(세)						
19-29	93	3.0 (1.8)	1.9 (1.5)	63.5 (5.5)	4.2 (2.4)	28.8 (4.9)
30-39	337	9.6 (1.7)	3.1 (1.2)	85.2 (2.2)	0.5 (0.5)	8.4 (1.6)
40-49	376	13.2 (2.1)	1.8 (0.9)	80.7 (2.6)	1.8 (0.9)	9.2 (2.1)
50-59	322	13.0 (2.3)	1.5 (1.0)	85.9 (2.6)	1.0 (0.6)	6.3 (1.6)
60-69	345	9.2 (1.7)	0.0 (-)[4]	88.6 (1.9)	1.9 (1.0)	5.0 (1.7)
70+	219	10.1 (2.3)	0.0 (-)	89.3 (2.4)	3.3 (1.8)	1.7 (0.8)
19-64	1,301	10.7 (1.1)	2.0 (0.5)	81.5 (1.5)	1.6 (0.5)	10.3 (1.2)
65+	391	9.0 (1.6)	0.0 (-)	89.6 (1.6)	2.5 (1.1)	4.2 (1.2)
거주지역						
동	1,316	10.8 (1.1)	1.4 (0.5)	82.1 (1.6)	1.6 (0.6)	10.2 (1.3)
읍면	376	9.4 (2.0)	3.0 (1.2)	83.9 (2.3)	2.1 (0.8)	6.8 (1.8)
소득수준[2]						
하	329	10.9 (2.2)	1.0 (0.8)	79.3 (2.9)	2.2 (0.9)	10.5 (2.3)
중하	440	9.8 (1.7)	2.1 (1.0)	84.6 (2.2)	1.9 (0.7)	9.1 (2.1)
중상	446	9.0 (1.6)	2.3 (1.0)	83.0 (2.7)	0.9 (0.5)	9.8 (2.0)
상	463	12.2 (2.1)	1.3 (0.6)	83.0 (2.2)	1.4 (0.8)	9.1 (1.9)
거주지역(표준화[3])						
동	1,316	9.8 (1.1)	1.4 (0.5)	79.9 (1.8)	2.1 (0.7)	12.4 (1.5)
읍면	376	- -[5]	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	329	- -	- -	- -	- -	- -
중하	440	8.4 (1.4)	2.0 (0.9)	80.6 (2.9)	2.4 (1.3)	13.0 (2.9)
중상	446	8.5 (1.7)	1.8 (0.8)	82.5 (2.8)	0.9 (0.5)	11.1 (2.3)
상	463	11.1 (2.0)	1.3 (0.5)	79.9 (3.1)	2.9 (1.8)	10.9 (2.9)

1) 기타 : 직장건강검진, 국가유공자검진, 채용신체검사, 징병검사 등

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VI-8. 건강검진 종류 : 여자, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 종합건강검진	산업장 특수건강검진	건강보험 건강검진	무료건강검진	기타[1]
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,901	12.6 (1.0)	0.1 (0.1)	81.9 (1.1)	2.2 (0.6)	7.7 (0.8)
연령(세)						
19-29	146	11.3 (2.9)	0.0 (-)[4]	63.2 (4.8)	3.6 (1.8)	23.6 (4.2)
30-39	234	27.2 (3.4)	0.8 (0.5)	57.1 (4.2)	3.5 (2.1)	14.5 (2.8)
40-49	398	12.4 (2.1)	0.0 (-)	86.6 (2.0)	1.9 (0.8)	7.0 (1.6)
50-59	487	10.2 (1.6)	0.1 (0.1)	90.7 (1.5)	0.9 (0.5)	2.9 (0.7)
60-69	376	9.5 (2.0)	0.0 (-)	91.2 (1.9)	1.9 (1.0)	1.4 (0.5)
70+	260	7.1 (2.0)	0.0 (-)	88.4 (2.6)	3.1 (1.0)	3.4 (1.8)
19-64	1,462	13.8 (1.1)	0.1 (0.1)	80.1 (1.3)	2.2 (0.7)	8.8 (1.0)
65+	439	7.1 (1.4)	0.0 (-)	89.9 (1.8)	2.5 (0.7)	2.8 (1.2)
거주지역						
동	1,476	13.5 (1.2)	0.1 (0.1)	81.0 (1.3)	2.3 (0.7)	8.5 (1.0)
읍면	425	9.6 (1.7)	0.2 (0.2)	84.9 (2.3)	2.0 (0.8)	5.3 (1.4)
소득수준[2]						
하	409	10.0 (2.1)	0.0 (-)	83.4 (2.2)	3.5 (1.1)	5.4 (1.4)
중하	442	12.8 (1.9)	0.3 (0.2)	82.6 (2.4)	2.0 (0.8)	7.3 (1.7)
중상	509	12.4 (1.8)	0.1 (0.1)	83.7 (2.0)	0.7 (0.3)	8.5 (1.5)
상	514	14.4 (1.8)	0.1 (0.1)	79.0 (2.2)	2.0 (0.9)	9.9 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,476	15.0 (1.4)	0.1 (0.1)	76.0 (1.6)	2.5 (0.9)	11.0 (1.3)
읍면	425	- -[5]	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	409	13.1 (3.3)	0.0 (-)	75.5 (3.2)	4.2 (1.7)	9.0 (2.5)
중하	442	17.9 (2.4)	0.7 (0.5)	72.5 (3.2)	2.2 (1.0)	11.5 (2.6)
중상	509	13.6 (2.1)	0.0 (-)	78.8 (2.9)	0.7 (0.4)	11.8 (2.2)
상	514	14.4 (1.8)	0.2 (0.2)	75.3 (2.8)	2.5 (1.2)	12.2 (2.4)

1) 기타 : 직장건강검진, 국가유공자검진, 채용신체검사 등

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VI-9. 암검진 종류 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 암검진[1]	본인부담 특정암검진[2]	국민건강보험공단 무료 암검진[3]	무료 암검진	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,295	38.2 (1.3)	28.0 (1.3)	38.3 (1.5)	1.6 (0.4)	5.1 (0.6)
연령(세)						
19-29	120	86.8 (3.7)	2.1 (1.7)	5.1 (1.9)	2.5 (1.6)	7.2 (3.1)
30-39	541	65.1 (2.4)	8.6 (1.3)	21.5 (2.3)	2.6 (1.0)	8.3 (1.3)
40-49	722	32.0 (2.4)	34.6 (2.3)	38.8 (2.5)	1.0 (0.4)	6.6 (1.4)
50-59	792	32.7 (2.3)	36.1 (2.5)	42.4 (2.8)	0.4 (0.3)	4.0 (0.9)
60-69	707	21.8 (2.1)	34.9 (2.7)	50.4 (2.6)	2.5 (0.9)	1.8 (0.7)
70+	413	19.8 (2.2)	26.9 (3.9)	56.8 (3.8)	2.2 (1.0)	1.9 (0.8)
19-64	2,540	41.6 (1.4)	27.6 (1.3)	35.2 (1.5)	1.5 (0.4)	5.7 (0.7)
65+	755	20.5 (1.8)	30.2 (2.9)	54.5 (2.7)	1.9 (0.8)	2.2 (0.7)
거주지역						
동	2,572	40.4 (1.5)	30.9 (1.4)	34.0 (1.4)	1.6 (0.5)	5.1 (0.7)
읍면	723	30.7 (3.1)	17.9 (1.9)	53.2 (3.1)	1.6 (0.7)	5.5 (1.6)
소득수준[4]						
하	700	36.7 (2.4)	24.3 (2.3)	42.6 (2.7)	2.4 (0.9)	2.8 (0.8)
중하	809	39.2 (2.6)	26.6 (2.2)	40.6 (2.5)	1.8 (0.6)	3.6 (0.8)
중상	854	35.0 (1.9)	29.6 (2.3)	39.5 (2.6)	0.7 (0.4)	6.5 (1.2)
상	893	41.3 (2.3)	31.9 (2.3)	31.0 (1.9)	0.9 (0.5)	7.8 (1.3)
거주지역(표준화)[5]						
동	2,572	51.6 (1.3)	23.6 (1.1)	27.5 (1.2)	1.8 (0.6)	5.1 (0.7)
읍면	723	- -[6]	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	700	51.3 (2.1)	17.2 (1.7)	32.4 (2.0)	2.6 (0.9)	3.2 (1.0)
중하	809	50.6 (2.8)	19.3 (1.6)	32.4 (2.3)	1.6 (0.5)	5.4 (2.0)
중상	854	47.3 (2.5)	23.2 (2.5)	30.6 (2.1)	1.0 (0.7)	7.2 (1.4)
상	893	52.4 (2.1)	24.1 (1.8)	24.0 (1.6)	2.0 (1.4)	8.1 (1.6)

1) 본인부담 암검진 : 병의원의 건강검진센터등에서 본인이 비용을 모두 부담하여 받은 암검진

2) 본인부담 특정암검진 : 국민건강보험공단에서 검진 권고 통보를 받은 보험가입자가 검사비중 일부를 부담하여 받은 암검진

3) 국민건강보험공단 무료암검진 : 국민건강보험가입자 중 본인부담금 없이 무료로 받은 암검진(생애전환기건강진단 대상자등)

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

6) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VI-10. 암검진 종류 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 암검진[1]	본인부담 특정암검진[2]	국민건강보험공단 무료 암검진[3]	무료 암검진	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,228	28.4 (1.9)	28.0 (1.9)	44.1 (2.1)	1.2 (0.4)	6.9 (1.2)
연령(세)						
19-29	8	- -[6]	- -	- -	- -	- -
30-39	146	40.3 (4.9)	16.0 (3.2)	37.8 (4.7)	0.0 (-)[7]	12.8 (2.8)
40-49	278	26.7 (3.7)	30.3 (3.3)	41.5 (4.0)	0.4 (0.4)	8.1 (2.5)
50-59	284	29.2 (3.3)	31.0 (3.3)	43.5 (3.7)	0.8 (0.6)	6.5 (1.7)
60-69	326	22.7 (3.1)	30.3 (3.5)	51.5 (3.1)	3.0 (1.1)	2.7 (1.5)
70+	186	21.5 (3.3)	26.3 (4.8)	54.2 (4.7)	3.0 (1.8)	1.0 (0.6)
19-64	878	29.4 (2.1)	28.0 (2.0)	42.6 (2.4)	0.8 (0.3)	7.8 (1.3)
65+	350	23.2 (2.5)	28.3 (3.4)	51.6 (2.8)	2.7 (1.3)	2.5 (1.0)
거주지역						
동	942	29.9 (2.1)	31.2 (2.0)	41.1 (2.3)	0.8 (0.3)	6.5 (1.3)
읍면	286	23.4 (3.9)	17.9 (3.7)	53.8 (4.2)	2.3 (1.0)	8.4 (2.3)
소득수준[4]						
하	238	26.9 (3.7)	26.4 (3.4)	46.2 (4.1)	1.9 (0.9)	4.2 (1.8)
중하	316	29.5 (3.5)	28.0 (3.2)	44.6 (3.5)	1.4 (0.8)	5.3 (1.5)
중상	320	26.5 (2.8)	25.5 (3.0)	47.0 (3.8)	0.8 (0.6)	9.1 (2.5)
상	345	29.8 (3.4)	32.1 (3.5)	39.5 (3.4)	0.3 (0.3)	9.0 (2.0)
거주지역(표준화)[5]						
동	942	- -[8]	- -	- -	- -	- -
읍면	286	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	238	- -	- -	- -	- -	- -
중하	316	- -	- -	- -	- -	- -
중상	320	- -	- -	- -	- -	- -
상	345	- -	- -	- -	- -	- -

1) 본인부담 암검진 : 병의원의 건강검진센터등에서 본인이 비용을 모두 부담하여 받은 암검진

2) 본인부담 특정암검진 : 국민건강보험공단에서 검진 권고 통보를 받은 보험가입자가 검사비중 일부를 부담하여 받은 암검진

3) 국민건강보험공단 무료암검진 : 국민건강보험가입자 중 본인부담금 없이 무료로 받은 암검진(생애전환기건강진단 대상자등)

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

8) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VI-11. 암검진 종류 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 암검진[1]	본인부담 특정암검진[2]	국민건강보험공단 무료 암검진[3]	무료 암검진	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	2,067	44.8 (1.3)	28.0 (1.4)	34.4 (1.8)	1.8 (0.6)	4.0 (0.5)
연령(세)						
19-29	112	91.0 (2.8)	0.4 (0.4)	4.4 (1.9)	2.7 (1.8)	5.4 (2.3)
30-39	395	76.6 (2.4)	5.2 (1.5)	14.0 (2.0)	3.8 (1.5)	6.2 (1.2)
40-49	444	35.8 (2.6)	37.8 (2.8)	36.8 (2.8)	1.5 (0.6)	5.5 (1.4)
50-59	508	35.7 (2.6)	40.3 (3.0)	41.4 (3.2)	0.0 (-)[6]	2.0 (0.6)
60-69	381	21.0 (2.7)	38.9 (3.8)	49.4 (4.0)	2.1 (1.1)	1.0 (0.4)
70+	227	18.7 (3.0)	27.3 (4.5)	58.4 (4.5)	1.7 (0.8)	2.4 (1.2)
19-64	1,662	49.5 (1.4)	27.3 (1.4)	30.4 (1.7)	1.9 (0.6)	4.3 (0.6)
65+	405	18.6 (2.1)	31.7 (3.6)	56.7 (4.0)	1.3 (0.6)	1.9 (0.8)
거주지역						
동	1,630	47.1 (1.6)	30.8 (1.4)	29.4 (1.5)	2.0 (0.7)	4.1 (0.6)
읍면	437	36.2 (3.2)	17.9 (2.4)	52.7 (4.4)	1.1 (0.5)	3.3 (1.1)
소득수준[4]						
하	462	42.2 (2.6)	23.0 (2.5)	40.5 (2.9)	2.6 (1.0)	2.0 (0.7)
중하	493	46.4 (3.0)	25.5 (2.5)	37.7 (3.3)	2.2 (0.7)	2.4 (0.8)
중상	534	40.5 (2.6)	32.2 (2.8)	34.6 (2.9)	0.5 (0.3)	4.9 (1.0)
상	548	49.6 (2.5)	31.7 (2.4)	24.9 (2.3)	1.3 (0.9)	6.9 (1.4)
거주지역(표준화)[5]						
동	1,630	55.9 (1.2)	24.3 (1.1)	24.4 (1.2)	2.2 (0.8)	4.3 (0.7)
읍면	437	- -[7]	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	462	53.0 (2.3)	17.3 (1.9)	32.6 (2.3)	3.0 (1.1)	2.5 (1.0)
중하	493	56.5 (2.2)	19.7 (1.9)	30.2 (2.4)	2.0 (0.6)	3.1 (1.1)
중상	534	53.2 (2.0)	23.6 (2.0)	26.7 (2.2)	1.0 (0.7)	5.9 (1.5)
상	548	58.1 (2.1)	25.1 (1.9)	20.3 (1.8)	2.3 (1.6)	6.7 (1.4)

1) 본인부담 암검진 : 병의원의 건강검진센터등에서 본인이 비용을 모두 부담하여 받은 암검진

2) 본인부담 특정암검진 : 국민건강보험공단에서 검진 권고 통보를 받은 보험가입자가 검사비중 일부를 부담하여 받은 암검진

3) 국민건강보험공단 무료암검진 : 국민건강보험가입자 중 본인부담금 없이 무료로 받은 암검진(생애전환기건강진단 대상자등)

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

6) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VI-12. 위암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	6,249	20.4 (0.8)	12.8 (0.5)	12.5 (0.5)	54.3 (1.0)
40세이상[1)]	4,230	30.4 (1.0)	19.3 (0.8)	16.2 (0.7)	34.1 (1.0)
65세이상	1,377	25.6 (1.6)	19.1 (1.5)	17.7 (1.2)	37.6 (2.0)
성별					
남자	2,696	19.9 (1.0)	12.8 (0.7)	11.3 (0.8)	56.1 (1.4)
여자	3,553	20.9 (1.0)	12.8 (0.7)	13.7 (0.7)	52.6 (1.1)
연령(세)					
19-29	767	1.8 (0.5)	1.2 (0.4)	4.3 (0.8)	92.8 (1.0)
30-39	1,252	10.1 (1.0)	5.5 (0.7)	9.9 (1.1)	74.4 (1.5)
40-49	1,162	30.3 (1.6)	17.5 (1.4)	15.2 (1.3)	37.0 (1.7)
50-59	1,170	33.0 (1.7)	21.6 (1.4)	16.2 (1.2)	29.2 (1.9)
60-69	1,026	33.2 (2.1)	22.1 (1.8)	18.2 (1.3)	26.5 (1.7)
70+	872	22.2 (1.7)	15.9 (1.9)	16.3 (1.5)	45.5 (2.6)

1) 국가암조기검진 대상연령(위암) : 만 40세이상, 2년주기

표 1-VI-13. 유방암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,540	23.9 (0.9)	14.3 (0.7)	16.7 (0.7)	45.0 (1.0)
40세이상[1)]	2,358	34.7 (1.2)	20.4 (1.1)	21.2 (1.0)	23.7 (1.3)
65세이상	761	23.9 (2.1)	18.6 (2.0)	21.9 (1.9)	35.7 (2.9)
연령(세)					
19-29	455	2.6 (0.7)	2.0 (0.8)	3.7 (1.0)	91.8 (1.5)
30-39	727	11.6 (1.6)	7.8 (1.4)	15.5 (1.8)	65.0 (2.1)
40-49	630	37.8 (2.2)	18.6 (1.7)	20.1 (1.9)	23.5 (2.0)
50-59	690	39.1 (2.2)	23.1 (2.0)	21.8 (1.8)	16.0 (1.9)
60-69	552	35.1 (2.3)	23.9 (2.3)	26.0 (1.9)	15.0 (2.2)
70+	486	21.2 (2.6)	16.1 (2.3)	17.7 (2.2)	45.0 (3.4)

1) 국가암조기검진 대상연령(유방암) : 만 40세이상, 2년주기

표 1-VI-14. 자궁경부암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,540	28.7 (1.0)	16.2 (0.7)	19.6 (0.9)	35.5 (1.0)
30세이상[1]	3,085	32.4 (1.1)	18.7 (0.8)	23.3 (1.0)	25.6 (1.1)
65세이상	761	18.2 (1.8)	14.5 (1.7)	24.3 (2.1)	43.0 (3.0)
연령(세)					
19-29	455	12.6 (2.1)	5.4 (1.1)	3.8 (1.0)	78.2 (2.2)
30-39	727	31.4 (2.2)	18.2 (1.5)	20.9 (1.9)	29.4 (2.1)
40-49	630	37.7 (2.3)	21.0 (2.0)	24.3 (2.0)	17.0 (2.0)
50-59	690	38.9 (2.0)	21.1 (1.9)	22.9 (1.8)	17.0 (1.8)
60-69	552	31.1 (2.4)	17.5 (2.2)	29.4 (2.1)	22.0 (2.2)
70+	486	14.7 (2.2)	12.6 (2.1)	20.2 (2.2)	52.5 (3.2)

1) 국가암조기검진 대상연령(자궁경부암) : 만 30세이상, 2년주기

표 1-VI-15. 대장암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상 5년이내	5년이상 10년이내	10년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	6,251	11.2 (0.5)	7.3 (0.4)	6.3 (0.4)	1.9 (0.2)	0.5 (0.1)	72.7 (0.9)
50세이상[1]	3,069	21.3 (1.0)	13.7 (0.8)	10.9 (0.7)	2.6 (0.3)	0.9 (0.2)	50.5 (1.4)
65세이상	1,378	17.1 (1.3)	13.9 (1.4)	9.8 (0.9)	3.1 (0.5)	1.0 (0.3)	55.0 (2.0)
성별							
남자	2,698	11.8 (0.7)	7.4 (0.6)	6.1 (0.6)	1.8 (0.3)	0.5 (0.1)	72.3 (1.2)
여자	3,553	10.6 (0.6)	7.3 (0.6)	6.6 (0.5)	2.0 (0.2)	0.6 (0.1)	73.0 (1.0)
연령(세)							
19-29	767	0.9 (0.3)	0.6 (0.2)	1.1 (0.4)	0.1 (0.1)	0.0 (-)[2]	97.4 (0.6)
30-39	1,253	4.3 (0.6)	3.5 (0.7)	3.7 (0.5)	1.6 (0.4)	0.3 (0.1)	86.5 (1.2)
40-49	1,162	10.0 (0.9)	6.3 (0.8)	5.8 (0.7)	2.8 (0.6)	0.6 (0.3)	74.4 (1.5)
50-59	1,170	23.0 (1.5)	13.7 (1.3)	11.5 (1.1)	2.1 (0.5)	0.6 (0.3)	49.1 (2.1)
60-69	1,027	24.9 (1.9)	15.6 (1.4)	13.0 (1.3)	3.2 (0.6)	1.7 (0.5)	41.6 (2.1)
70+	872	13.8 (1.4)	11.5 (1.7)	7.4 (1.0)	2.9 (0.6)	0.7 (0.3)	63.6 (2.5)

1) 국가암조기검진 대상연령(대장암) : 만 50세이상, 분변잠혈반응검사(1년주기) 이상소견 시 대장내시경검사 또는 대장이중조영검사와 에스결장경검사(5-10년주기)실시

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VI-16. 간암검사수진율(고위험군)[1] : 성별, 만19세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	N	6개월이내	6개월이상 1년이내	1년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	741	12.8 (1.4)	9.6 (1.4)	15.6 (1.6)	61.9 (2.1)
40세이상[2]	528	14.8 (1.8)	11.6 (1.8)	19.0 (2.1)	54.7 (2.6)
65세이상	122	11.4 (3.4)	4.2 (1.8)	19.8 (4.9)	64.6 (5.3)
성별					
남자	349	14.6 (2.2)	10.8 (1.9)	15.6 (2.1)	59.1 (3.1)
여자	392	10.7 (1.8)	8.4 (1.7)	15.8 (2.1)	65.2 (2.8)
연령(세)					
19-29	55	1.3 (1.3)	1.0 (1.0)	6.8 (4.4)	90.9 (4.5)
30-39	158	12.4 (3.1)	8.1 (3.3)	10.1 (2.6)	69.4 (4.5)
40-49	193	16.0 (3.1)	15.3 (2.9)	16.6 (2.9)	52.0 (4.0)
50-59	161	16.7 (3.2)	7.5 (2.5)	20.5 (3.6)	55.3 (4.4)
60-69	113	7.6 (2.6)	11.6 (4.1)	25.5 (5.3)	55.3 (5.6)
70+	61	14.4 (5.4)	6.8 (3.5)	12.4 (4.3)	66.4 (6.8)

1) 고위험군 : B형간염표면항원(HBsAg)양성 또는 C형 간염, 간경변증을 의사로부터 진단받았다고 응답한 사람
2) 국가암조기검진 대상연령(간암) : 만 40세이상 고위험군, 6개월주기

표 1-VI-17. 인플루엔자예방접종률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,251	29.6 (0.9)	2,698	25.3 (1.1)	3,553	33.9 (1.0)
연령(세)						
19-29	767	16.6 (1.7)	306	13.4 (2.4)	461	20.0 (2.3)
30-39	1,253	25.4 (1.6)	525	21.9 (2.0)	728	29.1 (2.1)
40-49	1,162	16.9 (1.2)	531	15.5 (2.0)	631	18.4 (1.7)
50-59	1,170	23.5 (1.5)	478	19.3 (2.1)	692	27.6 (2.1)
60-69	1,027	55.5 (2.0)	473	50.7 (2.7)	554	59.8 (2.4)
70+	872	80.6 (1.7)	385	80.0 (2.6)	487	81.1 (2.1)
19-64	4,873	22.1 (0.8)	2,083	18.9 (1.0)	2,790	25.3 (1.0)
65+	1,378	77.1 (1.6)	615	74.8 (2.4)	763	78.8 (1.8)
거주지역						
동	4,883	27.9 (0.9)	2,102	24.1 (1.1)	2,781	31.7 (1.1)
읍면	1,368	35.7 (2.3)	596	29.6 (2.9)	772	41.5 (2.5)
소득수준[2]						
하	1,538	27.0 (1.7)	666	21.6 (2.0)	872	32.1 (1.9)
중하	1,540	30.7 (1.5)	668	25.5 (1.9)	872	35.8 (2.0)
중상	1,561	28.5 (1.5)	675	25.3 (2.2)	886	31.7 (2.0)
상	1,532	32.3 (1.5)	661	29.0 (2.1)	871	35.8 (2.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,883	28.2 (0.8)	2,102	25.2 (1.1)	2,781	31.2 (1.0)
읍면	1,368	27.6 (1.9)	596	24.2 (2.3)	772	31.4 (2.4)
소득수준(표준화)						
하	1,538	26.1 (1.4)	666	22.0 (1.8)	872	29.9 (1.7)
중하	1,540	29.8 (1.4)	668	25.8 (1.7)	872	33.7 (2.0)
중상	1,561	27.0 (1.4)	675	24.8 (2.1)	886	29.1 (1.8)
상	1,532	30.5 (1.5)	661	28.7 (1.9)	871	32.9 (2.1)

1) 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VI-18. 소아청소년 인플루엔자예방접종률[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,115	45.2 (1.9)	1,101	44.4 (2.1)	1,014	46.2 (2.6)
연령(세)						
1-5	604	73.9 (2.2)	297	71.5 (3.4)	307	76.5 (2.5)
6-11	780	57.4 (2.6)	408	53.7 (3.2)	372	61.3 (3.5)
12-14	371	31.7 (3.1)	203	32.1 (3.7)	168	31.3 (4.7)
15-18	360	16.3 (2.5)	193	21.4 (3.4)	167	9.8 (2.6)
1-11	1,384	64.1 (1.9)	705	60.9 (2.5)	679	67.4 (2.4)
12-18	731	22.6 (2.1)	396	25.7 (2.6)	335	19.0 (2.8)
거주지역						
동	1,783	45.1 (2.0)	935	43.8 (2.3)	848	46.7 (2.7)
읍면	332	45.7 (5.4)	166	47.2 (4.9)	166	44.2 (7.1)
소득수준[2]						
하	509	39.3 (3.3)	266	38.9 (3.9)	243	39.8 (4.3)
중하	516	46.9 (3.2)	269	44.4 (3.8)	247	49.8 (4.7)
중상	532	49.7 (3.5)	273	50.0 (4.1)	259	49.4 (3.9)
상	524	46.1 (3.4)	275	45.5 (4.2)	249	46.8 (5.2)

1) 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-VI-19. 소아선천성대사이상검사 수진율[1] : 성별, 만1-11세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-11세	1,301	92.5 (1.1)	670	90.9 (1.7)	631	94.4 (1.1)
연령(세)						
1-5	580	96.6 (1.2)	287	95.5 (1.7)	293	97.8 (1.0)
6-11	721	89.6 (1.6)	383	87.6 (2.4)	338	92.0 (1.7)
거주지역						
동	1,102	91.9 (1.3)	571	90.6 (1.9)	531	93.5 (1.3)
읍면	199	95.4 (2.2)	99	92.2 (4.2)	100	98.6 (0.8)
소득수준[2]						
하	299	92.3 (2.1)	156	92.6 (2.6)	143	92.1 (2.8)
중하	332	92.9 (1.9)	173	90.1 (3.0)	159	95.8 (1.6)
중상	346	91.2 (2.3)	173	88.5 (3.8)	173	94.4 (1.7)
상	312	93.4 (2.0)	162	91.9 (3.3)	150	95.3 (1.8)

1) 소아선천성대사이상검사 수진율 : 신생아(선천성)대사이상검사를 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-Ⅶ-1. 연간미치료율(병의원)[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	25,197	16.4 (0.4)	2,979	22.4 (1.1)	6,802	22.8 (0.6)	7,472	24.0 (0.6)	6,251	20.3 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	3,705	22.4 (0.9)	721	19.5 (2.1)	1,516	24.1 (1.5)	1,648	24.0 (1.4)	1,378	21.5 (1.5)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	25,197	16.4 (0.4)	2,979	22.4 (1.1)	6,802	22.8 (0.6)	7,472	24.1 (0.6)	6,251	20.3 (0.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	4,556	11.8 (0.6)	338	25.2 (2.6)	891	24.1 (1.7)	1,049	26.7 (1.5)	767	21.5 (1.7)
30-39	-	- -	-	- -	5,517	14.3 (0.7)	635	23.4 (2.2)	1,411	23.7 (1.2)	1,425	25.1 (1.4)	1,253	19.9 (1.4)
40-49	-	- -	-	- -	5,810	17.1 (0.6)	564	20.8 (2.0)	1,328	21.8 (1.4)	1,495	21.3 (1.0)	1,162	19.3 (1.4)
50-59	-	- -	-	- -	3,932	19.3 (0.9)	504	22.8 (2.2)	1,134	21.9 (1.4)	1,247	24.5 (1.4)	1,170	18.9 (1.5)
60-69	-	- -	-	- -	3,189	21.9 (1.0)	489	19.2 (2.7)	1,079	20.1 (1.4)	1,205	19.8 (1.4)	1,027	21.3 (1.4)
70+	-	- -	-	- -	2,193	22.3 (1.1)	449	19.6 (2.3)	959	24.4 (1.8)	1,051	26.0 (1.8)	872	22.7 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	20,231	16.2 (0.5)	2,118	22.8 (1.4)	5,002	22.8 (0.7)	5,556	23.4 (0.7)	4,883	18.7 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	4,966	17.2 (0.9)	861	20.9 (1.6)	1,800	22.6 (1.5)	1,916	26.7 (1.7)	1,368	26.2 (1.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	6,279	23.1 (0.8)	712	23.6 (1.9)	1,632	26.2 (1.4)	1,860	27.1 (1.2)	1,538	22.6 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	6,291	17.0 (0.7)	697	24.9 (2.3)	1,634	23.8 (1.3)	1,862	24.3 (1.2)	1,540	21.5 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	6,186	14.0 (0.6)	733	22.2 (2.1)	1,665	20.8 (1.1)	1,819	23.5 (1.2)	1,561	20.1 (1.6)
상	-	- -	-	- -	6,137	11.4 (0.6)	699	18.5 (1.9)	1,659	20.9 (1.4)	1,851	21.2 (1.2)	1,532	16.5 (1.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	20,231	16.5 (0.5)	2,118	22.8 (1.3)	5,002	22.8 (0.7)	5,556	23.3 (0.7)	4,883	18.7 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	4,966	15.7 (0.9)	861	20.8 (1.6)	1,800	21.1 (1.6)	1,916	26.5 (2.0)	1,368	25.9 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	6,279	23.2 (0.8)	712	23.7 (1.9)	1,632	26.1 (1.4)	1,860	27.0 (1.2)	1,538	22.5 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	6,291	17.0 (0.7)	697	24.9 (2.3)	1,634	23.9 (1.3)	1,862	24.4 (1.2)	1,540	21.5 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	6,186	13.9 (0.6)	733	22.2 (2.1)	1,665	20.9 (1.1)	1,819	23.5 (1.2)	1,561	20.4 (1.7)
상	-	- -	-	- -	6,137	11.4 (0.6)	699	18.8 (1.9)	1,659	21.2 (1.5)	1,851	21.7 (1.2)	1,532	16.7 (1.3)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	11,713	15.1 (0.5)	1,241	18.5 (1.5)	2,835	18.1 (0.9)	3,233	20.0 (0.8)	2,698	16.3 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	1,480	18.9 (1.1)	302	7.7 (1.6)	581	15.6 (1.9)	687	15.3 (1.5)	615	12.9 (1.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,713	15.3 (0.5)	1,241	18.5 (1.5)	2,835	18.2 (0.9)	3,233	20.2 (0.8)	2,698	16.3 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,050	10.7 (0.9)	141	27.7 (3.8)	366	20.7 (2.3)	485	22.8 (2.0)	306	16.3 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	2,680	15.1 (0.8)	247	21.7 (3.1)	595	20.4 (1.9)	595	24.7 (2.1)	525	16.4 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	2,820	16.1 (0.8)	248	15.4 (2.5)	579	18.2 (1.9)	642	19.1 (1.6)	531	18.7 (2.2)
50-59	-	- -	-	- -	1,916	17.4 (1.0)	204	15.6 (2.7)	490	16.6 (1.9)	542	17.3 (1.8)	478	15.4 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	1,449	18.2 (1.2)	217	9.5 (2.3)	439	9.6 (1.5)	541	12.5 (1.5)	473	14.8 (2.0)
70+	-	- -	-	- -	798	19.2 (1.6)	184	7.2 (1.8)	366	17.7 (2.5)	428	16.8 (2.1)	385	12.7 (2.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	9,400	15.1 (0.6)	868	18.8 (1.8)	2,080	19.0 (1.0)	2,390	19.6 (0.9)	2,102	14.9 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	15.4 (1.0)	373	17.6 (2.7)	755	14.1 (2.0)	843	21.8 (2.1)	596	21.3 (1.4)

1) 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간미치료율(병의원) 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,944	21.4 (1.0)	300	17.5 (2.4)	681	20.5 (1.8)	817	23.0 (1.6)	666	16.6 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	2,861	15.3 (0.8)	286	19.3 (3.0)	673	19.1 (1.8)	801	19.6 (1.6)	668	16.6 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	2,891	12.9 (0.8)	308	19.8 (3.1)	707	16.4 (1.7)	774	19.2 (1.6)	675	17.0 (1.7)
상	-	- -	-	- -	2,866	10.9 (0.7)	298	18.0 (3.0)	690	16.6 (1.9)	803	18.5 (1.7)	661	15.3 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	9,400	15.3 (0.5)	868	18.3 (1.7)	2,080	18.9 (1.0)	2,390	19.4 (0.9)	2,102	14.9 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	14.7 (0.9)	373	18.8 (2.8)	755	13.2 (2.1)	843	21.9 (2.6)	596	21.9 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,944	21.8 (0.9)	300	17.8 (2.3)	681	20.4 (1.8)	817	23.0 (1.6)	666	16.3 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	2,861	15.6 (0.9)	286	19.3 (2.9)	673	19.5 (1.8)	801	19.8 (1.6)	668	16.6 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	2,891	12.9 (0.7)	308	19.7 (2.9)	707	16.4 (1.6)	774	19.4 (1.6)	675	17.1 (1.8)
상	-	- -	-	- -	2,866	11.0 (0.7)	298	18.0 (2.9)	690	16.7 (2.0)	803	19.0 (1.6)	661	15.4 (1.8)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	13,484	17.7 (0.5)	1,738	26.1 (1.4)	3,967	27.4 (0.9)	4,239	27.9 (0.9)	3,553	24.2 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	2,225	24.7 (1.0)	419	27.4 (3.1)	935	29.9 (1.8)	961	29.9 (1.9)	763	27.5 (2.0)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,484	17.4 (0.5)	1,738	25.9 (1.4)	3,967	27.3 (0.9)	4,239	27.7 (0.9)	3,553	24.1 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,506	12.9 (0.8)	197	22.7 (3.5)	525	27.8 (2.4)	564	30.9 (2.1)	461	27.0 (2.2)
30-39	-	- -	-	- -	2,837	13.6 (0.8)	388	25.2 (2.7)	816	27.2 (1.6)	830	25.5 (1.7)	728	23.5 (2.0)
40-49	-	- -	-	- -	2,990	18.0 (0.9)	316	26.4 (2.8)	749	25.6 (1.7)	853	23.6 (1.5)	631	19.9 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	2,016	21.2 (1.1)	300	30.0 (3.0)	644	27.3 (2.1)	705	31.7 (2.2)	692	22.3 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	1,740	25.0 (1.3)	272	27.7 (4.1)	640	29.5 (2.1)	664	26.3 (1.9)	554	27.2 (2.1)
70+	-	- -	-	- -	1,395	24.1 (1.3)	265	27.0 (3.0)	593	28.5 (2.2)	623	31.7 (2.4)	487	29.1 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	10,831	17.4 (0.6)	1,250	26.6 (1.7)	2,922	26.6 (1.0)	3,166	27.1 (1.0)	2,781	22.3 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	18.9 (1.1)	488	24.4 (1.8)	1,045	30.9 (1.8)	1,073	31.6 (2.2)	772	30.8 (2.4)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	3,335	24.7 (0.9)	412	29.7 (2.5)	951	31.8 (2.0)	1,043	31.2 (1.7)	872	28.4 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	3,430	18.7 (0.8)	411	30.0 (2.9)	961	28.3 (1.7)	1,061	28.9 (1.6)	872	26.3 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	3,295	15.0 (0.8)	425	24.5 (2.5)	958	25.3 (1.5)	1,045	27.7 (1.6)	886	23.1 (2.1)
상	-	- -	-	- -	3,271	11.8 (0.7)	401	19.1 (2.2)	969	25.2 (1.8)	1,048	23.8 (1.6)	871	17.8 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	10,831	17.6 (0.6)	1,250	26.5 (1.7)	2,922	26.6 (1.0)	3,166	27.0 (1.0)	2,781	22.4 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	16.9 (1.2)	488	23.4 (1.7)	1,045	29.6 (2.3)	1,073	31.2 (2.4)	772	29.4 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	3,335	24.5 (0.9)	412	29.5 (2.5)	951	31.7 (2.0)	1,043	31.0 (1.7)	872	27.7 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	3,430	18.3 (0.8)	411	29.9 (2.9)	961	28.0 (1.7)	1,061	28.5 (1.6)	872	26.0 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	3,295	14.7 (0.8)	425	24.7 (2.5)	958	25.2 (1.6)	1,045	27.0 (1.5)	886	23.5 (2.2)
상	-	- -	-	- -	3,271	11.7 (0.7)	401	19.0 (2.2)	969	25.7 (1.9)	1,048	24.2 (1.6)	871	18.0 (1.7)

표 1-Ⅶ-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	640	22.3 (2.6)	1,621	23.0 (1.4)	1,848	24.6 (1.3)	1,215	16.9 (1.3)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	145	43.8 (5.2)	373	52.9 (3.5)	405	50.1 (3.7)	278	35.7 (3.6)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	640	22.4 (2.4)	1,621	22.3 (1.3)	1,848	23.9 (1.2)	1,215	15.7 (1.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	78	15.7 (5.5)	230	10.1 (2.9)	299	15.1 (2.4)	170	8.9 (2.1)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	144	12.5 (3.1)	334	12.2 (1.8)	363	13.6 (2.0)	249	9.3 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	114	19.2 (3.8)	310	21.1 (2.6)	331	24.1 (2.6)	204	13.7 (2.8)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	113	31.2 (5.9)	266	27.5 (3.2)	322	28.2 (3.1)	217	18.2 (3.2)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	104	37.9 (5.7)	250	45.2 (4.0)	260	41.1 (3.9)	187	27.6 (4.2)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	87	46.9 (6.8)	231	54.7 (3.9)	273	52.2 (4.1)	188	42.3 (4.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	452	22.8 (3.1)	1,165	21.9 (1.6)	1,319	25.3 (1.5)	855	17.3 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	188	20.0 (3.9)	456	28.0 (2.5)	529	21.7 (2.8)	360	16.0 (2.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	170	37.6 (4.1)	449	37.8 (2.9)	540	41.2 (2.5)	338	27.2 (2.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	172	28.4 (5.5)	412	24.1 (2.1)	465	22.5 (2.1)	335	14.4 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	145	11.6 (2.8)	366	16.8 (2.3)	440	20.5 (2.4)	286	12.7 (2.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	117	7.4 (3.2)	348	8.5 (1.6)	388	10.1 (1.6)	239	10.1 (2.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	452	23.9 (2.8)	1,165	23.1 (1.5)	1,319	26.4 (1.4)	855	17.7 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	188	- -[4]	456	23.7 (3.0)	529	16.1 (2.2)	360	11.7 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	170	- -	449	36.7 (2.6)	540	39.2 (2.4)	338	24.6 (2.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	172	26.8 (4.6)	412	22.7 (1.9)	465	21.4 (1.8)	335	13.5 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	145	- -	366	16.7 (2.0)	440	19.8 (2.3)	286	11.7 (1.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	117	- -	348	9.2 (1.4)	388	10.7 (1.6)	239	10.0 (2.2)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	200	16.8 (3.3)	501	17.3 (1.9)	637	18.6 (1.8)	386	12.4 (1.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	27	48.1 (9.6)	91	56.3 (6.0)	109	47.4 (5.1)	73	27.2 (5.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	200	- -	501	19.2 (1.8)	637	20.0 (1.8)	386	12.8 (1.7)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	37	16.4 (6.3)	81	5.6 (2.8)	116	16.5 (4.0)	52	6.6 (3.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	51	12.6 (4.6)	120	8.1 (2.6)	143	8.5 (2.5)	88	5.4 (2.7)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	40	4.8 (2.8)	107	19.4 (4.2)	130	21.6 (3.7)	77	10.3 (3.8)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	34	34.6 (10.6)	79	23.1 (4.6)	102	19.8 (4.5)	66	15.4 (5.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	23	42.6 (11.3)	54	40.8 (8.6)	72	27.1 (5.8)	57	26.4 (7.0)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	15	- -[5]	60	58.5 (7.0)	74	52.8 (6.4)	46	39.2 (7.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	141	18.2 (4.1)	388	15.0 (2.0)	454	19.2 (2.1)	272	12.6 (2.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	59	11.4 (4.1)	113	31.1 (5.5)	183	16.3 (3.7)	114	11.8 (3.7)

1) 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 병의원(치과 제외) 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	50	32.3 (8.4)	137	37.4 (4.8)	199	31.3 (3.7)	108	23.2 (4.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	51	24.1 (7.9)	125	13.9 (2.8)	150	15.1 (3.3)	92	11.1 (4.0)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	50	8.2 (3.2)	113	6.4 (2.0)	139	14.6 (3.5)	97	11.2 (3.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	43	7.1 (5.1)	111	6.0 (2.0)	143	10.8 (2.7)	87	1.9 (1.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	141	- -	388	19.4 (1.9)	454	22.7 (2.2)	272	14.5 (2.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	59	- -	113	- -	183	14.1 (3.7)	114	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	50	- -	137	- -	199	30.3 (3.5)	108	- -
중하	-	- -	-	- -	-	- -	51	- -	125	- -	150	- -	92	- -
중상	-	- -	-	- -	-	- -	50	- -	113	- -	139	- -	97	- -
상	-	- -	-	- -	-	- -	43	- -	111	- -	143	- -	87	- -
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	440	26.0 (2.9)	1,120	26.6 (1.8)	1,211	28.8 (1.6)	829	20.0 (1.7)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	118	43.0 (5.7)	282	51.7 (3.8)	296	51.0 (4.2)	205	38.5 (4.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	440	24.1 (2.8)	1,120	24.5 (1.8)	1,211	26.6 (1.6)	829	17.9 (1.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	41	14.9 (6.5)	149	13.7 (4.8)	183	14.0 (2.9)	118	10.3 (2.9)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	93	12.4 (3.8)	214	15.4 (2.4)	220	18.8 (2.9)	161	12.2 (2.8)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	74	28.3 (5.5)	203	22.4 (3.2)	201	26.2 (3.6)	127	17.0 (4.3)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	79	29.5 (6.6)	187	30.1 (3.9)	220	32.7 (3.7)	151	20.2 (4.3)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	81	36.7 (6.2)	196	46.5 (4.2)	188	47.2 (4.5)	130	28.2 (5.0)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	72	49.6 (7.5)	171	53.3 (4.4)	199	52.0 (4.9)	142	43.2 (5.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	311	25.9 (3.3)	777	26.6 (2.2)	865	29.7 (1.9)	583	20.4 (2.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	129	26.4 (6.1)	343	26.6 (2.3)	346	25.3 (3.1)	246	18.9 (2.6)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	120	40.5 (4.8)	312	37.9 (3.3)	341	48.6 (3.3)	230	29.5 (3.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	121	30.8 (5.8)	287	30.6 (3.1)	315	27.4 (2.9)	243	16.5 (2.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	95	14.5 (4.8)	253	23.5 (3.6)	301	24.6 (3.0)	189	13.7 (2.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	74	7.6 (3.6)	237	10.1 (2.1)	245	9.7 (2.0)	152	17.4 (4.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	311	24.8 (3.0)	777	26.1 (2.1)	865	29.0 (1.8)	583	20.1 (2.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	129	- -	343	- -	346	17.4 (2.3)	246	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	120	- -	312	36.0 (3.0)	341	45.9 (3.3)	230	27.8 (3.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	121	- -	287	27.5 (3.1)	315	23.3 (2.6)	243	14.1 (2.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	95	- -	253	21.1 (3.2)	301	21.6 (2.8)	189	12.1 (2.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	74	- -	237	9.9 (2.0)	245	9.5 (1.8)	152	16.4 (3.4)

표 1-VII-3. 연간미치료율(치과)[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,977	40.0 (1.3)	6,793	43.5 (0.8)	7,479	45.9 (0.8)	6,252	39.7 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	720	33.1 (2.4)	1,510	34.4 (1.6)	1,655	38.8 (1.7)	1,373	27.9 (1.5)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,977	40.3 (1.3)	6,793	43.6 (0.8)	7,479	46.0 (0.8)	6,252	40.1 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	338	44.2 (3.4)	892	45.8 (1.8)	1,049	42.1 (1.6)	771	41.8 (2.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	635	43.1 (2.6)	1,411	45.1 (1.7)	1,425	52.5 (1.6)	1,254	42.9 (1.8)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	565	41.3 (2.4)	1,328	43.5 (1.5)	1,495	47.7 (1.5)	1,162	41.8 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	503	37.4 (2.0)	1,131	46.2 (1.8)	1,248	46.6 (1.6)	1,172	42.4 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	488	31.7 (2.9)	1,077	38.9 (1.8)	1,206	40.4 (1.7)	1,024	33.1 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	448	32.8 (3.1)	954	34.0 (2.0)	1,056	38.8 (2.1)	869	25.1 (1.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,114	39.3 (1.4)	4,995	44.0 (1.0)	5,559	46.2 (0.8)	4,887	39.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	42.8 (2.9)	1,798	41.0 (1.2)	1,920	44.7 (1.8)	1,365	41.4 (1.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	713	44.0 (2.5)	1,628	48.8 (1.6)	1,865	50.8 (1.4)	1,536	42.8 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	695	44.3 (2.4)	1,634	45.7 (1.5)	1,859	50.6 (1.3)	1,541	42.8 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	38.3 (1.8)	1,665	43.4 (1.6)	1,819	43.7 (1.4)	1,564	38.6 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	700	34.6 (2.0)	1,656	36.8 (1.6)	1,855	38.3 (1.3)	1,531	34.8 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,114	39.4 (1.4)	4,995	43.9 (1.0)	5,559	46.1 (0.8)	4,887	39.2 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	43.6 (3.2)	1,798	40.9 (1.6)	1,920	46.6 (2.1)	1,365	43.9 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	713	44.1 (2.5)	1,628	48.8 (1.6)	1,865	50.6 (1.4)	1,536	42.6 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	695	44.5 (2.3)	1,634	45.7 (1.5)	1,859	50.8 (1.3)	1,541	43.1 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	38.2 (1.8)	1,665	43.6 (1.6)	1,819	43.5 (1.4)	1,564	39.0 (1.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	700	35.1 (2.0)	1,656	36.8 (1.5)	1,855	38.8 (1.3)	1,531	35.5 (1.6)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,240	37.2 (1.8)	2,835	39.8 (1.2)	3,235	43.3 (1.1)	2,703	38.7 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	300	31.4 (3.1)	580	28.1 (2.1)	690	34.5 (2.2)	613	23.2 (2.3)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,240	37.1 (1.8)	2,835	39.6 (1.1)	3,235	43.1 (1.1)	2,703	38.6 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	141	38.4 (4.5)	366	39.6 (2.8)	485	38.7 (2.4)	307	38.0 (3.1)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	247	42.4 (3.1)	597	39.6 (2.4)	595	50.4 (2.4)	527	42.5 (2.7)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	248	35.5 (3.2)	579	43.1 (2.1)	642	45.7 (2.3)	532	43.0 (2.3)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	205	38.0 (3.3)	488	43.7 (2.5)	543	46.5 (2.4)	480	40.7 (2.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	216	28.4 (4.2)	440	33.8 (2.5)	539	33.7 (2.2)	473	30.4 (2.2)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	183	31.3 (3.6)	365	28.6 (2.7)	431	32.4 (2.6)	384	21.7 (2.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	36.3 (2.0)	2,078	40.6 (1.4)	2,390	43.7 (1.2)	2,108	37.9 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	40.5 (3.5)	757	36.2 (1.9)	845	41.5 (2.1)	595	41.6 (2.1)

1) 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간미치료율(치과) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	35.9 (3.4)	678	45.6 (2.2)	818	47.6 (2.3)	666	42.0 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	285	41.8 (3.5)	676	40.6 (2.1)	800	45.7 (2.0)	670	40.2 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	307	36.8 (2.8)	707	40.6 (2.2)	772	42.8 (2.2)	677	39.2 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	35.1 (3.0)	690	33.0 (2.2)	806	36.6 (1.8)	661	33.9 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	36.0 (2.0)	2,078	40.2 (1.3)	2,390	43.3 (1.2)	2,108	37.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	41.2 (3.9)	757	34.9 (2.2)	845	42.9 (2.6)	595	43.0 (2.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	35.7 (3.3)	678	45.4 (2.2)	818	47.1 (2.2)	666	40.7 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	285	41.8 (3.5)	676	40.4 (2.1)	800	45.3 (2.0)	670	40.1 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	307	36.8 (2.6)	707	40.3 (2.1)	772	42.6 (2.2)	677	39.5 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	35.1 (2.9)	690	32.8 (2.1)	806	36.8 (1.7)	661	34.1 (2.4)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,737	42.8 (1.6)	3,958	47.1 (1.0)	4,244	48.4 (1.0)	3,549	40.8 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	420	34.3 (3.5)	930	38.7 (1.8)	965	41.7 (2.1)	760	31.2 (2.0)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,737	43.4 (1.6)	3,958	47.6 (1.0)	4,244	48.8 (1.0)	3,549	41.4 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	50.2 (4.6)	526	52.6 (2.3)	564	45.8 (2.1)	464	45.9 (2.9)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	388	43.8 (3.0)	814	50.8 (2.2)	830	54.7 (1.9)	727	43.3 (2.4)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	317	47.4 (3.5)	749	43.9 (1.8)	853	49.9 (1.8)	630	40.6 (2.3)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	298	36.8 (2.9)	643	48.7 (2.3)	705	46.7 (2.1)	692	44.0 (2.4)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	272	34.6 (3.8)	637	43.4 (2.4)	667	46.4 (2.3)	551	35.5 (2.4)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	265	33.7 (3.9)	589	37.3 (2.2)	625	42.6 (2.9)	485	27.2 (2.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	42.2 (1.8)	2,917	47.4 (1.1)	3,169	48.5 (1.2)	2,779	40.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	45.0 (3.5)	1,041	45.6 (1.9)	1,075	47.9 (2.1)	770	41.2 (2.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	52.0 (2.9)	950	51.8 (1.9)	1,047	54.0 (1.8)	870	43.6 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	46.7 (2.9)	958	50.6 (1.7)	1,059	55.4 (2.0)	871	45.3 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	39.8 (2.3)	958	46.2 (2.1)	1,047	44.6 (2.0)	887	38.0 (2.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	34.0 (2.8)	966	40.5 (1.9)	1,049	39.9 (1.8)	870	35.7 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,247	42.7 (1.8)	2,917	47.5 (1.1)	3,169	48.6 (1.2)	2,779	40.7 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	46.6 (3.9)	1,041	48.0 (2.4)	1,075	50.3 (2.5)	770	44.4 (2.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	52.3 (2.9)	950	52.4 (1.9)	1,047	53.9 (1.9)	870	44.0 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	46.8 (2.9)	958	50.7 (1.8)	1,059	56.0 (2.1)	871	45.9 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	40.4 (2.5)	958	47.0 (2.2)	1,047	44.2 (2.0)	887	38.6 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	34.8 (2.9)	966	41.0 (1.9)	1,049	40.8 (1.9)	870	36.9 (2.1)

표 1-Ⅶ-4. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과)[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,099	40.2 (2.3)	2,901	40.1 (1.2)	3,436	44.5 (1.2)	2,347	33.0 (1.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	222	62.7 (3.8)	531	68.3 (2.1)	652	67.9 (2.7)	395	50.5 (3.1)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	1,099	40.8 (2.1)	2,901	40.0 (1.1)	3,436	43.9 (1.2)	2,347	33.1 (1.4)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	143	27.7 (4.5)	418	25.4 (2.4)	469	30.6 (2.7)	320	22.3 (3.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	270	34.4 (3.8)	628	30.5 (2.1)	750	35.2 (2.0)	523	25.4 (2.3)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	217	37.1 (4.5)	580	40.4 (2.5)	706	45.2 (2.0)	461	34.8 (2.9)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	181	54.1 (4.5)	519	48.3 (2.5)	594	52.1 (2.6)	483	38.9 (2.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	150	59.7 (4.8)	435	61.1 (3.0)	503	59.9 (2.9)	328	47.8 (3.5)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	138	61.6 (4.8)	321	69.8 (2.7)	414	70.8 (2.9)	232	53.9 (4.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	773	41.9 (2.7)	2,172	39.0 (1.4)	2,586	45.1 (1.4)	1,820	32.5 (1.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	326	34.8 (3.7)	729	45.5 (2.3)	850	42.0 (2.3)	527	34.6 (3.6)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	296	56.0 (4.1)	757	49.9 (2.1)	969	57.1 (1.9)	632	51.2 (2.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	292	43.8 (3.5)	742	45.3 (2.1)	919	48.0 (2.0)	634	31.0 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	249	36.8 (3.8)	702	33.6 (2.6)	802	41.7 (2.1)	579	24.9 (2.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	216	19.3 (3.7)	609	27.5 (2.3)	708	27.0 (2.0)	476	18.7 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	773	42.8 (2.5)	2,172	40.3 (1.3)	2,586	45.4 (1.4)	1,820	33.7 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	326	34.9 (3.3)	729	39.4 (2.4)	850	37.7 (2.3)	527	30.9 (3.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	296	56.5 (3.8)	757	50.0 (2.0)	969	56.7 (2.0)	632	49.5 (2.4)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	292	43.9 (3.1)	742	44.6 (2.0)	919	46.9 (2.0)	634	31.3 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	249	37.2 (3.3)	702	34.4 (2.5)	802	40.4 (2.1)	579	25.7 (2.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	216	20.2 (3.2)	609	27.3 (2.1)	708	26.5 (2.0)	476	19.4 (2.1)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	424	34.7 (3.2)	1,096	36.3 (1.8)	1,379	41.4 (1.6)	969	31.3 (2.0)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	83	56.0 (6.5)	171	69.2 (4.1)	239	70.6 (3.5)	155	47.1 (4.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	424	35.4 (3.0)	1,096	37.1 (1.7)	1,379	42.1 (1.6)	969	31.8 (2.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	49	29.6 (6.6)	147	29.5 (3.9)	195	30.5 (3.8)	114	23.7 (4.8)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	103	31.1 (5.8)	231	23.5 (3.0)	296	31.9 (2.9)	220	25.7 (3.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	87	21.5 (5.4)	245	36.5 (3.8)	295	40.2 (3.1)	210	30.3 (4.0)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	78	53.6 (5.9)	214	42.6 (3.6)	256	50.5 (3.7)	189	39.7 (4.3)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	55	44.2 (6.4)	155	55.3 (4.5)	194	59.3 (4.1)	144	42.2 (4.8)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	52	62.1 (6.7)	104	70.8 (4.9)	143	76.3 (3.9)	92	51.1 (6.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	292	36.3 (3.9)	824	35.2 (2.0)	1,040	42.1 (1.9)	745	30.0 (2.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	132	29.7 (5.1)	272	41.8 (3.7)	339	38.1 (3.6)	224	36.0 (4.7)

1) 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) : 최근 1년 동안 치과 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	110	52.4 (5.0)	295	49.6 (3.3)	388	55.5 (2.9)	270	53.2 (4.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	109	38.9 (5.7)	272	39.0 (3.3)	353	40.1 (3.0)	246	26.9 (3.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	105	33.3 (5.7)	272	28.8 (3.6)	322	38.0 (3.2)	249	23.4 (3.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	87	12.8 (4.4)	228	22.6 (3.3)	295	29.2 (3.4)	196	16.4 (3.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	292	37.3 (3.8)	824	37.4 (1.9)	1,040	43.6 (1.9)	745	31.3 (2.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	132	- - [4)]	272	- -	339	35.7 (3.7)	224	- -
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	110	- -	295	49.3 (3.1)	388	56.1 (2.9)	270	51.9 (4.1)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	109	- -	272	40.1 (3.3)	353	40.2 (2.8)	246	27.8 (3.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	105	- -	272	29.9 (3.5)	322	38.3 (3.0)	249	24.8 (3.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	87	- -	228	24.3 (3.3)	295	30.3 (3.2)	196	- -
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	675	44.9 (2.6)	1,805	43.2 (1.5)	2,057	47.3 (1.3)	1,378	34.6 (1.7)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	139	66.8 (5.1)	360	67.9 (2.4)	413	66.4 (3.2)	240	52.2 (3.7)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	675	45.4 (2.4)	1,805	42.5 (1.4)	2,057	45.8 (1.4)	1,378	34.3 (1.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	94	26.3 (5.3)	271	22.0 (3.3)	274	30.8 (3.6)	206	21.2 (3.7)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	167	37.8 (4.7)	397	36.2 (2.7)	454	38.5 (2.5)	303	25.1 (2.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	130	50.1 (5.8)	335	44.3 (3.1)	411	50.0 (2.8)	251	39.8 (3.5)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	103	54.5 (5.7)	305	53.3 (3.5)	338	53.7 (3.1)	294	38.1 (3.5)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	95	71.1 (5.8)	280	65.2 (3.6)	309	60.4 (3.4)	184	52.2 (5.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	86	61.3 (6.7)	217	69.3 (3.3)	271	68.3 (3.5)	140	55.3 (4.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	481	46.5 (3.0)	1,348	42.1 (1.7)	1,546	47.7 (1.5)	1,075	34.9 (2.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	194	39.5 (5.3)	457	48.3 (2.5)	511	45.4 (2.6)	303	33.3 (3.4)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	186	58.5 (5.2)	462	50.2 (2.9)	581	58.6 (2.4)	362	49.4 (3.4)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	183	47.9 (4.3)	470	50.1 (2.6)	566	54.2 (2.3)	388	34.6 (3.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	144	40.2 (5.7)	430	37.7 (3.3)	480	45.2 (2.7)	330	26.5 (2.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	129	26.1 (5.0)	381	31.4 (2.7)	413	25.0 (2.2)	280	21.1 (3.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	481	47.4 (2.7)	1,348	42.8 (1.5)	1,546	47.2 (1.5)	1,075	36.0 (1.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	194	39.0 (5.0)	457	41.4 (2.5)	511	40.1 (3.0)	303	29.3 (3.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	186	60.5 (4.2)	462	50.6 (2.5)	581	57.4 (2.6)	362	49.0 (3.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	183	47.0 (3.9)	470	49.5 (2.6)	566	52.7 (2.3)	388	34.1 (3.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	144	- -	430	38.1 (3.2)	480	42.3 (2.6)	330	26.4 (2.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	129	- -	381	30.0 (2.4)	413	23.8 (2.1)	280	21.7 (2.9)

표 1-VII-5. 연간입원율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	27,745	6.5 (0.2)	27,318	3.8 (0.1)	25,210	9.5 (0.2)	2,974	9.5 (0.6)	6,800	11.2 (0.5)	7,471	10.1 (0.5)	6,248	11.1 (0.5)
65세이상	3,329	8.7 (0.6)	3,289	7.0 (0.5)	3,706	15.5 (0.7)	720	11.7 (1.3)	1,516	13.8 (1.2)	1,648	13.0 (1.0)	1,378	14.8 (1.2)
19세이상(표준화)[2]	27,745	6.5 (0.2)	27,318	3.8 (0.1)	25,210	9.5 (0.2)	2,974	9.4 (0.6)	6,800	11.2 (0.5)	7,471	10.1 (0.5)	6,248	11.0 (0.5)
연령(세)														
19-29	6,138	7.7 (0.5)	5,775	1.8 (0.2)	4,561	8.2 (0.4)	339	6.1 (1.5)	891	12.2 (1.2)	1,049	10.4 (1.2)	767	10.6 (1.2)
30-39	6,808	6.5 (0.3)	6,658	2.6 (0.2)	5,521	8.7 (0.4)	634	9.9 (1.4)	1,410	10.4 (1.0)	1,425	10.4 (0.9)	1,253	12.0 (1.1)
40-49	5,549	4.6 (0.3)	6,225	3.8 (0.2)	5,812	7.6 (0.4)	561	9.6 (1.7)	1,328	10.1 (0.9)	1,495	7.6 (0.8)	1,162	8.3 (1.0)
50-59	4,017	5.6 (0.4)	3,712	5.8 (0.4)	3,934	9.6 (0.5)	503	10.3 (1.5)	1,133	9.3 (0.9)	1,246	10.3 (1.0)	1,169	11.4 (1.1)
60-69	3,212	7.6 (0.5)	3,024	6.7 (0.5)	3,188	13.2 (0.7)	490	11.6 (1.7)	1,079	12.4 (1.2)	1,205	12.1 (1.1)	1,025	11.6 (1.7)
70+	2,021	9.1 (0.8)	1,924	6.6 (0.6)	2,194	16.0 (0.9)	447	12.5 (1.8)	959	15.5 (1.7)	1,051	12.4 (1.1)	872	16.1 (1.4)
거주지역														
동	17,976	6.3 (0.2)	21,606	3.7 (0.1)	20,244	9.2 (0.2)	2,116	9.4 (0.7)	5,000	10.8 (0.5)	5,555	9.9 (0.6)	4,880	10.4 (0.5)
읍면	9,769	7.3 (0.3)	5,712	4.5 (0.3)	4,966	10.4 (0.5)	858	9.9 (1.5)	1,800	12.9 (1.0)	1,916	10.9 (1.0)	1,368	13.6 (1.5)
소득수준[3]														
하	7,001	7.5 (0.4)	6,481	4.4 (0.3)	6,286	10.9 (0.4)	711	10.2 (1.5)	1,632	12.0 (1.1)	1,859	11.6 (1.0)	1,538	11.0 (0.9)
중하	7,013	7.0 (0.3)	6,198	4.1 (0.3)	6,293	9.8 (0.4)	696	8.4 (1.3)	1,633	10.7 (1.0)	1,862	9.5 (0.8)	1,539	12.6 (1.2)
중상	6,778	6.1 (0.3)	6,583	3.4 (0.2)	6,191	8.6 (0.4)	732	9.9 (1.3)	1,665	11.3 (0.9)	1,819	9.8 (0.8)	1,560	11.3 (0.9)
상	6,953	5.6 (0.3)	6,308	3.4 (0.2)	6,136	8.5 (0.4)	697	10.2 (1.4)	1,658	10.7 (0.9)	1,851	9.6 (0.8)	1,532	9.4 (0.9)
거주지역(표준화)														
동	17,976	6.3 (0.2)	21,606	3.9 (0.1)	20,244	9.5 (0.2)	2,116	9.4 (0.7)	5,000	10.9 (0.5)	5,555	9.9 (0.6)	4,880	10.4 (0.5)
읍면	9,769	7.0 (0.3)	5,712	3.8 (0.3)	4,966	9.4 (0.5)	858	9.4 (1.5)	1,800	11.9 (1.2)	1,916	10.1 (0.9)	1,368	13.7 (1.5)
소득수준(표준화)														
하	7,001	7.5 (0.4)	6,481	4.3 (0.3)	6,286	10.9 (0.4)	711	10.1 (1.5)	1,632	12.1 (1.1)	1,859	11.6 (1.0)	1,538	10.9 (1.0)
중하	7,013	7.0 (0.3)	6,198	4.1 (0.3)	6,293	9.8 (0.4)	696	8.3 (1.2)	1,633	10.5 (1.0)	1,862	9.7 (0.8)	1,539	12.7 (1.2)
중상	6,778	6.1 (0.3)	6,583	3.3 (0.2)	6,191	8.6 (0.4)	732	10.0 (1.3)	1,665	11.4 (0.9)	1,819	9.7 (0.8)	1,560	11.1 (0.9)
상	6,953	5.6 (0.3)	6,308	3.4 (0.2)	6,136	8.4 (0.4)	697	9.9 (1.4)	1,658	10.6 (0.9)	1,851	9.4 (0.8)	1,532	9.2 (0.9)
남자														
19세이상	13,095	4.9 (0.2)	12,866	4.2 (0.2)	11,722	8.4 (0.3)	1,239	8.7 (0.8)	2,834	9.5 (0.7)	3,233	8.8 (0.6)	2,698	9.3 (0.7)
65세이상	1,268	9.1 (0.8)	1,289	8.1 (0.8)	1,481	15.6 (1.1)	302	14.0 (1.8)	581	15.7 (2.0)	687	15.0 (1.8)	615	13.4 (1.8)
19세이상(표준화)	13,095	5.0 (0.2)	12,866	4.3 (0.2)	11,722	8.6 (0.3)	1,239	8.7 (0.8)	2,834	9.6 (0.7)	3,233	8.8 (0.6)	2,698	9.2 (0.7)
연령(세)														
19-29	2,828	3.2 (0.3)	2,605	2.1 (0.3)	2,052	6.7 (0.6)	141	4.6 (1.8)	366	9.1 (1.6)	485	7.4 (1.4)	306	7.2 (1.6)
30-39	3,384	4.1 (0.4)	3,289	3.1 (0.3)	2,684	6.3 (0.5)	246	8.4 (1.8)	594	7.4 (1.2)	595	7.6 (1.3)	525	9.0 (1.6)
40-49	2,813	4.8 (0.4)	3,120	4.0 (0.3)	2,822	8.2 (0.5)	247	9.7 (2.1)	579	9.2 (1.3)	642	7.5 (1.3)	531	8.1 (1.4)
50-59	1,936	5.5 (0.6)	1,803	6.2 (0.6)	1,917	9.2 (0.7)	204	10.4 (2.4)	489	7.4 (1.2)	542	9.2 (1.3)	478	10.3 (1.6)
60-69	1,429	7.7 (0.8)	1,379	6.8 (0.7)	1,448	12.9 (1.0)	217	7.7 (1.9)	440	14.4 (2.1)	541	11.8 (1.5)	473	11.8 (2.7)
70+	705	10.0 (1.3)	670	9.0 (1.2)	799	16.6 (1.4)	184	17.1 (2.9)	366	17.1 (2.5)	428	16.2 (2.1)	385	14.1 (1.8)
거주지역														
동	8,548	4.3 (0.2)	10,196	4.1 (0.2)	9,409	8.1 (0.3)	867	8.1 (0.9)	2,079	9.1 (0.8)	2,390	8.6 (0.7)	2,102	8.8 (0.7)
읍면	4,547	6.9 (0.5)	2,670	4.9 (0.4)	2,313	9.8 (0.7)	372	10.6 (1.5)	755	11.4 (1.5)	843	9.7 (1.5)	596	11.0 (2.0)

1) 연간입원율 : 최근 1년 동안 입원한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간입원율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	3,330	6.1 (0.5)	3,073	5.2 (0.4)	2,948	10.0 (0.6)	299	10.2 (2.0)	681	9.8 (1.3)	817	10.9 (1.4)	666	9.3 (1.3)
중하	3,261	5.1 (0.4)	2,868	4.6 (0.4)	2,863	8.8 (0.6)	285	6.1 (1.3)	673	9.2 (1.4)	801	8.2 (1.1)	668	9.9 (1.7)
중상	3,260	4.1 (0.3)	3,137	3.9 (0.3)	2,894	7.6 (0.5)	308	8.4 (1.5)	707	9.7 (1.3)	774	8.0 (1.1)	675	9.8 (1.4)
상	3,244	4.2 (0.4)	2,965	3.4 (0.4)	2,866	7.1 (0.5)	298	10.3 (2.0)	689	8.8 (1.3)	803	8.1 (1.1)	661	7.5 (1.2)
거주지역(표준화)														
동	8,548	4.6 (0.3)	10,196	4.4 (0.2)	9,409	8.5 (0.3)	867	8.3 (0.9)	2,079	9.4 (0.8)	2,390	8.8 (0.7)	2,102	8.8 (0.7)
읍면	4,547	6.3 (0.4)	2,670	4.1 (0.4)	2,313	9.0 (0.7)	372	9.8 (1.4)	755	10.6 (1.7)	843	7.9 (1.4)	596	10.8 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	3,330	6.3 (0.5)	3,073	5.1 (0.4)	2,948	10.3 (0.6)	299	10.0 (2.1)	681	9.9 (1.3)	817	11.0 (1.4)	666	9.0 (1.3)
중하	3,261	5.3 (0.4)	2,868	4.6 (0.4)	2,863	9.1 (0.6)	285	6.2 (1.3)	673	9.1 (1.3)	801	8.3 (1.1)	668	10.1 (1.7)
중상	3,260	4.5 (0.4)	3,137	3.9 (0.4)	2,894	7.9 (0.5)	308	8.8 (1.6)	707	9.9 (1.3)	774	7.9 (1.1)	675	9.7 (1.3)
상	3,244	4.3 (0.4)	2,965	3.6 (0.4)	2,866	7.3 (0.5)	298	10.3 (2.0)	689	8.8 (1.2)	803	8.0 (1.1)	661	7.4 (1.2)
여자														
19세이상	14,650	8.0 (0.3)	14,452	3.5 (0.2)	13,488	10.5 (0.3)	1,735	10.3 (0.8)	3,966	12.8 (0.7)	4,238	11.4 (0.6)	3,550	12.9 (0.7)
65세이상	2,061	8.4 (0.8)	2,000	6.2 (0.6)	2,225	15.5 (0.8)	418	10.1 (1.7)	935	12.6 (1.4)	961	11.6 (1.3)	763	15.8 (1.6)
19세이상(표준화)	14,650	7.8 (0.3)	14,452	3.4 (0.2)	13,488	10.3 (0.3)	1,735	10.2 (0.8)	3,966	12.9 (0.7)	4,238	11.5 (0.6)	3,550	12.8 (0.7)
연령(세)														
19-29	3,310	11.4 (0.8)	3,170	1.5 (0.2)	2,509	9.9 (0.6)	198	7.6 (2.3)	525	15.5 (1.6)	564	13.6 (1.7)	461	14.2 (1.8)
30-39	3,424	8.8 (0.6)	3,369	2.2 (0.3)	2,837	11.2 (0.6)	388	11.6 (1.8)	816	13.5 (1.5)	830	13.3 (1.2)	728	15.1 (1.7)
40-49	2,736	4.3 (0.4)	3,105	3.5 (0.3)	2,990	6.9 (0.5)	314	9.5 (2.0)	749	11.1 (1.2)	853	7.7 (1.0)	631	8.4 (1.3)
50-59	2,081	5.6 (0.5)	1,909	5.3 (0.5)	2,017	10.1 (0.8)	299	10.3 (1.9)	644	11.3 (1.5)	704	11.4 (1.3)	691	12.6 (1.6)
60-69	1,783	7.5 (0.6)	1,645	6.6 (0.7)	1,740	13.4 (0.9)	273	14.9 (2.9)	639	10.7 (1.4)	664	12.4 (1.5)	552	11.3 (1.5)
70+	1,316	8.6 (1.0)	1,254	5.4 (0.7)	1,395	15.7 (1.1)	263	9.8 (2.1)	593	14.5 (1.9)	623	10.2 (1.4)	487	17.4 (2.1)
거주지역														
동	9,428	8.1 (0.4)	11,410	3.3 (0.2)	10,835	10.4 (0.3)	1,249	10.6 (0.9)	2,921	12.5 (0.7)	3,165	11.2 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)
읍면	5,222	7.7 (0.5)	3,042	4.2 (0.4)	2,653	10.9 (0.7)	486	9.1 (2.0)	1,045	14.2 (1.1)	1,073	12.2 (1.2)	772	16.2 (1.5)
소득수준														
하	3,671	8.7 (0.6)	3,408	3.7 (0.4)	3,338	11.8 (0.6)	412	10.2 (1.9)	951	14.2 (1.4)	1,042	12.3 (1.2)	872	12.7 (1.3)
중하	3,752	8.7 (0.5)	3,330	3.8 (0.3)	3,430	10.8 (0.6)	411	10.5 (1.9)	960	12.1 (1.3)	1,061	10.8 (1.1)	871	15.3 (1.5)
중상	3,518	8.0 (0.5)	3,446	2.9 (0.3)	3,297	9.6 (0.6)	424	11.4 (1.8)	958	12.9 (1.3)	1,045	11.6 (1.1)	885	12.8 (1.4)
상	3,709	6.8 (0.4)	3,343	3.4 (0.3)	3,270	9.8 (0.6)	399	10.0 (1.8)	969	12.5 (1.2)	1,048	11.0 (1.1)	871	11.4 (1.3)
거주지역(표준화)														
동	9,428	7.8 (0.3)	11,410	3.5 (0.2)	10,835	10.4 (0.3)	1,249	10.6 (0.9)	2,921	12.5 (0.7)	3,165	11.3 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)
읍면	5,222	7.8 (0.5)	3,042	3.6 (0.4)	2,653	10.1 (0.8)	486	9.0 (2.2)	1,045	13.6 (1.7)	1,073	12.9 (1.3)	772	16.6 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	3,671	8.5 (0.6)	3,408	3.6 (0.4)	3,338	11.7 (0.6)	412	10.3 (1.9)	951	14.2 (1.5)	1,042	12.5 (1.3)	872	12.7 (1.4)
중하	3,752	8.5 (0.5)	3,330	3.6 (0.3)	3,430	10.6 (0.6)	411	10.3 (1.8)	960	12.0 (1.3)	1,061	11.3 (1.3)	871	15.1 (1.6)
중상	3,518	7.7 (0.5)	3,446	2.9 (0.3)	3,297	9.3 (0.5)	424	11.5 (1.9)	958	13.1 (1.4)	1,045	11.5 (1.2)	885	12.6 (1.4)
상	3,709	6.7 (0.4)	3,343	3.4 (0.3)	3,270	9.6 (0.6)	399	9.5 (1.7)	969	12.7 (1.3)	1,048	11.0 (1.2)	871	11.4 (1.4)

표 1-VII-6. 2주간 외래이용률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	27,745	29.0 (0.4)	27,318	20.7 (0.3)	25,199	26.3 (0.4)	2,980	27.8 (1.1)	6,798	30.0 (0.7)	7,470	28.7 (0.8)	6,248	31.4 (0.8)
65세이상	3,329	41.3 (1.1)	3,289	41.4 (0.9)	3,702	52.1 (0.9)	722	44.8 (2.5)	1,516	49.3 (1.6)	1,648	48.8 (1.8)	1,378	51.1 (1.8)
19세이상(표준화)[2]	27,745	29.3 (0.4)	27,318	20.6 (0.3)	25,199	26.3 (0.3)	2,980	27.4 (1.0)	6,798	29.3 (0.6)	7,470	27.9 (0.7)	6,248	30.5 (0.7)
연령(세)														
19-29	6,138	20.6 (0.6)	5,775	9.6 (0.4)	4,559	14.7 (0.6)	338	18.6 (2.4)	890	21.4 (1.4)	1,048	22.5 (1.3)	767	23.2 (2.0)
30-39	6,808	24.5 (0.6)	6,658	14.2 (0.5)	5,521	19.3 (0.6)	635	23.0 (2.0)	1,410	20.2 (1.2)	1,425	20.7 (1.2)	1,253	24.9 (1.3)
40-49	5,549	29.5 (0.7)	6,225	17.6 (0.5)	5,809	23.5 (0.6)	564	23.3 (1.7)	1,327	26.5 (1.4)	1,495	23.2 (1.3)	1,162	25.9 (1.5)
50-59	4,017	36.4 (0.9)	3,712	28.9 (0.8)	3,933	32.6 (0.9)	505	34.0 (2.5)	1,133	38.1 (1.8)	1,246	33.8 (1.6)	1,169	34.7 (1.9)
60-69	3,212	42.1 (1.0)	3,024	40.4 (1.0)	3,187	47.4 (0.9)	489	44.4 (3.4)	1,079	47.5 (1.9)	1,205	43.2 (1.9)	1,025	49.2 (1.8)
70+	2,021	40.2 (1.4)	1,924	41.2 (1.2)	2,190	52.7 (1.2)	449	45.0 (2.9)	959	49.3 (2.0)	1,051	49.4 (2.0)	872	51.0 (2.5)
거주지역														
동	17,976	28.0 (0.5)	21,606	19.2 (0.3)	20,235	24.9 (0.4)	2,119	28.9 (1.3)	4,999	29.1 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,880	30.5 (0.9)
읍면	9,769	32.5 (0.7)	5,712	27.2 (0.8)	4,964	32.7 (1.1)	861	23.9 (1.8)	1,799	34.3 (1.6)	1,915	34.7 (1.9)	1,368	34.9 (2.1)
소득수준[3]														
하	7,001	28.6 (0.7)	6,481	23.4 (0.6)	6,283	27.0 (0.7)	713	31.2 (2.3)	1,631	29.3 (1.4)	1,858	28.0 (1.4)	1,538	31.1 (1.6)
중하	7,013	28.8 (0.7)	6,198	21.0 (0.6)	6,292	26.5 (0.7)	697	29.7 (2.2)	1,632	31.0 (1.3)	1,862	27.6 (1.3)	1,539	32.5 (1.6)
중상	6,778	29.1 (0.7)	6,583	20.6 (0.5)	6,187	26.6 (0.7)	732	23.5 (2.0)	1,665	29.0 (1.4)	1,819	29.2 (1.2)	1,560	30.5 (1.6)
상	6,953	29.3 (0.6)	6,308	19.0 (0.6)	6,134	25.4 (0.6)	701	27.6 (2.2)	1,658	31.2 (1.2)	1,851	30.3 (1.3)	1,532	31.3 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	17,976	29.1 (0.5)	21,606	20.2 (0.3)	20,235	26.0 (0.4)	2,119	28.8 (1.2)	4,999	29.3 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,880	30.4 (0.8)
읍면	9,769	29.8 (0.7)	5,712	21.7 (0.7)	4,964	27.6 (0.8)	861	21.5 (1.5)	1,799	28.3 (1.7)	1,915	29.8 (1.5)	1,368	30.2 (2.0)
소득수준(표준화)														
하	7,001	29.0 (0.7)	6,481	23.1 (0.6)	6,283	27.3 (0.6)	713	31.1 (2.3)	1,631	28.8 (1.3)	1,858	27.6 (1.4)	1,538	30.5 (1.5)
중하	7,013	29.2 (0.6)	6,198	20.9 (0.6)	6,292	26.4 (0.6)	697	29.4 (2.0)	1,632	30.2 (1.2)	1,862	26.5 (1.1)	1,539	31.6 (1.5)
중상	6,778	29.7 (0.7)	6,583	20.6 (0.5)	6,187	26.4 (0.6)	732	23.3 (1.8)	1,665	28.9 (1.4)	1,819	28.5 (1.1)	1,560	29.4 (1.5)
상	6,953	29.4 (0.6)	6,308	19.1 (0.6)	6,134	25.3 (0.6)	701	26.9 (2.1)	1,658	30.1 (1.2)	1,851	29.4 (1.3)	1,532	30.2 (1.6)
남자														
19세이상	13,095	24.3 (0.5)	12,866	16.8 (0.4)	11,717	21.3 (0.4)	1,242	24.2 (1.4)	2,832	24.9 (0.9)	3,233	23.8 (0.9)	2,698	25.4 (1.0)
65세이상	1,268	37.7 (1.6)	1,289	38.3 (1.5)	1,480	46.9 (1.4)	302	40.5 (3.2)	581	45.5 (2.6)	687	43.7 (2.5)	615	45.6 (2.5)
19세이상(표준화)	13,095	25.0 (0.5)	12,866	17.2 (0.4)	11,717	22.1 (0.4)	1,242	24.3 (1.4)	2,832	24.8 (0.9)	3,233	23.7 (0.9)	2,698	25.1 (1.0)
연령(세)														
19-29	2,828	17.3 (0.8)	2,605	7.5 (0.5)	2,052	10.5 (0.7)	141	16.5 (3.4)	365	16.2 (1.8)	485	17.5 (1.8)	306	17.8 (2.4)
30-39	3,384	19.8 (0.8)	3,289	11.5 (0.6)	2,683	16.2 (0.8)	247	20.4 (2.6)	594	16.7 (1.7)	595	18.0 (1.8)	525	19.6 (1.9)
40-49	2,813	25.2 (0.8)	3,120	14.5 (0.7)	2,819	20.3 (0.8)	248	20.7 (2.7)	578	22.5 (2.0)	642	18.8 (1.7)	531	21.4 (1.8)
50-59	1,936	30.7 (1.2)	1,803	22.3 (1.1)	1,918	27.1 (1.1)	205	29.0 (3.5)	489	31.9 (2.4)	542	27.3 (2.2)	478	28.8 (2.3)
60-69	1,429	35.9 (1.3)	1,379	34.6 (1.3)	1,447	39.9 (1.4)	217	38.3 (4.7)	440	44.0 (2.6)	541	41.1 (2.6)	473	41.6 (3.0)
70+	705	39.3 (2.2)	670	40.2 (1.9)	798	48.4 (1.9)	184	43.7 (3.8)	366	44.0 (3.4)	428	45.2 (3.0)	385	47.4 (3.1)
거주지역														
동	8,548	23.5 (0.5)	10,196	15.5 (0.4)	9,404	20.1 (0.5)	869	24.8 (1.7)	2,078	24.3 (1.0)	2,390	22.5 (1.0)	2,102	25.4 (1.2)
읍면	4,547	27.2 (0.9)	2,670	22.3 (1.0)	2,313	26.6 (1.1)	373	22.1 (2.8)	754	27.4 (1.8)	843	29.1 (2.5)	596	25.5 (2.1)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 외래이용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	3,330	23.5 (0.8)	3,073	19.3 (0.7)	2,946	21.7 (0.9)	300	29.5 (3.4)	680	22.1 (1.9)	817	23.0 (1.8)	666	24.3 (2.0)
중하	3,261	24.9 (0.9)	2,868	16.9 (0.7)	2,862	21.2 (0.9)	286	24.6 (2.9)	672	28.8 (1.7)	801	22.4 (1.6)	668	25.9 (2.0)
중상	3,260	24.6 (0.8)	3,137	17.0 (0.7)	2,893	22.4 (0.8)	308	18.3 (2.6)	707	23.3 (1.9)	774	22.8 (1.6)	675	24.9 (2.2)
상	3,244	24.3 (0.8)	2,965	15.1 (0.7)	2,866	20.0 (0.8)	299	24.7 (3.0)	689	26.0 (1.9)	803	27.0 (1.8)	661	26.7 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	8,548	24.9 (0.6)	10,196	16.8 (0.4)	9,404	21.8 (0.5)	869	25.4 (1.6)	2,078	25.0 (1.0)	2,390	23.2 (1.0)	2,102	25.8 (1.1)
읍면	4,547	25.1 (0.9)	2,670	18.4 (0.8)	2,313	23.9 (1.0)	373	19.8 (2.2)	754	22.5 (1.5)	843	24.5 (1.9)	596	21.7 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	3,330	24.2 (0.8)	3,073	19.4 (0.7)	2,946	22.8 (0.8)	300	29.5 (3.4)	680	22.3 (1.8)	817	23.0 (1.8)	666	24.2 (1.9)
중하	3,261	25.7 (0.9)	2,868	17.6 (0.7)	2,862	22.1 (0.8)	286	25.2 (2.7)	672	28.4 (1.7)	801	22.1 (1.5)	668	25.5 (1.9)
중상	3,260	25.5 (0.9)	3,137	17.2 (0.7)	2,893	23.1 (0.8)	308	18.6 (2.4)	707	23.8 (1.9)	774	22.8 (1.6)	675	24.5 (2.2)
상	3,244	24.7 (0.8)	2,965	15.8 (0.7)	2,866	20.5 (0.8)	299	24.8 (2.9)	689	25.7 (1.8)	803	26.8 (1.8)	661	26.2 (2.4)
여자														
19세이상	14,650	33.1 (0.6)	14,452	24.2 (0.4)	13,482	31.3 (0.5)	1,738	31.4 (1.4)	3,966	35.1 (1.0)	4,237	33.6 (1.0)	3,550	37.2 (1.0)
65세이상	2,061	43.4 (1.3)	2,000	43.3 (1.2)	2,222	55.6 (1.1)	420	47.8 (2.9)	935	51.8 (2.0)	961	52.4 (1.9)	763	55.0 (2.2)
19세이상(표준화)	14,650	33.3 (0.5)	14,452	23.7 (0.4)	13,482	30.5 (0.4)	1,738	30.4 (1.3)	3,966	33.7 (1.0)	4,237	32.1 (0.9)	3,550	35.8 (1.0)
연령(세)														
19-29	3,310	23.4 (0.8)	3,170	11.3 (0.6)	2,507	19.3 (0.9)	197	20.6 (3.2)	525	26.9 (2.5)	563	28.0 (1.9)	461	29.0 (2.4)
30-39	3,424	29.1 (0.9)	3,369	16.9 (0.7)	2,838	22.6 (0.9)	388	25.6 (2.5)	816	23.8 (1.6)	830	23.7 (1.5)	728	30.5 (2.1)
40-49	2,736	34.0 (1.0)	3,105	20.7 (0.8)	2,990	26.7 (0.9)	316	26.1 (2.3)	749	30.7 (2.0)	853	27.8 (1.9)	631	30.5 (2.2)
50-59	2,081	41.8 (1.2)	1,909	35.1 (1.1)	2,015	38.2 (1.2)	300	39.1 (3.5)	644	44.3 (2.5)	704	40.4 (2.2)	691	40.6 (2.4)
60-69	1,783	47.1 (1.4)	1,645	45.3 (1.2)	1,740	53.8 (1.2)	272	49.8 (4.5)	639	50.7 (2.3)	664	45.0 (2.5)	552	56.0 (2.7)
70+	1,316	40.6 (1.6)	1,254	41.8 (1.4)	1,392	55.2 (1.4)	265	45.7 (3.8)	593	52.5 (2.5)	623	52.0 (2.4)	487	53.3 (3.0)
거주지역														
동	9,428	32.0 (0.7)	11,410	22.5 (0.4)	10,831	29.6 (0.5)	1,250	32.8 (1.6)	2,921	33.8 (1.1)	3,165	32.0 (1.1)	2,778	35.4 (1.0)
읍면	5,222	37.2 (1.0)	3,042	31.5 (1.0)	2,651	38.5 (1.4)	488	25.8 (2.1)	1,045	41.1 (2.1)	1,072	40.3 (1.8)	772	43.8 (3.1)
소득수준														
하	3,671	33.3 (1.0)	3,408	27.0 (0.9)	3,337	32.2 (0.9)	413	32.9 (2.9)	951	36.3 (1.9)	1,041	33.1 (1.8)	872	37.6 (2.1)
중하	3,752	32.2 (0.9)	3,330	24.6 (0.8)	3,430	31.4 (0.9)	411	34.2 (3.0)	960	33.0 (1.9)	1,061	32.6 (1.6)	871	38.9 (2.1)
중상	3,518	33.3 (0.9)	3,446	24.0 (0.8)	3,294	30.7 (0.9)	424	28.8 (2.6)	958	34.9 (2.1)	1,045	35.3 (1.6)	885	35.9 (2.1)
상	3,709	33.7 (0.9)	3,343	22.3 (0.8)	3,268	30.7 (0.8)	402	30.7 (2.8)	969	36.2 (1.7)	1,048	33.6 (1.7)	871	36.1 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	9,428	33.1 (0.7)	11,410	23.3 (0.4)	10,831	30.2 (0.5)	1,250	32.1 (1.5)	2,921	33.5 (1.1)	3,165	31.4 (1.0)	2,778	35.0 (1.0)
읍면	5,222	34.1 (0.9)	3,042	24.8 (0.9)	2,651	31.4 (1.2)	488	23.0 (1.8)	1,045	34.9 (2.7)	1,072	35.5 (1.7)	772	38.7 (3.3)
소득수준(표준화)														
하	3,671	33.4 (0.9)	3,408	26.4 (0.8)	3,337	31.8 (0.8)	413	32.6 (2.9)	951	35.4 (1.8)	1,041	32.2 (1.7)	872	36.5 (2.1)
중하	3,752	32.5 (0.9)	3,330	23.8 (0.8)	3,430	30.4 (0.8)	411	33.6 (2.8)	960	31.8 (1.8)	1,061	31.1 (1.6)	871	37.5 (2.0)
중상	3,518	33.8 (0.9)	3,446	23.8 (0.7)	3,294	29.6 (0.8)	424	28.1 (2.4)	958	34.3 (2.1)	1,045	33.7 (1.5)	885	34.1 (2.0)
상	3,709	33.7 (0.8)	3,343	22.1 (0.8)	3,268	30.0 (0.8)	402	29.3 (2.9)	969	34.3 (1.6)	1,048	32.2 (1.7)	871	34.8 (1.7)

표 1-Ⅶ-7. 2주간 약국이용률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	25,190	30.0 (0.4)	2,977	34.9 (1.3)	6,799	32.0 (0.6)	7,471	27.9 (0.7)	6,247	32.6 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	3,702	47.9 (0.9)	720	48.9 (2.6)	1,516	43.5 (1.5)	1,648	41.1 (1.6)	1,377	45.0 (1.8)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	25,190	30.0 (0.4)	2,977	34.6 (1.3)	6,799	31.6 (0.6)	7,471	27.3 (0.7)	6,247	32.1 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	4,553	19.1 (0.7)	339	27.0 (2.8)	891	28.0 (1.5)	1,049	25.0 (1.4)	767	28.4 (1.9)
30-39	-	- -	-	- -	5,518	25.0 (0.7)	634	30.0 (2.3)	1,410	26.9 (1.3)	1,425	21.0 (1.3)	1,253	30.2 (1.5)
40-49	-	- -	-	- -	5,809	29.4 (0.7)	563	35.2 (2.7)	1,327	28.6 (1.4)	1,495	23.0 (1.2)	1,162	28.6 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	3,933	35.9 (0.9)	504	37.7 (2.8)	1,133	36.1 (1.7)	1,246	32.6 (1.5)	1,169	32.7 (1.6)
60-69	-	- -	-	- -	3,187	45.8 (0.9)	490	45.0 (2.9)	1,079	43.4 (1.8)	1,205	39.5 (2.1)	1,025	41.6 (1.8)
70+	-	- -	-	- -	2,190	48.2 (1.2)	447	50.2 (3.4)	959	42.3 (2.0)	1,051	41.3 (1.7)	871	46.6 (2.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	20,227	29.5 (0.5)	2,116	36.0 (1.5)	4,999	31.7 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,879	32.9 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	4,963	32.3 (1.0)	861	31.1 (2.5)	1,800	33.4 (1.3)	1,916	30.4 (1.5)	1,368	31.5 (1.7)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	6,276	31.8 (0.7)	710	37.6 (2.4)	1,631	34.1 (1.4)	1,859	27.5 (1.3)	1,538	33.2 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	6,291	30.0 (0.7)	697	37.8 (2.2)	1,633	33.1 (1.3)	1,862	27.5 (1.2)	1,539	32.6 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	6,186	30.3 (0.7)	731	31.6 (2.4)	1,665	30.0 (1.4)	1,819	27.8 (1.3)	1,560	33.0 (1.5)
상	-	- -	-	- -	6,134	27.8 (0.7)	701	32.8 (2.2)	1,658	31.2 (1.4)	1,851	28.8 (1.4)	1,531	31.5 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	20,227	30.4 (0.4)	2,116	36.0 (1.4)	4,999	31.8 (0.7)	5,555	27.4 (0.7)	4,879	32.9 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	4,963	28.8 (0.9)	861	29.8 (2.6)	1,800	29.9 (1.7)	1,916	26.8 (1.4)	1,368	29.8 (2.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	6,276	32.1 (0.7)	710	37.6 (2.4)	1,631	33.9 (1.3)	1,859	27.4 (1.3)	1,538	32.7 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	6,291	30.0 (0.7)	697	37.6 (2.2)	1,633	32.9 (1.3)	1,862	26.6 (1.1)	1,539	32.0 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	6,186	30.2 (0.7)	731	31.4 (2.3)	1,665	29.9 (1.4)	1,819	27.2 (1.3)	1,560	32.8 (1.5)
상	-	- -	-	- -	6,134	27.7 (0.7)	701	31.8 (2.1)	1,658	30.6 (1.4)	1,851	28.1 (1.4)	1,531	30.9 (1.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	11,711	25.3 (0.5)	1,239	29.7 (1.9)	2,833	27.7 (1.0)	3,233	23.8 (0.9)	2,698	28.2 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	1,480	44.5 (1.4)	301	45.3 (3.6)	581	43.2 (2.4)	687	37.5 (2.3)	615	42.1 (2.5)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,711	25.9 (0.5)	1,239	29.8 (1.8)	2,833	27.6 (1.0)	3,233	23.7 (0.9)	2,698	28.1 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,049	14.6 (0.9)	141	21.4 (3.9)	366	24.0 (2.2)	485	18.9 (1.9)	306	22.4 (2.6)
30-39	-	- -	-	- -	2,680	21.8 (0.9)	247	25.8 (3.1)	594	22.3 (1.8)	595	18.8 (1.9)	525	26.7 (2.1)
40-49	-	- -	-	- -	2,819	25.3 (0.9)	247	28.6 (3.7)	578	22.7 (2.0)	642	20.9 (1.7)	531	25.0 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	1,918	31.6 (1.1)	204	34.2 (4.0)	489	32.6 (2.2)	542	26.7 (2.0)	478	28.7 (2.2)
60-69	-	- -	-	- -	1,447	39.9 (1.4)	217	40.7 (4.6)	440	42.5 (2.7)	541	37.9 (2.6)	473	38.2 (2.5)
70+	-	- -	-	- -	798	46.1 (1.9)	183	48.4 (3.9)	366	41.2 (3.2)	428	38.3 (2.7)	385	44.8 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	9,398	24.8 (0.6)	866	29.9 (2.2)	2,078	27.8 (1.1)	2,390	23.2 (1.0)	2,102	28.8 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	27.8 (1.1)	373	28.8 (3.0)	755	26.9 (1.8)	843	26.5 (2.3)	596	26.1 (1.5)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 약국이용률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,942	26.3 (0.9)	298	31.5 (3.5)	680	29.6 (2.0)	817	23.5 (1.7)	666	27.5 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	2,861	25.0 (0.9)	286	31.0 (3.1)	673	29.1 (1.7)	801	23.2 (1.6)	668	29.2 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	2,892	26.9 (0.9)	307	27.9 (3.8)	707	25.4 (2.0)	774	23.1 (1.8)	675	28.2 (2.2)
상	-	- -	-	- -	2,866	23.1 (0.8)	299	28.4 (3.1)	689	25.9 (1.9)	803	25.7 (2.0)	661	28.2 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	9,398	26.2 (0.6)	866	30.6 (2.1)	2,078	28.3 (1.1)	2,390	23.7 (1.0)	2,102	29.3 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	2,313	25.8 (1.1)	373	27.3 (3.1)	755	23.4 (1.8)	843	22.3 (1.9)	596	24.8 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,942	27.2 (0.9)	298	31.4 (3.3)	680	29.9 (2.0)	817	23.5 (1.7)	666	27.2 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	2,861	25.7 (0.9)	286	31.3 (3.1)	673	28.9 (1.7)	801	22.8 (1.5)	668	29.3 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	2,892	27.5 (0.9)	307	28.0 (3.5)	707	25.8 (2.0)	774	23.0 (1.7)	675	28.2 (2.3)
상	-	- -	-	- -	2,866	23.5 (0.8)	299	28.3 (3.0)	689	25.7 (1.9)	803	25.6 (2.0)	661	28.0 (2.1)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	13,479	34.5 (0.5)	1,738	40.0 (1.4)	3,966	36.3 (0.9)	4,238	31.9 (0.9)	3,549	36.8 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	2,222	50.1 (1.1)	419	51.3 (3.2)	935	43.7 (1.9)	961	43.6 (1.9)	762	47.1 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,479	34.0 (0.5)	1,738	39.4 (1.4)	3,966	35.7 (0.9)	4,238	31.0 (0.9)	3,549	36.1 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,504	23.9 (0.9)	198	32.7 (3.6)	525	32.4 (2.4)	564	31.7 (2.3)	461	34.6 (2.5)
30-39	-	- -	-	- -	2,838	28.3 (0.9)	387	34.5 (2.8)	816	31.7 (1.7)	830	23.3 (1.6)	728	33.8 (2.3)
40-49	-	- -	-	- -	2,990	33.7 (1.0)	316	42.1 (3.3)	749	34.6 (2.0)	853	25.1 (1.7)	631	32.3 (2.2)
50-59	-	- -	-	- -	2,015	40.2 (1.3)	300	41.3 (3.3)	644	39.6 (2.3)	704	38.4 (2.1)	691	36.7 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	1,740	50.9 (1.2)	273	48.8 (3.6)	639	44.2 (2.4)	664	40.9 (2.9)	552	44.6 (2.7)
70+	-	- -	-	- -	1,392	49.4 (1.3)	264	51.2 (4.3)	593	43.1 (2.4)	623	43.1 (2.2)	486	47.7 (3.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	10,829	34.1 (0.6)	1,250	41.8 (1.5)	2,921	35.5 (1.0)	3,165	31.3 (1.0)	2,777	36.9 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	2,650	36.6 (1.3)	488	33.5 (2.5)	1,045	39.7 (1.9)	1,073	34.2 (1.7)	772	36.7 (2.6)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	3,334	37.3 (0.9)	412	43.6 (2.7)	951	38.6 (2.0)	1,042	31.6 (1.9)	872	38.6 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	3,430	34.7 (0.9)	411	43.9 (2.5)	960	37.0 (1.7)	1,061	31.6 (1.5)	871	35.9 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	3,294	33.6 (0.9)	424	35.3 (2.7)	958	34.5 (2.0)	1,045	32.4 (1.5)	885	37.6 (2.0)
상	-	- -	-	- -	3,268	32.5 (1.0)	402	37.3 (2.8)	969	36.3 (1.8)	1,048	31.9 (1.6)	870	35.0 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	10,829	34.5 (0.5)	1,250	41.3 (1.6)	2,921	35.4 (1.0)	3,165	31.0 (1.0)	2,777	36.7 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	2,650	32.0 (1.3)	488	32.6 (2.7)	1,045	37.9 (2.7)	1,073	32.0 (1.9)	772	34.7 (3.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	3,334	37.1 (0.9)	412	43.7 (2.7)	951	38.2 (2.0)	1,042	31.4 (1.9)	872	38.3 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	3,430	34.0 (0.9)	411	43.6 (2.5)	960	36.6 (1.7)	1,061	30.5 (1.5)	871	34.5 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	3,294	32.8 (0.9)	424	34.7 (2.6)	958	34.3 (2.1)	1,045	31.1 (1.5)	885	37.5 (2.1)
상	-	- -	-	- -	3,268	32.0 (1.0)	402	35.8 (2.8)	969	35.3 (1.8)	1,048	30.9 (1.6)	870	34.2 (2.0)

표 1-VII-8. 연간미치료율(병의원[1], 치과[2]) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	병의원						치과					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,251	20.3 (0.7)	2,698	16.3 (0.8)	3,553	24.2 (1.0)	6,252	39.7 (0.8)	2,703	38.7 (1.1)	3,549	40.8 (1.1)
연령(세)												
19-29	767	21.5 (1.7)	306	16.3 (2.4)	461	27.0 (2.2)	771	41.8 (2.3)	307	38.0 (3.1)	464	45.9 (2.9)
30-39	1,253	19.9 (1.4)	525	16.4 (1.6)	728	23.5 (2.0)	1,254	42.9 (1.8)	527	42.5 (2.7)	727	43.3 (2.4)
40-49	1,162	19.3 (1.4)	531	18.7 (2.2)	631	19.9 (2.1)	1,162	41.8 (1.6)	532	43.0 (2.3)	630	40.6 (2.3)
50-59	1,170	18.9 (1.5)	478	15.4 (1.9)	692	22.3 (1.9)	1,172	42.4 (1.9)	480	40.7 (2.7)	692	44.0 (2.4)
60-69	1,027	21.3 (1.4)	473	14.8 (2.0)	554	27.2 (2.1)	1,024	33.1 (1.7)	473	30.4 (2.2)	551	35.5 (2.4)
70+	872	22.7 (2.0)	385	12.7 (2.2)	487	29.1 (2.5)	869	25.1 (1.8)	384	21.7 (2.6)	485	27.2 (2.3)
19-64	4,873	20.1 (0.8)	2,083	16.7 (0.9)	2,790	23.5 (1.1)	4,879	41.6 (0.9)	2,090	40.7 (1.2)	2,789	42.6 (1.3)
65+	1,378	21.5 (1.5)	615	12.9 (1.8)	763	27.5 (2.0)	1,373	27.9 (1.5)	613	23.2 (2.3)	760	31.2 (2.0)
거주지역												
동	4,883	18.7 (0.8)	2,102	14.9 (1.0)	2,781	22.3 (1.1)	4,887	39.3 (0.9)	2,108	37.9 (1.3)	2,779	40.6 (1.2)
읍면	1,368	26.2 (1.5)	596	21.3 (1.4)	772	30.8 (2.4)	1,365	41.4 (1.5)	595	41.6 (2.1)	770	41.2 (2.0)
소득수준[3]												
하	1,538	22.6 (1.3)	666	16.6 (1.4)	872	28.4 (1.9)	1,536	42.8 (1.6)	666	42.0 (2.2)	870	43.6 (1.9)
중하	1,540	21.5 (1.3)	668	16.6 (1.8)	872	26.3 (1.7)	1,541	42.8 (1.6)	670	40.2 (2.4)	871	45.3 (2.1)
중상	1,561	20.1 (1.6)	675	17.0 (1.7)	886	23.1 (2.1)	1,564	38.6 (1.7)	677	39.2 (2.3)	887	38.0 (2.2)
상	1,532	16.5 (1.2)	661	15.3 (1.8)	871	17.8 (1.7)	1,531	34.8 (1.5)	661	33.9 (2.5)	870	35.7 (2.0)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,883	18.7 (0.8)	2,102	14.9 (1.0)	2,781	22.4 (1.1)	4,887	39.2 (0.9)	2,108	37.6 (1.2)	2,779	40.7 (1.2)
읍면	1,368	25.9 (1.8)	596	21.9 (1.8)	772	29.4 (2.9)	1,365	43.9 (1.6)	595	43.0 (2.7)	770	44.4 (2.8)
소득수준(표준화)												
하	1,538	22.5 (1.3)	666	16.3 (1.4)	872	27.7 (1.9)	1,536	42.6 (1.6)	666	40.7 (2.1)	870	44.0 (2.0)
중하	1,540	21.5 (1.4)	668	16.6 (1.8)	872	26.0 (1.8)	1,541	43.1 (1.7)	670	40.1 (2.4)	871	45.9 (2.2)
중상	1,561	20.4 (1.7)	675	17.1 (1.8)	886	23.5 (2.2)	1,564	39.0 (1.8)	677	39.5 (2.3)	887	38.6 (2.3)
상	1,532	16.7 (1.3)	661	15.4 (1.8)	871	18.0 (1.7)	1,531	35.5 (1.6)	661	34.1 (2.4)	870	36.9 (2.1)

1) 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지못한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-Ⅶ-9. 소아청소년 연간미치료율(병의원[1], 치과[2]) : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	병의원						치과					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,116	7.4 (0.8)	1,102	7.1 (1.1)	1,014	7.7 (1.1)	2,112	25.3 (1.5)	1,101	24.6 (1.8)	1,011	26.0 (2.2)
연령(세)												
1-5	604	2.7 (0.6)	297	2.4 (0.9)	307	3.1 (1.0)	604	14.5 (1.7)	297	15.7 (2.3)	307	13.1 (2.3)
6-11	780	5.8 (1.0)	408	6.1 (1.5)	372	5.6 (1.4)	780	21.0 (2.4)	408	21.1 (3.1)	372	20.9 (3.1)
12-14	371	10.1 (1.8)	203	9.7 (2.7)	168	10.6 (2.6)	369	26.2 (2.8)	203	18.1 (3.3)	166	35.4 (4.8)
15-18	361	11.1 (2.1)	194	10.0 (2.3)	167	12.5 (3.1)	359	38.6 (3.5)	193	39.5 (4.6)	166	37.5 (5.2)
1-11	1,384	4.6 (0.6)	705	4.6 (1.0)	679	4.6 (0.9)	1,384	18.4 (1.6)	705	18.9 (2.1)	679	17.8 (2.1)
12-18	732	10.7 (1.5)	397	9.9 (1.8)	335	11.7 (2.1)	728	33.5 (2.7)	396	31.0 (3.2)	332	36.6 (3.8)
거주지역												
동	1,783	7.8 (0.9)	935	7.2 (1.2)	848	8.6 (1.2)	1,780	25.2 (1.7)	934	25.2 (2.1)	846	25.1 (2.3)
읍면	333	5.2 (1.8)	167	6.3 (3.0)	166	4.2 (1.5)	332	25.7 (3.7)	167	21.7 (3.2)	165	29.7 (5.6)
소득수준[3]												
하	510	9.1 (1.9)	267	7.6 (2.1)	243	10.9 (2.5)	510	33.2 (2.9)	267	30.9 (3.4)	243	35.9 (4.1)
중하	516	7.0 (1.4)	269	7.7 (2.0)	247	6.3 (1.8)	514	25.3 (3.2)	268	25.5 (4.6)	246	25.1 (3.4)
중상	532	5.7 (1.1)	273	4.4 (1.4)	259	7.2 (1.7)	531	20.6 (2.2)	273	19.5 (3.1)	258	22.0 (3.6)
상	524	7.2 (1.7)	275	8.2 (3.0)	249	6.1 (2.1)	523	19.4 (2.2)	275	19.7 (3.1)	248	19.1 (3.1)

1) 소아청소년 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 소아청소년 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지못한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-VII-10. 연간미치료이유(병의원)[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,215	16.9 (1.3)	1.2 (0.4)	3.1 (0.7)	39.1 (1.8)	2.8 (0.6)	26.2 (1.9)	10.7 (1.1)
연령(세)								
19-29	170	8.9 (2.1)	4.1 (1.8)	3.8 (2.2)	49.8 (4.4)	3.7 (1.6)	21.1 (3.9)	8.6 (2.3)
30-39	249	9.3 (1.9)	0.6 (0.6)	1.2 (1.0)	48.6 (3.5)	2.1 (1.2)	21.7 (3.7)	16.4 (2.6)
40-49	204	13.7 (2.8)	0.9 (0.9)	0.7 (0.5)	43.5 (3.8)	3.7 (1.6)	31.0 (4.0)	6.5 (1.9)
50-59	217	18.2 (3.1)	0.1 (0.1)	2.2 (1.1)	39.8 (4.8)	4.1 (1.7)	25.9 (3.6)	9.6 (2.2)
60-69	187	27.6 (4.2)	0.0 (-)[4]	3.9 (1.3)	19.6 (4.2)	1.7 (1.4)	38.5 (4.3)	8.7 (2.3)
70+	188	42.3 (4.5)	0.0 (-)	11.0 (2.4)	8.4 (2.4)	0.0 (-)	23.0 (3.7)	15.3 (2.6)
19-64	937	13.7 (1.4)	1.4 (0.5)	2.0 (0.7)	43.8 (2.0)	3.3 (0.7)	25.7 (2.2)	10.1 (1.2)
65+	278	35.7 (3.6)	0.0 (-)	9.6 (1.9)	11.3 (2.7)	0.3 (0.3)	28.9 (3.1)	14.1 (2.4)
거주지역								
동	855	17.3 (1.5)	1.1 (0.5)	1.7 (0.7)	41.2 (2.1)	2.8 (0.7)	24.5 (2.2)	11.5 (1.3)
읍면	360	16.0 (2.5)	1.4 (0.9)	6.7 (1.6)	33.8 (3.1)	3.0 (1.2)	30.5 (3.5)	8.5 (2.2)
소득수준[2]								
하	338	27.2 (2.9)	1.9 (1.0)	5.3 (1.3)	29.9 (3.0)	2.2 (1.1)	24.9 (3.3)	8.6 (1.7)
중하	335	14.4 (2.3)	1.0 (0.7)	2.7 (0.8)	39.9 (3.0)	2.1 (1.0)	27.1 (2.8)	12.8 (2.1)
중상	286	12.7 (2.1)	0.7 (0.7)	1.0 (0.5)	43.2 (3.6)	4.7 (1.5)	26.7 (3.9)	11.2 (2.5)
상	239	10.1 (2.3)	1.1 (1.1)	2.9 (2.1)	49.2 (4.4)	2.7 (1.3)	24.1 (3.3)	9.9 (2.3)
거주지역(표준화)[3]								
동	855	17.7 (1.5)	1.1 (0.4)	1.6 (0.6)	40.7 (2.0)	2.7 (0.7)	24.5 (2.1)	11.7 (1.2)
읍면	360	11.7 (2.1)	2.4 (1.8)	4.3 (1.3)	36.6 (3.5)	3.5 (1.5)	33.0 (4.1)	8.5 (2.9)
소득수준(표준화)								
하	338	24.6 (2.6)	2.4 (1.2)	4.9 (1.4)	32.2 (3.1)	2.3 (1.1)	24.7 (3.4)	8.9 (1.7)
중하	335	13.5 (2.2)	1.1 (0.8)	2.1 (0.7)	41.4 (3.1)	2.2 (1.0)	26.8 (2.6)	12.9 (2.1)
중상	286	11.7 (1.8)	0.7 (0.7)	0.9 (0.5)	43.9 (3.8)	4.6 (1.5)	26.8 (4.0)	11.4 (2.5)
상	239	10.0 (2.2)	1.1 (1.1)	2.8 (2.0)	50.2 (4.5)	2.7 (1.2)	23.6 (3.1)	9.5 (2.1)

1) 연간미치료이유(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-Ⅶ-11. 연간미치료이유(병의원)[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	386	12.4 (1.9)	0.9 (0.6)	2.1 (1.0)	44.5 (3.2)	2.8 (1.1)	31.1 (3.4)	6.3 (1.4)
연령(세)								
19-29	52	6.6 (3.3)	2.5 (2.5)	4.7 (4.5)	40.6 (7.7)	3.2 (2.4)	33.2 (7.1)	9.2 (4.4)
30-39	88	5.4 (2.7)	1.5 (1.5)	0.0 (-)[4]	61.4 (6.9)	3.7 (2.6)	24.3 (6.8)	3.8 (2.5)
40-49	77	10.3 (3.8)	0.0 (-)	0.8 (0.8)	46.2 (6.1)	2.1 (1.3)	35.3 (6.5)	5.4 (2.7)
50-59	66	15.4 (5.1)	0.0 (-)	1.1 (1.1)	46.3 (7.6)	2.6 (1.9)	29.9 (7.0)	4.8 (2.5)
60-69	57	26.4 (7.0)	0.0 (-)	3.3 (1.9)	25.6 (7.6)	3.9 (3.8)	38.1 (6.7)	2.7 (1.7)
70+	46	39.2 (7.1)	0.0 (-)	9.0 (4.4)	8.5 (4.1)	0.0 (-)	23.3 (6.8)	20.0 (7.4)
19-64	313	10.9 (2.0)	0.9 (0.7)	1.6 (1.1)	47.0 (3.5)	3.1 (1.2)	30.8 (3.8)	5.6 (1.5)
65+	73	27.2 (5.6)	0.0 (-)	7.5 (3.3)	19.0 (5.3)	0.0 (-)	33.5 (6.2)	12.8 (5.0)
거주지역								
동	272	12.6 (2.2)	0.5 (0.5)	1.8 (1.4)	47.4 (3.7)	2.8 (1.0)	29.0 (3.5)	6.0 (1.7)
읍면	114	11.8 (3.7)	1.8 (1.8)	3.0 (1.4)	37.0 (5.6)	3.0 (2.6)	36.4 (7.3)	7.0 (2.6)
소득수준[2]								
하	108	23.2 (4.7)	1.2 (1.3)	1.7 (0.9)	28.2 (5.4)	0.9 (0.9)	38.4 (6.1)	6.3 (2.7)
중하	92	11.1 (4.0)	0.0 (-)	0.7 (0.5)	47.4 (6.2)	2.3 (1.4)	32.1 (6.2)	6.4 (3.0)
중상	97	11.2 (3.3)	0.0 (-)	1.2 (0.9)	48.2 (5.7)	5.3 (2.6)	27.4 (5.6)	6.6 (3.0)
상	87	1.9 (1.2)	2.3 (2.3)	5.3 (4.2)	57.5 (7.3)	3.0 (2.3)	25.4 (5.9)	4.6 (2.2)
거주지역(표준화)[3]								
동	272	14.5 (2.1)	0.5 (0.5)	1.7 (1.2)	45.6 (3.4)	2.7 (1.0)	28.9 (3.3)	6.1 (1.6)
읍면	114	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	92	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	97	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 연간미치료이유(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-12. 연간미치료이유(병의원)[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	829	20.0 (1.7)	1.4 (0.6)	3.8 (0.8)	35.6 (2.1)	2.8 (0.7)	22.9 (2.0)	13.5 (1.5)
연령(세)								
19-29	118	10.3 (2.9)	5.2 (2.4)	3.3 (2.0)	55.7 (5.3)	4.0 (2.1)	13.4 (3.6)	8.2 (2.7)
30-39	161	12.2 (2.8)	0.0 (-)[4]	2.2 (1.6)	39.2 (4.0)	0.9 (0.7)	19.9 (3.4)	25.6 (4.4)
40-49	127	17.0 (4.3)	1.8 (1.8)	0.7 (0.7)	40.9 (4.8)	5.2 (2.5)	26.8 (4.8)	7.7 (2.2)
50-59	151	20.2 (4.3)	0.2 (0.2)	3.0 (1.7)	35.4 (5.0)	5.1 (2.8)	23.2 (4.0)	12.9 (3.3)
60-69	130	28.2 (5.0)	0.0 (-)	4.3 (1.7)	16.6 (4.3)	0.7 (0.7)	38.7 (5.3)	11.6 (3.4)
70+	142	43.2 (5.2)	0.0 (-)	11.5 (3.1)	8.3 (2.8)	0.0 (-)	23.0 (4.3)	14.0 (3.1)
19-64	624	15.8 (1.8)	1.8 (0.7)	2.3 (0.8)	41.5 (2.3)	3.4 (0.9)	21.9 (2.3)	13.3 (1.7)
65+	205	38.5 (4.1)	0.0 (-)	10.2 (2.4)	8.8 (2.5)	0.5 (0.5)	27.4 (3.9)	14.5 (2.9)
거주지역								
동	583	20.4 (2.1)	1.6 (0.7)	1.6 (0.7)	37.0 (2.3)	2.8 (0.9)	21.5 (2.4)	15.1 (1.8)
읍면	246	18.9 (2.6)	1.1 (1.0)	9.2 (2.2)	31.7 (4.2)	2.9 (1.1)	26.6 (3.7)	9.6 (2.7)
소득수준[2]								
하	230	29.5 (3.2)	2.3 (1.4)	7.2 (1.8)	30.9 (3.5)	2.9 (1.4)	17.4 (2.9)	9.9 (2.3)
중하	243	16.5 (2.7)	1.6 (1.2)	3.9 (1.2)	35.3 (3.5)	2.0 (1.3)	24.0 (3.0)	16.8 (3.0)
중상	189	13.7 (2.8)	1.1 (1.1)	0.8 (0.5)	39.6 (4.1)	4.2 (1.9)	26.1 (4.2)	14.4 (2.9)
상	152	17.4 (4.2)	0.0 (-)	0.7 (0.6)	41.8 (4.6)	2.5 (1.3)	22.9 (3.7)	14.7 (3.8)
거주지역(표준화)[3]								
동	583	20.1 (2.1)	1.4 (0.6)	1.5 (0.6)	37.0 (2.1)	2.8 (0.9)	21.8 (2.4)	15.3 (1.7)
읍면	246	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	230	27.8 (3.3)	2.1 (1.2)	6.2 (1.9)	33.2 (3.3)	2.9 (1.4)	16.3 (2.9)	11.4 (2.4)
중하	243	14.1 (2.7)	2.3 (1.7)	2.8 (1.0)	37.6 (3.4)	2.6 (1.9)	24.3 (2.9)	16.3 (3.0)
중상	189	12.1 (2.5)	1.4 (1.4)	0.6 (0.4)	40.9 (4.0)	4.4 (1.9)	26.7 (4.3)	13.9 (2.7)
상	152	16.4 (3.4)	0.0 (-)	0.4 (0.3)	45.0 (4.9)	2.7 (1.4)	21.8 (3.8)	13.7 (3.7)

1) 연간미치료이유(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-Ⅶ-13. 소아청소년 미치료이유(병의원)[1] : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체								
1-18세	142	16.6 (5.8)	0.7 (0.1)	1.5 (0.9)	48.7 (5.8)	1.4 (1.0)	18.5 (3.6)	12.6 (4.0)
성별								
남자	73	9.4 (6.0)	0.0 (-)[3]	1.4 (1.4)	50.2 (7.6)	2.7 (2.0)	22.7 (5.4)	13.6 (4.7)
여자	69	24.1 (7.1)	1.4 (0.2)	1.5 (1.1)	47.1 (7.5)	0.0 (-)	14.2 (3.9)	11.7 (5.2)
연령(세)								
1-5	20	7.2 (7.0)	4.5 (4.6)	18.0 (10.4)	17.8 (10.2)	0.0 (-)	17.0 (8.4)	35.5 (13.7)
6-11	44	19.0 (7.4)	0.0 (-)	0.0 (-)	39.9 (8.9)	0.0 (-)	18.5 (6.2)	22.6 (8.7)
12-14	33	11.9 (7.3)	1.3 (1.3)	0.0 (-)	48.9 (9.4)	5.5 (4.1)	22.1 (8.0)	10.3 (6.1)
15-18	45	20.0 (8.6)	0.0 (-)	0.0 (-)	60.2 (9.5)	0.0 (-)	16.6 (6.2)	3.2 (2.4)
1-11	64	16.1 (5.9)	1.1 (1.1)	4.3 (2.7)	34.6 (7.7)	0.0 (-)	18.1 (5.1)	25.7 (8.4)
12-18	78	16.8 (6.9)	0.5 (0.5)	0.0 (-)	55.8 (7.3)	2.1 (1.5)	18.7 (5.1)	6.0 (2.9)
거주지역								
동	120	18.4 (6.5)	0.8 (0.1)	0.8 (0.8)	46.2 (6.3)	1.6 (1.2)	17.5 (3.9)	14.6 (4.6)
읍면	22	5.2 (4.7)	0.0 (-)	5.4 (4.2)	64.5 (8.4)	0.0 (-)	24.9 (8.5)	0.0 (-)
소득수준[2]								
하	45	35.2 (11.7)	0.0 (-)	2.0 (2.0)	41.6 (10.6)	2.6 (2.6)	6.6 (3.6)	12.0 (6.5)
중하	36	14.2 (8.8)	1.4 (1.4)	1.1 (1.1)	50.4 (10.1)	1.7 (1.7)	23.4 (8.5)	7.8 (4.7)
중상	33	0.0 (-)	2.1 (2.2)	0.0 (-)	54.5 (9.8)	0.0 (-)	23.9 (9.0)	19.5 (8.9)
상	25	0.0 (-)	0.0 (-)	2.3 (2.4)	57.9 (13.8)	0.0 (-)	26.9 (9.8)	13.0 (7.4)

1) 소아청소년 미치료이유(병의원) : 최근 1년동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-14. 연간미치료이유(치과)[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장,학교 때문	거동불편/ 건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,347	33.0 (1.4)	2.3 (0.4)	25.3 (1.3)	1.4 (0.3)	2.9 (0.4)	20.0 (1.1)	12.3 (0.9)	2.7 (0.4)
연령(세)									
19-29	320	22.3 (3.3)	2.0 (0.8)	34.6 (2.8)	0.4 (0.3)	4.3 (1.1)	16.9 (2.5)	15.9 (2.9)	3.4 (1.3)
30-39	523	25.4 (2.3)	1.0 (0.5)	26.9 (2.6)	0.7 (0.6)	7.4 (1.3)	23.1 (2.3)	13.4 (1.9)	2.1 (0.6)
40-49	461	34.8 (2.8)	1.7 (0.8)	30.1 (2.7)	0.3 (0.3)	0.3 (0.2)	19.4 (1.9)	12.0 (1.6)	1.3 (0.6)
50-59	483	38.9 (2.7)	3.2 (0.9)	20.3 (2.0)	2.4 (0.8)	0.7 (0.3)	21.9 (2.1)	10.3 (1.6)	2.3 (0.7)
60-69	328	47.8 (3.5)	4.6 (2.0)	10.3 (2.0)	3.5 (1.1)	0.8 (0.4)	19.7 (2.4)	8.8 (1.8)	4.4 (1.4)
70+	232	53.9 (4.1)	4.8 (1.7)	4.7 (1.7)	6.6 (1.7)	0.0 (-)[4]	15.5 (2.6)	8.2 (2.4)	6.3 (1.9)
19-64	1,952	31.2 (1.5)	2.1 (0.4)	27.3 (1.4)	0.9 (0.3)	3.1 (0.5)	20.4 (1.2)	12.6 (1.0)	2.4 (0.4)
65+	395	50.5 (3.1)	4.8 (1.3)	6.1 (1.5)	6.2 (1.3)	0.5 (0.3)	16.5 (2.1)	10.0 (2.0)	5.5 (1.3)
거주지역									
동	1,820	32.5 (1.6)	1.7 (0.4)	25.8 (1.5)	1.0 (0.2)	3.3 (0.5)	19.4 (1.2)	13.4 (1.0)	2.8 (0.4)
읍면	527	34.6 (3.6)	4.6 (1.2)	23.6 (2.6)	3.1 (0.9)	1.4 (0.5)	22.1 (3.0)	8.6 (1.4)	2.0 (0.7)
소득수준[2]									
하	632	51.2 (2.6)	2.7 (0.7)	16.5 (1.7)	1.4 (0.4)	3.0 (0.8)	14.8 (1.8)	7.9 (1.1)	2.6 (0.6)
중하	634	31.0 (2.4)	1.7 (0.7)	25.2 (2.2)	2.0 (0.5)	3.1 (0.7)	20.4 (2.1)	13.9 (1.7)	2.7 (0.9)
중상	579	24.9 (2.4)	2.9 (0.9)	28.5 (3.0)	1.1 (0.5)	2.6 (0.6)	23.1 (2.2)	14.3 (2.0)	2.6 (0.7)
상	476	18.7 (2.1)	2.1 (0.9)	35.1 (2.7)	1.2 (0.7)	2.8 (1.0)	23.2 (2.3)	13.9 (2.2)	2.9 (0.9)
거주지역(표준화)[3]									
동	1,820	33.7 (1.5)	1.7 (0.4)	24.9 (1.4)	1.1 (0.2)	3.2 (0.5)	19.2 (1.2)	13.3 (1.0)	3.0 (0.5)
읍면	527	30.9 (3.4)	3.9 (1.0)	26.2 (2.9)	2.6 (0.7)	2.1 (0.8)	23.0 (3.5)	9.1 (1.8)	2.2 (0.9)
소득수준(표준화)									
하	632	49.5 (2.4)	3.2 (0.9)	16.7 (1.8)	1.5 (0.4)	3.3 (0.9)	15.1 (2.0)	7.8 (1.0)	2.8 (0.7)
중하	634	31.3 (2.3)	1.7 (0.6)	25.1 (2.1)	1.9 (0.5)	3.2 (0.7)	20.0 (2.0)	14.0 (1.7)	2.8 (0.9)
중상	579	25.7 (2.4)	2.9 (0.9)	28.4 (2.9)	1.1 (0.4)	2.5 (0.6)	22.4 (2.2)	14.2 (2.0)	2.8 (0.7)
상	476	19.4 (2.1)	2.2 (0.9)	33.7 (2.5)	1.3 (0.7)	2.6 (0.9)	24.1 (2.3)	13.8 (2.1)	2.9 (0.9)

1) 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-15. 연간미치료이유(치과)[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장,학교 때문	거동불편/ 건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	969	31.3 (2.0)	2.3 (0.6)	32.2 (1.9)	0.8 (0.3)	0.0 (-)[4]	22.8 (1.8)	8.6 (1.2)	2.0 (0.6)
연령(세)									
19-29	114	23.7 (4.7)	1.2 (1.0)	33.7 (4.4)	0.0 (-)	0.0 (-)	22.4 (4.5)	15.2 (4.2)	3.8 (2.3)
30-39	220	25.7 (3.5)	1.0 (0.7)	38.3 (4.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	26.1 (3.6)	8.9 (2.7)	0.0 (-)
40-49	210	30.3 (3.9)	2.2 (1.3)	39.8 (3.7)	0.5 (0.5)	0.0 (-)	19.3 (2.8)	6.6 (2.0)	1.3 (0.8)
50-59	189	39.7 (4.4)	3.7 (1.9)	24.8 (3.5)	2.1 (1.4)	0.0 (-)	21.7 (3.5)	5.8 (1.7)	2.2 (0.9)
60-69	144	42.2 (4.8)	4.5 (1.9)	15.8 (3.7)	1.5 (0.8)	0.0 (-)	25.6 (4.6)	6.0 (2.3)	4.4 (1.7)
70+	92	51.1 (6.4)	6.7 (3.2)	4.5 (2.6)	3.1 (1.8)	0.0 (-)	26.3 (5.4)	3.4 (2.4)	4.9 (2.2)
19-64	814	30.2 (2.1)	2.1 (0.6)	33.9 (2.1)	0.6 (0.3)	0.0 (-)	22.7 (1.9)	8.7 (1.3)	1.8 (0.6)
65+	155	47.1 (4.7)	5.8 (2.2)	7.6 (2.5)	2.7 (1.1)	0.0 (-)	25.1 (3.9)	6.8 (2.6)	5.0 (1.8)
거주지역									
동	745	30.0 (2.2)	1.8 (0.5)	34.6 (2.3)	0.6 (0.3)	0.0 (-)	21.3 (1.9)	9.6 (1.5)	2.1 (0.7)
읍면	224	36.0 (4.7)	4.1 (1.7)	24.0 (3.0)	1.4 (1.2)	0.0 (-)	27.8 (4.5)	5.1 (1.9)	1.6 (1.0)
소득수준[2]									
하	270	53.2 (3.9)	2.5 (1.0)	21.0 (3.0)	0.9 (0.6)	0.0 (-)	15.9 (3.0)	5.5 (1.6)	1.1 (0.5)
중하	246	26.9 (3.4)	1.9 (1.0)	29.3 (3.3)	0.8 (0.6)	0.0 (-)	26.6 (3.4)	11.1 (2.6)	3.4 (1.6)
중상	249	23.4 (3.4)	3.2 (1.3)	38.3 (4.0)	0.9 (0.6)	0.0 (-)	23.1 (3.2)	9.5 (3.0)	1.8 (0.9)
상	196	16.4 (3.1)	1.7 (1.1)	44.3 (3.9)	0.1 (0.2)	0.0 (-)	27.6 (3.7)	8.0 (2.7)	1.9 (1.2)
거주지역(표준화)[3]									
동	745	31.3 (2.2)	1.9 (0.6)	32.7 (2.1)	0.7 (0.3)	0.0 (-)	21.7 (1.8)	9.4 (1.4)	2.3 (0.7)
읍면	224	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	270	51.9 (4.1)	3.7 (1.6)	18.9 (2.7)	0.8 (0.6)	0.0 (-)	18.6 (3.7)	4.7 (1.3)	1.3 (0.5)
중하	246	27.8 (3.3)	2.0 (1.0)	28.2 (3.1)	0.7 (0.4)	0.0 (-)	26.4 (3.4)	11.3 (2.5)	3.7 (1.6)
중상	249	24.8 (3.3)	3.1 (1.2)	37.3 (3.9)	0.9 (0.6)	0.0 (-)	22.2 (3.2)	9.5 (3.0)	2.2 (1.0)
상	196	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-16. 연간미치료이유(치과)[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장,학교 때문	거동불편/ 건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	1,378	34.6 (1.7)	2.3 (0.5)	18.9 (1.7)	2.1 (0.4)	5.6 (0.8)	17.4 (1.2)	15.8 (1.2)	3.3 (0.5)
연령(세)									
19-29	206	21.2 (3.7)	2.7 (1.3)	35.4 (4.0)	0.8 (0.6)	8.0 (2.2)	12.1 (2.2)	16.6 (3.2)	3.2 (1.3)
30-39	303	25.1 (2.6)	1.1 (0.8)	14.9 (2.4)	1.5 (1.2)	15.2 (2.5)	20.0 (2.9)	18.1 (2.5)	4.2 (1.3)
40-49	251	39.8 (3.5)	1.2 (0.9)	19.3 (3.4)	0.0 (-)[4]	0.7 (0.4)	19.5 (2.7)	18.0 (2.4)	1.4 (0.8)
50-59	294	38.1 (3.5)	2.7 (1.0)	16.1 (2.3)	2.7 (1.0)	1.3 (0.6)	22.1 (3.0)	14.5 (3.0)	2.4 (0.8)
60-69	184	52.2 (5.1)	4.8 (2.2)	6.1 (2.0)	5.0 (1.8)	1.4 (0.7)	15.1 (3.0)	11.0 (2.6)	4.4 (2.0)
70+	140	55.3 (4.8)	3.9 (1.9)	4.8 (2.1)	8.4 (2.2)	0.0 (-)	10.1 (2.4)	10.6 (3.3)	6.9 (2.2)
19-64	1,138	32.1 (1.8)	2.1 (0.5)	20.8 (1.9)	1.3 (0.4)	6.2 (0.9)	18.2 (1.3)	16.4 (1.3)	2.9 (0.5)
65+	240	52.2 (3.7)	4.3 (1.6)	5.3 (1.7)	8.0 (1.8)	0.7 (0.5)	12.0 (2.3)	11.7 (2.7)	5.8 (1.5)
거주지역									
동	1,075	34.9 (2.0)	1.6 (0.5)	17.7 (1.8)	1.4 (0.4)	6.4 (1.0)	17.6 (1.4)	16.9 (1.4)	3.5 (0.6)
읍면	303	33.3 (3.4)	5.1 (1.6)	23.3 (4.1)	4.7 (1.2)	2.7 (1.1)	16.7 (2.4)	12.0 (2.1)	2.4 (0.9)
소득수준[2]									
하	362	49.4 (3.4)	2.8 (1.0)	12.5 (2.3)	1.8 (0.6)	5.7 (1.5)	13.7 (2.4)	10.0 (1.4)	4.0 (1.1)
중하	388	34.6 (3.4)	1.5 (0.7)	21.6 (3.3)	3.0 (0.8)	5.8 (1.4)	14.9 (2.3)	16.4 (2.1)	2.2 (0.9)
중상	330	26.5 (2.9)	2.7 (1.1)	18.6 (3.6)	1.4 (0.7)	5.2 (1.3)	23.2 (2.7)	19.2 (2.7)	3.3 (1.0)
상	280	21.1 (3.0)	2.5 (1.4)	25.9 (3.4)	2.2 (1.4)	5.6 (1.9)	18.9 (3.1)	19.8 (2.9)	3.9 (1.3)
거주지역(표준화)[3]									
동	1,075	36.0 (1.9)	1.6 (0.5)	17.2 (1.6)	1.4 (0.4)	6.2 (0.9)	17.2 (1.4)	16.8 (1.3)	3.6 (0.6)
읍면	303	29.3 (3.6)	4.4 (1.4)	27.2 (4.4)	3.5 (1.0)	4.4 (1.7)	16.3 (2.5)	13.0 (2.2)	2.0 (0.9)
소득수준(표준화)									
하	362	49.0 (3.2)	3.0 (1.1)	12.6 (2.2)	1.9 (0.6)	5.9 (1.6)	13.5 (2.5)	10.1 (1.4)	4.0 (1.1)
중하	388	34.1 (3.3)	1.5 (0.8)	22.0 (3.1)	2.7 (0.7)	6.1 (1.3)	14.7 (2.3)	16.7 (2.1)	2.3 (0.9)
중상	330	26.4 (2.7)	2.6 (1.1)	18.7 (3.6)	1.2 (0.6)	5.7 (1.2)	22.8 (2.6)	18.8 (2.6)	3.8 (1.1)
상	280	21.7 (2.9)	2.4 (1.1)	25.2 (3.2)	2.1 (1.3)	5.5 (1.8)	19.0 (3.0)	20.2 (3.1)	4.0 (1.5)

1) 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-17. 소아청소년 연간미치료이유(치과)[1] : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장,학교 때문	거동불편/ 건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체									
1-18세	423	20.7 (3.2)	3.9 (1.4)	30.4 (3.4)	0.7 (0.4)	0.9 (0.4)	22.6 (2.6)	17.0 (2.3)	3.7 (1.1)
성별									
남자	217	20.2 (5.0)	4.7 (2.0)	31.7 (4.8)	1.0 (0.8)	1.0 (0.6)	22.4 (3.9)	14.1 (2.5)	4.9 (1.8)
여자	206	21.3 (3.9)	3.1 (1.7)	29.0 (3.9)	0.4 (0.4)	0.8 (0.6)	22.8 (3.4)	20.1 (4.0)	2.5 (1.1)
연령(세)									
1-5	85	9.0 (4.0)	6.1 (3.0)	14.5 (5.9)	1.5 (1.5)	7.3 (3.1)	23.8 (5.5)	33.3 (6.6)	4.6 (2.3)
6-11	126	31.9 (5.6)	0.8 (0.6)	28.8 (5.2)	0.0 (-)[3]	0.0 (-)	13.6 (4.6)	19.1 (5.0)	5.8 (2.8)
12-14	86	7.9 (3.6)	1.9 (1.3)	29.9 (5.6)	2.6 (2.1)	0.0 (-)	32.9 (6.1)	21.2 (5.6)	3.5 (2.0)
15-18	126	23.1 (5.6)	6.2 (2.9)	36.6 (6.1)	0.0 (-)	0.0 (-)	23.3 (3.4)	8.7 (2.7)	2.2 (1.3)
1-11	211	24.6 (4.3)	2.5 (1.3)	24.3 (3.8)	0.5 (0.5)	2.3 (1.0)	16.8 (3.5)	23.6 (4.0)	5.4 (2.0)
12-18	212	18.2 (4.1)	4.9 (2.0)	34.4 (4.9)	0.8 (0.7)	0.0 (-)	26.4 (3.2)	12.7 (2.4)	2.6 (1.3)
거주지역									
동	348	21.8 (3.6)	2.6 (1.2)	28.6 (3.8)	0.6 (0.5)	1.1 (0.5)	22.8 (2.8)	17.9 (2.2)	4.6 (1.4)
읍면	75	16.2 (7.4)	9.6 (5.4)	38.1 (7.7)	1.0 (1.0)	0.0 (-)	21.7 (6.2)	13.4 (7.6)	0.0 (-)
소득수준[2]									
하	139	35.1 (6.0)	3.7 (1.9)	22.3 (4.5)	1.5 (1.1)	0.8 (0.6)	15.0 (3.6)	14.9 (3.7)	6.7 (2.6)
중하	102	16.4 (5.1)	5.2 (2.9)	29.7 (6.4)	0.5 (0.5)	1.6 (1.2)	28.9 (4.4)	17.7 (4.6)	0.0 (-)
중상	89	10.0 (4.2)	4.0 (3.9)	44.9 (7.3)	0.0 (-)	1.0 (1.0)	20.8 (6.1)	13.8 (5.9)	5.4 (2.7)
상	86	3.4 (2.1)	2.2 (1.3)	36.7 (7.1)	0.0 (-)	0.0 (-)	31.9 (6.6)	25.2 (5.6)	0.5 (0.5)

1) 소아청소년 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-18. 연간입원율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,248	11.1 (0.5)	2,698	9.3 (0.7)	3,550	12.9 (0.7)
연령(세)						
19-29	767	10.6 (1.2)	306	7.2 (1.6)	461	14.2 (1.8)
30-39	1,253	12.0 (1.1)	525	9.0 (1.6)	728	15.1 (1.7)
40-49	1,162	8.3 (1.0)	531	8.1 (1.4)	631	8.4 (1.3)
50-59	1,169	11.4 (1.1)	478	10.3 (1.6)	691	12.6 (1.6)
60-69	1,025	11.6 (1.7)	473	11.8 (2.7)	552	11.3 (1.5)
70+	872	16.1 (1.4)	385	14.1 (1.8)	487	17.4 (2.1)
19-64	4,870	10.5 (0.5)	2,083	8.8 (0.7)	2,787	12.4 (0.8)
65+	1,378	14.8 (1.2)	615	13.4 (1.8)	763	15.8 (1.6)
거주지역						
동	4,880	10.4 (0.5)	2,102	8.8 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)
읍면	1,368	13.6 (1.5)	596	11.0 (2.0)	772	16.2 (1.5)
소득수준[2]						
하	1,538	11.0 (0.9)	666	9.3 (1.3)	872	12.7 (1.3)
중하	1,539	12.6 (1.2)	668	9.9 (1.7)	871	15.3 (1.5)
중상	1,560	11.3 (0.9)	675	9.8 (1.4)	885	12.8 (1.4)
상	1,532	9.4 (0.9)	661	7.5 (1.2)	871	11.4 (1.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,880	10.4 (0.5)	2,102	8.8 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)
읍면	1,368	13.7 (1.5)	596	10.8 (1.9)	772	16.6 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	1,538	10.9 (1.0)	666	9.0 (1.3)	872	12.7 (1.4)
중하	1,539	12.7 (1.2)	668	10.1 (1.7)	871	15.1 (1.6)
중상	1,560	11.1 (0.9)	675	9.7 (1.3)	885	12.6 (1.4)
상	1,532	9.2 (0.9)	661	7.4 (1.2)	871	11.4 (1.4)

1) 연간입원율 : 최근 1년 동안 입원한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VII-19. 소아청소년 연간입원율[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,116	5.8 (0.7)	1,102	6.1 (0.9)	1,014	5.4 (1.0)
연령(세)						
1-5	604	14.4 (1.9)	297	14.9 (2.5)	307	14.0 (2.4)
6-11	780	3.9 (0.8)	408	4.4 (1.1)	372	3.5 (1.1)
12-14	371	1.0 (0.4)	203	1.9 (0.8)	168	0.0 (-)[3]
15-18	361	4.2 (1.3)	194	4.1 (1.4)	167	4.3 (2.0)
1-11	1,384	8.2 (1.0)	705	8.7 (1.3)	679	7.7 (1.4)
12-18	732	2.9 (0.8)	397	3.2 (1.0)	335	2.5 (1.2)
거주지역						
동	1,783	5.5 (0.7)	935	6.1 (0.9)	848	4.8 (0.9)
읍면	333	6.7 (1.8)	167	6.0 (2.0)	166	7.5 (2.8)
소득수준[2]						
하	510	5.1 (1.1)	267	5.1 (1.4)	243	5.1 (1.5)
중하	516	6.7 (1.5)	269	8.2 (2.0)	247	5.1 (1.4)
중상	532	6.7 (1.4)	273	7.0 (1.7)	259	6.3 (2.3)
상	524	4.9 (1.0)	275	4.6 (1.2)	249	5.1 (1.7)

1) 소아청소년 연간입원율 : 최근 1년동안 입원한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-20. 입원건당 평균 입원기간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 일)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	847	11.6 (0.9)	324	15.5 (1.8)	523	9.0 (0.6)
연령(세)						
19-29	86	10.0 (1.6)	24	14.9 (3.7)	62	7.3 (1.4)
30-39	149	8.4 (1.1)	45	11.4 (2.5)	104	6.5 (0.9)
40-49	124	12.0 (3.1)	46	19.0 (6.4)	78	7.0 (1.0)
50-59	161	14.4 (2.8)	62	19.5 (5.8)	99	10.5 (1.6)
60-69	160	13.8 (1.3)	75	15.4 (1.8)	85	12.0 (1.3)
70+	167	12.4 (1.2)	72	10.5 (1.5)	95	13.4 (1.6)
19-64	595	11.4 (1.0)	215	16.3 (2.2)	380	8.0 (0.6)
65+	252	12.4 (1.0)	109	11.6 (1.2)	143	12.9 (1.3)
거주지역						
동	616	11.7 (1.1)	236	16.0 (2.4)	380	8.7 (0.7)
읍면	231	11.5 (0.9)	88	14.0 (1.5)	143	9.7 (1.0)
소득수준[1)]						
하	227	12.4 (1.9)	86	17.7 (4.3)	141	8.8 (0.9)
중하	233	11.3 (2.0)	79	16.8 (4.3)	154	8.0 (1.0)
중상	202	10.4 (1.0)	83	10.6 (1.6)	119	10.4 (1.4)
상	175	12.6 (1.7)	70	17.4 (3.6)	105	9.3 (1.3)
거주지역(표준화)[2)]						
동	616	11.3 (1.2)	236	15.6 (2.4)	380	8.4 (0.7)
읍면	231	- -[3)]	88	- -	143	- -
소득수준(표준화)						
하	227	- -	86	- -	141	- -
중하	233	11.0 (1.9)	79	- -	154	- -
중상	202	- -	83	- -	119	- -
상	175	- -	70	- -	105	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-21. 입원건당 의료비재원[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	852	79.5 (2.1)	10.6 (1.6)	2.7 (0.9)	4.2 (1.2)	33.8 (2.7)	1.6 (0.6)	4.6 (1.3)
연령(세)								
19-29	86	76.8 (5.7)	9.8 (3.7)	3.4 (2.5)	2.0 (2.0)	40.0 (5.9)	2.3 (1.7)	7.6 (4.1)
30-39	151	76.7 (5.0)	14.9 (4.1)	3.2 (1.9)	4.3 (4.2)	35.8 (4.7)	1.0 (0.7)	3.2 (2.1)
40-49	125	72.1 (7.1)	14.4 (4.3)	4.7 (3.5)	4.7 (2.4)	53.8 (9.1)	2.6 (2.2)	1.8 (0.9)
50-59	162	83.3 (4.2)	9.7 (2.8)	1.7 (1.2)	4.1 (2.8)	35.8 (5.7)	1.6 (1.6)	1.2 (0.7)
60-69	160	87.7 (3.4)	5.4 (2.1)	2.1 (1.2)	3.4 (1.7)	20.0 (4.8)	1.9 (1.1)	10.3 (8.3)
70+	168	85.1 (3.5)	5.2 (2.3)	0.0 (-)[4]	7.4 (2.3)	3.7 (1.6)	0.0 (-)	6.6 (2.8)
19-64	599	78.2 (2.6)	12.0 (1.9)	3.2 (1.1)	3.5 (1.4)	39.6 (3.1)	1.7 (0.7)	4.4 (1.5)
65+	253	85.6 (3.0)	4.2 (1.7)	0.5 (0.5)	7.3 (2.0)	7.9 (2.5)	1.0 (0.6)	5.5 (2.0)
거주지역								
동	621	78.6 (2.6)	10.9 (1.8)	3.3 (1.2)	4.6 (1.6)	35.9 (3.4)	1.4 (0.6)	5.3 (1.7)
읍면	231	82.2 (3.6)	9.7 (3.7)	1.0 (0.7)	3.3 (1.3)	27.7 (3.4)	2.1 (1.3)	2.6 (1.3)
소득수준[2]								
하	229	73.5 (4.5)	9.6 (2.2)	1.5 (0.9)	12.6 (3.9)	26.6 (5.2)	1.5 (1.2)	6.5 (3.6)
중하	234	81.9 (3.8)	9.0 (2.6)	5.0 (2.5)	1.4 (0.9)	38.7 (6.8)	3.0 (1.6)	3.4 (1.5)
중상	204	81.5 (4.4)	14.9 (4.0)	0.4 (0.4)	1.0 (0.7)	38.0 (4.6)	0.7 (0.5)	1.5 (0.6)
상	175	84.5 (4.1)	6.9 (2.3)	4.0 (2.4)	0.0 (-)	32.8 (4.8)	0.6 (0.4)	7.2 (3.5)
거주지역(표준화)[3]								
동	621	78.2 (2.9)	11.0 (1.9)	3.5 (1.3)	4.4 (1.6)	37.7 (3.1)	1.4 (0.6)	5.3 (1.6)
읍면	231	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	229	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	234	81.2 (4.1)	9.6 (2.8)	5.2 (2.5)	1.2 (0.7)	38.9 (5.1)	3.2 (1.7)	3.5 (1.5)
중상	204	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	175	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 입원건당 의료비재원 : 최근 1년간 입원이용을 위해 의료기관에서 사용한 보험 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-22. 입원건당 의료비재원[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	325	72.3 (4.0)	14.7 (3.3)	5.8 (2.1)	3.0 (1.4)	30.8 (3.6)	2.8 (1.2)	7.3 (2.9)
연령(세)								
19-29	24	62.2 (12.1)	18.5 (8.9)	6.7 (6.5)	0.0 (-)[4]	46.4 (12.3)	2.8 (2.7)	15.3 (9.4)
30-39	45	69.1 (8.9)	21.3 (9.2)	8.4 (4.7)	0.0 (-)	40.4 (8.7)	1.1 (1.1)	4.3 (4.0)
40-49	47	61.7 (9.5)	20.3 (6.9)	10.4 (7.8)	2.2 (2.1)	49.2 (10.0)	4.8 (4.7)	1.6 (1.2)
50-59	62	71.6 (8.4)	13.7 (5.1)	4.0 (2.9)	8.0 (6.1)	20.7 (6.0)	3.8 (3.7)	2.1 (1.5)
60-69	75	90.2 (4.3)	5.1 (2.7)	2.6 (1.9)	0.0 (-)	13.5 (6.2)	3.1 (2.0)	18.7 (15.0)
70+	72	86.5 (5.3)	3.6 (3.0)	0.0 (-)	8.8 (4.5)	4.4 (2.8)	0.0 (-)	6.3 (5.0)
19-64	216	69.0 (4.8)	17.1 (4.0)	7.0 (2.5)	2.5 (1.6)	35.9 (4.2)	2.8 (1.5)	7.6 (3.4)
65+	109	88.5 (4.1)	3.3 (2.2)	0.0 (-)	5.7 (3.0)	6.0 (2.6)	2.7 (1.7)	5.7 (3.4)
거주지역								
동	237	72.6 (4.5)	13.2 (3.0)	7.0 (2.7)	3.3 (1.8)	32.8 (4.2)	2.2 (1.2)	9.4 (3.8)
읍면	88	71.6 (8.9)	19.3 (9.6)	2.5 (1.8)	2.3 (1.6)	25.1 (6.8)	4.3 (2.8)	1.2 (0.9)
소득수준[2]								
하	86	74.4 (6.6)	10.7 (3.8)	3.0 (2.1)	9.3 (4.8)	35.6 (8.4)	3.8 (2.9)	12.6 (8.1)
중하	79	64.5 (7.3)	16.7 (5.8)	12.7 (5.9)	1.4 (1.5)	21.5 (5.9)	5.7 (3.5)	5.4 (3.3)
중상	84	75.7 (7.8)	22.4 (7.8)	0.8 (0.8)	0.0 (-)	33.0 (6.8)	0.6 (0.7)	0.2 (0.2)
상	70	80.2 (8.4)	2.6 (2.0)	7.4 (5.4)	0.0 (-)	35.5 (7.3)	0.0 (-)	11.2 (7.1)
거주지역(표준화)[3]								
동	237	71.7 (4.7)	13.5 (3.5)	7.9 (3.2)	2.3 (1.2)	37.3 (4.7)	2.0 (1.0)	9.9 (3.4)
읍면	88	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	86	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	79	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 입원건당 의료비재원 : 최근 1년간 입원이용을 위해 의료기관에서 사용한 보험 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-23. 입원건당 의료비재원[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	527	84.5 (2.4)	7.8 (1.5)	0.5 (0.3)	5.1 (1.7)	35.8 (3.6)	0.8 (0.4)	2.7 (0.9)
연령(세)								
19-29	62	84.6 (5.5)	5.1 (2.9)	1.6 (1.6)	3.1 (3.1)	36.6 (7.2)	2.1 (2.1)	3.5 (3.4)
30-39	106	81.3 (7.0)	11.0 (4.0)	0.0 (-)[4]	7.0 (6.6)	32.9 (6.2)	0.9 (0.6)	2.5 (2.3)
40-49	78	79.8 (8.0)	10.0 (4.7)	0.5 (0.6)	6.5 (4.0)	57.2 (12.1)	1.0 (1.0)	1.9 (1.4)
50-59	100	92.1 (2.6)	6.8 (2.4)	0.0 (-)	1.1 (1.0)	47.3 (8.6)	0.0 (-)	0.6 (0.5)
60-69	85	85.0 (4.7)	5.7 (3.1)	1.6 (1.6)	7.1 (3.3)	27.1 (6.9)	0.6 (0.6)	1.2 (0.9)
70+	96	84.4 (4.5)	6.0 (3.1)	0.0 (-)	6.6 (2.7)	3.4 (2.0)	0.0 (-)	6.8 (3.3)
19-64	383	84.6 (2.8)	8.5 (1.7)	0.5 (0.4)	4.3 (2.1)	42.2 (4.2)	1.0 (0.5)	2.1 (1.0)
65+	144	83.9 (4.0)	4.8 (2.3)	0.8 (0.8)	8.3 (2.6)	9.0 (3.5)	0.0 (-)	5.4 (2.4)
거주지역								
동	384	82.7 (3.1)	9.3 (1.9)	0.7 (0.5)	5.5 (2.3)	38.0 (4.6)	0.8 (0.6)	2.4 (0.9)
읍면	143	89.3 (3.0)	3.4 (2.0)	0.0 (-)	3.9 (1.8)	29.4 (4.2)	0.7 (0.7)	3.5 (2.3)
소득수준[2]								
하	143	72.8 (6.3)	8.8 (2.7)	0.5 (0.5)	14.8 (5.6)	20.5 (5.5)	0.0 (-)	2.4 (2.1)
중하	155	92.5 (2.6)	4.3 (1.9)	0.3 (0.3)	1.4 (0.8)	49.2 (8.3)	1.4 (1.3)	2.2 (1.4)
중상	120	85.8 (3.8)	9.4 (3.1)	0.0 (-)	1.7 (1.2)	41.6 (6.1)	0.8 (0.8)	2.4 (1.1)
상	105	87.5 (3.7)	9.9 (3.4)	1.6 (1.6)	0.0 (-)	30.9 (6.5)	1.0 (0.8)	4.4 (3.0)
거주지역(표준화)[3]								
동	384	82.4 (3.4)	9.4 (2.1)	0.8 (0.5)	5.6 (2.3)	39.0 (3.9)	0.9 (0.6)	2.3 (0.9)
읍면	143	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	143	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	155	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	120	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	105	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1) 입원건당 의료비재원 : 최근 1년간 입원이용을 위해 의료기관에서 사용한 보험 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-24. 입원건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 :천원)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	788	986 (99)	303	1,181 (216)	485	854 (65)
연령(세)						
19-29	79	817 (174)	21	994 (460)	58	735 (137)
30-39	150	547 (61)	45	480 (115)	105	589 (67)
40-49	115	1,201 (352)	43	1,801 (793)	72	775 (122)
50-59	152	1,014 (206)	56	1,411 (449)	96	720 (74)
60-69	148	1,195 (158)	72	1,027 (218)	76	1,404 (166)
70+	144	1,480 (299)	66	1,555 (594)	78	1,437 (304)
19-64	565	896 (106)	201	1,121 (248)	364	742 (54)
65+	223	1,416 (215)	102	1,472 (403)	121	1,379 (232)
거주지역						
동	578	986 (115)	220	1,264 (270)	358	797 (57)
읍면	210	989 (187)	83	950 (279)	127	1,015 (189)
소득수준[1)]						
하	208	1,063 (233)	81	1,638 (564)	127	679 (85)
중하	218	844 (111)	75	740 (152)	143	910 (144)
중상	189	775 (89)	76	596 (106)	113	901 (130)
상	164	1,379 (279)	66	1,961 (663)	98	969 (111)
거주지역(표준화)[2)]						
동	578	982 (122)	220	- -[3)]	358	804 (58)
읍면	210	- -	83	- -	127	- -
소득수준(표준화)						
하	208	- -	81	- -	127	- -
중하	218	845 (101)	75	- -	143	- -
중상	189	- -	76	- -	113	- -
상	164	- -	66	- -	98	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-25. 2주간 외래이용률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,248	31.4 (0.8)	2,698	25.4 (1.0)	3,550	37.2 (1.0)
연령(세)						
19-29	767	23.2 (2.0)	306	17.8 (2.4)	461	29.0 (2.4)
30-39	1,253	24.9 (1.3)	525	19.6 (1.9)	728	30.5 (2.1)
40-49	1,162	25.9 (1.5)	531	21.4 (1.8)	631	30.5 (2.2)
50-59	1,169	34.7 (1.9)	478	28.8 (2.3)	691	40.6 (2.4)
60-69	1,025	49.2 (1.8)	473	41.6 (3.0)	552	56.0 (2.7)
70+	872	51.0 (2.5)	385	47.4 (3.1)	487	53.3 (3.0)
19-64	4,870	28.3 (0.8)	2,083	22.8 (1.1)	2,787	33.8 (1.1)
65+	1,378	51.1 (1.8)	615	45.6 (2.5)	763	55.0 (2.2)
거주지역						
동	4,880	30.5 (0.9)	2,102	25.4 (1.2)	2,778	35.4 (1.0)
읍면	1,368	34.9 (2.1)	596	25.5 (2.1)	772	43.8 (3.1)
소득수준[2]						
하	1,538	31.1 (1.6)	666	24.3 (2.0)	872	37.6 (2.1)
중하	1,539	32.5 (1.6)	668	25.9 (2.0)	871	38.9 (2.1)
중상	1,560	30.5 (1.6)	675	24.9 (2.2)	885	35.9 (2.1)
상	1,532	31.3 (1.5)	661	26.7 (2.4)	871	36.1 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,880	30.4 (0.8)	2,102	25.8 (1.1)	2,778	35.0 (1.0)
읍면	1,368	30.2 (2.0)	596	21.7 (1.9)	772	38.7 (3.3)
소득수준(표준화)						
하	1,538	30.5 (1.5)	666	24.2 (1.9)	872	36.5 (2.1)
중하	1,539	31.6 (1.5)	668	25.5 (1.9)	871	37.5 (2.0)
중상	1,560	29.4 (1.5)	675	24.5 (2.2)	885	34.1 (2.0)
상	1,532	30.2 (1.6)	661	26.2 (2.4)	871	34.8 (1.7)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VII-26. 소아청소년 2주간 외래이용률[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,116	30.3 (1.4)	1,102	27.8 (1.8)	1,014	33.1 (1.9)
연령(세)						
1-5	604	50.6 (3.0)	297	49.7 (4.1)	307	51.6 (3.7)
6-11	780	30.9 (2.1)	408	29.2 (2.8)	372	32.8 (2.6)
12-14	371	24.8 (2.9)	203	24.4 (3.8)	168	25.3 (3.9)
15-18	361	16.7 (2.2)	194	12.0 (2.7)	167	22.6 (3.3)
1-11	1,384	38.9 (1.8)	705	37.6 (2.6)	679	40.3 (2.3)
12-18	732	20.0 (1.9)	397	16.9 (2.2)	335	23.8 (2.8)
거주지역						
동	1,783	31.3 (1.5)	935	28.8 (2.0)	848	34.2 (1.9)
읍면	333	26.0 (3.0)	167	23.4 (4.1)	166	28.7 (4.6)
소득수준[2]						
하	510	29.7 (2.2)	267	28.0 (3.2)	243	31.8 (3.4)
중하	516	29.0 (2.8)	269	26.2 (3.4)	247	32.0 (3.8)
중상	532	30.2 (2.6)	273	27.3 (3.3)	259	33.7 (3.6)
상	524	33.1 (2.8)	275	30.5 (3.8)	249	35.8 (3.9)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-VII-27. 외래이용건당 의료비재원[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	4,183	86.3 (1.5)	1.0 (0.4)	0.5 (0.3)	4.2 (1.0)	0.8 (0.3)	3.8 (0.5)	5.7 (0.9)
연령(세)								
19-29	320	85.4 (3.2)	1.0 (1.0)	2.1 (2.1)	0.5 (0.5)	0.6 (0.4)	7.8 (2.0)	4.9 (1.4)
30-39	511	85.8 (4.5)	0.8 (0.6)	0.0 (-)[4]	0.5 (0.5)	1.3 (0.7)	4.2 (1.0)	8.6 (4.2)
40-49	575	79.5 (3.6)	1.2 (1.2)	1.0 (0.9)	8.6 (2.9)	1.3 (0.9)	6.3 (1.4)	4.5 (1.9)
50-59	845	91.4 (2.0)	1.8 (1.6)	0.5 (0.5)	1.8 (0.8)	1.2 (1.2)	2.3 (0.8)	3.4 (0.9)
60-69	926	89.9 (1.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	3.4 (1.3)	0.0 (-)	2.7 (0.7)	6.4 (1.1)
70+	1,006	84.9 (3.4)	0.8 (0.8)	0.0 (-)	9.6 (2.8)	0.1 (0.1)	0.9 (0.4)	7.1 (2.3)
19-64	2,666	85.9 (1.6)	1.1 (0.6)	0.7 (0.4)	3.1 (0.8)	1.0 (0.4)	4.8 (0.6)	5.5 (1.1)
65+	1,517	87.5 (2.6)	0.5 (0.5)	0.0 (-)	7.5 (2.3)	0.1 (0.1)	1.1 (0.3)	6.4 (1.7)
거주지역								
동	3,137	86.0 (1.7)	1.3 (0.6)	0.4 (0.2)	3.9 (1.2)	0.8 (0.4)	4.6 (0.6)	5.3 (1.0)
읍면	1,046	87.2 (2.6)	0.1 (0.1)	1.1 (1.1)	5.1 (1.6)	0.8 (0.5)	1.5 (0.5)	7.0 (2.1)
소득수준[2]								
하	1,077	83.0 (3.1)	1.0 (0.7)	0.3 (0.3)	9.7 (2.4)	0.2 (0.2)	1.3 (0.4)	5.3 (1.5)
중하	1,060	86.4 (2.9)	0.5 (0.3)	0.7 (0.6)	3.7 (1.5)	0.6 (0.4)	3.9 (1.1)	6.4 (2.4)
중상	1,005	86.8 (2.6)	1.5 (1.5)	1.3 (1.3)	1.7 (1.1)	1.4 (1.1)	4.9 (1.0)	5.4 (1.1)
상	991	90.1 (1.7)	1.2 (1.0)	0.0 (-)	0.3 (0.3)	1.1 (0.6)	5.3 (1.1)	6.1 (1.3)
거주지역(표준화)[3]								
동	3,137	85.4 (1.8)	1.2 (0.5)	0.4 (0.3)	3.3 (1.0)	0.8 (0.3)	5.3 (0.7)	5.7 (1.3)
읍면	1,046	84.6 (3.6)	0.1 (0.1)	3.6 (3.1)	5.1 (2.1)	1.6 (1.1)	2.8 (1.0)	4.5 (1.4)
소득수준(표준화)								
하	1,077	83.5 (3.1)	1.3 (1.1)	0.2 (0.2)	8.8 (2.2)	0.2 (0.2)	1.8 (0.7)	4.2 (1.4)
중하	1,060	84.8 (3.6)	0.6 (0.4)	1.0 (0.8)	1.8 (0.7)	0.9 (0.6)	4.9 (1.4)	8.1 (3.1)
중상	1,005	85.1 (3.1)	0.9 (0.9)	2.8 (2.5)	0.8 (0.5)	1.1 (0.7)	6.6 (1.4)	4.7 (1.1)
상	991	89.2 (2.1)	1.6 (1.3)	0.0 (-)	0.2 (0.2)	1.5 (0.9)	5.8 (1.3)	6.1 (1.3)

1) 외래이용건당 의료비재원 : 최근 2주동안 외래이용을 위해 의료기관에서 사용한 의료비재원 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-28. 외래이용건당 의료비재원[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,481	85.7 (2.5)	1.5 (0.9)	1.0 (0.8)	3.3 (1.2)	0.5 (0.3)	4.2 (0.9)	6.7 (1.8)
연령(세)								
19-29	95	82.1 (6.6)	2.7 (2.7)	5.5 (5.3)	0.0 (-)[4]	0.0 (-)	5.9 (3.5)	3.7 (2.5)
30-39	189	82.5 (9.3)	1.2 (1.1)	0.0 (-)	0.0 (-)	1.8 (1.3)	2.7 (1.2)	14.0 (8.4)
40-49	204	81.0 (4.6)	0.0 (-)	0.3 (0.3)	8.0 (3.5)	1.0 (1.0)	9.4 (3.2)	3.8 (1.7)
50-59	263	88.5 (4.5)	4.3 (4.0)	1.2 (1.2)	1.3 (0.9)	0.0 (-)	3.3 (1.9)	4.9 (2.0)
60-69	345	89.4 (2.7)	0.0 (-)	0.0 (-)	2.5 (1.7)	0.0 (-)	3.3 (1.5)	7.5 (2.1)
70+	385	89.8 (5.3)	0.0 (-)	0.0 (-)	7.9 (5.3)	0.0 (-)	0.7 (0.4)	5.8 (1.8)
19-64	912	84.1 (3.1)	1.9 (1.2)	1.3 (1.0)	2.7 (1.1)	0.6 (0.4)	5.1 (1.2)	6.9 (2.3)
65+	569	91.0 (3.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	5.4 (3.7)	0.0 (-)	1.2 (0.5)	5.9 (1.6)
거주지역								
동	1,158	84.8 (3.0)	1.9 (1.2)	0.4 (0.3)	2.9 (1.2)	0.4 (0.3)	5.0 (1.1)	7.1 (2.2)
읍면	323	88.6 (4.2)	0.0 (-)	3.4 (3.3)	4.6 (3.1)	1.0 (1.0)	1.3 (1.1)	5.1 (1.6)
소득수준[2]								
하	377	86.0 (3.4)	1.3 (1.3)	0.9 (0.9)	7.8 (3.0)	0.4 (0.4)	0.9 (0.7)	4.5 (1.4)
중하	386	79.8 (6.9)	1.0 (0.8)	0.2 (0.2)	4.2 (3.3)	0.6 (0.6)	5.4 (2.4)	11.4 (5.8)
중상	376	86.3 (4.9)	3.8 (3.7)	3.2 (3.1)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	5.7 (2.1)	3.5 (1.0)
상	331	92.0 (2.3)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.1)	0.9 (0.9)	4.0 (1.5)	7.3 (2.2)
거주지역(표준화)[3]								
동	1,158	84.5 (3.1)	1.8 (1.0)	0.3 (0.2)	2.4 (0.9)	0.4 (0.3)	5.7 (1.4)	7.2 (2.3)
읍면	323	- -[5]	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	377	83.4 (4.0)	2.9 (2.7)	0.6 (0.7)	8.2 (2.8)	0.5 (0.5)	1.7 (1.6)	3.8 (1.4)
중하	386	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	376	85.2 (5.1)	2.2 (1.9)	5.0 (4.1)	0.0 (-)	0.0 (-)	7.1 (2.5)	2.6 (0.8)
상	331	92.2 (2.5)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.1)	1.1 (1.1)	3.6 (1.4)	7.3 (2.3)

1) 외래이용건당 의료비재원 : 최근 2주동안 외래이용을 위해 의료기관에서 사용한 의료비재원 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-29. 외래이용건당 의료비재원[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	2,702	86.7 (1.7)	0.7 (0.4)	0.3 (0.3)	4.8 (1.3)	0.9 (0.4)	3.6 (0.5)	5.1 (0.9)
연령(세)								
19-29	225	87.4 (3.0)	0.0 (-)[4]	0.0 (-)	0.8 (0.8)	0.9 (0.7)	8.9 (2.2)	5.6 (1.7)
30-39	322	88.6 (2.3)	0.5 (0.5)	0.0 (-)	0.9 (0.9)	0.9 (0.7)	5.3 (1.5)	4.2 (1.6)
40-49	371	78.5 (5.0)	1.9 (1.9)	1.4 (1.4)	8.9 (3.8)	1.6 (1.1)	4.4 (1.2)	4.9 (2.9)
50-59	582	93.2 (1.7)	0.3 (0.2)	0.0 (-)	2.1 (1.2)	1.9 (1.9)	1.7 (0.6)	2.5 (0.9)
60-69	581	90.2 (2.4)	0.0 (-)	0.0 (-)	4.0 (1.8)	0.0 (-)	2.4 (0.8)	5.7 (1.3)
70+	621	82.2 (4.1)	1.2 (1.2)	0.0 (-)	10.5 (3.1)	0.1 (0.1)	1.0 (0.5)	7.8 (3.0)
19-64	1,754	87.1 (1.6)	0.6 (0.5)	0.3 (0.3)	3.4 (1.0)	1.3 (0.6)	4.6 (0.6)	4.5 (0.9)
65+	948	85.7 (3.4)	0.8 (0.8)	0.0 (-)	8.6 (2.8)	0.1 (0.1)	1.0 (0.4)	6.7 (2.1)
거주지역								
동	1,979	86.8 (1.8)	0.9 (0.6)	0.3 (0.3)	4.6 (1.7)	1.0 (0.6)	4.3 (0.6)	4.0 (0.8)
읍면	723	86.5 (3.2)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	5.4 (1.3)	0.6 (0.6)	1.7 (0.7)	7.9 (2.7)
소득수준[2]								
하	700	81.3 (3.9)	0.7 (0.7)	0.0 (-)	10.8 (3.0)	0.0 (-)	1.6 (0.5)	5.7 (2.3)
중하	674	90.6 (1.8)	0.1 (0.1)	1.0 (1.0)	3.4 (1.3)	0.6 (0.4)	2.9 (0.9)	3.1 (0.9)
중상	629	87.1 (2.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	2.7 (1.9)	2.3 (1.8)	4.4 (1.1)	6.7 (1.6)
상	660	88.8 (2.4)	2.0 (1.6)	0.0 (-)	0.5 (0.5)	1.3 (0.9)	6.1 (1.4)	5.3 (1.4)
거주지역(표준화)[3]								
동	1,979	86.4 (1.8)	0.8 (0.6)	0.4 (0.4)	3.7 (1.4)	1.0 (0.4)	5.2 (0.8)	4.4 (0.9)
읍면	723	87.1 (3.3)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	5.2 (1.9)	1.5 (1.4)	3.2 (1.4)	5.0 (1.9)
소득수준(표준화)								
하	700	83.8 (3.3)	0.3 (0.3)	0.0 (-)	9.1 (2.7)	0.0 (-)	2.0 (0.7)	4.3 (2.0)
중하	674	90.9 (2.0)	0.1 (0.1)	1.3 (1.3)	1.8 (0.7)	0.8 (0.5)	3.6 (1.2)	3.1 (1.1)
중상	629	85.5 (2.8)	0.0 (-)	0.0 (-)	1.2 (0.8)	1.9 (1.2)	7.0 (1.8)	6.2 (1.8)
상	660	86.7 (3.1)	3.1 (2.3)	0.0 (-)	0.3 (0.3)	1.8 (1.3)	7.4 (1.7)	5.1 (1.4)

1) 외래이용건당 의료비재원 : 최근 2주동안 외래이용을 위해 의료기관에서 사용한 의료비재원 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-30. 2주간외래이용건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 원)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	4,145	26,162 (2,131)	1,462	25,296 (3,512)	2,683	26,700 (2,859)
연령(세)						
19-29	314	39,737 (9,296)	92	24,918 (6,621)	222	48,745 (13,974)
30-39	507	24,369 (4,789)	187	22,170 (8,163)	320	26,169 (4,688)
40-49	574	37,650 (6,666)	203	32,475 (8,460)	371	40,822 (9,116)
50-59	840	21,790 (4,031)	260	21,801 (6,780)	580	21,784 (5,157)
60-69	915	24,800 (6,107)	339	31,031 (14,590)	576	21,127 (4,423)
70+	995	12,315 (2,703)	381	19,922 (6,626)	614	8,313 (2,452)
19-64	2,646	29,159 (2,526)	901	24,102 (3,278)	1,745	32,491 (3,721)
65+	1,499	17,425 (4,076)	561	29,333 (10,816)	938	11,225 (2,708)
거주지역						
동	3,106	29,784 (2,575)	1,141	27,795 (4,331)	1,965	31,104 (3,502)
읍면	1,039	14,941 (2,953)	321	16,042 (4,092)	718	14,389 (3,770)
소득수준[1)]						
하	1,065	19,698 (3,085)	373	18,632 (3,808)	692	20,323 (4,610)
중하	1,054	23,652 (3,615)	382	19,159 (5,345)	672	26,497 (5,418)
중상	995	33,473 (6,436)	371	36,621 (12,202)	624	31,444 (7,147)
상	982	29,972 (5,121)	325	27,055 (6,410)	657	31,886 (7,481)
거주지역(표준화)[2)]						
동	3,106	32,314 (3,062)	1,141	28,640 (4,176)	1,965	34,754 (4,313)
읍면	1,039	17,284 (3,274)	321	- -[3)]	718	19,929 (4,362)
소득수준(표준화)						
하	1,065	24,488 (5,237)	373	23,306 (5,480)	692	24,632 (7,731)
중하	1,054	28,715 (4,589)	382	- -	672	32,713 (6,898)
중상	995	35,250 (7,723)	371	38,086 (13,622)	624	38,757 (13,211)
상	982	32,615 (5,658)	325	24,963 (5,353)	657	38,736 (8,214)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-31. 2주간 약국이용률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,247	32.6 (0.8)	2,698	28.2 (1.0)	3,549	36.8 (0.9)
연령(세)						
19-29	767	28.4 (1.9)	306	22.4 (2.6)	461	34.6 (2.5)
30-39	1,253	30.2 (1.5)	525	26.7 (2.1)	728	33.8 (2.3)
40-49	1,162	28.6 (1.6)	531	25.0 (2.1)	631	32.3 (2.2)
50-59	1,169	32.7 (1.6)	478	28.7 (2.2)	691	36.7 (2.1)
60-69	1,025	41.6 (1.8)	473	38.2 (2.5)	552	44.6 (2.7)
70+	871	46.6 (2.3)	385	44.8 (2.9)	486	47.7 (3.0)
19-64	4,870	30.6 (0.8)	2,083	26.5 (1.1)	2,787	34.9 (1.0)
65+	1,377	45.0 (1.8)	615	42.1 (2.5)	762	47.1 (2.2)
거주지역						
동	4,879	32.9 (0.9)	2,102	28.8 (1.2)	2,777	36.9 (1.0)
읍면	1,368	31.5 (1.7)	596	26.1 (1.5)	772	36.7 (2.6)
소득수준[2]						
하	1,538	33.2 (1.6)	666	27.5 (2.1)	872	38.6 (2.0)
중하	1,539	32.6 (1.4)	668	29.2 (2.0)	871	35.9 (1.9)
중상	1,560	33.0 (1.5)	675	28.2 (2.2)	885	37.6 (2.0)
상	1,531	31.5 (1.5)	661	28.2 (2.1)	870	35.0 (2.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,879	32.9 (0.8)	2,102	29.3 (1.2)	2,777	36.7 (1.0)
읍면	1,368	29.8 (2.0)	596	24.8 (1.9)	772	34.7 (3.4)
소득수준(표준화)						
하	1,538	32.7 (1.6)	666	27.2 (2.0)	872	38.3 (2.0)
중하	1,539	32.0 (1.4)	668	29.3 (2.0)	871	34.5 (1.8)
중상	1,560	32.8 (1.5)	675	28.2 (2.3)	885	37.5 (2.1)
상	1,531	30.9 (1.5)	661	28.0 (2.1)	870	34.2 (2.0)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VII-32. 소아청소년 2주간 약국이용률[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,116	24.8 (1.5)	1,102	23.7 (1.9)	1,014	26.0 (1.8)
연령(세)						
1-5	604	43.1 (2.8)	297	43.9 (3.9)	307	42.1 (3.6)
6-11	780	23.3 (2.0)	408	22.2 (3.0)	372	24.5 (2.6)
12-14	371	20.3 (2.7)	203	19.4 (3.9)	168	21.3 (3.9)
15-18	361	14.6 (2.2)	194	12.8 (2.9)	167	17.1 (3.1)
1-11	1,384	31.3 (1.8)	705	31.1 (2.5)	679	31.5 (2.2)
12-18	732	16.9 (1.9)	397	15.4 (2.4)	335	18.9 (2.7)
거주지역						
동	1,783	25.2 (1.6)	935	24.2 (2.0)	848	26.4 (1.9)
읍면	333	22.8 (3.7)	167	21.4 (5.0)	166	24.2 (4.7)
소득수준[2]						
하	510	24.1 (2.5)	267	23.4 (3.3)	243	24.9 (3.5)
중하	516	26.8 (2.8)	269	25.8 (3.8)	247	27.9 (3.6)
중상	532	22.0 (2.2)	273	21.1 (3.2)	259	23.2 (2.9)
상	524	26.3 (2.6)	275	25.3 (3.3)	249	27.5 (3.5)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-VII-33. 2주간 약국이용목적 : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 :%)

구 분	N	처방약 구입	일반의약품	의약외품	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,062	72.6 (1.4)	26.2 (1.4)	5.4 (0.8)	0.0 (-)[3]
연령(세)					
19-29	307	61.7 (3.7)	35.9 (3.5)	8.1 (1.8)	0.0 (-)
30-39	515	59.1 (3.5)	35.7 (3.7)	9.1 (1.9)	0.0 (-)
40-49	431	69.5 (3.2)	30.8 (3.3)	4.0 (1.1)	0.0 (-)
50-59	579	79.5 (2.5)	22.1 (2.3)	1.6 (0.5)	0.0 (-)
60-69	611	86.5 (2.0)	14.2 (1.8)	3.3 (1.0)	0.0 (-)
70+	619	85.7 (2.8)	13.0 (2.1)	6.0 (2.2)	0.0 (-)
19-64	2,135	68.9 (1.5)	29.7 (1.6)	5.6 (0.8)	0.0 (-)
65+	927	86.7 (2.2)	12.9 (1.7)	4.7 (1.6)	0.0 (-)
거주지역					
동	2,397	70.8 (1.6)	28.1 (1.6)	5.5 (0.7)	0.0 (-)
읍면	665	78.7 (3.1)	19.7 (2.5)	5.2 (2.5)	0.0 (-)
소득수준[1]					
하	788	73.1 (2.7)	25.7 (2.8)	5.2 (1.0)	0.0 (-)
중하	772	71.8 (2.4)	27.6 (2.2)	5.3 (1.1)	0.0 (-)
중상	748	71.9 (2.7)	28.4 (2.7)	3.3 (0.9)	0.0 (-)
상	719	73.3 (3.2)	23.4 (2.5)	8.6 (2.6)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[2]					
동	2,397	69.0 (1.5)	29.7 (1.7)	5.8 (0.8)	0.0 (-)
읍면	665	71.9 (3.4)	25.7 (3.2)	6.1 (2.6)	0.0 (-)
소득수준(표준화)					
하	788	70.4 (2.8)	28.3 (2.9)	5.9 (1.3)	0.0 (-)
중하	772	67.3 (2.9)	31.7 (2.7)	5.6 (1.2)	0.0 (-)
중상	748	69.0 (3.2)	30.8 (3.2)	3.5 (0.8)	0.0 (-)
상	719	73.3 (3.2)	23.4 (2.5)	8.6 (2.6)	0.0 (-)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VII-34. 2주간 약국이용목적 : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 :%)

구 분	N	처방약 구입	일반의약품	의약외품	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,131	69.9 (2.2)	27.5 (2.1)	5.2 (1.0)	0.0 (-)[3]
연령(세)					
19-29	100	65.2 (5.9)	29.4 (5.6)	7.1 (2.8)	0.0 (-)
30-39	173	55.0 (4.9)	37.5 (4.6)	8.9 (3.6)	0.0 (-)
40-49	167	68.2 (4.7)	32.2 (4.7)	3.3 (1.6)	0.0 (-)
50-59	179	73.6 (4.9)	26.7 (4.7)	1.5 (1.0)	0.0 (-)
60-69	251	81.2 (3.4)	18.2 (3.2)	5.4 (2.1)	0.0 (-)
70+	261	85.5 (3.2)	13.3 (3.3)	5.1 (2.7)	0.0 (-)
19-64	756	66.6 (2.6)	30.4 (2.5)	5.5 (1.2)	0.0 (-)
65+	375	84.9 (2.7)	14.6 (2.8)	3.9 (1.9)	0.0 (-)
거주지역					
동	894	69.6 (2.4)	27.7 (2.3)	5.1 (1.0)	0.0 (-)
읍면	237	71.4 (5.0)	26.8 (4.3)	5.7 (3.3)	0.0 (-)
소득수준[1]					
하	288	69.6 (4.7)	28.9 (4.3)	3.4 (1.3)	0.0 (-)
중하	297	68.1 (3.8)	28.3 (3.6)	5.5 (1.9)	0.0 (-)
중상	285	72.8 (3.9)	27.3 (3.9)	3.4 (1.8)	0.0 (-)
상	253	69.6 (4.7)	25.2 (4.3)	9.1 (3.2)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[2]					
동	894	68.3 (2.4)	28.9 (2.4)	5.1 (1.0)	0.0 (-)
읍면	237	- -[4]	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	288	- -	- -	- -	- -
중하	297	64.3 (4.1)	31.9 (4.1)	5.3 (1.9)	0.0 (-)
중상	285	71.1 (4.0)	28.9 (4.1)	3.1 (1.6)	0.0 (-)
상	253	69.7 (5.0)	26.1 (4.9)	8.3 (2.6)	0.0 (-)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-VII-35. 2주간 약국이용목적 : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 :%)

구 분	N	처방약 구입	일반의약품	의약외품	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	1,931	74.4 (1.6)	25.4 (1.6)	5.6 (0.9)	0.0 (-)[3]
연령(세)					
19-29	207	59.3 (4.7)	40.4 (4.6)	8.9 (2.5)	0.0 (-)
30-39	342	61.9 (4.4)	34.6 (4.5)	9.2 (2.1)	0.0 (-)
40-49	264	70.5 (4.1)	29.7 (4.4)	4.5 (1.6)	0.0 (-)
50-59	400	83.3 (2.6)	19.1 (2.4)	1.8 (0.6)	0.0 (-)
60-69	360	90.2 (2.1)	11.4 (2.0)	1.9 (0.7)	0.0 (-)
70+	358	85.8 (3.9)	12.9 (2.4)	6.6 (3.0)	0.0 (-)
19-64	1,379	70.6 (1.9)	29.2 (1.9)	5.7 (1.0)	0.0 (-)
65+	552	87.7 (3.0)	12.0 (1.9)	5.2 (2.2)	0.0 (-)
거주지역					
동	1,503	71.7 (1.9)	28.4 (2.0)	5.8 (0.9)	0.0 (-)
읍면	428	83.3 (2.9)	15.2 (2.4)	4.9 (2.2)	0.0 (-)
소득수준[1]					
하	500	75.1 (3.1)	23.9 (3.3)	6.3 (1.4)	0.0 (-)
중하	475	74.5 (3.1)	27.1 (3.1)	5.1 (1.3)	0.0 (-)
중상	463	71.2 (3.3)	29.1 (3.4)	3.2 (1.0)	0.0 (-)
상	466	76.0 (3.4)	22.0 (2.7)	8.2 (2.7)	0.0 (-)
거주지역(표준화)[2]					
동	1,503	69.4 (1.9)	30.4 (2.1)	6.3 (1.1)	0.0 (-)
읍면	428	77.9 (3.4)	21.7 (3.6)	4.1 (1.4)	0.0 (-)
소득수준(표준화)					
하	500	73.5 (3.0)	25.8 (3.2)	6.8 (1.8)	0.0 (-)
중하	475	69.8 (3.7)	31.4 (3.6)	6.0 (1.6)	0.0 (-)
중상	463	66.2 (3.7)	33.3 (3.8)	3.9 (1.2)	0.0 (-)
상	466	74.0 (3.0)	24.9 (3.0)	7.1 (2.1)	0.0 (-)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제 2 장 영 양

Ⅰ. 식품 섭취
Ⅱ. 에너지 및 영양소 섭취
Ⅲ. 식생활 행태
Ⅳ. 수유 및 이유 현황

표 2-I-1. 식품군별 1일 섭취량 추이[1] : 전체, 만1세이상, 1969-2010

(단위 : g)

구 분	국민영양조사												
	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
곡류	559.0	517.0	540.0	479.0	489.0	500.0	474.0	490.0	486.0	419.0	478.0	495.0	469.0
감자·전분류	75.6	49.8	70.5	25.1	48.0	52.9	54.6	44.8	43.9	20.7	26.9	35.8	23.5
당류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
두류	24.9	53.1	34.6	32.2	22.2	27.1	31.1	28.6	40.5	28.4	34.9	46.9	49.9
종실류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채소류	271.0	295.0	255.0	234.0	237.0	289.0	246.0	256.0	281.0	241.0	288.0	301.0	262.0
버섯류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과일류	48.1	18.9	27.0	25.2	92.7	27.7	22.4	43.1	47.7	67.3	27.8	41.3	31.9
해조류	0.8	2.4	0.9	2.6	2.4	4.8	1.9	2.6	4.0	2.8	2.7	1.5	3.9
음료·주류·조미료류[2]	41.0	16.9	21.8	16.2	26.6	36.8	17.7	18.5	20.6	21.2	23.3	36.6	29.7
조미료류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유지류(식물성)	-	-	-	-	-	2.3	3.1	3.0	6.1	4.6	3.9	4.4	4.8
기타(식물성)	3.5	0.0	3.1	5.0	3.5	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
식물성식품 계	1,024.0	953.0	953.0	819.0	921.0	941.0	850.0	886.0	930.0	805.0	885.0	963.0	874.0
육류	6.6	19.8	5.0	8.9	18.7	6.7	14.3	9.6	14.7	19.8	26.0	13.6	15.7
난류	4.2	8.8	1.7	4.9	7.3	1.6	5.1	5.5	6.0	9.9	12.8	8.3	7.4
어패류	18.2	44.5	34.1	57.8	41.0	49.1	47.8	41.0	57.8	48.3	69.2	65.7	65.9
우유류	2.4	4.9	0.2	2.0	8.8	1.7	4.7	5.3	6.0	10.4	10.4	9.9	8.4
유지류(동물성)	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.4	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1
기타(동물성)	0.6	4.2	4.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
동물성식품 계	32.0	82.0	46.0	74.0	76.0	59.0	72.0	63.0	85.0	89.0	119.0	98.0	98.0
총계	1,056.0	1,035.0	999.0	893.0	997.0	1,000.0	922.0	949.0	1,015.0	894.0	1,004.0	1,061.0	972.0
식물성식품 섭취분율(%)	97.0	92.1	95.4	91.7	92.4	94.1	92.2	93.4	91.6	90.0	88.1	90.8	89.9
동물성식품 섭취분율(%)	3.0	7.9	4.6	8.3	7.6	5.9	7.8	6.6	8.4	10.0	11.9	9.2	10.1

1) '69~'95년 원시자료 확보 불가로 이전 보고서에 수록된 값 제시

2) '69~'95년 자료 중 '음료·주류', '조미료류'는 '음료·주류·조미료류'로 합산, '버섯류', '종실류' 등은 기타(식물성)에 포함

(계속 : 식품군별 1일 평균 섭취량 추이, 만1세이상, 1969-2010)

구 분	국민영양조사													
	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
곡류	458.0	444.0	404.0	384.0	389.0	339.0	360.0	354.9	344.0	348.9	337.2	326.6	310.4	308.9
감자·전분류	22.6	33.5	32.5	39.8	39.9	48.0	42.2	55.3	43.1	23.4	22.4	19.2	19.0	21.2
당류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
두류	46.6	61.8	59.6	74.2	74.2	44.4	48.6	55.5	58.1	36.1	36.5	30.5	33.9	34.7
종실류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채소류	266.0	277.0	254.0	273.0	278.0	221.0	249.0	224.0	281.0	284.3	301.5	272.4	275.7	286.2
버섯류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과일류	42.1	68.5	68.3	64.1	75.3	41.8	80.6	77.6	68.8	102.7	123.9	119.7	122.2	146.0
해조류	3.0	2.6	3.1	3.2	4.3	5.0	5.4	7.2	6.0	7.1	6.7	7.0	7.4	6.6
음료·주류·조미료류	21.8	25.4	22.4	21.7	21.3	27.7	29.2	35.5	34.7	38.6	37.8	44.8	53.5	47.6
조미료류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유지류(식물성)	4.4	4.6	5.7	6.9	5.3	6.8	5.3	4.8	5.6	5.7	5.8	7.0	7.5	7.5
기타(식물성)	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	9.8	10.1	9.4	9.7	11.2	12.0	12.9	11.9
식물성식품 계	864.0	917.0	850.0	867.0	887.0	735.0	830.0	824.9	850.0	857.0	883.0	839.0	843.0	871.0
육류	17.6	21.2	29.1	38.9	38.8	39.3	45.2	45.3	47.3	52.5	58.1	58.3	55.7	67.0
난류	8.3	11.3	13.3	20.6	20.7	19.3	18.7	18.5	19.5	19.8	19.0	23.6	20.0	21.8
어패류	76.1	77.1	78.0	80.6	79.1	78.0	90.1	74.0	78.6	80.5	85.4	74.8	82.6	75.1
우유류	14.0	14.8	20.2	42.8	42.5	49.3	53.0	52.9	52.2	58.1	51.6	58.0	65.7	65.6
유지류(동물성)	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.1
기타(동물성)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
동물성식품 계	116.0	125.0	141.0	183.0	181.0	186.0	207.0	191.1	198.0	211.0	215.0	215.0	224.0	230.0
총계	980.0	1,042.0	991.0	1,050.0	1,068.0	921.0	1,037.0	1,016.0	1,048.0	1,068.0	1,098.0	1,054.0	1,067.0	1,101.0
식물성식품 섭취분율(%)	88.2	88.0	85.8	82.6	83.1	79.8	80.0	81.2	81.1	80.2	80.4	79.6	79.0	79.1
동물성식품 섭취분율(%)	11.8	12.0	14.2	17.4	16.9	20.2	20.0	18.8	18.9	19.8	19.6	20.4	21.0	20.9

(계속 : 식품군별 1일 평균 섭취량 추이, 만1세이상, 1969-2010)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=10,400)		(N=9,968)		(N=8,930)		(N=4,091)		(N=8,631)		(N=9,391)		(N=8,019)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	336.0	(3.3)	287.5	(2.9)	314.5	(2.7)	290.0	(3.2)	293.6	(2.7)	294.6	(2.2)	312.9	(2.8)
감자·전분류	35.2	(1.7)	26.5	(1.0)	20.2	(0.8)	34.3	(2.9)	37.4	(1.8)	37.3	(1.8)	35.3	(1.6)
당류	7.3	(0.2)	10.9	(0.2)	7.3	(0.2)	8.1	(0.4)	7.7	(0.2)	7.7	(0.2)	9.8	(0.4)
두류	30.5	(1.0)	31.5	(1.0)	38.7	(1.1)	37.7	(1.7)	37.1	(1.2)	35.4	(1.0)	37.0	(1.1)
종실류	2.9	(0.2)	2.6	(0.2)	4.2	(0.2)	2.4	(0.2)	2.7	(0.2)	2.7	(0.2)	2.9	(0.2)
채소류	279.6	(4.1)	290.6	(3.6)	326.1	(3.7)	279.9	(5.3)	298.0	(4.3)	291.4	(3.8)	301.7	(4.2)
버섯류	4.0	(0.3)	4.7	(0.3)	4.3	(0.2)	3.5	(0.3)	4.2	(0.2)	4.2	(0.3)	5.0	(0.3)
과일류	197.8	(5.4)	207.2	(6.2)	87.5	(3.4)	177.4	(8.9)	165.7	(5.6)	169.5	(5.4)	181.5	(7.2)
해조류	7.7	(0.5)	9.0	(0.6)	8.5	(0.4)	6.3	(0.6)	5.4	(0.3)	4.8	(0.3)	4.6	(0.3)
음료류	45.5	(2.0)	59.5	(2.3)	61.4	(2.7)	61.6	(3.7)	67.9	(3.2)	83.4	(3.4)	126.1	(5.2)
주류	46.5	(2.8)	51.5	(3.3)	80.4	(5.7)	97.4	(7.2)	97.8	(5.6)	104.7	(5.6)	140.0	(7.9)
조미료류	25.4	(0.5)	31.1	(0.6)	37.4	(0.6)	32.5	(0.9)	35.4	(0.7)	36.4	(0.8)	37.1	(0.8)
유지류(식물성)	5.5	(0.1)	9.7	(0.2)	7.5	(0.2)	7.2	(0.2)	7.7	(0.2)	7.4	(0.2)	8.4	(0.2)
기타(식물성)	3.1	(0.4)	5.1	(0.5)	0.0	(0.0)	0.5	(0.1)	0.3	(0.0)	0.5	(0.1)	1.4	(0.2)
식물성식품 계	1,027.1	(12.7)	1,027.5	(11.5)	997.9	(11.0)	1,038.9	(14.7)	1,060.9	(11.9)	1,080.2	(11.5)	1,203.6	(15.1)
육류	67.8	(1.7)	91.4	(2.5)	89.8	(2.3)	88.6	(4.1)	83.7	(2.3)	86.1	(2.3)	102.1	(2.5)
난류	22.4	(0.7)	21.1	(0.6)	25.8	(0.7)	21.9	(0.9)	23.2	(0.6)	24.9	(0.6)	26.5	(0.8)
어패류	65.4	(2.0)	63.6	(1.5)	67.7	(1.5)	52.7	(1.9)	52.7	(1.5)	50.4	(1.2)	56.9	(1.8)
우유류	86.9	(3.1)	84.6	(2.5)	90.5	(2.4)	90.6	(3.7)	98.1	(3.4)	101.2	(2.7)	115.2	(3.3)
유지류(동물성)	2.0	(0.1)	0.1	(0.0)	1.6	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.0)	0.2	(0.1)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	244.6	(4.7)	261.0	(4.3)	275.7	(3.9)	254.0	(6.1)	257.9	(4.7)	263.0	(4.2)	301.1	(4.4)
총계	1,271.7	(15.1)	1,288.5	(13.7)	1,273.6	(13.2)	1,292.9	(18.4)	1,318.8	(13.9)	1,343.2	(13.6)	1,504.7	(16.9)
식물성식품 섭취분율(%)	80.7	(0.3)	79.6	(0.3)	78.3	(0.2)	80.3	(0.4)	80.3	(0.3)	80.2	(0.2)	79.5	(0.2)
동물성식품 섭취분율(%)	19.3	(0.3)	20.4	(0.3)	21.7	(0.2)	19.7	(0.4)	19.7	(0.3)	19.8	(0.2)	20.5	(0.2)

표 2-I-2. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 전체, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=10,400)		(N=9,968)		(N=8,930)		(N=4,091)		(N=8,631)		(N=9,391)		(N=8,019)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	337.2	(3.3)	289.4	(2.9)	314.4	(2.7)	288.9	(3.2)	292.0	(2.6)	292.5	(2.2)	311.0	(2.8)
감자·전분류	35.5	(1.7)	26.7	(1.0)	20.2	(0.8)	34.3	(3.0)	37.1	(1.7)	36.8	(1.7)	35.0	(1.6)
당류	7.3	(0.2)	11.2	(0.2)	7.3	(0.2)	8.2	(0.4)	7.7	(0.2)	7.8	(0.2)	9.8	(0.4)
두류	31.0	(1.0)	31.8	(1.0)	38.7	(1.1)	37.5	(1.7)	36.9	(1.2)	35.2	(1.1)	36.6	(1.1)
종실류	3.0	(0.2)	2.7	(0.2)	4.2	(0.2)	2.4	(0.2)	2.7	(0.2)	2.7	(0.2)	2.8	(0.2)
채소류	287.5	(4.3)	297.9	(3.7)	326.4	(3.7)	278.2	(5.3)	294.4	(4.1)	286.7	(3.5)	294.7	(3.9)
버섯류	4.0	(0.3)	4.8	(0.3)	4.3	(0.2)	3.5	(0.3)	4.2	(0.2)	4.2	(0.3)	5.0	(0.3)
과일류	197.1	(5.3)	208.1	(6.3)	87.6	(3.3)	176.9	(8.7)	165.1	(5.6)	169.1	(5.4)	180.3	(6.9)
해조류	7.8	(0.5)	9.1	(0.6)	8.5	(0.4)	6.3	(0.6)	5.4	(0.3)	4.7	(0.2)	4.5	(0.2)
음료류	45.3	(2.0)	61.4	(2.4)	61.5	(2.6)	62.4	(3.6)	69.3	(3.2)	85.9	(3.4)	130.2	(5.1)
주류	48.9	(2.9)	54.8	(3.5)	80.9	(5.7)	98.0	(7.1)	98.4	(5.5)	104.5	(5.5)	138.6	(7.5)
조미료류	26.0	(0.5)	31.8	(0.6)	37.4	(0.6)	32.6	(0.9)	35.3	(0.7)	36.4	(0.8)	37.0	(0.8)
유지류(식물성)	5.4	(0.1)	10.0	(0.2)	7.5	(0.2)	7.2	(0.2)	7.7	(0.2)	7.5	(0.1)	8.5	(0.2)
기타(식물성)	3.0	(0.3)	5.0	(0.5)	0.0	(0.0)	0.5	(0.1)	0.3	(0.0)	0.4	(0.1)	1.4	(0.2)
식물성식품 계	1,038.9	(12.6)	1,044.9	(11.8)	998.9	(10.9)	1,036.7	(14.0)	1,056.5	(11.5)	1,074.6	(10.9)	1,195.2	(14.2)
육류	67.8	(1.7)	92.4	(2.5)	89.8	(2.2)	88.8	(3.9)	84.6	(2.2)	87.4	(2.2)	104.0	(2.5)
난류	21.7	(0.6)	21.2	(0.6)	25.8	(0.7)	22.2	(0.9)	23.7	(0.6)	25.7	(0.6)	27.4	(0.8)
어패류	66.5	(2.0)	65.1	(1.5)	67.8	(1.5)	52.8	(1.8)	52.5	(1.5)	50.1	(1.2)	56.4	(1.8)
우유류	79.7	(2.6)	78.7	(2.2)	90.2	(2.3)	92.2	(3.7)	101.6	(3.5)	105.8	(2.8)	121.5	(3.4)
유지류(동물성)	2.1	(0.1)	0.1	(0.0)	1.6	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.0)	0.2	(0.1)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	238.0	(4.2)	257.7	(3.9)	275.5	(3.7)	256.2	(6.0)	262.7	(4.6)	269.3	(4.2)	309.6	(4.2)
총계	1,276.9	(14.8)	1,302.6	(13.7)	1,274.3	(13.0)	1,292.9	(17.4)	1,319.1	(13.5)	1,343.9	(13.0)	1,504.8	(16.1)
식물성식품 섭취분율(%)	81.4	(0.2)	80.2	(0.2)	78.3	(0.2)	80.0	(0.3)	79.9	(0.2)	79.6	(0.2)	78.8	(0.2)
동물성식품 섭취분율(%)	18.6	(0.2)	19.8	(0.2)	21.7	(0.2)	20.0	(0.3)	20.1	(0.2)	20.4	(0.2)	21.2	(0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-I-3. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=4,984)		(N=4,760)		(N=4,167)		(N=1,821)		(N=3,692)		(N=4,182)		(N=3,550)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	372.3	(4.5)	316.7	(3.8)	342.2	(3.6)	321.2	(4.6)	323.2	(3.6)	326.0	(3.1)	344.0	(3.8)
감자·전분류	32.6	(1.8)	25.7	(1.3)	20.8	(1.1)	32.0	(2.5)	35.4	(2.1)	35.6	(1.9)	32.7	(1.9)
당류	8.2	(0.3)	12.1	(0.3)	8.1	(0.2)	10.2	(0.6)	9.0	(0.3)	9.1	(0.3)	11.0	(0.4)
두류	35.4	(1.3)	37.0	(1.6)	42.5	(1.5)	43.5	(2.7)	41.8	(1.9)	40.0	(1.6)	42.6	(1.7)
종실류	2.9	(0.3)	2.6	(0.2)	4.7	(0.3)	2.5	(0.2)	2.5	(0.2)	3.0	(0.2)	3.0	(0.3)
채소류	319.4	(5.2)	330.8	(4.6)	360.4	(5.0)	319.8	(7.2)	333.7	(5.4)	326.9	(4.7)	334.7	(4.9)
버섯류	4.1	(0.3)	5.0	(0.3)	4.4	(0.3)	3.4	(0.5)	4.1	(0.3)	4.0	(0.3)	5.1	(0.4)
과일류	176.0	(5.8)	176.9	(6.1)	77.8	(3.8)	157.8	(9.5)	148.0	(7.3)	151.2	(6.3)	161.9	(7.5)
해조류	8.3	(0.6)	9.1	(0.6)	8.0	(0.5)	6.7	(0.7)	5.3	(0.3)	5.1	(0.3)	4.6	(0.3)
음료류	48.6	(2.5)	60.5	(3.0)	71.7	(4.2)	68.7	(5.5)	78.4	(4.7)	95.1	(4.9)	149.6	(6.8)
주류	83.1	(5.4)	87.5	(6.2)	126.2	(9.5)	147.9	(13.3)	151.7	(9.6)	161.3	(9.1)	224.6	(13.5)
조미료류	30.0	(0.6)	35.8	(0.7)	41.6	(0.8)	39.3	(1.4)	41.8	(1.1)	43.3	(1.2)	43.5	(1.1)
유지류(식물성)	6.0	(0.2)	11.4	(0.3)	8.3	(0.2)	8.7	(0.3)	9.3	(0.2)	9.2	(0.2)	10.3	(0.3)
기타(식물성)	2.9	(0.4)	4.6	(0.6)	0.0	(0.0)	0.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.4	(0.1)	1.3	(0.2)
식물성식품 계	1,129.8	(15.6)	1,115.6	(14.9)	1,116.8	(15.0)	1,162.3	(19.7)	1,184.5	(16.4)	1,210.3	(15.4)	1,368.8	(19.7)
육류	82.6	(2.3)	112.1	(3.4)	104.5	(2.7)	112.8	(6.2)	104.5	(3.4)	109.3	(3.3)	129.8	(4.0)
난류	25.1	(0.8)	24.5	(0.9)	28.4	(0.9)	25.9	(1.4)	27.3	(1.0)	30.1	(1.0)	32.2	(1.2)
어패류	75.0	(2.3)	75.6	(2.0)	78.1	(2.2)	64.4	(2.9)	64.0	(2.4)	60.9	(1.8)	68.4	(2.5)
우유류	79.6	(2.9)	78.7	(2.6)	86.3	(2.7)	91.6	(4.8)	105.7	(4.6)	107.1	(4.0)	117.7	(4.4)
유지류(동물성)	2.4	(0.1)	0.1	(0.0)	2.0	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.1)	0.2	(0.1)	0.4	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	264.8	(4.9)	291.3	(5.2)	299.7	(4.7)	294.8	(8.9)	301.6	(6.7)	307.6	(6.3)	348.4	(6.0)
총계	1,394.7	(18.2)	1,406.8	(17.2)	1,416.5	(17.7)	1,457.2	(23.8)	1,486.2	(19.1)	1,517.9	(18.8)	1,717.2	(22.0)
식물성식품 섭취분율(%)	80.9	(0.3)	79.2	(0.3)	78.4	(0.2)	79.4	(0.5)	79.4	(0.3)	79.1	(0.3)	78.8	(0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	19.1	(0.3)	20.8	(0.3)	21.6	(0.2)	20.6	(0.5)	20.6	(0.3)	20.9	(0.3)	21.2	(0.3)

표 2-I-4. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 남자, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=4,984)		(N=4,760)		(N=4,167)		(N=1,821)		(N=3,692)		(N=4,182)		(N=3,550)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	370.8	(4.4)	312.8	(3.7)	342.4	(3.7)	322.9	(4.5)	325.2	(3.6)	328.5	(3.1)	346.6	(4.0)
감자·전분류	32.5	(1.8)	25.6	(1.3)	20.9	(1.0)	32.3	(2.5)	35.6	(2.1)	35.8	(2.0)	32.9	(1.9)
당류	8.1	(0.3)	11.6	(0.3)	8.1	(0.2)	10.2	(0.7)	9.0	(0.3)	9.1	(0.3)	11.1	(0.4)
두류	34.5	(1.3)	36.2	(1.6)	42.3	(1.5)	43.5	(2.8)	42.0	(1.8)	40.2	(1.6)	42.9	(1.7)
종실류	2.9	(0.3)	2.5	(0.2)	4.6	(0.3)	2.5	(0.2)	2.5	(0.2)	3.0	(0.2)	3.1	(0.3)
채소류	308.1	(5.0)	316.6	(4.4)	358.7	(5.1)	320.7	(7.4)	336.9	(5.7)	331.2	(5.1)	341.2	(5.4)
버섯류	4.1	(0.3)	4.9	(0.3)	4.5	(0.3)	3.5	(0.5)	4.1	(0.3)	4.0	(0.3)	5.2	(0.4)
과일류	177.8	(5.8)	178.9	(6.1)	78.5	(3.8)	157.9	(9.7)	148.6	(7.4)	151.3	(6.3)	162.4	(7.7)
해조류	8.2	(0.5)	8.9	(0.6)	7.9	(0.5)	6.7	(0.7)	5.3	(0.3)	5.2	(0.3)	4.7	(0.3)
음료류	49.0	(2.5)	59.4	(3.0)	72.9	(4.5)	68.8	(5.7)	78.0	(4.9)	94.3	(4.9)	147.7	(6.9)
주류	77.9	(5.0)	80.2	(5.6)	125.6	(9.8)	148.3	(13.4)	152.5	(9.8)	163.7	(9.5)	229.3	(14.4)
조미료류	29.3	(0.6)	34.5	(0.6)	41.5	(0.8)	39.3	(1.4)	42.1	(1.1)	43.6	(1.2)	43.7	(1.1)
유지류(식물성)	6.1	(0.2)	10.9	(0.3)	8.4	(0.2)	8.8	(0.3)	9.3	(0.3)	9.2	(0.2)	10.3	(0.3)
기타(식물성)	3.0	(0.4)	5.0	(0.7)	0.0	(0.0)	0.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.4	(0.1)	1.4	(0.2)
식물성식품 계	1,112.3	(15.2)	1,087.9	(13.6)	1,116.5	(15.5)	1,166.0	(20.4)	1,191.7	(17.4)	1,219.6	(16.3)	1,382.7	(21.1)
육류	82.6	(2.3)	110.9	(3.4)	105.8	(2.8)	113.9	(6.3)	104.7	(3.6)	109.0	(3.4)	128.9	(3.9)
난류	25.9	(0.8)	24.6	(0.9)	28.9	(1.0)	25.9	(1.4)	27.3	(1.0)	29.8	(1.0)	31.7	(1.2)
어패류	73.8	(2.2)	72.6	(1.9)	77.9	(2.2)	64.7	(3.0)	64.4	(2.3)	61.6	(1.8)	69.6	(2.5)
우유류	90.8	(3.7)	90.2	(3.2)	88.7	(2.9)	92.8	(4.9)	104.1	(4.6)	104.5	(4.0)	113.8	(4.2)
유지류(동물성)	2.3	(0.1)	0.1	(0.0)	2.0	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.1)	0.2	(0.1)	0.4	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	275.4	(5.5)	298.7	(5.5)	303.7	(5.0)	297.5	(9.0)	300.7	(6.9)	305.2	(6.3)	344.4	(6.2)
총계	1,387.7	(17.9)	1,386.6	(16.0)	1,420.2	(18.1)	1,463.5	(24.6)	1,492.3	(20.0)	1,524.8	(19.6)	1,727.1	(23.2)
식물성식품 섭취분율(%)	79.8	(0.3)	78.1	(0.3)	78.1	(0.3)	79.3	(0.5)	79.6	(0.4)	79.5	(0.3)	79.3	(0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	20.2	(0.3)	21.9	(0.3)	21.9	(0.3)	20.7	(0.5)	20.4	(0.4)	20.5	(0.3)	20.7	(0.3)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-I-5. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=5,416)		(N=5,208)		(N=4,763)		(N=2,270)		(N=4,939)		(N=5,209)		(N=4,469)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	302.9	(3.2)	264.6	(2.9)	286.3	(2.7)	256.8	(4.2)	261.8	(2.8)	260.4	(2.8)	279.0	(3.1)
감자·전분류	37.9	(2.1)	27.4	(1.2)	19.5	(0.9)	36.4	(4.1)	39.2	(2.2)	38.9	(2.3)	37.6	(2.4)
당류	6.5	(0.2)	10.3	(0.3)	6.3	(0.2)	6.0	(0.3)	6.4	(0.2)	6.3	(0.2)	8.4	(0.5)
두류	26.6	(1.0)	27.2	(0.9)	35.0	(1.2)	31.9	(1.3)	32.3	(1.0)	30.6	(1.1)	31.0	(1.3)
종실류	2.9	(0.3)	2.7	(0.3)	3.7	(0.2)	2.3	(0.2)	2.9	(0.3)	2.4	(0.2)	2.7	(0.2)
채소류	252.6	(4.1)	267.2	(3.8)	293.1	(3.7)	238.8	(5.9)	258.9	(4.2)	251.3	(3.7)	261.9	(4.5)
버섯류	4.0	(0.3)	4.6	(0.3)	4.2	(0.3)	3.5	(0.4)	4.2	(0.3)	4.4	(0.3)	4.8	(0.3)
과일류	216.8	(6.4)	232.8	(7.5)	96.6	(4.2)	197.0	(10.7)	182.9	(6.2)	187.9	(6.9)	200.6	(8.8)
해조류	7.3	(0.5)	9.1	(0.8)	9.1	(0.5)	6.0	(0.7)	5.5	(0.4)	4.4	(0.3)	4.6	(0.3)
음료류	42.2	(2.2)	59.7	(2.9)	49.8	(2.2)	54.3	(4.0)	57.6	(3.1)	72.4	(3.7)	104.4	(5.6)
주류	16.6	(1.8)	25.6	(2.8)	34.7	(4.1)	46.1	(7.2)	42.8	(4.6)	45.3	(4.0)	50.3	(4.1)
조미료류	21.8	(0.5)	28.1	(0.7)	33.3	(0.5)	25.7	(0.9)	28.6	(0.7)	29.1	(0.8)	30.4	(0.8)
유지류(식물성)	4.9	(0.2)	8.7	(0.2)	6.7	(0.2)	5.6	(0.2)	5.9	(0.2)	5.7	(0.1)	6.5	(0.2)
기타(식물성)	3.2	(0.5)	5.1	(0.6)	0.0	(0.0)	0.3	(0.1)	0.3	(0.0)	0.5	(0.1)	1.4	(0.3)
식물성식품 계	946.1	(12.1)	973.1	(12.5)	878.2	(9.4)	910.7	(18.7)	929.1	(10.4)	939.7	(11.4)	1,023.5	(15.2)
육류	53.7	(1.6)	73.8	(2.3)	73.6	(2.8)	63.0	(3.8)	62.5	(2.2)	63.1	(2.0)	75.2	(2.2)
난류	19.1	(0.7)	18.0	(0.6)	22.7	(0.8)	17.9	(1.0)	19.2	(0.6)	20.1	(0.6)	21.3	(0.7)
어패류	57.5	(2.1)	55.4	(1.4)	57.4	(1.5)	40.7	(1.8)	40.8	(1.2)	39.1	(1.1)	44.1	(1.6)
우유류	83.2	(3.4)	79.5	(2.8)	92.3	(3.0)	88.3	(5.0)	92.1	(3.7)	97.9	(3.2)	116.7	(3.7)
유지류(동물성)	1.8	(0.1)	0.1	(0.0)	1.2	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.0)	0.2	(0.1)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	215.3	(4.7)	227.1	(4.3)	247.4	(4.3)	210.1	(6.8)	214.9	(4.5)	220.4	(4.3)	257.5	(4.6)
총계	1,161.4	(14.4)	1,200.1	(14.5)	1,125.6	(11.3)	1,120.8	(21.5)	1,143.9	(12.2)	1,160.1	(12.9)	1,281.0	(17.1)
식물성식품 섭취분율(%)	81.4	(0.3)	80.9	(0.3)	78.4	(0.3)	81.3	(0.5)	81.2	(0.3)	80.9	(0.3)	79.8	(0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	18.6	(0.3)	19.1	(0.3)	21.6	(0.3)	18.7	(0.5)	18.8	(0.3)	19.1	(0.3)	20.2	(0.3)

표 2-I-6. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 여자, 만1세이상, 표준화, 1998-2010

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사													
	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	(N=5,416)		(N=5,208)		(N=4,763)		(N=2,270)		(N=4,939)		(N=5,209)		(N=4,469)	
	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)	평균	(표준오차)
곡류	303.9	(3.1)	265.3	(2.9)	286.2	(2.7)	255.9	(4.0)	260.1	(2.8)	258.0	(2.7)	277.0	(3.2)
감자·전분류	38.1	(2.1)	27.6	(1.2)	19.7	(1.0)	36.6	(4.3)	38.8	(2.1)	38.0	(2.2)	37.4	(2.4)
당류	6.5	(0.2)	10.5	(0.3)	6.4	(0.2)	6.1	(0.3)	6.4	(0.2)	6.5	(0.3)	8.7	(0.6)
두류	26.8	(1.0)	27.3	(0.9)	34.9	(1.2)	31.7	(1.3)	32.0	(1.0)	30.3	(1.2)	30.5	(1.3)
종실류	3.0	(0.3)	2.8	(0.3)	3.7	(0.2)	2.4	(0.2)	2.9	(0.3)	2.4	(0.2)	2.6	(0.2)
채소류	257.6	(4.1)	269.6	(3.8)	292.5	(3.7)	236.9	(5.8)	254.8	(4.0)	246.3	(3.5)	254.5	(4.5)
버섯류	4.0	(0.3)	4.7	(0.3)	4.2	(0.2)	3.5	(0.4)	4.3	(0.3)	4.5	(0.3)	4.8	(0.3)
과일류	218.3	(6.3)	235.3	(7.4)	97.9	(4.2)	197.0	(10.1)	182.9	(6.4)	187.5	(6.8)	199.6	(8.4)
해조류	7.4	(0.5)	9.2	(0.8)	9.0	(0.5)	5.9	(0.7)	5.4	(0.3)	4.4	(0.3)	4.5	(0.3)
음료류	42.1	(2.1)	62.1	(3.0)	50.7	(2.2)	55.7	(4.2)	60.0	(3.2)	76.3	(3.9)	109.7	(5.8)
주류	17.4	(1.9)	26.8	(2.9)	35.5	(4.2)	47.6	(7.6)	44.8	(4.8)	47.2	(4.2)	51.5	(4.3)
조미료류	22.1	(0.5)	28.3	(0.7)	33.3	(0.5)	25.9	(0.9)	28.7	(0.7)	29.3	(0.8)	30.4	(0.8)
유지류(식물성)	4.9	(0.1)	8.9	(0.2)	6.7	(0.2)	5.7	(0.2)	6.1	(0.2)	5.8	(0.1)	6.7	(0.2)
기타(식물성)	3.2	(0.4)	5.2	(0.6)	0.0	(0.0)	0.3	(0.1)	0.3	(0.0)	0.5	(0.1)	1.4	(0.3)
식물성식품 계	955.2	(12.0)	983.7	(12.3)	880.7	(9.3)	911.2	(17.7)	927.5	(10.2)	937.0	(11.0)	1,019.4	(14.8)
육류	53.7	(1.6)	74.8	(2.3)	74.5	(2.8)	64.1	(3.6)	64.1	(2.1)	64.9	(1.9)	77.4	(2.2)
난류	18.6	(0.7)	18.3	(0.5)	23.2	(0.7)	18.6	(1.0)	20.0	(0.6)	21.1	(0.6)	22.4	(0.7)
어패류	58.4	(2.1)	56.3	(1.4)	57.6	(1.5)	41.0	(1.8)	41.0	(1.2)	39.1	(1.1)	44.5	(1.7)
우유류	79.5	(3.0)	78.3	(2.7)	94.2	(3.0)	92.5	(5.0)	96.9	(3.7)	104.3	(3.3)	125.1	(3.9)
유지류(동물성)	1.9	(0.1)	0.1	(0.0)	1.2	(0.1)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)	0.2	(0.0)
기타(동물성)	0.1	(0.0)	0.2	(0.1)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	0.1	(0.0)
동물성식품 계	212.1	(4.3)	228.1	(4.1)	250.9	(4.2)	216.4	(6.6)	222.2	(4.4)	229.7	(4.1)	269.6	(4.5)
총계	1,167.3	(14.0)	1,211.7	(14.2)	1,131.6	(11.1)	1,127.5	(20.4)	1,149.7	(12.0)	1,166.7	(12.5)	1,289.0	(16.4)
식물성식품 섭취분율(%)	81.9	(0.3)	81.0	(0.3)	78.2	(0.3)	80.7	(0.5)	80.4	(0.3)	80.0	(0.3)	78.7	(0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	18.1	(0.3)	19.0	(0.3)	21.8	(0.3)	19.3	(0.5)	19.6	(0.3)	20.0	(0.3)	21.3	(0.3)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-I-7. 식품군별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2010

(단위 : g)

구 분	전체 (N=8,019) 평균 (표준오차)	남자 (N=3,550) 평균 (표준오차)	여자 (N=4,469) 평균 (표준오차)
곡류	312.9 (2.8)	346.6 (4.0)	279.0 (3.1)
감자・전분류	35.3 (1.6)	32.9 (1.9)	37.6 (2.4)
당류	9.8 (0.4)	11.1 (0.4)	8.4 (0.5)
두류	37.0 (1.1)	42.9 (1.7)	31.0 (1.3)
종실류	2.9 (0.2)	3.1 (0.3)	2.7 (0.2)
채소류	301.7 (4.2)	341.2 (5.4)	261.9 (4.5)
버섯류	5.0 (0.3)	5.2 (0.4)	4.8 (0.3)
과일류	181.5 (7.2)	162.4 (7.7)	200.6 (8.8)
해조류	4.6 (0.3)	4.7 (0.3)	4.6 (0.3)
음료류	126.1 (5.2)	147.7 (6.9)	104.4 (5.6)
주류	140.0 (7.9)	229.3 (14.4)	50.3 (4.1)
조미료류	37.1 (0.8)	43.7 (1.1)	30.4 (0.8)
유지류(식물성)	8.4 (0.2)	10.3 (0.3)	6.5 (0.2)
기타(식물성)	1.4 (0.2)	1.4 (0.2)	1.4 (0.3)
식물성식품 계	1,203.6 (15.1)	1,382.7 (21.1)	1,023.5 (15.2)
육류	102.1 (2.5)	128.9 (3.9)	75.2 (2.2)
난류	26.5 (0.8)	31.7 (1.2)	21.3 (0.7)
어패류	56.9 (1.8)	69.6 (2.5)	44.1 (1.6)
우유류	115.2 (3.3)	113.8 (4.2)	116.7 (3.7)
유지류(동물성)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
동물성식품 계	301.1 (4.4)	344.4 (6.2)	257.5 (4.6)
총계	1,504.7 (16.9)	1,727.1 (23.2)	1,281.0 (17.1)
식물성식품 섭취분율(%)	79.5 (0.2)	79.3 (0.3)	79.8 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	20.5 (0.2)	20.7 (0.3)	20.2 (0.3)

표 2-I-8. 식품군별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	8,019	312.9 (2.8)	35.3 (1.6)	9.8 (0.4)	37.0 (1.1)	2.9 (0.2)	301.7 (4.2)	5.0 (0.3)	181.5 (7.2)
19세이상	5,944	314.7 (3.0)	36.4 (1.7)	9.9 (0.3)	39.5 (1.3)	3.3 (0.2)	337.6 (4.7)	5.1 (0.3)	188.5 (8.0)
연령(세)									
1-9	1,104	238.3 (5.2)	25.6 (2.3)	6.9 (0.8)	24.9 (2.4)	1.2 (0.2)	110.3 (3.8)	3.0 (0.5)	184.4 (11.1)
10-18	971	354.9 (8.0)	35.0 (4.3)	10.9 (1.7)	29.0 (2.3)	1.6 (0.2)	209.4 (7.7)	5.6 (0.6)	134.2 (15.1)
19-29	692	302.4 (7.4)	37.0 (4.9)	10.9 (0.9)	34.2 (3.2)	2.8 (0.6)	279.5 (9.5)	3.7 (0.5)	146.6 (10.7)
30-39	1,148	322.0 (5.6)	33.5 (2.8)	11.6 (0.7)	41.2 (3.1)	2.7 (0.3)	349.7 (7.7)	6.7 (0.9)	192.4 (12.7)
40-49	1,103	314.3 (6.5)	38.5 (3.4)	10.3 (0.5)	44.9 (3.1)	3.0 (0.4)	357.2 (8.0)	6.7 (0.8)	205.9 (12.8)
50-59	1,107	318.3 (6.5)	40.1 (4.4)	10.0 (0.6)	39.7 (2.8)	4.4 (0.4)	385.8 (10.9)	4.9 (0.6)	236.7 (19.6)
60-69	999	325.2 (6.7)	38.2 (3.9)	7.5 (0.6)	37.5 (2.5)	5.4 (1.4)	351.5 (10.1)	3.0 (0.5)	213.4 (18.7)
70+	895	306.6 (6.8)	27.7 (3.3)	5.4 (0.6)	36.4 (2.9)	1.7 (0.3)	278.4 (10.1)	3.1 (1.1)	108.2 (9.5)
1-2	243	163.1 (8.1)	25.0 (5.7)	5.1 (1.4)	34.9 (8.3)	1.4 (0.5)	61.9 (4.2)	2.3 (0.5)	186.9 (18.3)
3-5	351	222.7 (8.0)	22.3 (3.0)	4.6 (0.5)	22.4 (3.2)	1.4 (0.3)	91.3 (5.1)	2.4 (0.4)	174.8 (12.7)
6-11	779	300.3 (5.7)	35.2 (5.2)	9.9 (1.2)	26.1 (2.2)	1.2 (0.1)	156.2 (5.5)	4.3 (0.7)	168.6 (12.8)
12-18	702	361.1 (9.5)	31.9 (3.8)	10.9 (1.5)	28.0 (2.7)	1.6 (0.3)	217.9 (9.3)	5.7 (0.8)	134.6 (18.5)
19-29	692	302.4 (7.4)	37.0 (4.9)	10.9 (0.9)	34.2 (3.2)	2.8 (0.6)	279.5 (9.5)	3.7 (0.5)	146.6 (10.7)
30-49	2,251	318.1 (4.6)	36.0 (2.3)	10.9 (0.4)	43.1 (2.2)	2.9 (0.3)	353.5 (5.9)	6.7 (0.6)	199.2 (10.0)
50-64	1,613	318.5 (5.3)	39.7 (3.7)	9.5 (0.5)	39.5 (2.1)	5.0 (0.7)	380.3 (9.5)	4.4 (0.5)	234.3 (17.2)
65+	1,388	315.3 (6.2)	31.2 (2.8)	5.9 (0.4)	36.2 (2.1)	2.5 (0.3)	298.1 (7.7)	3.2 (0.8)	137.8 (10.8)
거주지역									
동	6,343	310.5 (3.3)	36.1 (1.8)	10.3 (0.5)	37.1 (1.3)	2.9 (0.2)	298.2 (4.7)	5.3 (0.3)	186.5 (7.8)
읍면	1,676	321.7 (5.9)	32.3 (3.5)	7.9 (0.6)	36.4 (2.4)	2.8 (0.6)	314.3 (8.4)	3.7 (0.6)	163.1 (18.5)
소득수준[1)]									
하	1,952	308.5 (4.7)	32.0 (2.8)	8.4 (0.6)	34.7 (2.2)	3.0 (0.5)	280.8 (6.3)	4.5 (0.6)	160.0 (10.9)
중하	1,987	310.4 (5.1)	31.1 (2.7)	8.6 (0.5)	36.8 (2.2)	2.8 (0.3)	300.7 (7.4)	4.8 (0.6)	173.1 (12.1)
중상	2,000	313.5 (5.9)	37.7 (3.9)	10.7 (0.5)	36.3 (2.4)	2.7 (0.2)	309.1 (7.5)	5.6 (0.7)	203.5 (11.9)
상	1,979	322.1 (5.2)	41.7 (3.4)	11.5 (1.4)	40.0 (2.2)	3.2 (0.3)	322.9 (7.1)	5.2 (0.5)	198.6 (11.2)
거주지역(표준화)[2)]									
동	6,343	308.9 (3.2)	35.7 (1.8)	10.2 (0.4)	36.8 (1.2)	2.9 (0.2)	293.1 (4.5)	5.3 (0.3)	185.5 (7.5)
읍면	1,676	317.8 (6.3)	34.3 (4.6)	8.3 (0.6)	34.6 (2.5)	2.4 (0.4)	296.6 (5.7)	3.9 (0.6)	160.0 (15.9)
소득수준(표준화)									
하	1,952	307.1 (4.6)	32.2 (2.9)	8.4 (0.6)	34.5 (2.2)	2.9 (0.6)	277.7 (5.9)	4.5 (0.5)	160.9 (10.8)
중하	1,987	307.4 (5.0)	31.1 (2.8)	8.6 (0.4)	36.6 (2.3)	2.7 (0.3)	295.0 (6.8)	4.9 (0.6)	170.5 (11.1)
중상	2,000	311.7 (5.7)	36.6 (3.9)	10.8 (0.5)	35.7 (2.5)	2.6 (0.2)	298.4 (6.7)	5.6 (0.7)	201.4 (11.6)
상	1,979	321.8 (5.4)	41.6 (3.3)	11.9 (1.5)	39.4 (2.2)	3.1 (0.3)	313.0 (7.1)	5.2 (0.5)	196.1 (11.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지류(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4.6 (0.3)	126.1 (5.2)	140.0 (7.9)	37.1 (0.8)	8.4 (0.2)	1.4 (0.2)	102.1 (2.5)	26.5 (0.8)
19세이상	5.2 (0.3)	133.4 (6.0)	173.7 (9.4)	39.3 (0.8)	8.8 (0.2)	1.5 (0.2)	101.0 (2.7)	25.6 (0.9)
연령(세)								
1-9	2.6 (0.2)	52.4 (6.7)	0.8 (0.5)	18.6 (1.0)	4.7 (0.2)	1.1 (0.6)	66.2 (3.4)	25.0 (1.3)
10-18	2.8 (0.2)	132.9 (11.0)	24.5 (13.0)	36.1 (2.5)	8.6 (0.6)	1.2 (0.5)	135.1 (7.8)	33.7 (1.9)
19-29	3.3 (0.4)	234.3 (17.1)	188.4 (22.9)	39.2 (1.8)	10.6 (0.5)	0.6 (0.2)	143.6 (8.0)	33.0 (2.5)
30-39	5.1 (0.5)	157.7 (10.7)	212.3 (21.1)	45.1 (1.9)	11.3 (0.5)	1.5 (0.5)	122.2 (6.0)	35.8 (1.9)
40-49	5.7 (0.5)	139.3 (10.7)	203.6 (19.7)	43.8 (1.9)	9.3 (0.4)	1.9 (0.5)	94.8 (4.6)	28.2 (1.7)
50-59	6.8 (0.8)	81.9 (8.0)	193.6 (22.8)	37.7 (1.4)	8.1 (0.4)	2.3 (0.6)	81.4 (4.7)	18.1 (1.4)
60-69	5.3 (0.7)	55.1 (5.8)	82.1 (9.8)	32.7 (1.5)	5.1 (0.4)	1.2 (0.4)	60.2 (5.2)	13.4 (1.8)
70+	4.7 (0.9)	37.0 (5.3)	49.8 (9.7)	26.1 (1.5)	3.4 (0.2)	1.2 (1.0)	60.8 (8.7)	8.2 (1.0)
1-2	2.5 (0.4)	29.0 (11.0)	0.1 (0.0)	8.4 (0.8)	2.3 (0.3)	1.2 (0.6)	29.5 (2.9)	17.4 (2.1)
3-5	2.7 (0.4)	40.4 (6.3)	0.1 (0.0)	16.8 (1.8)	4.1 (0.4)	0.1 (0.0)	51.8 (4.2)	25.4 (2.0)
6-11	2.9 (0.4)	78.3 (8.6)	1.2 (0.6)	25.7 (1.5)	6.1 (0.4)	1.2 (0.8)	93.3 (4.4)	29.7 (1.6)
12-18	2.6 (0.2)	143.2 (13.1)	30.3 (16.1)	38.2 (3.0)	9.2 (0.7)	1.3 (0.6)	145.2 (9.2)	34.0 (2.1)
19-29	3.3 (0.4)	234.3 (17.1)	188.4 (22.9)	39.2 (1.8)	10.6 (0.5)	0.6 (0.2)	143.6 (8.0)	33.0 (2.5)
30-49	5.4 (0.4)	148.4 (7.8)	207.9 (14.8)	44.4 (1.4)	10.3 (0.3)	1.7 (0.4)	108.3 (3.6)	32.0 (1.3)
50-64	6.2 (0.6)	76.8 (6.6)	166.3 (17.9)	36.7 (1.2)	7.5 (0.3)	2.1 (0.5)	78.4 (4.0)	17.2 (1.2)
65+	5.2 (0.8)	40.6 (4.3)	60.6 (8.3)	28.0 (1.3)	3.8 (0.2)	1.1 (0.6)	56.9 (5.6)	9.5 (0.9)
거주지역								
동	4.8 (0.3)	133.2 (6.1)	136.3 (8.5)	37.6 (0.9)	8.8 (0.2)	1.5 (0.2)	102.6 (2.8)	27.7 (0.9)
읍면	4.1 (0.6)	100.2 (8.8)	153.6 (17.8)	35.2 (1.6)	6.9 (0.4)	1.2 (0.6)	100.4 (5.2)	22.2 (1.8)
소득수준								
하	4.6 (0.5)	108.9 (9.1)	143.5 (14.3)	32.9 (1.2)	7.5 (0.3)	1.3 (0.4)	101.4 (5.1)	25.2 (1.5)
중하	4.5 (0.3)	120.5 (9.2)	131.3 (15.1)	35.9 (1.4)	8.6 (0.4)	1.1 (0.4)	102.6 (5.1)	26.0 (1.3)
중상	4.7 (0.4)	135.2 (9.7)	140.5 (13.1)	39.6 (1.6)	8.8 (0.3)	1.6 (0.4)	96.1 (4.5)	26.2 (1.4)
상	4.9 (0.5)	139.8 (7.2)	148.4 (15.4)	40.9 (1.6)	8.8 (0.4)	1.6 (0.4)	107.2 (4.6)	29.4 (1.5)
거주지역(표준화)								
동	4.7 (0.3)	132.4 (5.9)	132.5 (7.8)	37.2 (0.9)	8.7 (0.2)	1.4 (0.2)	102.2 (2.7)	27.7 (0.8)
읍면	3.8 (0.5)	119.5 (8.6)	159.8 (20.2)	35.8 (1.5)	7.5 (0.4)	1.3 (0.6)	108.4 (6.0)	26.4 (1.8)
소득수준(표준화)								
하	4.5 (0.4)	111.2 (8.5)	144.3 (14.3)	32.8 (1.2)	7.6 (0.3)	1.3 (0.4)	102.1 (4.9)	25.7 (1.5)
중하	4.4 (0.3)	122.7 (9.3)	128.5 (14.1)	35.8 (1.4)	8.6 (0.4)	1.1 (0.5)	103.5 (5.2)	26.5 (1.3)
중상	4.5 (0.4)	140.9 (9.7)	136.4 (13.1)	39.8 (1.7)	8.9 (0.3)	1.5 (0.4)	99.2 (4.7)	27.4 (1.4)
상	4.6 (0.4)	144.3 (7.2)	147.8 (15.5)	40.8 (1.6)	9.0 (0.4)	1.6 (0.4)	110.4 (4.6)	30.5 (1.4)

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	어패류	우유류	유지류 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
					식물성	동물성	총계	식물성	동물성
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	56.9 (1.8)	115.2 (3.3)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,203.6 (15.1)	301.1 (4.4)	1,504.7 (16.9)	79.5 (0.2)	20.5 (0.2)
19세이상	63.4 (2.1)	86.5 (3.6)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	1,296.9 (16.3)	276.8 (5.0)	1,573.6 (18.1)	82.6 (0.3)	17.4 (0.3)
연령(세)									
1-9	25.2 (1.4)	251.1 (8.5)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	674.8 (16.8)	367.6 (9.4)	1,042.3 (19.7)	64.2 (0.7)	35.8 (0.7)
10-18	37.9 (2.6)	201.6 (10.4)	0.4 (0.1)	0.1 (0.1)	986.7 (30.1)	408.8 (14.4)	1,395.5 (38.0)	71.2 (0.7)	28.8 (0.7)
19-29	55.9 (4.4)	127.3 (9.2)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,293.6 (35.8)	360.1 (13.8)	1,653.7 (41.6)	77.5 (0.7)	22.5 (0.7)
30-39	73.2 (5.3)	100.2 (6.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,392.8 (32.3)	331.8 (10.1)	1,724.6 (37.4)	80.5 (0.4)	19.5 (0.4)
40-49	76.4 (3.7)	79.6 (6.6)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1,384.3 (26.0)	279.3 (8.2)	1,663.6 (29.0)	83.1 (0.4)	16.9 (0.4)
50-59	66.7 (4.4)	72.9 (5.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,370.2 (36.0)	239.2 (8.6)	1,609.4 (39.1)	85.0 (0.4)	15.0 (0.4)
60-69	50.9 (4.1)	60.7 (5.6)	0.0 (0.0)	0.3 (0.1)	1,163.2 (26.6)	185.4 (9.2)	1,348.6 (28.8)	86.6 (0.6)	13.4 (0.6)
70+	33.9 (3.5)	40.5 (4.2)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	889.9 (26.8)	143.7 (9.5)	1,033.6 (31.1)	87.9 (0.6)	12.1 (0.6)
1-2	15.9 (1.9)	276.0 (18.2)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	524.1 (25.1)	338.9 (19.2)	863.0 (31.8)	60.0 (1.4)	40.0 (1.4)
3-5	22.0 (2.2)	265.3 (13.4)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	606.1 (18.9)	364.7 (14.0)	970.7 (25.7)	62.3 (1.0)	37.7 (1.0)
6-11	31.5 (2.5)	235.9 (10.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	817.3 (20.7)	390.6 (11.4)	1,207.9 (23.7)	67.9 (0.8)	32.1 (0.8)
12-18	39.5 (3.1)	190.8 (11.4)	0.4 (0.1)	0.1 (0.1)	1,016.5 (36.8)	410.0 (16.1)	1,426.5 (45.9)	71.8 (0.7)	28.2 (0.7)
19-29	55.9 (4.4)	127.3 (9.2)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,293.6 (35.8)	360.1 (13.8)	1,653.7 (41.6)	77.5 (0.7)	22.5 (0.7)
30-49	74.8 (3.2)	89.7 (4.9)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,388.5 (21.5)	305.1 (6.6)	1,693.7 (24.2)	81.8 (0.3)	18.2 (0.3)
50-64	64.5 (3.5)	72.4 (4.9)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,326.8 (29.9)	232.7 (7.4)	1,559.4 (32.7)	85.0 (0.4)	15.0 (0.4)
65+	36.7 (3.0)	43.0 (3.4)	0.0 (0.0)	0.3 (0.1)	969.3 (23.9)	146.5 (6.5)	1,115.8 (27.2)	88.1 (0.4)	11.9 (0.4)
거주지역									
동	59.4 (2.1)	121.4 (3.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,209.2 (16.8)	311.4 (4.8)	1,520.6 (19.1)	79.0 (0.3)	21.0 (0.3)
읍면	47.7 (3.3)	92.6 (6.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,183.4 (32.1)	263.2 (11.2)	1,446.5 (34.7)	81.6 (0.7)	18.4 (0.7)
소득수준									
하	49.7 (2.8)	105.3 (5.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,130.7 (21.0)	281.9 (7.6)	1,412.6 (24.9)	79.8 (0.4)	20.2 (0.4)
중하	54.7 (2.7)	117.4 (5.8)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,170.2 (25.4)	300.9 (7.8)	1,471.1 (28.5)	79.1 (0.5)	20.9 (0.5)
중상	59.4 (3.3)	119.8 (5.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,249.5 (23.7)	301.8 (8.6)	1,551.3 (27.7)	80.1 (0.4)	19.9 (0.4)
상	65.8 (4.1)	120.2 (6.0)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,289.7 (25.5)	323.0 (8.4)	1,612.7 (28.0)	79.2 (0.4)	20.8 (0.4)
거주지역(표준화)									
동	58.4 (2.0)	124.4 (4.0)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,195.4 (15.4)	313.0 (4.6)	1,508.5 (17.6)	78.6 (0.2)	21.4 (0.2)
읍면	49.1 (3.9)	114.4 (6.9)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,185.5 (29.5)	298.4 (12.0)	1,484.0 (35.4)	79.1 (0.6)	20.9 (0.6)
소득수준(표준화)									
하	49.7 (2.8)	108.2 (5.8)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,130.0 (20.1)	286.0 (7.6)	1,416.0 (24.3)	79.5 (0.4)	20.5 (0.4)
중하	54.0 (2.7)	123.0 (5.9)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,157.9 (23.5)	307.2 (7.9)	1,465.1 (27.1)	78.4 (0.4)	21.6 (0.4)
중상	59.3 (3.3)	129.0 (6.6)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,235.0 (22.2)	315.1 (8.9)	1,550.2 (26.0)	79.0 (0.4)	21.0 (0.4)
상	65.2 (4.0)	129.2 (6.1)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,280.2 (25.6)	335.6 (7.9)	1,615.8 (28.0)	78.2 (0.4)	21.8 (0.4)

표 2-I-9. 식품군별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	3,550	346.6 (4.0)	32.9 (1.9)	11.1 (0.4)	42.9 (1.7)	3.1 (0.3)	341.2 (5.4)	5.2 (0.4)	162.4 (7.7)
19세이상	2,475	349.5 (4.2)	34.0 (2.3)	11.9 (0.5)	46.3 (2.1)	3.6 (0.4)	387.3 (5.9)	5.4 (0.5)	163.7 (8.6)
연령(세)									
1-9	552	252.4 (7.8)	24.0 (2.7)	6.2 (0.7)	27.3 (3.5)	1.4 (0.3)	109.3 (4.8)	2.8 (0.4)	195.2 (14.7)
10-18	523	394.4 (11.6)	33.1 (4.4)	10.1 (1.1)	34.2 (3.7)	1.6 (0.2)	232.9 (10.7)	5.3 (0.7)	133.0 (24.1)
19-29	270	336.0 (10.0)	36.3 (5.7)	11.0 (1.1)	43.0 (5.5)	3.0 (1.0)	321.4 (14.6)	3.5 (0.9)	110.4 (15.3)
30-39	445	359.3 (8.9)	30.2 (3.8)	14.3 (1.1)	43.0 (3.4)	2.7 (0.4)	406.6 (10.6)	6.6 (1.4)	170.2 (17.0)
40-49	478	349.9 (9.2)	38.0 (4.8)	12.4 (0.9)	54.8 (5.4)	3.2 (0.7)	402.8 (11.7)	8.0 (1.3)	181.5 (16.6)
50-59	442	355.3 (9.5)	36.2 (6.0)	11.4 (0.8)	46.4 (3.7)	4.1 (0.6)	427.8 (13.7)	5.6 (0.8)	180.3 (16.8)
60-69	451	355.6 (9.5)	30.0 (4.5)	10.5 (1.0)	43.4 (3.3)	7.4 (2.6)	408.8 (15.2)	2.8 (0.6)	216.0 (27.9)
70+	389	333.5 (10.6)	26.2 (4.0)	8.1 (1.4)	42.5 (4.8)	2.3 (0.5)	334.2 (15.3)	2.3 (0.5)	123.5 (16.2)
1-2	115	160.2 (9.9)	23.7 (7.1)	5.9 (2.5)	35.4 (13.2)	2.0 (1.0)	63.1 (7.0)	2.4 (0.6)	195.9 (27.9)
3-5	172	243.2 (11.4)	19.1 (3.2)	3.9 (0.5)	25.9 (5.3)	1.6 (0.3)	89.3 (5.8)	2.4 (0.7)	203.7 (20.7)
6-11	407	317.7 (8.5)	35.4 (7.4)	9.4 (1.8)	30.4 (3.3)	1.1 (0.2)	152.8 (6.4)	4.3 (0.8)	169.0 (17.7)
12-18	381	404.8 (13.3)	29.3 (3.4)	9.6 (1.0)	32.7 (4.2)	1.6 (0.3)	246.9 (12.6)	5.1 (0.8)	133.2 (28.9)
19-29	270	336.0 (10.0)	36.3 (5.7)	11.0 (1.1)	43.0 (5.5)	3.0 (1.0)	321.4 (14.6)	3.5 (0.9)	110.4 (15.3)
30-49	923	354.6 (6.7)	34.1 (3.2)	13.4 (0.7)	48.9 (3.2)	3.0 (0.4)	404.7 (8.3)	7.3 (0.9)	175.8 (12.9)
50-64	673	355.2 (7.6)	34.6 (4.9)	11.3 (0.7)	45.0 (2.9)	5.4 (1.2)	425.5 (12.0)	4.9 (0.7)	189.9 (17.0)
65+	609	342.2 (8.4)	27.9 (3.4)	8.7 (1.0)	44.2 (3.2)	3.1 (0.4)	357.6 (12.3)	2.5 (0.4)	156.2 (20.0)
거주지역									
동	2,810	342.7 (4.7)	33.2 (2.2)	11.4 (0.4)	42.8 (2.0)	3.0 (0.3)	336.0 (6.3)	5.6 (0.5)	163.0 (7.9)
읍면	740	361.1 (6.8)	31.8 (3.8)	9.9 (0.8)	43.4 (3.8)	3.5 (1.0)	360.6 (9.2)	3.6 (0.6)	160.6 (22.2)
소득수준[1)]									
하	874	341.5 (7.3)	30.7 (3.7)	9.3 (0.7)	41.5 (3.6)	3.3 (1.0)	317.6 (9.6)	4.2 (0.6)	146.7 (15.0)
중하	876	345.6 (7.0)	25.4 (2.3)	10.2 (0.7)	42.6 (3.4)	2.8 (0.5)	333.8 (9.9)	4.9 (0.7)	145.0 (11.8)
중상	877	347.5 (8.4)	36.6 (4.5)	12.5 (0.8)	41.7 (3.7)	3.3 (0.4)	343.7 (10.6)	6.7 (1.2)	176.2 (14.0)
상	883	353.8 (7.6)	39.9 (4.2)	12.6 (1.0)	44.6 (3.2)	3.1 (0.3)	375.2 (11.0)	5.2 (0.7)	190.1 (15.1)
거주지역(표준화)[2)]									
동	2,810	340.3 (4.4)	32.9 (2.1)	11.3 (0.4)	42.6 (2.0)	3.0 (0.3)	332.5 (5.7)	5.5 (0.5)	163.9 (7.9)
읍면	740	360.7 (7.1)	34.4 (5.3)	10.0 (0.8)	39.8 (4.1)	2.8 (0.6)	332.1 (6.2)	3.4 (0.6)	151.5 (19.1)
소득수준(표준화)									
하	874	338.7 (6.6)	30.4 (3.7)	9.2 (0.7)	40.9 (3.5)	3.4 (1.1)	316.1 (9.0)	4.1 (0.6)	144.7 (13.7)
중하	876	341.6 (6.7)	25.5 (2.3)	10.1 (0.7)	42.4 (3.5)	2.7 (0.5)	327.9 (8.5)	4.8 (0.7)	144.0 (11.5)
중상	877	345.0 (7.7)	35.2 (4.1)	12.4 (0.8)	41.1 (3.8)	3.2 (0.4)	334.7 (9.7)	6.5 (1.2)	175.4 (13.6)
상	883	352.6 (7.9)	40.4 (4.0)	12.5 (1.0)	43.8 (3.1)	2.9 (0.3)	363.4 (9.9)	5.1 (0.7)	189.5 (14.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지류(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4.7 (0.3)	147.7 (6.9)	229.3 (14.4)	43.7 (1.1)	10.3 (0.3)	1.4 (0.2)	128.9 (3.9)	31.7 (1.2)
19세이상	5.3 (0.4)	157.6 (8.7)	288.9 (17.2)	47.7 (1.2)	11.1 (0.4)	1.5 (0.3)	130.0 (4.4)	31.3 (1.5)
연령(세)								
1-9	2.7 (0.3)	63.2 (9.5)	0.8 (0.5)	19.9 (1.6)	4.9 (0.4)	0.6 (0.3)	72.8 (5.9)	27.4 (1.9)
10-18	2.8 (0.4)	148.7 (15.6)	40.5 (23.8)	37.3 (2.7)	9.1 (0.7)	1.2 (0.8)	161.6 (12.1)	37.1 (2.5)
19-29	3.8 (0.7)	250.7 (25.0)	278.6 (40.3)	44.9 (3.0)	12.8 (1.0)	0.7 (0.3)	182.7 (14.6)	41.5 (4.0)
30-39	4.1 (0.5)	200.9 (16.1)	347.2 (38.9)	57.5 (3.2)	14.8 (0.8)	1.2 (0.5)	158.4 (9.8)	44.0 (3.0)
40-49	5.4 (0.7)	155.0 (16.6)	315.5 (33.0)	53.0 (3.0)	11.3 (0.6)	1.7 (0.6)	120.7 (7.2)	32.4 (2.5)
50-59	7.8 (1.1)	101.6 (14.0)	338.0 (42.3)	42.2 (1.9)	9.8 (0.5)	2.1 (0.7)	94.3 (6.7)	19.7 (2.2)
60-69	6.1 (1.0)	64.1 (9.1)	161.5 (19.8)	40.0 (2.3)	6.5 (0.5)	1.9 (0.9)	79.5 (8.9)	15.8 (3.2)
70+	5.6 (1.3)	40.0 (6.6)	110.8 (24.3)	32.8 (2.5)	4.4 (0.4)	1.9 (1.5)	82.2 (10.4)	10.6 (1.4)
1-2	2.6 (0.5)	41.7 (18.1)	0.1 (0.1)	8.7 (1.1)	2.3 (0.3)	1.1 (1.0)	29.5 (4.0)	17.7 (3.2)
3-5	2.2 (0.3)	44.1 (9.4)	0.2 (0.0)	19.5 (3.2)	4.2 (0.5)	0.1 (0.0)	53.1 (6.0)	28.0 (2.8)
6-11	3.3 (0.6)	94.2 (13.1)	1.0 (0.6)	25.5 (1.7)	6.7 (0.6)	0.7 (0.4)	99.9 (7.2)	33.6 (2.6)
12-18	2.6 (0.3)	157.3 (18.1)	49.4 (29.0)	39.8 (3.4)	9.6 (0.7)	1.3 (0.9)	177.4 (14.3)	37.0 (2.8)
19-29	3.8 (0.7)	250.7 (25.0)	278.6 (40.3)	44.9 (3.0)	12.8 (1.0)	0.7 (0.3)	182.7 (14.6)	41.5 (4.0)
30-49	4.7 (0.4)	177.8 (12.0)	331.3 (26.3)	55.2 (2.3)	13.1 (0.5)	1.5 (0.4)	139.4 (5.8)	38.1 (1.9)
50-64	7.0 (0.9)	93.7 (11.3)	293.5 (33.2)	41.7 (1.6)	9.1 (0.5)	2.2 (0.7)	92.9 (6.0)	18.6 (1.9)
65+	6.6 (1.2)	46.7 (6.0)	133.8 (20.2)	35.5 (2.0)	4.9 (0.4)	1.7 (1.0)	76.7 (7.2)	12.8 (1.6)
거주지역								
동	4.9 (0.4)	154.5 (8.2)	217.1 (14.8)	44.4 (1.3)	10.7 (0.3)	1.4 (0.2)	128.2 (4.7)	33.0 (1.4)
읍면	4.0 (0.6)	122.7 (12.7)	274.5 (35.4)	41.4 (1.8)	8.9 (0.5)	1.4 (0.7)	131.7 (7.1)	27.0 (2.7)
소득수준								
하	4.8 (0.7)	120.6 (10.8)	235.6 (26.1)	37.6 (1.7)	9.7 (0.5)	1.1 (0.4)	127.6 (7.8)	29.9 (2.2)
중하	4.6 (0.4)	143.5 (15.0)	212.8 (27.8)	42.2 (1.9)	10.4 (0.7)	1.3 (0.5)	129.5 (8.9)	29.8 (2.0)
중상	4.7 (0.6)	163.1 (16.2)	232.8 (24.6)	47.3 (2.7)	10.6 (0.5)	1.1 (0.3)	118.3 (7.0)	32.2 (2.2)
상	4.9 (0.6)	165.2 (11.0)	241.0 (27.7)	48.9 (2.4)	10.4 (0.6)	2.0 (0.6)	136.2 (7.4)	36.0 (2.5)
거주지역(표준화)								
동	4.9 (0.3)	151.8 (7.8)	211.7 (13.6)	43.9 (1.3)	10.5 (0.3)	1.4 (0.3)	126.4 (4.4)	32.5 (1.3)
읍면	3.7 (0.5)	141.7 (13.3)	267.5 (36.8)	41.4 (1.9)	9.5 (0.5)	1.3 (0.6)	140.0 (8.5)	31.5 (2.8)
소득수준(표준화)								
하	4.7 (0.6)	123.7 (11.1)	236.6 (26.1)	37.9 (1.8)	9.7 (0.5)	1.1 (0.4)	128.9 (7.7)	30.5 (2.3)
중하	4.5 (0.4)	143.7 (14.7)	204.1 (25.7)	42.1 (1.8)	10.4 (0.7)	1.2 (0.5)	130.0 (8.9)	30.2 (1.9)
중상	4.5 (0.5)	165.2 (15.6)	221.4 (23.3)	46.9 (2.8)	10.5 (0.5)	1.0 (0.3)	118.5 (6.9)	32.6 (2.1)
상	4.7 (0.5)	166.4 (10.2)	235.5 (27.4)	48.2 (2.4)	10.4 (0.5)	1.9 (0.6)	137.5 (7.2)	36.6 (2.4)

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	어패류	우유류	유지류 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
					식물성	동물성	총계	식물성	동물성
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	69.6 (2.5)	113.8 (4.2)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,382.7 (21.1)	344.4 (6.2)	1,727.1 (23.2)	79.3 (0.3)	20.7 (0.3)
19세이상	79.8 (3.2)	78.9 (4.5)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,513.7 (23.0)	320.3 (7.0)	1,834.0 (24.7)	82.6 (0.3)	17.4 (0.3)
연령(세)									
1-9	26.6 (2.0)	261.2 (11.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	710.5 (23.9)	388.1 (13.0)	1,098.6 (29.1)	64.1 (0.9)	35.9 (0.9)
10-18	39.9 (3.6)	215.3 (12.9)	0.4 (0.1)	0.0 (0.0)	1,084.3 (47.1)	454.2 (18.7)	1,538.4 (56.6)	70.6 (0.7)	29.4 (0.7)
19-29	63.4 (6.2)	117.5 (14.7)	0.3 (0.1)	0.1 (0.0)	1,456.1 (57.1)	405.4 (22.2)	1,861.4 (63.9)	77.6 (1.0)	22.4 (1.0)
30-39	89.7 (7.6)	94.1 (9.2)	0.2 (0.1)	0.3 (0.2)	1,658.5 (51.9)	386.7 (16.4)	2,045.2 (59.7)	80.9 (0.6)	19.1 (0.6)
40-49	92.4 (5.7)	68.7 (8.4)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1,592.6 (41.6)	314.5 (12.0)	1,907.1 (46.0)	83.3 (0.5)	16.7 (0.5)
50-59	87.8 (7.0)	57.0 (6.5)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,568.6 (50.2)	258.8 (10.9)	1,827.5 (52.6)	85.4 (0.5)	14.6 (0.5)
60-69	69.3 (6.7)	54.8 (7.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)	1,354.7 (45.6)	219.6 (13.3)	1,574.3 (46.6)	86.4 (0.8)	13.6 (0.8)
70+	51.4 (8.2)	43.5 (6.5)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	1,067.9 (42.6)	187.8 (14.9)	1,255.7 (48.9)	86.9 (0.8)	13.1 (0.8)
1-2	18.1 (3.0)	306.3 (30.1)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	544.9 (36.4)	371.7 (30.9)	916.6 (43.1)	59.0 (2.3)	41.0 (2.3)
3-5	22.5 (3.0)	266.4 (15.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	659.1 (27.6)	370.2 (17.0)	1,029.3 (33.1)	63.7 (1.4)	36.3 (1.4)
6-11	33.5 (3.1)	243.9 (14.5)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	851.5 (32.2)	411.1 (16.5)	1,262.6 (40.5)	67.7 (0.9)	32.3 (0.9)
12-18	41.1 (4.2)	206.2 (14.7)	0.4 (0.1)	0.0 (0.0)	1,123.2 (55.5)	462.1 (21.1)	1,585.3 (65.5)	71.0 (0.8)	29.0 (0.8)
19-29	63.4 (6.2)	117.5 (14.7)	0.3 (0.1)	0.1 (0.0)	1,456.1 (57.1)	405.4 (22.2)	1,861.4 (63.9)	77.6 (1.0)	22.4 (1.0)
30-49	91.0 (4.5)	81.3 (6.4)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1,625.4 (35.1)	350.3 (10.2)	1,975.7 (39.1)	82.1 (0.4)	17.9 (0.4)
50-64	85.5 (5.6)	58.3 (5.6)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,519.1 (38.8)	255.4 (9.2)	1,774.5 (41.0)	85.3 (0.5)	14.7 (0.5)
65+	53.7 (6.3)	44.0 (4.7)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,171.3 (39.8)	187.4 (10.7)	1,358.6 (43.1)	87.4 (0.6)	12.6 (0.6)
거주지역									
동	72.1 (2.8)	119.7 (5.0)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,370.6 (23.2)	353.3 (7.0)	1,723.9 (26.2)	78.8 (0.3)	21.2 (0.3)
읍면	60.4 (4.8)	92.0 (7.8)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,427.5 (43.9)	311.2 (15.3)	1,738.7 (45.0)	81.2 (0.8)	18.8 (0.8)
소득수준									
하	59.6 (3.9)	95.9 (7.3)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1,303.9 (34.8)	313.3 (10.8)	1,617.2 (39.6)	80.1 (0.5)	19.9 (0.5)
중하	68.4 (3.8)	116.0 (8.0)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,325.1 (42.2)	343.9 (12.3)	1,669.0 (47.1)	78.6 (0.6)	21.4 (0.6)
중상	72.6 (4.6)	124.7 (8.5)	0.2 (0.0)	0.2 (0.2)	1,427.7 (38.1)	348.1 (11.9)	1,775.7 (42.8)	79.4 (0.6)	20.6 (0.6)
상	79.9 (5.9)	122.3 (9.1)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	1,496.8 (37.6)	374.6 (12.6)	1,871.4 (40.5)	78.9 (0.6)	21.1 (0.6)
거주지역(표준화)									
동	71.3 (2.8)	120.0 (5.1)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,356.3 (21.0)	350.5 (6.6)	1,706.8 (23.8)	78.7 (0.3)	21.3 (0.3)
읍면	60.1 (5.2)	112.3 (9.2)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,399.8 (44.2)	344.1 (15.7)	1,743.9 (48.0)	79.1 (0.8)	20.9 (0.8)
소득수준(표준화)									
하	59.7 (4.1)	94.4 (6.8)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1,301.3 (33.9)	313.9 (11.2)	1,615.2 (39.6)	80.1 (0.5)	19.9 (0.5)
중하	66.8 (3.9)	120.9 (8.3)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,305.0 (38.9)	348.2 (12.0)	1,653.1 (44.3)	78.1 (0.6)	21.9 (0.6)
중상	71.7 (4.4)	130.6 (9.2)	0.2 (0.0)	0.3 (0.2)	1,403.0 (34.7)	353.9 (12.1)	1,756.9 (39.0)	78.7 (0.6)	21.3 (0.6)
상	78.2 (5.6)	129.1 (9.1)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	1,477.3 (35.8)	381.7 (11.6)	1,859.0 (38.7)	78.2 (0.6)	21.8 (0.6)

표 2-I-10. 식품군별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4,469	279.0 (3.1)	37.6 (2.4)	8.4 (0.5)	31.0 (1.3)	2.7 (0.2)	261.9 (4.5)	4.8 (0.3)	200.6 (8.8)
19세이상	3,469	280.9 (3.4)	38.7 (2.5)	8.0 (0.4)	33.0 (1.5)	3.0 (0.2)	289.2 (5.5)	4.8 (0.4)	212.7 (9.7)
연령(세)									
1-9	552	223.1 (6.3)	27.4 (3.5)	7.6 (1.3)	22.3 (2.9)	1.1 (0.2)	111.5 (5.8)	3.1 (0.7)	172.7 (14.6)
10-18	448	307.9 (8.5)	37.3 (5.6)	11.8 (2.6)	22.9 (1.9)	1.6 (0.3)	181.5 (7.9)	6.0 (1.1)	135.7 (14.7)
19-29	422	267.4 (9.9)	37.8 (7.6)	10.9 (1.4)	25.2 (2.8)	2.6 (0.6)	236.1 (11.0)	4.0 (0.5)	184.1 (16.1)
30-39	703	282.3 (6.2)	36.9 (4.6)	8.8 (0.7)	39.3 (5.3)	2.7 (0.4)	289.2 (9.6)	6.7 (0.8)	216.0 (16.7)
40-49	625	277.8 (6.9)	39.0 (4.8)	8.1 (0.5)	34.7 (3.1)	2.8 (0.5)	310.4 (10.1)	5.5 (0.7)	230.9 (15.9)
50-59	665	281.1 (6.9)	44.1 (6.1)	8.5 (0.7)	33.0 (3.6)	4.7 (0.7)	343.7 (14.8)	4.3 (0.7)	293.2 (30.9)
60-69	548	297.8 (7.5)	45.4 (5.4)	4.8 (0.5)	32.2 (2.9)	3.7 (0.7)	300.2 (11.6)	3.2 (0.6)	211.0 (19.8)
70+	506	290.0 (7.9)	28.6 (4.7)	3.8 (0.4)	32.6 (3.5)	1.4 (0.2)	243.9 (11.0)	3.6 (1.8)	98.8 (10.9)
1-2	128	166.2 (14.5)	26.4 (7.5)	4.3 (0.9)	34.4 (9.6)	0.7 (0.3)	60.5 (5.3)	2.2 (0.8)	177.0 (23.3)
3-5	179	201.3 (10.0)	25.7 (4.9)	5.3 (0.9)	18.8 (3.1)	1.2 (0.3)	93.4 (7.1)	2.3 (0.6)	144.7 (13.4)
6-11	372	281.9 (7.9)	35.0 (5.4)	10.3 (1.6)	21.5 (2.2)	1.3 (0.2)	159.8 (8.8)	4.3 (1.1)	168.2 (17.3)
12-18	321	306.9 (9.4)	35.2 (7.0)	12.4 (3.3)	22.1 (2.3)	1.6 (0.4)	181.8 (9.4)	6.4 (1.4)	136.3 (18.2)
19-29	422	267.4 (9.9)	37.8 (7.6)	10.9 (1.4)	25.2 (2.8)	2.6 (0.6)	236.1 (11.0)	4.0 (0.5)	184.1 (16.1)
30-49	1,328	280.0 (4.9)	38.0 (3.5)	8.4 (0.4)	36.9 (2.9)	2.8 (0.3)	300.1 (7.3)	6.1 (0.6)	223.7 (12.7)
50-64	940	282.1 (5.9)	44.7 (4.8)	7.7 (0.5)	34.1 (2.7)	4.5 (0.5)	335.5 (11.6)	4.0 (0.5)	278.4 (25.4)
65+	779	296.9 (6.7)	33.4 (3.9)	4.0 (0.3)	30.7 (2.6)	2.1 (0.4)	257.4 (9.0)	3.6 (1.3)	125.2 (10.7)
거주지역									
동	3,533	277.9 (3.5)	38.9 (2.7)	9.1 (0.7)	31.4 (1.6)	2.9 (0.2)	260.0 (4.9)	5.1 (0.4)	210.3 (10.0)
읍면	936	282.9 (7.7)	32.8 (4.6)	5.9 (0.6)	29.4 (1.9)	2.0 (0.3)	268.6 (10.3)	3.7 (0.7)	165.7 (17.8)
소득수준[1)]									
하	1,078	274.9 (5.6)	33.4 (3.6)	7.5 (0.7)	27.8 (2.3)	2.6 (0.4)	243.4 (8.5)	4.8 (0.8)	173.5 (13.1)
중하	1,111	275.3 (5.9)	36.9 (4.5)	7.1 (0.5)	31.0 (2.9)	2.8 (0.4)	267.7 (8.7)	4.8 (0.6)	201.0 (17.8)
중상	1,123	279.4 (6.4)	38.7 (4.9)	9.0 (0.5)	30.8 (2.7)	2.1 (0.2)	274.3 (8.4)	4.6 (0.5)	230.9 (15.4)
상	1,096	289.4 (6.1)	43.6 (4.7)	10.5 (2.0)	35.3 (2.5)	3.3 (0.5)	269.1 (7.2)	5.2 (0.6)	207.4 (13.6)
거주지역(표준화)[2)]									
동	3,533	277.1 (3.5)	38.5 (2.7)	9.2 (0.7)	31.0 (1.6)	2.8 (0.2)	253.8 (5.0)	5.0 (0.4)	207.5 (9.4)
읍면	936	272.4 (8.0)	33.8 (5.5)	6.3 (0.6)	28.5 (1.9)	2.0 (0.4)	259.4 (9.6)	4.4 (0.8)	171.1 (17.1)
소득수준(표준화)									
하	1,078	273.5 (5.5)	34.1 (3.7)	7.6 (0.7)	28.1 (2.4)	2.5 (0.4)	239.6 (8.1)	4.8 (0.7)	176.1 (13.3)
중하	1,111	272.6 (5.8)	36.8 (4.6)	7.1 (0.5)	30.5 (2.9)	2.7 (0.4)	262.4 (8.3)	5.0 (0.6)	198.2 (15.6)
중상	1,123	277.2 (6.6)	38.2 (5.4)	9.4 (0.6)	29.8 (2.6)	2.0 (0.2)	262.1 (7.7)	4.6 (0.5)	229.4 (15.5)
상	1,096	288.9 (6.2)	42.4 (4.4)	11.3 (2.4)	34.8 (2.6)	3.2 (0.4)	261.1 (7.7)	5.3 (0.6)	203.7 (13.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지류(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4.6 (0.3)	104.4 (5.6)	50.3 (4.1)	30.4 (0.8)	6.5 (0.2)	1.4 (0.3)	75.2 (2.2)	21.3 (0.7)
19세이상	5.1 (0.4)	109.8 (6.0)	61.8 (5.2)	31.2 (0.8)	6.5 (0.2)	1.5 (0.3)	72.9 (2.5)	20.0 (0.8)
연령(세)								
1-9	2.6 (0.3)	40.7 (6.1)	0.8 (0.5)	17.2 (1.4)	4.4 (0.3)	1.6 (1.3)	59.1 (3.9)	22.4 (1.7)
10-18	2.7 (0.3)	114.0 (14.1)	5.5 (3.0)	34.8 (4.1)	8.0 (0.9)	1.1 (0.7)	103.7 (6.3)	29.6 (2.5)
19-29	2.8 (0.4)	217.2 (21.6)	94.6 (15.2)	33.3 (2.3)	8.4 (0.4)	0.5 (0.3)	103.0 (6.7)	24.1 (2.2)
30-39	6.3 (0.9)	111.8 (10.1)	69.0 (11.8)	31.9 (1.5)	7.6 (0.4)	1.8 (1.0)	83.6 (4.3)	27.2 (1.9)
40-49	6.0 (0.7)	123.2 (10.9)	88.7 (16.3)	34.5 (1.6)	7.2 (0.4)	2.0 (0.8)	68.4 (4.7)	23.9 (1.6)
50-59	5.8 (0.7)	62.1 (5.6)	48.9 (7.5)	33.2 (1.9)	6.5 (0.5)	2.4 (0.9)	68.5 (4.9)	16.5 (1.5)
60-69	4.5 (0.7)	47.0 (6.2)	10.9 (3.6)	26.1 (1.5)	3.9 (0.4)	0.6 (0.2)	42.8 (4.9)	11.2 (1.3)
70+	4.2 (1.1)	35.2 (6.2)	12.1 (3.6)	21.9 (1.2)	2.8 (0.2)	0.7 (0.6)	47.6 (11.2)	6.7 (1.1)
1-2	2.3 (0.5)	15.0 (5.0)	0.1 (0.0)	8.1 (1.3)	2.4 (0.4)	1.4 (0.8)	29.5 (4.0)	17.1 (2.7)
3-5	3.2 (0.7)	36.6 (7.5)	0.1 (0.0)	14.0 (1.9)	4.1 (0.4)	0.1 (0.0)	50.5 (5.0)	22.6 (3.0)
6-11	2.5 (0.3)	61.5 (8.6)	1.5 (0.7)	26.0 (2.3)	5.5 (0.4)	1.8 (1.7)	86.2 (5.5)	25.6 (2.2)
12-18	2.7 (0.4)	125.7 (16.7)	6.7 (3.8)	36.2 (5.0)	8.7 (1.1)	1.3 (0.9)	105.1 (7.5)	30.4 (2.9)
19-29	2.8 (0.4)	217.2 (21.6)	94.6 (15.2)	33.3 (2.3)	8.4 (0.4)	0.5 (0.3)	103.0 (6.7)	24.1 (2.2)
30-49	6.2 (0.6)	117.6 (7.4)	79.1 (10.1)	33.2 (1.1)	7.4 (0.3)	1.9 (0.7)	75.8 (3.1)	25.5 (1.3)
50-64	5.4 (0.6)	60.1 (4.9)	40.3 (6.0)	31.7 (1.5)	5.9 (0.4)	1.9 (0.7)	64.0 (4.2)	15.8 (1.2)
65+	4.3 (0.9)	36.4 (5.2)	10.4 (2.7)	22.9 (1.1)	3.0 (0.2)	0.7 (0.4)	43.4 (7.6)	7.2 (0.9)
거주지역								
동	4.7 (0.4)	111.7 (6.7)	54.7 (5.1)	30.8 (0.9)	7.0 (0.2)	1.5 (0.4)	76.8 (2.4)	22.3 (0.8)
읍면	4.1 (0.7)	78.0 (8.1)	34.3 (5.1)	29.0 (2.2)	4.9 (0.4)	1.1 (0.6)	69.6 (4.7)	17.6 (1.6)
소득수준								
하	4.5 (0.4)	97.1 (12.8)	49.8 (8.1)	28.2 (1.8)	5.4 (0.3)	1.5 (0.7)	74.7 (5.2)	20.3 (1.7)
중하	4.4 (0.5)	97.6 (8.2)	50.0 (7.3)	29.7 (1.5)	6.7 (0.4)	0.8 (0.4)	75.8 (4.2)	22.3 (1.3)
중상	4.7 (0.6)	107.2 (9.1)	47.9 (7.2)	31.9 (1.2)	7.0 (0.4)	2.2 (0.7)	73.9 (4.3)	20.3 (1.4)
상	4.9 (0.6)	113.8 (7.9)	53.3 (11.2)	32.8 (1.7)	7.2 (0.6)	1.3 (0.6)	77.2 (3.6)	22.6 (1.3)
거주지역(표준화)								
동	4.6 (0.4)	112.4 (6.8)	53.3 (5.0)	30.5 (0.9)	7.0 (0.2)	1.5 (0.4)	77.5 (2.4)	22.8 (0.8)
읍면	4.0 (0.5)	95.8 (10.3)	42.5 (6.9)	29.7 (2.3)	5.4 (0.4)	1.2 (0.8)	74.3 (4.9)	20.9 (1.9)
소득수준(표준화)								
하	4.5 (0.4)	98.7 (11.7)	50.3 (8.4)	28.0 (1.9)	5.4 (0.3)	1.5 (0.7)	74.8 (4.7)	21.1 (1.7)
중하	4.4 (0.5)	100.8 (8.4)	51.2 (7.7)	29.4 (1.5)	6.8 (0.3)	0.9 (0.5)	76.4 (4.1)	22.7 (1.4)
중상	4.7 (0.6)	116.1 (10.3)	50.5 (8.3)	32.6 (1.4)	7.3 (0.4)	2.1 (0.7)	79.5 (4.5)	21.7 (1.5)
상	4.5 (0.5)	120.5 (8.5)	55.1 (11.4)	33.4 (1.7)	7.5 (0.6)	1.4 (0.7)	81.3 (3.6)	23.9 (1.3)

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	어패류	우유류	유지류 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
					식물성	동물성	총계	식물성	동물성
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	44.1 (1.6)	116.7 (3.7)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,023.5 (15.2)	257.5 (4.6)	1,281.0 (17.1)	79.8 (0.3)	20.2 (0.3)
19세이상	47.4 (1.8)	93.9 (4.1)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	1,086.2 (17.3)	234.5 (5.3)	1,320.7 (19.8)	82.6 (0.3)	17.4 (0.3)
연령(세)									
1-9	23.7 (1.9)	240.1 (11.2)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	636.1 (21.3)	345.5 (12.3)	981.5 (24.8)	64.2 (0.9)	35.8 (0.9)
10-18	35.6 (4.3)	185.4 (15.9)	0.4 (0.1)	0.2 (0.2)	870.7 (30.9)	355.0 (18.5)	1,225.7 (38.6)	71.9 (1.1)	28.1 (1.1)
19-29	48.2 (5.2)	137.4 (9.7)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,125.0 (36.9)	313.0 (14.1)	1,438.0 (43.2)	77.3 (0.9)	22.7 (0.9)
30-39	55.7 (4.5)	106.7 (7.1)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,110.4 (29.0)	273.5 (8.5)	1,383.8 (31.3)	80.0 (0.6)	20.0 (0.6)
40-49	60.1 (3.9)	90.7 (8.0)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	1,170.8 (31.6)	243.2 (11.1)	1,414.0 (35.1)	82.8 (0.6)	17.2 (0.6)
50-59	45.5 (3.5)	88.8 (7.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1,171.3 (41.3)	219.4 (11.4)	1,390.8 (47.5)	84.6 (0.6)	15.4 (0.6)
60-69	34.4 (2.6)	65.9 (7.1)	0.0 (0.0)	0.4 (0.3)	991.4 (24.5)	154.7 (9.7)	1,146.1 (26.6)	86.9 (0.8)	13.1 (0.8)
70+	23.1 (2.2)	38.7 (4.7)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	779.7 (25.5)	116.3 (11.4)	896.0 (29.2)	88.6 (0.7)	11.4 (0.7)
1-2	13.4 (2.3)	242.8 (17.4)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	501.1 (36.0)	302.9 (18.7)	804.0 (42.9)	61.1 (2.0)	38.9 (2.0)
3-5	21.5 (3.2)	264.1 (19.7)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	550.8 (23.9)	358.9 (19.7)	909.6 (35.7)	60.8 (1.5)	39.2 (1.5)
6-11	29.4 (3.6)	227.5 (14.5)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	781.0 (25.5)	368.8 (17.1)	1,149.8 (28.4)	68.2 (1.2)	31.8 (1.2)
12-18	37.6 (4.9)	171.6 (17.8)	0.5 (0.1)	0.3 (0.2)	883.9 (36.9)	345.4 (21.1)	1,229.3 (47.2)	72.7 (1.1)	27.3 (1.1)
19-29	48.2 (5.2)	137.4 (9.7)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,125.0 (36.9)	313.0 (14.1)	1,438.0 (43.2)	77.3 (0.9)	22.7 (0.9)
30-49	57.9 (2.9)	98.5 (5.7)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	1,141.3 (22.1)	258.0 (7.2)	1,399.3 (24.2)	81.4 (0.5)	18.6 (0.5)
50-64	43.8 (2.8)	86.4 (6.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1,136.3 (33.4)	210.1 (9.7)	1,346.4 (38.4)	84.8 (0.5)	15.2 (0.5)
65+	25.0 (1.8)	42.3 (4.4)	0.0 (0.0)	0.4 (0.2)	831.0 (20.9)	118.4 (8.0)	949.4 (23.9)	88.6 (0.6)	11.4 (0.6)
거주지역									
동	46.5 (1.9)	123.2 (4.2)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,046.0 (17.0)	269.1 (5.1)	1,315.1 (19.0)	79.2 (0.3)	20.8 (0.3)
읍면	35.3 (2.7)	93.3 (8.4)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	942.5 (30.1)	215.8 (10.7)	1,158.3 (32.3)	81.9 (0.9)	18.1 (0.9)
소득수준									
하	39.5 (2.9)	115.0 (6.9)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	954.4 (23.9)	249.8 (8.5)	1,204.2 (27.7)	79.5 (0.6)	20.5 (0.6)
중하	41.1 (2.9)	118.8 (6.8)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,015.8 (25.3)	258.2 (8.5)	1,274.0 (29.2)	79.5 (0.6)	20.5 (0.6)
중상	46.2 (3.3)	114.9 (7.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	1,070.8 (21.8)	255.4 (9.4)	1,326.1 (24.2)	80.8 (0.6)	19.2 (0.6)
상	51.4 (3.5)	118.2 (6.3)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)	1,076.7 (25.5)	269.8 (9.0)	1,346.6 (28.8)	79.5 (0.6)	20.5 (0.6)
거주지역(표준화)									
동	46.1 (1.9)	128.1 (4.2)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,034.1 (16.1)	274.8 (4.9)	1,308.9 (17.9)	78.6 (0.3)	21.4 (0.3)
읍면	37.6 (3.6)	116.9 (10.3)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	956.6 (31.5)	249.9 (13.2)	1,206.4 (36.4)	79.2 (1.0)	20.8 (1.0)
소득수준(표준화)									
하	40.0 (3.0)	120.6 (6.9)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	954.7 (23.2)	256.8 (7.8)	1,211.4 (25.9)	78.8 (0.6)	21.2 (0.6)
중하	41.3 (2.8)	124.8 (6.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,008.9 (23.1)	265.5 (8.6)	1,274.4 (27.2)	78.8 (0.5)	21.2 (0.5)
중상	47.2 (3.6)	126.6 (8.3)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	1,066.1 (21.8)	275.1 (10.2)	1,341.2 (24.4)	79.2 (0.6)	20.8 (0.6)
상	52.2 (3.9)	128.7 (6.0)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	1,073.0 (26.9)	286.5 (8.0)	1,359.5 (28.9)	78.2 (0.5)	21.8 (0.5)

표 2-I-11. 다소비식품[1] : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	백미	181.0	2.1	11.9	11.9	백미	207.7	2.6	11.9	11.9	백미	154.2	2.4	11.9	11.9
2	우유	85.1	2.7	5.6	17.5	맥주	106.6	9.3	6.1	18.0	우유	83.5	2.9	6.5	18.4
3	김치,배추김치	71.4	1.6	4.7	22.2	김치,배추김치	87.9	2.2	5.0	23.0	김치,배추김치	54.9	1.6	4.2	22.6
4	맥주	69.0	5.3	4.5	26.7	우유	86.7	3.9	5.0	28.0	사과	38.1	2.8	2.9	25.6
5	소주	39.2	2.9	2.6	29.3	소주	69.8	5.6	4.0	32.0	귤	34.1	3.8	2.6	28.2
6	돼지고기	39.1	1.5	2.6	31.9	돼지고기	52.7	2.6	3.0	35.0	맥주	31.2	3.7	2.4	30.6
7	사과	34.3	2.4	2.3	34.1	막걸리	45.7	6.2	2.6	37.6	돼지고기	25.4	1.2	2.0	32.6
8	귤	30.2	3.4	2.0	36.1	달걀	32.4	1.3	1.9	39.5	쇠고기,족,사골국물	24.3	3.7	1.9	34.4
9	달걀	27.0	0.8	1.8	37.9	고추	31.4	1.2	1.8	41.3	배	22.0	2.9	1.7	36.1
10	막걸리	26.7	3.3	1.8	39.6	양파	30.7	1.0	1.8	43.0	달걀	21.5	0.8	1.7	37.8
11	쇠고기,족,사골국물	26.2	3.2	1.7	41.4	사과	30.5	2.7	1.7	44.8	양파	21.4	0.7	1.7	39.5
12	양파	26.1	0.7	1.7	43.1	쇠고기,족,사골국물	28.0	3.8	1.6	46.4	포도	20.6	4.7	1.6	41.1
13	고추	25.5	0.8	1.7	44.8	콜라	27.4	3.0	1.6	47.9	고추	19.6	0.8	1.5	42.6
14	두부	22.6	0.9	1.5	46.2	두부	27.3	1.4	1.6	49.5	떡	19.1	1.4	1.5	44.0
15	배	21.7	2.5	1.4	47.7	귤	26.4	4.2	1.5	51.0	토마토	18.5	1.7	1.4	45.5
16	콜라	21.1	1.9	1.4	49.0	닭고기	24.2	2.2	1.4	52.4	수박	18.5	3.0	1.4	46.9
17	수박	19.1	3.0	1.3	50.3	쇠고기	22.8	1.5	1.3	53.7	녹차	18.2	2.2	1.4	48.3
18	닭고기	18.9	1.3	1.2	51.5	과일음료	21.7	2.1	1.2	54.9	오이	17.9	1.5	1.4	49.7
19	감자	18.8	1.2	1.2	52.8	배	21.4	2.8	1.2	56.2	두부	17.9	0.9	1.4	51.1
20	쇠고기	18.7	1.0	1.2	54.0	감자	19.8	1.4	1.1	57.3	감자	17.8	1.7	1.4	52.4
21	토마토	18.2	1.6	1.2	55.2	수박	19.7	3.4	1.1	58.4	빵	16.1	1.0	1.2	53.7
22	포도	18.0	3.6	1.2	56.4	빵	18.9	1.6	1.1	59.5	감	15.5	2.3	1.2	54.9
23	빵	17.5	0.9	1.2	57.5	라면	18.0	1.1	1.0	60.5	고구마	15.1	1.8	1.2	56.1
24	녹차	17.3	1.6	1.1	58.7	토마토	18.0	2.1	1.0	61.6	콜라	14.7	1.7	1.1	57.2
25	과일음료	17.2	1.5	1.1	59.8	파	16.6	0.6	1.0	62.5	쇠고기	14.5	0.8	1.1	58.3
26	떡	16.9	1.1	1.1	60.9	녹차	16.4	2.0	0.9	63.5	닭고기	13.7	1.0	1.1	59.4
27	오이	16.6	1.2	1.1	62.0	포도	15.4	3.1	0.9	64.3	과일음료	12.6	1.5	1.0	60.3
28	파	13.8	0.4	0.9	62.9	오이	15.4	1.2	0.9	65.2	요구르트,호상	12.5	1.2	1.0	61.3
29	라면	13.7	0.7	0.9	63.8	떡	14.7	1.3	0.8	66.1	파	11.0	0.4	0.9	62.2
30	감	12.8	1.8	0.8	64.7	콩나물	13.2	0.7	0.8	66.8	참외	9.8	1.8	0.8	62.9

1) 다소비식품 : 중량을 기준으로 1일 평균 섭취량이 높은 식품

표 2-I-12. 식품별 주당 평균 섭취빈도 추이 : 전체, 만12세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
1. 쌀	-	- -	-	- -	7,460	18.07(0.07)	3,292	18.15(0.10)	6,942	18.24(0.07)	7,708	18.00(0.07)	6,387	17.26(0.09)
2. 보리/ 잡곡	-	- -	-	- -	7,460	9.65(0.19)	3,288	10.16(0.24)	6,940	9.97(0.15)	7,704	10.20(0.17)	6,383	9.67(0.16)
3. 라면	-	- -	-	- -	7,460	1.35(0.03)	3,289	1.14(0.03)	6,942	1.07(0.02)	7,707	1.09(0.03)	6,387	1.10(0.02)
4. 국수	-	- -	-	- -	7,460	0.77(0.02)	3,292	0.75(0.03)	6,941	0.72(0.02)	7,708	0.70(0.02)	6,387	0.76(0.02)
5. 빵류	-	- -	-	- -	7,460	1.30(0.03)	3,290	1.15(0.03)	6,942	1.11(0.03)	7,708	1.17(0.03)	6,386	1.24(0.03)
6. 떡류	-	- -	-	- -	7,460	0.68(0.02)	3,290	0.67(0.02)	6,941	0.65(0.02)	7,708	0.68(0.02)	6,386	0.66(0.02)
7. 과자류	-	- -	-	- -	7,460	1.88(0.04)	3,291	1.50(0.05)	6,939	1.29(0.03)	7,708	1.25(0.03)	6,386	1.26(0.03)
8. 두부	-	- -	-	- -	7,460	2.81(0.06)	3,291	2.61(0.09)	6,940	2.13(0.03)	7,707	2.20(0.05)	6,387	1.81(0.04)
9. 콩류	-	- -	-	- -	7,460	5.27(0.14)	3,292	5.88(0.20)	6,936	5.91(0.14)	7,707	5.69(0.14)	6,383	5.37(0.14)
10. 두유	-	- -	-	- -	7,460	0.70(0.03)	3,291	0.65(0.04)	6,942	0.55(0.02)	7,707	0.52(0.02)	6,386	0.51(0.02)
11. 감자	-	- -	-	- -	7,460	1.48(0.03)	3,291	1.56(0.06)	6,942	1.32(0.02)	7,708	1.26(0.03)	6,387	1.08(0.03)
12. 고구마	-	- -	-	- -	7,460	0.66(0.02)	3,289	0.70(0.03)	6,942	0.71(0.02)	7,707	0.71(0.02)	6,387	0.61(0.02)
13. 쇠고기	-	- -	-	- -	7,460	1.14(0.03)	3,291	1.13(0.04)	6,941	1.00(0.03)	7,708	1.03(0.03)	6,387	1.01(0.02)
14. 닭고기	-	- -	-	- -	7,460	0.91(0.02)	3,292	0.98(0.03)	6,941	0.88(0.02)	7,708	0.94(0.02)	6,387	0.95(0.02)
15. 돼지고기	-	- -	-	- -	7,460	1.46(0.03)	3,291	1.48(0.03)	6,942	1.44(0.02)	7,708	1.41(0.02)	6,386	1.48(0.03)
16. 햄,소시지	-	- -	-	- -	7,460	0.70(0.02)	3,292	0.65(0.02)	6,942	0.65(0.01)	7,708	0.63(0.02)	6,387	0.65(0.02)
17. 달걀	-	- -	-	- -	7,460	2.67(0.04)	3,291	2.63(0.06)	6,941	2.52(0.04)	7,708	2.62(0.04)	6,387	2.53(0.04)
18. 고등어	-	- -	-	- -	7,460	1.05(0.02)	3,292	0.91(0.03)	6,942	0.81(0.01)	7,708	0.83(0.01)	6,386	0.75(0.02)
19. 참치	-	- -	-	- -	7,460	0.69(0.02)	3,292	0.60(0.03)	6,943	0.57(0.02)	7,708	0.57(0.02)	6,387	0.58(0.01)
20. 조기	-	- -	-	- -	7,460	0.69(0.02)	3,292	0.58(0.02)	6,941	0.58(0.02)	7,705	0.55(0.01)	6,387	0.52(0.02)
21. 명태	-	- -	-	- -	7,460	0.62(0.01)	3,289	0.51(0.02)	6,941	0.48(0.01)	7,707	0.44(0.01)	6,385	0.42(0.01)
22. 멸치	-	- -	-	- -	7,460	2.58(0.07)	3,290	2.25(0.07)	6,942	2.05(0.05)	7,708	2.07(0.05)	6,381	1.91(0.05)
23. 어묵류	-	- -	-	- -	7,460	0.92(0.02)	3,289	0.84(0.02)	6,942	0.77(0.02)	7,708	0.79(0.02)	6,387	0.79(0.02)
24. 오징어	-	- -	-	- -	7,460	0.72(0.02)	3,292	0.71(0.02)	6,941	0.65(0.02)	7,708	0.62(0.02)	6,386	0.56(0.01)
25. 조개류	-	- -	-	- -	7,460	0.66(0.03)	3,292	0.59(0.02)	6,940	0.55(0.02)	7,707	0.53(0.02)	6,387	0.45(0.02)
26. 젓갈류	-	- -	-	- -	7,460	0.76(0.03)	3,292	0.69(0.04)	6,938	0.64(0.03)	7,705	0.55(0.02)	6,386	0.55(0.02)
27. 배추	-	- -	-	- -	7,460	15.80(0.14)	3,292	13.79(0.22)	6,941	15.10(0.14)	7,707	14.92(0.14)	6,387	13.68(0.15)
28. 무	-	- -	-	- -	7,460	8.22(0.21)	3,292	5.60(0.20)	6,939	5.37(0.11)	7,707	5.11(0.10)	6,385	4.71(0.11)
29. 무청	-	- -	-	- -	7,460	1.32(0.05)	3,291	1.54(0.06)	6,941	1.46(0.04)	7,707	1.61(0.05)	6,384	1.63(0.05)
30. 콩나물	-	- -	-	- -	7,460	1.84(0.04)	3,291	1.68(0.04)	6,939	1.43(0.02)	7,708	1.45(0.02)	6,387	1.44(0.02)
31. 시금치	-	- -	-	- -	7,460	1.39(0.03)	3,291	0.93(0.03)	6,941	0.93(0.03)	7,708	0.92(0.02)	6,387	0.80(0.02)
32. 오이	-	- -	-	- -	7,460	1.76(0.04)	3,290	1.60(0.07)	6,941	1.33(0.03)	7,708	1.25(0.03)	6,387	1.12(0.03)
33. 고추	-	- -	-	- -	7,460	2.22(0.05)	3,291	2.39(0.09)	6,941	1.92(0.04)	7,706	1.72(0.05)	6,384	1.41(0.04)
34. 당근	-	- -	-	- -	7,460	1.32(0.03)	3,290	1.19(0.05)	6,941	1.09(0.03)	7,708	0.82(0.03)	6,387	0.46(0.02)
35. 호박	-	- -	-	- -	7,460	1.32(0.03)	3,290	1.43(0.05)	6,941	1.23(0.02)	7,703	1.06(0.02)	6,385	0.85(0.02)
36. 양배추	-	- -	-	- -	7,460	1.04(0.03)	3,291	0.92(0.05)	6,941	0.78(0.03)	7,708	0.80(0.02)	6,387	0.70(0.02)
37. 토마토	-	- -	-	- -	7,460	1.40(0.04)	3,288	1.37(0.09)	6,938	1.05(0.04)	7,708	0.93(0.03)	6,386	0.76(0.03)
38. 버섯류	-	- -	-	- -	7,460	1.63(0.04)	3,291	1.69(0.06)	6,940	1.48(0.03)	7,708	1.41(0.03)	6,387	1.29(0.03)

1) 주당 평균섭취빈도 : 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품별 주당 평균섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
39. 미역	-	- -	-	- -	7,460	1.36(0.03)	3,290	1.13(0.03)	6,941	1.00(0.02)	7,708	0.99(0.02)	6,387	0.93(0.02)
40. 김	-	- -	-	- -	7,460	4.44(0.09)	3,291	3.25(0.08)	6,939	2.98(0.06)	7,708	3.01(0.07)	6,387	2.81(0.07)
41. 귤	-	- -	-	- -	7,460	1.78(0.04)	3,290	1.71(0.06)	6,940	1.52(0.03)	7,707	1.41(0.03)	6,387	1.02(0.04)
42. 감, 곶감	-	- -	-	- -	7,460	0.77(0.03)	3,289	0.80(0.04)	6,941	0.72(0.02)	7,708	0.74(0.02)	6,387	0.49(0.01)
43. 배	-	- -	-	- -	7,460	0.69(0.02)	3,290	0.63(0.03)	6,941	0.53(0.01)	7,708	0.56(0.02)	6,387	0.42(0.01)
44. 수박	-	- -	-	- -	7,460	1.20(0.04)	3,287	0.99(0.05)	6,941	0.85(0.02)	7,707	0.85(0.02)	6,387	0.59(0.02)
45. 참외	-	- -	-	- -	7,460	0.86(0.03)	3,290	0.63(0.03)	6,940	0.60(0.02)	7,708	0.61(0.02)	6,387	0.43(0.01)
46. 딸기	-	- -	-	- -	7,460	1.02(0.03)	3,289	0.72(0.03)	6,941	0.63(0.02)	7,708	0.60(0.01)	6,387	0.47(0.02)
47. 포도	-	- -	-	- -	7,460	0.88(0.03)	3,288	0.97(0.05)	6,941	0.73(0.02)	7,707	0.75(0.02)	6,386	0.54(0.01)
48. 복숭아	-	- -	-	- -	7,460	0.57(0.02)	3,288	0.58(0.03)	6,940	0.48(0.02)	7,707	0.50(0.02)	6,387	0.37(0.01)
49. 사과	-	- -	-	- -	7,460	1.48(0.04)	3,290	1.67(0.08)	6,941	1.44(0.04)	7,708	1.56(0.04)	6,384	1.36(0.04)
50. 바나나	-	- -	-	- -	7,460	1.08(0.03)	3,290	1.16(0.06)	6,941	0.96(0.03)	7,708	0.89(0.03)	6,387	0.87(0.03)
51. 오렌지	-	- -	-	- -	7,460	1.86(0.05)	3,290	1.34(0.06)	6,940	1.22(0.04)	7,708	1.04(0.03)	6,386	1.01(0.03)
52. 우유	-	- -	-	- -	7,460	3.67(0.07)	3,291	3.18(0.09)	6,940	2.92(0.06)	7,708	3.09(0.06)	6,386	2.86(0.06)
53. 요구르트	-	- -	-	- -	7,460	2.72(0.06)	3,291	1.33(0.06)	6,941	1.15(0.04)	7,708	1.22(0.05)	6,387	1.24(0.04)
54. 아이스크림	-	- -	-	- -	7,460	1.35(0.04)	3,288	1.13(0.04)	6,941	0.95(0.03)	7,706	0.87(0.02)	6,387	0.78(0.02)
55. 탄산음료	-	- -	-	- -	7,460	1.41(0.05)	3,290	1.00(0.04)	6,941	1.00(0.03)	7,707	0.93(0.03)	6,387	0.99(0.03)
56. 커피	-	- -	-	- -	7,460	7.63(0.11)	3,291	7.95(0.16)	6,941	7.86(0.11)	7,707	8.07(0.11)	6,387	8.38(0.13)
57. 녹차	-	- -	-	- -	7,460	4.16(0.10)	3,288	2.52(0.11)	6,939	2.25(0.07)	7,707	1.94(0.06)	6,385	1.83(0.07)
58. 맥주	-	- -	-	- -	7,460	0.63(0.02)	3,288	0.68(0.03)	6,940	0.64(0.02)	7,707	0.64(0.02)	6,387	0.68(0.02)
59. 소주	-	- -	-	- -	7,460	0.93(0.03)	3,287	0.91(0.04)	6,941	0.85(0.02)	7,707	0.83(0.02)	6,387	0.82(0.03)
60. 막걸리	-	- -	-	- -	7,460	0.17(0.01)	3,288	0.15(0.01)	6,940	0.12(0.01)	7,707	0.16(0.01)	6,386	0.28(0.01)
61. 햄버거	-	- -	-	- -	7,460	0.21(0.01)	3,291	0.16(0.01)	6,941	0.16(0.01)	7,707	0.17(0.01)	6,387	0.19(0.01)
62. 피자	-	- -	-	- -	7,460	0.21(0.01)	3,291	0.21(0.01)	6,941	0.19(0.01)	7,707	0.19(0.00)	6,387	0.20(0.01)
63. 튀긴 음식	-	- -	-	- -	7,460	0.53(0.02)	3,291	0.65(0.02)	6,940	0.59(0.01)	7,707	0.56(0.01)	6,387	0.68(0.02)

표 2-I-13. 식품섭취빈도 : 전체, 만12세이상, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	6,387	54.79	39.51	4.96	0.17	0.16	0.07	0.05	0.09	0.07	0.13	17.40
		(표준오차)		(1.11)	(0.94)	(0.46)	(0.07)	(0.06)	(0.04)	(0.03)	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.10)
	2. 보리/ 잡곡	분율	6,383	21.64	25.84	17.85	3.50	6.54	5.32	4.47	3.23	3.65	7.96	9.84
		(표준오차)		(0.85)	(0.71)	(0.59)	(0.30)	(0.41)	(0.37)	(0.40)	(0.34)	(0.38)	(0.56)	(0.18)
	3. 라면	분율	6,387	0.00	0.05	0.59	2.63	19.11	24.14	20.81	12.66	8.72	11.28	1.06
		(표준오차)		(-)[2]	(0.04)	(0.14)	(0.31)	(0.77)	(0.80)	(0.66)	(0.49)	(0.50)	(0.50)	(0.03)
	4. 국수	분율	6,387	0.00	0.00	0.32	1.13	9.51	21.85	24.51	22.37	11.92	8.40	0.75
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.11)	(0.18)	(0.49)	(0.80)	(0.61)	(0.70)	(0.61)	(0.50)	(0.02)
	5. 빵류	분율	6,386	0.03	0.12	2.62	4.17	17.01	21.20	18.10	14.98	9.41	12.35	1.21
		(표준오차)		(0.02)	(0.06)	(0.30)	(0.32)	(0.67)	(0.78)	(0.65)	(0.61)	(0.51)	(0.64)	(0.04)
	6. 떡류	분율	6,386	0.00	0.00	0.34	0.95	8.51	16.34	21.38	23.85	15.90	12.71	0.65
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.15)	(0.48)	(0.59)	(0.75)	(0.67)	(0.57)	(0.71)	(0.02)
	7. 과자류	분율	6,386	0.08	0.27	2.10	5.77	17.49	16.14	13.09	14.81	10.74	19.51	1.22
		(표준오차)		(0.05)	(0.09)	(0.26)	(0.40)	(0.67)	(0.63)	(0.55)	(0.53)	(0.55)	(0.81)	(0.04)
두류·서류	8. 두부	분율	6,387	0.02	0.43	2.36	7.32	32.83	25.82	15.74	8.45	3.54	3.49	1.79
		(표준오차)		(0.02)	(0.10)	(0.27)	(0.43)	(0.93)	(0.80)	(0.66)	(0.50)	(0.36)	(0.33)	(0.04)
	9. 콩류	분율	6,383	11.33	12.48	9.76	4.55	13.12	12.13	10.06	9.04	5.26	12.27	5.57
		(표준오차)		(0.55)	(0.59)	(0.50)	(0.30)	(0.56)	(0.53)	(0.53)	(0.52)	(0.41)	(0.72)	(0.16)
	10. 두유	분율	6,386	0.04	0.14	1.58	1.52	4.83	6.75	8.92	11.20	14.36	50.67	0.50
		(표준오차)		(0.02)	(0.05)	(0.21)	(0.20)	(0.36)	(0.40)	(0.56)	(0.51)	(0.64)	(0.98)	(0.02)
	11. 감자	분율	6,387	0.00	0.06	0.55	2.89	17.45	23.72	25.22	17.62	7.26	5.23	1.06
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.13)	(0.33)	(0.83)	(0.75)	(0.73)	(0.76)	(0.45)	(0.37)	(0.03)
	12. 고구마	분율	6,387	0.00	0.04	0.51	1.10	5.14	15.12	24.76	24.12	16.67	12.56	0.60
		(표준오차)		(-)	(0.03)	(0.12)	(0.18)	(0.38)	(0.62)	(0.70)	(0.70)	(0.67)	(0.63)	(0.02)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	6,387	0.00	0.01	0.46	2.70	16.70	21.20	22.05	18.06	9.44	9.37	0.98
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.12)	(0.32)	(0.68)	(0.73)	(0.72)	(0.78)	(0.54)	(0.70)	(0.03)
	14. 닭고기	분율	6,387	0.00	0.04	0.13	2.20	13.66	23.94	26.95	16.84	7.37	8.86	0.91
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.06)	(0.27)	(0.67)	(0.76)	(0.78)	(0.62)	(0.45)	(0.60)	(0.02)
	15. 돼지고기	분율	6,386	0.04	0.02	0.73	4.97	28.37	28.17	21.78	8.81	3.75	3.35	1.45
		(표준오차)		(0.04)	(0.02)	(0.14)	(0.48)	(0.81)	(0.71)	(0.73)	(0.53)	(0.30)	(0.29)	(0.03)
	16. 햄,소시지	분율	6,387	0.00	0.06	0.33	1.24	9.50	14.92	15.82	13.44	8.06	36.61	0.62
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.10)	(0.17)	(0.54)	(0.67)	(0.74)	(0.58)	(0.47)	(1.30)	(0.02)
	17. 달걀	분율	6,387	0.04	0.29	7.90	13.90	36.93	19.10	10.36	5.66	2.44	3.37	2.49
		(표준오차)		(0.03)	(0.08)	(0.51)	(0.59)	(0.80)	(0.76)	(0.44)	(0.34)	(0.24)	(0.28)	(0.04)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일				1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	6,386	0.00	0.00	0.13	0.91	10.51	22.15	26.14	20.84	8.12	11.21	0.75
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.15)	(0.58)	(0.66)	(0.63)	(0.68)	(0.46)	(0.63)	(0.02)
	19. 참치	분율	6,387	0.00	0.01	0.07	0.84	7.11	15.02	22.34	18.60	9.41	26.59	0.56
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.03)	(0.17)	(0.64)	(0.54)	(0.75)	(0.64)	(0.46)	(1.06)	(0.02)
	20. 조기	분율	6,387	0.00	0.01	0.07	0.60	6.53	12.30	21.21	24.06	14.74	20.48	0.52
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.03)	(0.11)	(0.44)	(0.61)	(0.67)	(0.68)	(0.67)	(0.79)	(0.02)
	21. 명태	분율	6,385	0.00	0.00	0.07	0.19	3.34	11.14	22.34	25.46	16.87	20.59	0.42
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.06)	(0.27)	(0.49)	(0.67)	(0.68)	(0.68)	(0.82)	(0.01)
	22. 멸치	분율	6,381	0.34	0.89	6.20	9.21	21.19	18.64	16.53	12.51	5.39	9.09	1.94
		(표준오차)		(0.09)	(0.13)	(0.43)	(0.46)	(0.64)	(0.65)	(0.67)	(0.55)	(0.38)	(0.51)	(0.05)
	23. 어묵류	분율	6,387	0.00	0.14	0.29	1.15	11.26	20.13	21.93	17.33	8.58	19.20	0.76
		(표준오차)		(-)	(0.09)	(0.09)	(0.17)	(0.57)	(0.68)	(0.78)	(0.65)	(0.50)	(0.81)	(0.02)
	24. 오징어	분율	6,386	0.00	0.00	0.25	0.73	6.19	14.12	21.82	22.63	13.14	21.13	0.55
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.14)	(0.46)	(0.67)	(0.76)	(0.68)	(0.56)	(0.75)	(0.01)
	25. 조개류	분율	6,387	0.00	0.00	0.11	0.61	4.41	10.53	19.83	23.93	15.53	25.04	0.45
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.12)	(0.41)	(0.65)	(0.76)	(0.74)	(0.67)	(1.13)	(0.02)
	26. 젓갈류	분율	6,386	0.12	0.15	0.79	1.28	6.83	9.43	12.04	17.12	14.49	37.75	0.56
		(표준오차)		(0.05)	(0.06)	(0.13)	(0.17)	(0.46)	(0.51)	(0.49)	(0.56)	(0.61)	(0.97)	(0.02)
채소류	27. 배추	분율	6,387	36.06	32.77	18.34	4.09	5.48	1.78	0.59	0.26	0.27	0.37	13.81
		(표준오차)		(1.09)	(0.85)	(0.80)	(0.34)	(0.39)	(0.18)	(0.12)	(0.06)	(0.08)	(0.08)	(0.16)
	28. 무	분율	6,385	3.95	7.48	19.92	11.76	25.61	15.26	7.55	4.41	1.46	2.59	4.71
		(표준오차)		(0.41)	(0.47)	(0.96)	(0.59)	(0.79)	(0.56)	(0.43)	(0.34)	(0.19)	(0.32)	(0.11)
	29. 무청	분율	6,384	0.33	0.72	4.78	7.11	17.58	20.25	18.49	13.91	6.84	9.99	1.65
		(표준오차)		(0.09)	(0.13)	(0.40)	(0.61)	(0.69)	(0.72)	(0.59)	(0.58)	(0.50)	(0.73)	(0.05)
	30. 콩나물	분율	6,387	0.02	0.08	0.88	3.81	28.58	30.20	20.64	10.02	3.14	2.61	1.43
		(표준오차)		(0.02)	(0.04)	(0.17)	(0.31)	(0.81)	(0.74)	(0.60)	(0.50)	(0.33)	(0.24)	(0.02)
	31. 시금치	분율	6,387	0.00	0.03	0.41	0.92	11.22	21.92	24.70	20.55	10.33	9.92	0.79
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.12)	(0.16)	(0.68)	(0.84)	(0.65)	(0.69)	(0.68)	(0.64)	(0.02)
	32. 오이	분율	6,387	0.04	0.15	1.14	3.13	15.40	26.01	28.45	15.71	4.90	5.06	1.12
		(표준오차)		(0.02)	(0.06)	(0.20)	(0.37)	(0.81)	(0.75)	(0.90)	(0.75)	(0.32)	(0.43)	(0.03)
	33. 고추	분율	6,384	0.12	0.35	3.41	5.88	17.40	23.61	18.95	12.04	4.79	13.44	1.42
		(표준오차)		(0.05)	(0.08)	(0.33)	(0.45)	(0.70)	(0.70)	(0.67)	(0.52)	(0.35)	(0.71)	(0.04)
	34. 당근	분율	6,387	0.03	0.02	0.58	0.89	5.33	11.08	11.53	13.45	10.04	47.06	0.45
		(표준오차)		(0.02)	(0.01)	(0.11)	(0.12)	(0.42)	(0.57)	(0.54)	(0.57)	(0.59)	(1.51)	(0.02)
	35. 호박	분율	6,385	0.07	0.07	0.30	1.60	12.23	20.33	26.75	20.06	8.47	10.11	0.85
		(표준오차)		(0.05)	(0.03)	(0.09)	(0.20)	(0.61)	(0.68)	(0.76)	(0.73)	(0.48)	(0.62)	(0.02)
	36. 양배추	분율	6,387	0.02	0.15	0.84	1.49	7.58	14.62	21.42	22.83	12.54	18.51	0.69
		(표준오차)		(0.02)	(0.06)	(0.14)	(0.20)	(0.46)	(0.64)	(0.81)	(0.71)	(0.62)	(0.97)	(0.02)
	37. 토마토	분율	6,386	0.02	0.08	1.24	2.07	6.75	17.90	24.85	21.42	13.31	12.38	0.77
		(표준오차)		(0.02)	(0.04)	(0.18)	(0.27)	(0.51)	(0.69)	(0.72)	(0.66)	(0.58)	(0.62)	(0.03)
	38. 버섯류	분율	6,387	0.04	0.21	1.44	3.88	21.98	24.12	19.07	13.93	6.26	9.07	1.27
		(표준오차)		(0.02)	(0.08)	(0.19)	(0.34)	(0.69)	(0.67)	(0.68)	(0.61)	(0.47)	(0.52)	(0.03)
해조류	39. 미역	분율	6,387	0.01	0.01	0.38	1.63	13.64	25.16	30.33	18.15	6.61	4.09	0.93
		(표준오차)		(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.19)	(0.55)	(0.69)	(0.78)	(0.72)	(0.42)	(0.36)	(0.02)
	40. 김	분율	6,387	0.44	1.79	9.67	13.99	30.56	22.39	13.03	5.27	1.51	1.36	2.80
		(표준오차)		(0.11)	(0.21)	(0.65)	(0.65)	(0.87)	(0.72)	(0.68)	(0.43)	(0.23)	(0.20)	(0.07)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명 \ 섭취빈도		N	1일				1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
			3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
과일류	41. 귤	분율	6,387	0.06	0.00	0.92	3.73	8.82	31.72	29.39	14.22	6.97	4.16	1.02
		(표준오차)		(0.04)	(-)	(0.21)	(0.47)	(0.78)	(1.06)	(0.79)	(0.65)	(0.44)	(0.35)	(0.04)
	42. 감, 곶감	분율	6,387	0.00	0.00	0.13	0.79	3.06	15.71	24.70	20.65	18.63	16.33	0.50
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.14)	(0.40)	(0.79)	(0.72)	(0.62)	(0.73)	(0.78)	(0.02)
	43. 배	분율	6,387	0.00	0.00	0.22	0.55	2.07	9.33	22.09	26.78	24.89	14.08	0.42
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.15)	(0.23)	(0.54)	(0.69)	(0.78)	(0.80)	(0.74)	(0.01)
	44. 수박	분율	6,387	0.00	0.00	0.09	0.71	3.24	20.80	30.82	21.77	14.41	8.15	0.58
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.14)	(0.42)	(0.90)	(0.71)	(0.75)	(0.57)	(0.49)	(0.02)
	45. 참외	분율	6,387	0.00	0.00	0.02	0.24	1.53	12.73	28.54	24.82	18.95	13.17	0.43
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.02)	(0.08)	(0.24)	(0.61)	(0.76)	(0.69)	(0.70)	(0.66)	(0.01)
	46. 딸기	분율	6,387	0.00	0.02	0.10	0.69	1.85	12.22	29.50	25.61	18.01	12.01	0.47
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.06)	(0.24)	(0.28)	(0.84)	(0.79)	(0.77)	(0.78)	(0.61)	(0.02)
	47. 포도	분율	6,386	0.00	0.01	0.33	0.69	3.24	15.74	28.82	23.49	16.70	10.97	0.55
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.11)	(0.14)	(0.33)	(0.74)	(0.70)	(0.64)	(0.71)	(0.62)	(0.01)
	48. 복숭아	분율	6,387	0.03	0.00	0.10	0.38	1.28	8.81	21.44	23.60	21.70	22.66	0.37
		(표준오차)		(0.03)	(-)	(0.06)	(0.10)	(0.19)	(0.59)	(0.70)	(0.74)	(0.69)	(0.89)	(0.01)
	49. 사과	분율	6,384	0.01	0.08	3.34	6.79	15.24	22.34	21.02	13.48	10.73	6.97	1.36
		(표준오차)		(0.01)	(0.03)	(0.33)	(0.43)	(0.62)	(0.80)	(0.71)	(0.69)	(0.53)	(0.45)	(0.04)
	50. 바나나	분율	6,387	0.04	0.00	1.12	2.63	11.37	17.21	19.42	18.58	14.28	15.35	0.85
		(표준오차)		(0.03)	(-)	(0.19)	(0.29)	(0.57)	(0.67)	(0.74)	(0.63)	(0.66)	(0.73)	(0.03)
	51. 오렌지	분율	6,386	0.01	0.19	1.84	3.39	13.40	15.87	16.66	16.98	11.90	19.75	0.98
		(표준오차)		(0.01)	(0.08)	(0.25)	(0.29)	(0.59)	(0.69)	(0.63)	(0.58)	(0.60)	(0.89)	(0.03)
우유류	52. 우유	분율	6,386	0.59	1.71	18.21	9.76	19.02	12.39	7.70	6.81	5.49	18.32	2.80
		(표준오차)		(0.15)	(0.21)	(0.76)	(0.50)	(0.66)	(0.51)	(0.38)	(0.42)	(0.36)	(0.76)	(0.06)
	53. 요구르트	분율	6,387	0.05	0.28	5.30	3.51	13.94	15.18	12.36	12.34	8.99	28.04	1.21
		(표준오차)		(0.05)	(0.07)	(0.46)	(0.31)	(0.62)	(0.62)	(0.52)	(0.50)	(0.50)	(1.19)	(0.04)
	54. 아이스크림	분율	6,387	0.03	0.12	0.76	2.24	9.23	16.78	18.97	16.50	15.04	20.33	0.76
		(표준오차)		(0.03)	(0.06)	(0.15)	(0.25)	(0.54)	(0.68)	(0.66)	(0.69)	(0.59)	(0.76)	(0.03)
음료류	55. 탄산음료	분율	6,387	0.03	0.31	1.84	3.75	13.16	12.96	12.56	12.53	11.71	31.15	0.94
		(표준오차)		(0.02)	(0.10)	(0.23)	(0.36)	(0.60)	(0.57)	(0.53)	(0.54)	(0.69)	(0.88)	(0.03)
	56. 커피	분율	6,387	18.40	18.47	20.68	4.32	8.02	5.59	4.02	3.02	3.13	14.36	8.40
		(표준오차)		(0.71)	(0.62)	(0.63)	(0.34)	(0.44)	(0.34)	(0.32)	(0.26)	(0.30)	(0.62)	(0.14)
	57. 녹차	분율	6,385	2.18	1.98	7.26	2.63	10.42	9.55	8.53	9.19	9.16	39.10	1.82
		(표준오차)		(0.30)	(0.21)	(0.46)	(0.28)	(0.52)	(0.51)	(0.50)	(0.49)	(0.54)	(1.25)	(0.07)
주류	58. 맥주	분율	6,387	0.02	0.05	0.60	2.13	11.49	12.02	10.23	10.28	6.90	46.29	0.66
		(표준오차)		(0.02)	(0.03)	(0.13)	(0.24)	(0.61)	(0.64)	(0.50)	(0.44)	(0.41)	(1.03)	(0.02)
	59. 소주	분율	6,387	0.09	0.13	1.53	3.48	13.17	9.64	9.69	8.25	5.28	48.75	0.83
		(표준오차)		(0.03)	(0.06)	(0.22)	(0.33)	(0.62)	(0.50)	(0.48)	(0.46)	(0.33)	(1.00)	(0.03)
	60. 막걸리	분율	6,386	0.09	0.05	0.40	0.61	3.43	4.99	6.28	9.54	8.00	66.62	0.29
		(표준오차)		(0.04)	(0.03)	(0.09)	(0.12)	(0.29)	(0.45)	(0.41)	(0.54)	(0.41)	(0.97)	(0.02)
기타	61. 햄버거	분율	6,387	0.00	0.05	0.04	0.04	0.92	3.51	9.30	15.85	14.28	56.00	0.18
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.04)	(0.03)	(0.18)	(0.36)	(0.54)	(0.73)	(0.62)	(1.17)	(0.01)
	62. 피자	분율	6,387	0.00	0.00	0.00	0.12	0.22	2.56	11.92	23.13	18.20	43.86	0.19
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.06)	(0.07)	(0.28)	(0.78)	(0.87)	(0.76)	(1.34)	(0.01)
	63. 튀긴 음식	분율	6,387	0.02	0.00	0.56	1.39	8.24	14.00	20.63	23.07	14.21	17.87	0.65
		(표준오차)		(0.01)	(-)	(0.15)	(0.20)	(0.51)	(0.66)	(0.67)	(0.59)	(0.57)	(0.82)	(0.02)

표 2-I-14. 식품섭취빈도 : 남자, 만12세이상, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명	섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
			3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	2,720	56.90	38.79	3.81	0.16	0.10	0.07	0.08	0.04	0.00	0.05	17.66
		(표준오차)		(1.29)	(1.15)	(0.59)	(0.11)	(0.10)	(0.07)	(0.06)	(0.04)	(-)[2]	(0.04)	(0.12)
	2. 보리/ 잡곡	분율	2,719	15.98	23.15	21.25	3.54	7.10	6.54	5.08	4.36	4.21	8.79	8.55
		(표준오차)		(1.06)	(0.95)	(0.97)	(0.47)	(0.65)	(0.57)	(0.63)	(0.46)	(0.59)	(0.72)	(0.21)
	3. 라면	분율	2,720	0.00	0.08	1.11	4.20	25.44	26.56	20.15	10.30	6.46	5.70	1.35
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.28)	(0.59)	(1.24)	(1.09)	(1.02)	(0.69)	(0.58)	(0.46)	(0.04)
	4. 국수	분율	2,720	0.00	0.00	0.36	1.39	10.66	25.44	24.42	20.60	9.73	7.41	0.82
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.16)	(0.33)	(0.69)	(1.10)	(0.92)	(1.00)	(0.78)	(0.70)	(0.03)
	5. 빵류	분율	2,720	0.06	0.11	2.19	4.34	16.04	20.21	18.00	15.27	9.93	13.85	1.16
		(표준오차)		(0.05)	(0.10)	(0.38)	(0.50)	(0.96)	(1.05)	(0.90)	(0.89)	(0.71)	(0.81)	(0.04)
	6. 떡류	분율	2,720	0.00	0.00	0.23	0.76	5.84	13.39	18.40	26.65	17.46	17.27	0.53
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.10)	(0.18)	(0.52)	(0.85)	(1.11)	(1.05)	(0.88)	(1.03)	(0.02)
	7. 과자류	분율	2,720	0.06	0.07	1.54	5.45	16.71	18.24	13.07	16.05	9.96	18.86	1.13
		(표준오차)		(0.05)	(0.07)	(0.28)	(0.56)	(0.95)	(1.02)	(0.80)	(0.88)	(0.70)	(1.00)	(0.04)
두류·서류	8. 두부	분율	2,720	0.00	0.51	2.43	6.85	34.52	26.86	15.27	7.82	2.95	2.78	1.83
		(표준오차)		(-)	(0.16)	(0.36)	(0.61)	(1.38)	(1.19)	(0.88)	(0.65)	(0.41)	(0.38)	(0.05)
	9. 콩류	분율	2,718	8.21	10.12	10.79	4.27	15.35	14.23	11.06	9.29	4.92	11.77	4.73
		(표준오차)		(0.63)	(0.76)	(0.76)	(0.48)	(0.88)	(0.85)	(0.82)	(0.76)	(0.58)	(0.89)	(0.18)
	10. 두유	분율	2,720	0.06	0.15	1.68	1.52	5.68	8.41	10.19	12.81	13.94	45.55	0.57
		(표준오차)		(0.04)	(0.07)	(0.32)	(0.31)	(0.55)	(0.74)	(0.78)	(0.84)	(0.86)	(1.25)	(0.03)
	11. 감자	분율	2,720	0.00	0.06	0.60	2.69	18.84	23.37	24.00	17.73	6.54	6.16	1.08
		(표준오차)		(-)	(0.06)	(0.18)	(0.42)	(1.01)	(1.15)	(0.99)	(1.03)	(0.57)	(0.51)	(0.03)
	12. 고구마	분율	2,720	0.00	0.07	0.55	0.78	4.18	11.67	21.58	25.06	19.12	16.99	0.52
		(표준오차)		(-)	(0.06)	(0.19)	(0.25)	(0.52)	(0.81)	(0.97)	(1.04)	(0.94)	(0.94)	(0.03)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	2,720	0.00	0.00	0.53	3.36	18.74	22.73	20.34	18.82	7.33	8.15	1.07
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.18)	(0.48)	(1.02)	(1.14)	(0.84)	(1.19)	(0.65)	(0.84)	(0.03)
	14. 닭고기	분율	2,720	0.00	0.09	0.18	2.65	16.35	25.83	25.95	16.59	5.48	6.88	1.02
		(표준오차)		(-)	(0.09)	(0.12)	(0.41)	(1.00)	(1.11)	(1.14)	(0.93)	(0.50)	(0.68)	(0.03)
	15. 돼지고기	분율	2,720	0.00	0.02	0.71	6.14	32.53	29.39	19.66	7.48	2.23	1.85	1.60
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.22)	(0.68)	(1.18)	(1.01)	(1.01)	(0.65)	(0.29)	(0.29)	(0.03)
	16. 햄,소시지	분율	2,720	0.00	0.13	0.22	1.36	11.45	15.29	16.89	14.64	7.31	32.72	0.68
		(표준오차)		(-)	(0.10)	(0.11)	(0.27)	(0.84)	(0.90)	(1.06)	(0.86)	(0.64)	(1.48)	(0.03)
	17. 달걀	분율	2,720	0.05	0.37	7.41	13.39	39.05	20.71	9.44	5.78	1.68	2.11	2.50
		(표준오차)		(0.04)	(0.15)	(0.66)	(0.89)	(1.18)	(1.12)	(0.62)	(0.51)	(0.26)	(0.29)	(0.05)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 남자, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	2,720	0.00	0.00	0.08	0.78	11.38	23.24	26.02	21.61	6.61	10.28	0.77
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.21)	(0.80)	(0.96)	(0.95)	(0.91)	(0.61)	(0.82)	(0.02)
	19. 참치	분율	2,720	0.00	0.00	0.07	1.09	7.19	16.24	22.49	20.07	9.05	23.81	0.59
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.27)	(0.82)	(0.86)	(1.11)	(0.95)	(0.60)	(1.12)	(0.02)
	20. 조기	분율	2,720	0.00	0.02	0.10	0.62	6.25	12.24	20.20	26.10	13.20	21.28	0.52
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.06)	(0.17)	(0.67)	(0.79)	(0.89)	(0.98)	(0.92)	(1.01)	(0.02)
	21. 명태	분율	2,718	0.00	0.00	0.04	0.13	3.55	12.96	23.25	26.82	14.49	18.76	0.45
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.08)	(0.43)	(0.80)	(1.01)	(0.98)	(0.87)	(1.00)	(0.01)
	22. 멸치	분율	2,719	0.31	0.37	5.71	8.43	22.28	20.59	16.30	12.57	4.34	9.10	1.83
		(표준오차)		(0.15)	(0.09)	(0.61)	(0.58)	(0.96)	(0.96)	(0.97)	(0.83)	(0.52)	(0.69)	(0.06)
	23. 어묵류	분율	2,720	0.00	0.26	0.21	1.29	12.98	21.56	21.88	16.92	6.81	18.09	0.83
		(표준오차)		(-)	(0.18)	(0.10)	(0.26)	(0.83)	(0.94)	(1.11)	(0.85)	(0.63)	(0.99)	(0.03)
	24. 오징어	분율	2,719	0.00	0.00	0.31	0.78	7.15	16.64	22.38	23.39	11.28	18.07	0.61
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.13)	(0.22)	(0.74)	(0.97)	(1.14)	(1.08)	(0.69)	(0.94)	(0.02)
	25. 조개류	분율	2,720	0.00	0.00	0.07	0.52	4.85	11.32	20.70	25.67	14.24	22.64	0.47
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.16)	(0.57)	(0.91)	(0.99)	(1.12)	(0.89)	(1.28)	(0.02)
	26. 젓갈류	분율	2,719	0.09	0.28	0.91	1.38	9.25	11.47	14.63	18.75	12.89	30.36	0.69
		(표준오차)		(0.06)	(0.12)	(0.21)	(0.27)	(0.73)	(0.75)	(0.85)	(0.89)	(0.82)	(1.12)	(0.03)
채소류	27. 배추	분율	2,720	36.19	33.86	18.15	4.10	4.95	1.73	0.38	0.18	0.04	0.43	13.96
		(표준오차)		(1.27)	(1.17)	(1.04)	(0.52)	(0.61)	(0.29)	(0.14)	(0.07)	(0.04)	(0.13)	(0.18)
	28. 무	분율	2,718	3.58	8.52	22.36	11.56	26.32	13.79	6.55	3.67	1.11	2.53	4.93
		(표준오차)		(0.46)	(0.63)	(1.24)	(0.84)	(1.08)	(0.81)	(0.60)	(0.46)	(0.24)	(0.44)	(0.13)
	29. 무청	분율	2,720	0.24	0.88	4.69	7.40	18.09	21.89	17.54	14.04	5.52	9.70	1.69
		(표준오차)		(0.09)	(0.21)	(0.54)	(0.80)	(0.87)	(1.05)	(0.90)	(0.85)	(0.69)	(0.91)	(0.07)
	30. 콩나물	분율	2,720	0.05	0.08	1.15	4.06	32.20	30.65	17.78	9.45	2.17	2.41	1.55
		(표준오차)		(0.03)	(0.05)	(0.30)	(0.50)	(1.12)	(1.15)	(0.81)	(0.76)	(0.35)	(0.35)	(0.03)
	31. 시금치	분율	2,720	0.00	0.06	0.45	1.04	12.04	24.54	22.27	21.69	8.74	9.16	0.83
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.17)	(0.24)	(0.89)	(1.20)	(0.98)	(1.02)	(0.79)	(0.89)	(0.03)
	32. 오이	분율	2,720	0.05	0.15	1.12	2.08	15.54	25.68	28.48	16.98	4.06	5.86	1.07
		(표준오차)		(0.05)	(0.08)	(0.26)	(0.31)	(1.07)	(1.09)	(1.35)	(1.04)	(0.46)	(0.62)	(0.04)
	33. 고추	분율	2,720	0.16	0.44	3.98	6.66	20.65	24.67	17.61	10.56	3.81	11.46	1.60
		(표준오차)		(0.10)	(0.14)	(0.51)	(0.61)	(1.01)	(0.98)	(0.95)	(0.68)	(0.43)	(0.89)	(0.05)
	34. 당근	분율	2,720	0.00	0.02	0.31	0.58	5.44	11.67	12.10	16.30	9.44	44.14	0.43
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.10)	(0.15)	(0.59)	(0.85)	(0.85)	(0.91)	(0.73)	(1.82)	(0.02)
	35. 호박	분율	2,719	0.00	0.06	0.23	1.31	11.41	18.93	26.06	22.34	9.10	10.57	0.78
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.11)	(0.27)	(0.85)	(0.90)	(1.08)	(1.07)	(0.73)	(0.85)	(0.02)
	36. 양배추	분율	2,720	0.00	0.12	0.69	1.43	8.53	15.40	19.41	24.91	11.19	18.32	0.69
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.19)	(0.28)	(0.68)	(0.92)	(0.94)	(0.99)	(0.87)	(1.14)	(0.03)
	37. 토마토	분율	2,719	0.03	0.05	1.19	1.61	5.80	15.42	24.10	24.04	13.96	13.80	0.69
		(표준오차)		(0.03)	(0.05)	(0.25)	(0.32)	(0.64)	(0.96)	(1.00)	(1.13)	(0.88)	(0.88)	(0.04)
	38. 버섯류	분율	2,720	0.00	0.22	1.37	3.76	21.94	24.98	18.54	14.70	5.79	8.70	1.26
		(표준오차)		(-)	(0.14)	(0.25)	(0.46)	(0.99)	(0.95)	(0.98)	(0.85)	(0.64)	(0.69)	(0.04)
해조류	39. 미역	분율	2,720	0.02	0.00	0.25	1.32	13.52	24.56	28.80	20.07	6.83	4.64	0.89
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.13)	(0.26)	(0.78)	(1.00)	(1.05)	(0.98)	(0.61)	(0.51)	(0.02)
	40. 김	분율	2,720	0.24	1.74	8.55	13.60	31.76	23.19	13.45	5.49	1.07	0.92	2.69
		(표준오차)		(0.11)	(0.29)	(0.75)	(0.89)	(1.26)	(0.91)	(0.93)	(0.55)	(0.24)	(0.20)	(0.08)

(계속 : 식품섭취빈도, 남자, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
과일류	41. 귤	분율	2,720	0.02	0.00	0.57	2.31	7.00	26.88	32.71	17.57	7.91	5.04	0.84
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.15)	(0.36)	(0.80)	(1.25)	(1.23)	(0.96)	(0.64)	(0.54)	(0.03)
	42. 감, 곶감	분율	2,720	0.00	0.00	0.16	0.42	1.99	10.78	24.40	23.45	20.07	18.73	0.42
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.14)	(0.41)	(0.82)	(1.09)	(1.02)	(1.05)	(1.09)	(0.02)
	43. 배	분율	2,720	0.00	0.01	0.28	0.41	1.56	7.56	23.18	29.05	23.89	14.06	0.40
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.09)	(0.17)	(0.36)	(0.67)	(1.00)	(1.02)	(1.03)	(0.96)	(0.02)
	44. 수박	분율	2,720	0.00	0.00	0.03	0.18	2.24	17.33	31.84	24.55	15.69	8.14	0.51
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.03)	(0.07)	(0.37)	(1.05)	(1.22)	(1.16)	(0.83)	(0.71)	(0.01)
	45. 참외	분율	2,720	0.00	0.00	0.00	0.11	0.83	8.93	28.46	27.85	19.47	14.34	0.38
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.07)	(0.21)	(0.69)	(1.15)	(0.89)	(0.96)	(0.83)	(0.01)
	46. 딸기	분율	2,720	0.00	0.04	0.08	0.48	0.97	9.11	28.94	28.72	18.91	12.75	0.41
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.06)	(0.21)	(0.25)	(0.86)	(1.06)	(1.07)	(1.02)	(0.84)	(0.02)
	47. 포도	분율	2,720	0.00	0.02	0.26	0.32	2.43	12.26	28.35	26.61	18.02	11.73	0.47
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.12)	(0.16)	(0.39)	(0.87)	(1.00)	(1.05)	(1.02)	(0.82)	(0.02)
	48. 복숭아	분율	2,720	0.06	0.01	0.09	0.25	0.94	6.86	19.94	25.51	23.07	23.27	0.34
		(표준오차)		(0.06)	(0.01)	(0.07)	(0.13)	(0.27)	(0.78)	(0.91)	(1.13)	(1.04)	(1.11)	(0.02)
	49. 사과	분율	2,720	0.00	0.02	2.22	4.95	12.15	23.41	22.84	15.37	11.17	7.87	1.13
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.31)	(0.51)	(0.69)	(1.12)	(1.04)	(0.94)	(0.80)	(0.64)	(0.04)
	50. 바나나	분율	2,720	0.06	0.00	0.61	2.33	10.64	16.40	19.63	19.75	14.77	15.81	0.78
		(표준오차)		(0.06)	(-)	(0.19)	(0.39)	(0.77)	(0.92)	(1.04)	(0.86)	(0.93)	(0.90)	(0.03)
	51. 오렌지	분율	2,719	0.03	0.33	1.67	3.82	14.18	17.09	16.16	16.97	11.26	18.49	1.04
		(표준오차)		(0.03)	(0.15)	(0.33)	(0.48)	(0.86)	(1.02)	(0.87)	(0.96)	(0.77)	(1.03)	(0.04)
우유류	52. 우유	분율	2,720	0.70	1.49	16.36	9.52	18.86	13.57	7.57	8.00	5.54	18.38	2.66
		(표준오차)		(0.27)	(0.27)	(0.94)	(0.69)	(1.03)	(0.80)	(0.60)	(0.66)	(0.53)	(0.92)	(0.09)
	53. 요구르트	분율	2,720	0.11	0.17	4.44	3.47	11.89	15.64	12.25	13.32	8.98	29.74	1.10
		(표준오차)		(0.10)	(0.06)	(0.56)	(0.42)	(0.72)	(0.99)	(0.76)	(0.81)	(0.66)	(1.37)	(0.05)
	54. 아이스크림	분율	2,720	0.05	0.20	0.91	2.68	10.61	18.65	20.36	16.45	12.58	17.52	0.86
		(표준오차)		(0.05)	(0.11)	(0.22)	(0.41)	(0.82)	(0.91)	(0.96)	(0.91)	(0.78)	(1.09)	(0.04)
음료류	55. 탄산음료	분율	2,720	0.04	0.43	2.64	5.33	18.13	15.22	12.76	12.24	9.68	23.53	1.24
		(표준오차)		(0.03)	(0.15)	(0.40)	(0.65)	(0.95)	(0.90)	(0.75)	(0.76)	(0.79)	(1.04)	(0.05)
	56. 커피	분율	2,720	24.70	17.18	18.03	3.60	7.77	5.97	4.41	3.08	2.88	12.38	9.33
		(표준오차)		(1.12)	(0.82)	(0.91)	(0.44)	(0.67)	(0.58)	(0.55)	(0.44)	(0.44)	(0.85)	(0.22)
	57. 녹차	분율	2,720	2.03	2.47	7.88	3.00	9.98	10.43	8.54	10.36	8.36	36.94	1.91
		(표준오차)		(0.35)	(0.33)	(0.69)	(0.47)	(0.77)	(0.82)	(0.68)	(0.84)	(0.68)	(1.44)	(0.10)
주류	58. 맥주	분율	2,720	0.03	0.10	0.79	3.24	18.09	15.40	11.32	10.22	5.69	35.11	0.94
		(표준오차)		(0.03)	(0.06)	(0.20)	(0.43)	(1.00)	(0.98)	(0.79)	(0.70)	(0.65)	(1.40)	(0.04)
	59. 소주	분율	2,720	0.17	0.25	2.83	6.38	22.09	13.80	10.84	8.53	3.63	31.48	1.37
		(표준오차)		(0.07)	(0.11)	(0.39)	(0.61)	(1.00)	(0.81)	(0.70)	(0.65)	(0.43)	(1.28)	(0.05)
	60. 막걸리	분율	2,720	0.18	0.05	0.69	1.19	5.82	7.28	8.42	13.59	9.36	53.42	0.47
		(표준오차)		(0.08)	(0.04)	(0.16)	(0.22)	(0.54)	(0.68)	(0.71)	(0.95)	(0.72)	(1.38)	(0.03)
기타	61. 햄버거	분율	2,720	0.00	0.09	0.00	0.00	1.16	4.25	9.41	17.23	13.53	54.32	0.20
		(표준오차)		(-)	(0.09)	(-)	(-)	(0.28)	(0.53)	(0.79)	(1.00)	(0.85)	(1.36)	(0.02)
	62. 피자	분율	2,720	0.00	0.00	0.00	0.13	0.31	2.85	12.37	23.29	16.50	44.55	0.19
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.10)	(0.11)	(0.48)	(1.06)	(1.13)	(0.99)	(1.50)	(0.01)
	63. 튀긴 음식	분율	2,720	0.02	0.00	0.65	1.48	10.26	16.87	20.59	23.14	11.81	15.17	0.74
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.23)	(0.29)	(0.73)	(0.96)	(0.92)	(0.93)	(0.78)	(0.89)	(0.03)

표 2-I-15. 식품섭취빈도 : 여자, 만12세이상, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명 \ 섭취빈도			N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	3,667	52.72	40.22	6.09	0.17	0.22	0.08	0.02	0.15	0.14	0.20	17.14
		(표준오차)		(1.36)	(1.23)	(0.57)	(0.10)	(0.09)	(0.04)	(0.02)	(0.06)	(0.07)	(0.09)	(0.12)
	2. 보리/ 잡곡	분율	3,664	27.22	28.49	14.50	3.46	6.00	4.11	3.86	2.13	3.10	7.14	11.12
		(표준오차)		(0.96)	(1.06)	(0.83)	(0.43)	(0.49)	(0.45)	(0.44)	(0.36)	(0.39)	(0.63)	(0.19)
	3. 라면	분율	3,667	0.00	0.02	0.09	1.09	12.88	21.75	21.46	14.99	10.95	16.78	0.78
		(표준오차)		(-)[2]	(0.02)	(0.06)	(0.23)	(0.81)	(1.00)	(0.90)	(0.62)	(0.68)	(0.79)	(0.02)
	4. 국수	분율	3,667	0.00	0.00	0.28	0.88	8.37	18.31	24.61	24.11	14.08	9.37	0.68
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.11)	(0.22)	(0.56)	(0.89)	(0.85)	(0.84)	(0.74)	(0.62)	(0.02)
	5. 빵류	분율	3,666	0.00	0.12	3.05	4.02	17.97	22.18	18.20	14.68	8.91	10.88	1.26
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.43)	(0.43)	(0.77)	(1.02)	(0.77)	(0.78)	(0.61)	(0.85)	(0.04)
	6. 떡류	분율	3,666	0.00	0.00	0.45	1.14	11.14	19.25	24.32	21.10	14.37	8.22	0.77
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.12)	(0.23)	(0.72)	(0.79)	(0.92)	(0.85)	(0.74)	(0.74)	(0.02)
	7. 과자류	분율	3,666	0.10	0.47	2.66	6.09	18.26	14.07	13.10	13.60	11.50	20.16	1.30
		(표준오차)		(0.09)	(0.17)	(0.41)	(0.53)	(0.85)	(0.70)	(0.78)	(0.64)	(0.64)	(0.98)	(0.06)
두류·서류	8. 두부	분율	3,667	0.04	0.35	2.29	7.79	31.16	24.80	16.19	9.06	4.13	4.18	1.76
		(표준오차)		(0.04)	(0.13)	(0.37)	(0.52)	(0.94)	(1.07)	(0.83)	(0.61)	(0.51)	(0.45)	(0.05)
	9. 콩류	분율	3,665	14.40	14.80	8.75	4.82	10.92	10.06	9.09	8.80	5.60	12.76	6.41
		(표준오차)		(0.74)	(0.76)	(0.63)	(0.40)	(0.60)	(0.62)	(0.60)	(0.64)	(0.51)	(0.86)	(0.19)
	10. 두유	분율	3,666	0.02	0.13	1.47	1.52	4.00	5.11	7.66	9.60	14.78	55.71	0.44
		(표준오차)		(0.02)	(0.07)	(0.26)	(0.25)	(0.40)	(0.43)	(0.64)	(0.56)	(0.81)	(1.18)	(0.03)
	11. 감자	분율	3,667	0.00	0.06	0.49	3.08	16.08	24.06	26.42	17.51	7.96	4.32	1.05
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.15)	(0.43)	(1.02)	(0.93)	(0.94)	(0.93)	(0.62)	(0.47)	(0.04)
	12. 고구마	분율	3,667	0.00	0.00	0.47	1.41	6.08	18.51	27.89	23.18	14.27	8.18	0.68
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.12)	(0.24)	(0.53)	(0.83)	(0.87)	(0.85)	(0.72)	(0.65)	(0.02)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	3,667	0.00	0.03	0.40	2.05	14.69	19.69	23.73	17.31	11.53	10.58	0.90
		(표준오차)		(-)	(0.03)	(0.17)	(0.30)	(0.75)	(0.91)	(1.03)	(0.77)	(0.70)	(0.78)	(0.03)
	14. 닭고기	분율	3,667	0.00	0.00	0.08	1.76	11.02	22.07	27.94	17.09	9.24	10.80	0.81
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.05)	(0.30)	(0.66)	(0.85)	(0.84)	(0.70)	(0.59)	(0.71)	(0.02)
	15. 돼지고기	분율	3,666	0.08	0.03	0.74	3.83	24.26	26.97	23.88	10.13	5.24	4.84	1.31
		(표준오차)		(0.08)	(0.03)	(0.20)	(0.46)	(1.05)	(0.99)	(0.96)	(0.67)	(0.45)	(0.43)	(0.05)
	16. 햄,소시지	분율	3,667	0.00	0.00	0.45	1.13	7.58	14.56	14.77	12.25	8.80	40.45	0.55
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.16)	(0.22)	(0.61)	(0.77)	(0.83)	(0.74)	(0.62)	(1.43)	(0.02)
	17. 달걀	분율	3,667	0.03	0.22	8.38	14.40	34.85	17.52	11.27	5.54	3.18	4.60	2.47
		(표준오차)		(0.03)	(0.07)	(0.73)	(0.77)	(1.05)	(0.81)	(0.60)	(0.42)	(0.36)	(0.43)	(0.05)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 여자, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	3,666	0.00	0.00	0.17	1.04	9.65	21.08	26.25	20.08	9.61	12.13	0.73
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.24)	(0.70)	(0.82)	(0.93)	(0.94)	(0.63)	(0.77)	(0.02)
	19. 참치	분율	3,667	0.00	0.02	0.07	0.60	7.04	13.83	22.19	17.15	9.76	29.34	0.54
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.04)	(0.17)	(0.73)	(0.60)	(0.81)	(0.78)	(0.67)	(1.33)	(0.02)
	20. 조기	분율	3,667	0.00	0.00	0.05	0.58	6.80	12.36	22.21	22.05	16.27	19.68	0.53
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.03)	(0.14)	(0.50)	(0.74)	(0.93)	(0.78)	(0.81)	(0.99)	(0.02)
	21. 명태	분율	3,667	0.00	0.00	0.10	0.24	3.13	9.34	21.45	24.13	19.22	22.39	0.40
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.08)	(0.09)	(0.35)	(0.53)	(0.84)	(0.89)	(0.90)	(1.08)	(0.01)
	22. 멸치	분율	3,662	0.37	1.41	6.68	9.98	20.11	16.72	16.77	12.45	6.43	9.08	2.05
		(표준오차)		(0.09)	(0.24)	(0.53)	(0.63)	(0.82)	(0.85)	(0.82)	(0.75)	(0.50)	(0.68)	(0.06)
	23. 어묵류	분율	3,667	0.00	0.02	0.36	1.01	9.57	18.71	21.97	17.72	10.32	20.30	0.69
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.14)	(0.22)	(0.58)	(0.80)	(0.91)	(0.81)	(0.70)	(0.96)	(0.02)
	24. 오징어	분율	3,667	0.00	0.00	0.19	0.68	5.24	11.63	21.27	21.87	14.98	24.14	0.49
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.19)	(0.51)	(0.74)	(0.88)	(0.83)	(0.75)	(0.87)	(0.02)
	25. 조개류	분율	3,667	0.00	0.00	0.15	0.71	3.97	9.76	18.97	22.22	16.81	27.41	0.43
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.10)	(0.18)	(0.45)	(0.69)	(0.99)	(0.89)	(0.84)	(1.30)	(0.02)
	26. 젓갈류	분율	3,667	0.16	0.02	0.68	1.18	4.43	7.43	9.49	15.51	16.06	45.04	0.44
		(표준오차)		(0.08)	(0.02)	(0.15)	(0.21)	(0.42)	(0.55)	(0.60)	(0.67)	(0.85)	(1.21)	(0.03)
채소류	27. 배추	분율	3,667	35.93	31.70	18.52	4.07	6.00	1.83	0.80	0.34	0.50	0.31	13.66
		(표준오차)		(1.36)	(1.12)	(0.94)	(0.44)	(0.50)	(0.27)	(0.21)	(0.10)	(0.17)	(0.11)	(0.18)
	28. 무	분율	3,667	4.32	6.46	17.51	11.96	24.92	16.70	8.53	5.14	1.81	2.65	4.49
		(표준오차)		(0.54)	(0.54)	(1.02)	(0.69)	(0.94)	(0.70)	(0.51)	(0.48)	(0.29)	(0.44)	(0.13)
	29. 무청	분율	3,664	0.41	0.57	4.86	6.83	17.07	18.63	19.43	13.79	8.14	10.27	1.62
		(표준오차)		(0.13)	(0.14)	(0.54)	(0.66)	(0.87)	(0.75)	(0.79)	(0.70)	(0.62)	(0.87)	(0.06)
	30. 콩나물	분율	3,667	0.00	0.08	0.61	3.57	25.02	29.76	23.47	10.58	4.09	2.81	1.32
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.16)	(0.41)	(0.91)	(0.91)	(0.81)	(0.64)	(0.47)	(0.33)	(0.03)
	31. 시금치	분율	3,667	0.00	0.00	0.37	0.80	10.40	19.34	27.10	19.43	11.91	10.66	0.74
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.18)	(0.19)	(0.81)	(0.95)	(0.91)	(0.87)	(0.81)	(0.72)	(0.03)
	32. 오이	분율	3,667	0.04	0.15	1.17	4.15	15.27	26.34	28.42	14.46	5.72	4.28	1.17
		(표준오차)		(0.03)	(0.07)	(0.23)	(0.55)	(0.95)	(0.90)	(1.03)	(0.90)	(0.51)	(0.50)	(0.04)
	33. 고추	분율	3,664	0.08	0.26	2.85	5.12	14.19	22.56	20.27	13.51	5.76	15.40	1.25
		(표준오차)		(0.05)	(0.09)	(0.36)	(0.54)	(0.77)	(0.87)	(0.82)	(0.77)	(0.50)	(0.92)	(0.04)
	34. 당근	분율	3,667	0.05	0.03	0.84	1.19	5.21	10.50	10.97	10.65	10.62	49.93	0.47
		(표준오차)		(0.04)	(0.02)	(0.19)	(0.19)	(0.55)	(0.66)	(0.71)	(0.59)	(0.81)	(1.49)	(0.03)
	35. 호박	분율	3,666	0.13	0.09	0.38	1.88	13.03	21.72	27.43	17.82	7.85	9.66	0.92
		(표준오차)		(0.10)	(0.05)	(0.14)	(0.31)	(0.71)	(0.91)	(0.95)	(0.80)	(0.55)	(0.71)	(0.03)
	36. 양배추	분율	3,667	0.04	0.18	1.00	1.55	6.64	13.85	23.40	20.78	13.87	18.70	0.69
		(표준오차)		(0.04)	(0.08)	(0.22)	(0.27)	(0.58)	(0.75)	(1.04)	(0.85)	(0.80)	(1.11)	(0.03)
	37. 토마토	분율	3,667	0.00	0.10	1.28	2.52	7.68	20.34	25.59	18.84	12.66	10.98	0.84
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.24)	(0.35)	(0.64)	(0.89)	(0.97)	(0.82)	(0.73)	(0.73)	(0.04)
	38. 버섯류	분율	3,667	0.07	0.20	1.51	3.99	22.02	23.28	19.59	13.17	6.73	9.43	1.29
		(표준오차)		(0.05)	(0.08)	(0.21)	(0.43)	(0.85)	(0.87)	(0.81)	(0.66)	(0.61)	(0.66)	(0.04)
해조류	39. 미역	분율	3,667	0.00	0.02	0.50	1.94	13.76	25.75	31.84	16.26	6.39	3.54	0.97
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.17)	(0.28)	(0.69)	(0.86)	(0.98)	(0.81)	(0.51)	(0.40)	(0.02)
	40. 김	분율	3,667	0.64	1.85	10.76	14.37	29.38	21.61	12.62	5.05	1.93	1.79	2.90
		(표준오차)		(0.18)	(0.29)	(0.82)	(0.78)	(0.90)	(0.94)	(0.80)	(0.50)	(0.36)	(0.32)	(0.09)

(계속 : 식품섭취빈도, 여자, 만12세이상, 2010)

식품 및 음식명 \ 섭취빈도			N	1일		1주			1개월			1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
과일류	41. 귤	분율	3,667	0.10	0.00	1.27	5.14	10.62	36.50	26.13	10.91	6.04	3.30	1.18
		(표준오차)		(0.07)	(-)	(0.33)	(0.68)	(0.98)	(1.30)	(0.90)	(0.71)	(0.56)	(0.36)	(0.06)
	42. 감, 곶감	분율	3,667	0.00	0.00	0.09	1.15	4.11	20.56	25.00	17.89	17.21	13.97	0.59
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.24)	(0.50)	(1.04)	(0.89)	(0.73)	(0.96)	(0.80)	(0.02)
	43. 배	분율	3,667	0.00	0.00	0.16	0.69	2.57	11.07	21.01	24.54	25.87	14.09	0.44
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.18)	(0.29)	(0.73)	(0.91)	(1.11)	(1.03)	(0.84)	(0.01)
	44. 수박	분율	3,667	0.00	0.00	0.15	1.24	4.24	24.23	29.81	19.04	13.14	8.16	0.66
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.25)	(0.60)	(1.10)	(0.89)	(0.92)	(0.78)	(0.60)	(0.02)
	45. 참외	분율	3,667	0.00	0.00	0.04	0.38	2.21	16.48	28.61	21.83	18.45	12.01	0.49
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.13)	(0.36)	(0.94)	(1.00)	(0.92)	(0.84)	(0.84)	(0.01)
	46. 딸기	분율	3,667	0.00	0.00	0.12	0.89	2.72	15.29	30.05	22.54	17.11	11.27	0.53
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.32)	(0.43)	(1.11)	(1.11)	(0.91)	(0.88)	(0.79)	(0.02)
	47. 포도	분율	3,666	0.00	0.00	0.40	1.05	4.04	19.17	29.29	20.42	15.39	10.23	0.62
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.18)	(0.22)	(0.43)	(0.92)	(0.93)	(0.72)	(0.71)	(0.71)	(0.02)
	48. 복숭아	분율	3,667	0.00	0.00	0.10	0.50	1.62	10.74	22.91	21.72	20.35	22.05	0.40
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.16)	(0.28)	(0.70)	(0.89)	(0.85)	(0.83)	(1.02)	(0.01)
	49. 사과	분율	3,664	0.03	0.14	4.43	8.60	18.29	21.28	19.22	11.61	10.30	6.09	1.59
		(표준오차)		(0.02)	(0.05)	(0.48)	(0.61)	(0.91)	(0.90)	(0.85)	(0.81)	(0.61)	(0.54)	(0.05)
	50. 바나나	분율	3,667	0.02	0.00	1.62	2.92	12.09	18.01	19.22	17.43	13.80	14.89	0.92
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.31)	(0.36)	(0.71)	(0.84)	(0.93)	(0.76)	(0.84)	(0.86)	(0.03)
	51. 오렌지	분율	3,667	0.00	0.06	2.02	2.98	12.62	14.67	17.14	17.00	12.53	20.99	0.92
		(표준오차)		(-)	(0.03)	(0.34)	(0.34)	(0.76)	(0.72)	(0.78)	(0.75)	(0.72)	(1.04)	(0.03)
우유류	52. 우유	분율	3,666	0.49	1.93	20.02	10.00	19.17	11.22	7.83	5.63	5.44	18.26	2.93
		(표준오차)		(0.14)	(0.31)	(1.01)	(0.67)	(0.79)	(0.61)	(0.52)	(0.48)	(0.42)	(0.97)	(0.08)
	53. 요구르트	분율	3,667	0.00	0.39	6.15	3.55	15.97	14.73	12.47	11.37	9.00	26.37	1.32
		(표준오차)		(-)	(0.12)	(0.62)	(0.41)	(0.93)	(0.72)	(0.61)	(0.54)	(0.65)	(1.32)	(0.06)
	54. 아이스크림	분율	3,667	0.00	0.05	0.61	1.82	7.86	14.93	17.61	16.54	17.47	23.10	0.65
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.18)	(0.26)	(0.68)	(0.81)	(0.80)	(0.95)	(0.87)	(0.90)	(0.03)
음료류	55. 탄산음료	분율	3,667	0.01	0.19	1.04	2.21	8.25	10.73	12.37	12.81	13.72	38.67	0.65
		(표준오차)		(0.01)	(0.11)	(0.21)	(0.31)	(0.57)	(0.65)	(0.77)	(0.69)	(0.83)	(1.05)	(0.03)
	56. 커피	분율	3,667	12.19	19.74	23.28	5.03	8.26	5.21	3.63	2.96	3.37	16.31	7.50
		(표준오차)		(0.75)	(0.87)	(0.90)	(0.53)	(0.55)	(0.42)	(0.37)	(0.34)	(0.38)	(0.80)	(0.15)
	57. 녹차	분율	3,665	2.33	1.50	6.65	2.26	10.86	8.69	8.51	8.04	9.94	41.22	1.72
		(표준오차)		(0.41)	(0.26)	(0.56)	(0.29)	(0.62)	(0.62)	(0.61)	(0.52)	(0.70)	(1.38)	(0.10)
주류	58. 맥주	분율	3,667	0.00	0.00	0.41	1.04	4.99	8.68	9.15	10.34	8.08	57.31	0.38
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.14)	(0.21)	(0.51)	(0.63)	(0.65)	(0.60)	(0.52)	(1.10)	(0.02)
	59. 소주	분율	3,667	0.00	0.01	0.26	0.62	4.38	5.53	8.56	7.97	6.90	65.76	0.29
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.13)	(0.16)	(0.53)	(0.55)	(0.61)	(0.52)	(0.51)	(1.12)	(0.02)
	60. 막걸리	분율	3,666	0.00	0.06	0.11	0.03	1.06	2.73	4.17	5.56	6.65	79.63	0.12
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.07)	(0.03)	(0.21)	(0.44)	(0.44)	(0.45)	(0.50)	(0.92)	(0.01)
기타	61. 햄버거	분율	3,667	0.00	0.00	0.09	0.08	0.69	2.78	9.19	14.49	15.02	57.66	0.17
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.06)	(0.21)	(0.48)	(0.64)	(0.80)	(0.76)	(1.36)	(0.01)
	62. 피자	분율	3,667	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	2.27	11.47	22.97	19.88	43.17	0.18
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.07)	(0.08)	(0.33)	(0.82)	(1.08)	(1.00)	(1.53)	(0.01)
	63. 튀긴 음식	분율	3,667	0.02	0.00	0.47	1.30	6.25	11.17	20.67	23.01	16.58	20.54	0.57
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.17)	(0.25)	(0.61)	(0.73)	(0.89)	(0.76)	(0.76)	(1.01)	(0.02)

표 2-I-16. 식품섭취빈도 : 전체, 만12-18세, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명 \ 섭취빈도			N	1일				1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	685	59.40	37.62	2.72	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
		(표준오차)		(2.70)	(2.62)	(1.02)	(0.19)	(-)[2]	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.22)
	2. 보리/ 잡곡	분율	685	13.92	32.35	23.64	5.71	11.36	4.68	3.45	2.36	0.64	1.88	9.75
		(표준오차)		(1.94)	(2.32)	(1.90)	(1.18)	(1.54)	(0.95)	(0.78)	(0.82)	(0.49)	(0.60)	(0.37)
	3. 라면	분율	685	0.00	0.00	2.22	5.17	35.05	28.10	19.31	6.96	2.30	0.88	1.70
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.84)	(1.15)	(2.36)	(2.04)	(1.64)	(1.31)	(0.84)	(0.40)	(0.07)
	4. 국수	분율	685	0.00	0.00	0.17	0.31	7.03	20.21	27.67	28.96	10.61	5.05	0.65
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.17)	(0.24)	(1.39)	(1.99)	(2.30)	(2.19)	(1.52)	(1.08)	(0.03)
	5. 빵류	분율	685	0.28	0.75	4.05	9.15	27.58	23.50	19.62	8.41	2.73	3.94	1.97
		(표준오차)		(0.20)	(0.54)	(1.19)	(1.42)	(2.10)	(1.78)	(1.92)	(1.27)	(0.68)	(1.09)	(0.13)
	6. 떡류	분율	685	0.00	0.00	0.42	2.68	16.50	23.66	23.41	18.90	6.81	7.63	1.00
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.30)	(0.70)	(1.48)	(1.82)	(1.87)	(1.98)	(1.20)	(1.22)	(0.05)
	7. 과자류	분율	685	0.56	0.75	5.35	18.23	34.90	15.53	11.60	6.34	3.21	3.53	2.62
		(표준오차)		(0.39)	(0.45)	(1.05)	(1.64)	(2.38)	(1.67)	(1.64)	(1.09)	(0.89)	(0.82)	(0.14)
두류·서류	8. 두부	분율	685	0.00	1.07	2.35	10.55	34.14	20.94	14.89	9.11	3.00	3.96	2.02
		(표준오차)		(-)	(0.43)	(0.78)	(1.24)	(2.15)	(2.13)	(1.69)	(1.17)	(0.78)	(0.81)	(0.09)
	9. 콩류	분율	685	1.04	10.41	8.16	5.15	18.41	17.50	11.03	11.32	5.22	11.76	3.24
		(표준오차)		(0.38)	(1.56)	(1.34)	(0.97)	(1.79)	(1.78)	(1.56)	(1.52)	(1.11)	(1.75)	(0.23)
	10. 두유	분율	685	0.15	0.07	1.41	0.83	4.92	3.60	8.00	10.97	13.60	56.45	0.43
		(표준오차)		(0.15)	(0.07)	(0.51)	(0.49)	(1.38)	(0.85)	(1.24)	(1.60)	(1.55)	(2.84)	(0.06)
	11. 감자	분율	685	0.00	0.00	1.08	5.06	29.92	22.97	21.40	11.59	3.11	4.87	1.46
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.47)	(1.26)	(2.41)	(2.14)	(2.02)	(1.69)	(0.81)	(1.02)	(0.08)
	12. 고구마	분율	685	0.00	0.02	0.39	1.29	6.55	15.06	28.73	25.15	13.17	9.64	0.65
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.37)	(0.64)	(1.27)	(1.62)	(2.34)	(1.98)	(1.67)	(1.41)	(0.05)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	685	0.00	0.12	1.57	9.59	37.36	23.52	17.57	6.00	2.16	2.10	1.90
		(표준오차)		(-)	(0.12)	(0.75)	(1.24)	(2.57)	(1.86)	(1.74)	(1.08)	(0.72)	(0.68)	(0.07)
	14. 닭고기	분율	685	0.00	0.00	0.25	6.04	33.35	30.88	20.52	7.81	0.73	0.42	1.60
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.13)	(1.05)	(2.65)	(2.38)	(2.15)	(1.21)	(0.31)	(0.25)	(0.07)
	15. 돼지고기	분율	685	0.35	0.19	0.79	13.41	45.65	23.35	10.77	4.57	0.55	0.38	2.27
		(표준오차)		(0.34)	(0.14)	(0.32)	(2.00)	(2.22)	(1.88)	(1.49)	(1.15)	(0.28)	(0.23)	(0.11)
	16. 햄,소시지	분율	685	0.00	0.55	0.74	6.81	27.32	26.01	21.27	11.63	2.39	3.29	1.57
		(표준오차)		(-)	(0.44)	(0.44)	(1.10)	(2.19)	(2.11)	(2.03)	(1.83)	(0.67)	(0.90)	(0.08)
	17. 달걀	분율	685	0.17	0.94	8.31	20.55	35.81	18.30	10.17	3.68	1.09	0.99	2.92
		(표준오차)		(0.17)	(0.47)	(1.26)	(1.64)	(2.23)	(1.88)	(1.48)	(0.94)	(0.48)	(0.40)	(0.10)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12~18세, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	685	0.00	0.00	0.00	1.17	11.86	25.24	28.20	18.14	7.22	8.19	0.82
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.51)	(1.37)	(1.82)	(1.90)	(1.92)	(1.65)	(1.11)	(0.04)
	19. 참치	분율	685	0.00	0.00	0.35	3.23	13.19	19.40	30.49	17.62	7.17	8.56	0.94
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.21)	(0.96)	(1.73)	(1.84)	(2.21)	(1.78)	(1.19)	(1.42)	(0.05)
	20. 조기	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.25	5.43	10.84	20.90	25.04	13.39	24.16	0.46
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.19)	(1.11)	(1.08)	(1.85)	(2.10)	(1.59)	(2.45)	(0.03)
	21. 명태	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.26	1.82	8.09	18.64	22.36	11.98	36.86	0.32
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.20)	(0.62)	(1.28)	(1.76)	(2.13)	(1.49)	(2.43)	(0.02)
	22. 멸치	분율	685	0.28	1.04	2.78	6.36	19.86	18.71	17.15	15.61	7.90	10.29	1.55
		(표준오차)		(0.28)	(0.48)	(0.69)	(1.04)	(1.83)	(1.84)	(1.84)	(2.20)	(1.38)	(1.46)	(0.10)
	23. 어묵류	분율	685	0.00	0.52	0.80	2.62	19.93	22.48	28.28	16.76	4.06	4.56	1.19
		(표준오차)		(-)	(0.43)	(0.42)	(0.89)	(2.17)	(2.11)	(2.49)	(2.21)	(1.00)	(1.19)	(0.08)
	24. 오징어	분율	685	0.00	0.00	0.27	1.63	11.93	15.43	29.28	20.46	9.84	11.17	0.79
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.17)	(0.60)	(1.52)	(1.75)	(2.43)	(1.88)	(1.33)	(1.55)	(0.04)
	25. 조개류	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.25	3.89	10.73	21.81	23.69	14.97	24.66	0.42
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.19)	(0.94)	(1.73)	(1.78)	(2.17)	(1.73)	(2.04)	(0.03)
	26. 젓갈류	분율	685	0.00	0.21	0.37	0.42	6.22	9.62	12.03	19.84	15.05	36.24	0.47
		(표준오차)		(-)	(0.21)	(0.27)	(0.27)	(1.03)	(1.71)	(1.72)	(1.60)	(1.68)	(2.30)	(0.05)
채소류	27. 배추	분율	685	23.15	32.34	22.19	6.93	8.79	3.91	0.83	0.51	0.34	1.02	11.55
		(표준오차)		(2.00)	(2.26)	(2.34)	(0.97)	(1.57)	(0.89)	(0.32)	(0.28)	(0.20)	(0.48)	(0.35)
	28. 무	분율	684	1.27	6.33	18.83	13.80	29.85	13.22	8.27	3.96	1.38	3.11	4.10
		(표준오차)		(0.46)	(1.04)	(2.17)	(1.65)	(2.22)	(1.63)	(1.21)	(1.02)	(0.55)	(0.75)	(0.20)
	29. 무청	분율	685	0.25	0.95	4.53	4.61	16.94	16.58	14.76	16.30	7.59	17.48	1.46
		(표준오차)		(0.26)	(0.45)	(0.98)	(1.01)	(2.08)	(1.59)	(1.84)	(1.76)	(1.32)	(2.31)	(0.12)
	30. 콩나물	분율	685	0.07	0.29	1.12	6.59	34.51	27.11	19.41	7.98	1.51	1.43	1.73
		(표준오차)		(0.07)	(0.18)	(0.39)	(1.13)	(2.14)	(1.85)	(1.54)	(1.17)	(0.58)	(0.52)	(0.06)
	31. 시금치	분율	685	0.00	0.00	0.76	1.36	17.37	21.65	26.92	14.07	5.50	12.37	0.97
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.42)	(0.42)	(1.84)	(1.76)	(2.15)	(1.47)	(1.01)	(1.74)	(0.06)
	32. 오이	분율	685	0.21	0.00	0.48	2.63	16.59	23.76	24.14	16.03	5.39	10.77	1.05
		(표준오차)		(0.21)	(-)	(0.36)	(0.88)	(2.00)	(1.85)	(2.02)	(1.81)	(0.92)	(1.74)	(0.08)
	33. 고추	분율	685	0.04	0.14	0.15	2.49	7.20	13.40	14.99	13.32	7.75	40.52	0.61
		(표준오차)		(0.04)	(0.11)	(0.15)	(0.79)	(1.35)	(2.09)	(1.51)	(1.43)	(1.17)	(2.65)	(0.05)
	34. 당근	분율	685	0.00	0.00	0.24	0.50	5.57	9.08	9.48	12.47	11.26	51.40	0.37
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.17)	(0.23)	(1.03)	(1.24)	(1.46)	(1.73)	(1.72)	(3.12)	(0.03)
	35. 호박	분율	685	0.00	0.00	0.00	1.70	7.06	12.56	18.74	21.28	13.66	24.99	0.57
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.70)	(1.24)	(1.56)	(2.09)	(1.86)	(1.55)	(2.19)	(0.05)
	36. 양배추	분율	685	0.00	0.46	1.19	3.02	10.59	14.01	23.66	19.63	11.81	15.62	0.91
		(표준오차)		(-)	(0.36)	(0.48)	(0.87)	(1.46)	(1.85)	(1.88)	(1.69)	(1.58)	(1.57)	(0.06)
	37. 토마토	분율	685	0.00	0.00	0.75	1.77	3.79	14.17	23.38	25.86	15.48	14.80	0.60
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.35)	(0.58)	(0.78)	(1.85)	(1.82)	(1.85)	(1.94)	(1.74)	(0.04)
	38. 버섯류	분율	685	0.00	0.00	0.51	2.45	21.09	23.65	19.90	15.62	3.81	12.98	1.08
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.26)	(0.56)	(2.08)	(1.81)	(2.38)	(1.97)	(0.99)	(1.38)	(0.05)
해조류	39. 미역	분율	685	0.07	0.00	0.16	1.11	13.62	22.53	28.75	21.44	8.26	4.05	0.88
		(표준오차)		(0.07)	(-)	(0.16)	(0.53)	(1.57)	(2.12)	(2.38)	(2.19)	(1.33)	(0.92)	(0.05)
	40. 김	분율	685	0.14	3.47	8.66	13.34	26.69	24.09	14.02	6.36	2.54	0.69	2.80
		(표준오차)		(0.14)	(0.82)	(1.45)	(1.47)	(2.16)	(1.98)	(1.37)	(1.24)	(0.86)	(0.30)	(0.16)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12~18세, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일				1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
과일류	41. 귤	분율	685	0.07	0.00	1.25	8.83	13.90	39.57	18.26	10.38	5.79	1.95	1.43
		(표준오차)		(0.07)	(-)	(0.51)	(1.51)	(2.11)	(2.97)	(1.70)	(1.83)	(1.22)	(0.69)	(0.11)
	42. 감, 곶감	분율	685	0.00	0.00	0.00	1.20	2.37	10.54	25.48	19.50	20.18	20.74	0.45
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.48)	(0.76)	(1.57)	(2.15)	(2.10)	(2.28)	(2.33)	(0.04)
	43. 배	분율	685	0.00	0.00	0.29	0.45	1.70	10.87	23.91	25.34	22.76	14.68	0.43
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.21)	(0.35)	(0.51)	(1.54)	(2.04)	(2.41)	(2.42)	(2.04)	(0.03)
	44. 수박	분율	685	0.00	0.00	0.13	1.45	4.51	20.45	31.67	21.39	12.11	8.27	0.65
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.13)	(0.50)	(1.25)	(2.10)	(2.22)	(2.05)	(1.95)	(1.27)	(0.04)
	45. 참외	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.13	1.85	13.16	27.76	23.32	16.11	17.67	0.42
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.13)	(0.64)	(1.60)	(2.30)	(2.14)	(1.95)	(2.11)	(0.02)
	46. 딸기	분율	685	0.00	0.00	0.12	0.92	1.72	15.01	31.27	22.27	17.65	11.04	0.51
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.12)	(0.46)	(0.60)	(2.60)	(2.36)	(2.20)	(1.83)	(1.88)	(0.03)
	47. 포도	분율	685	0.00	0.00	0.21	0.91	3.05	14.51	28.98	24.40	17.44	10.51	0.53
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.15)	(0.48)	(0.97)	(1.76)	(2.22)	(2.24)	(2.21)	(1.67)	(0.03)
	48. 복숭아	분율	685	0.25	0.00	0.12	0.94	1.70	9.60	19.22	24.50	18.24	25.42	0.44
		(표준오차)		(0.25)	(-)	(0.12)	(0.53)	(0.54)	(1.59)	(1.91)	(2.14)	(1.85)	(2.00)	(0.06)
	49. 사과	분율	685	0.07	0.00	3.56	7.34	18.01	26.11	21.64	11.53	7.80	3.95	1.51
		(표준오차)		(0.07)	(-)	(0.80)	(1.15)	(1.91)	(2.46)	(2.10)	(1.58)	(1.41)	(0.90)	(0.09)
	50. 바나나	분율	685	0.32	0.00	1.51	4.85	18.23	17.08	23.63	18.62	8.89	6.87	1.24
		(표준오차)		(0.26)	(-)	(0.57)	(1.10)	(2.07)	(1.58)	(2.18)	(1.74)	(1.45)	(1.23)	(0.09)
	51. 오렌지	분율	685	0.12	0.46	2.96	7.96	21.50	17.93	18.27	15.32	8.40	7.09	1.57
		(표준오차)		(0.12)	(0.42)	(0.74)	(1.40)	(1.91)	(1.75)	(2.19)	(1.32)	(1.37)	(1.44)	(0.09)
우유류	52. 우유	분율	685	2.46	4.80	25.16	18.57	20.62	11.38	5.76	4.16	3.21	3.87	4.56
		(표준오차)		(0.71)	(0.97)	(2.35)	(1.88)	(1.87)	(1.42)	(1.09)	(0.88)	(1.05)	(0.80)	(0.19)
	53. 요구르트	분율	685	0.48	0.41	5.62	6.71	19.57	17.25	16.14	14.69	7.38	11.75	1.69
		(표준오차)		(0.42)	(0.20)	(1.11)	(1.04)	(1.62)	(1.88)	(1.56)	(1.71)	(1.21)	(1.73)	(0.12)
	54. 아이스크림	분율	685	0.00	0.91	3.64	10.70	28.44	29.33	16.86	6.40	2.61	1.10	2.04
		(표준오차)		(-)	(0.50)	(0.98)	(1.47)	(2.36)	(2.03)	(1.69)	(1.08)	(0.70)	(0.52)	(0.11)
음료류	55. 탄산음료	분율	685	0.00	0.71	2.95	8.99	25.36	22.21	13.32	12.21	8.23	6.02	1.73
		(표준오차)		(-)	(0.46)	(0.83)	(1.38)	(2.10)	(1.92)	(1.50)	(1.48)	(1.44)	(0.99)	(0.09)
	56. 커피	분율	685	0.25	0.39	3.92	3.92	8.44	12.38	9.48	8.32	11.18	41.72	1.00
		(표준오차)		(0.26)	(0.27)	(1.07)	(1.10)	(1.42)	(1.76)	(1.53)	(1.18)	(1.43)	(2.33)	(0.10)
	57. 녹차	분율	685	0.77	0.24	0.89	1.19	5.27	4.31	10.87	10.49	12.62	53.35	0.60
		(표준오차)		(0.51)	(0.19)	(0.35)	(0.51)	(1.13)	(0.93)	(1.61)	(1.60)	(1.45)	(2.74)	(0.11)
주류	58. 맥주	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.35	2.02	2.43	2.92	89.57	0.08
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(0.76)	(0.61)	(0.76)	(0.83)	(0.94)	(1.51)	(0.02)
	59. 소주	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.43	2.12	3.07	2.15	89.52	0.08
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(0.73)	(0.66)	(0.73)	(0.91)	(0.84)	(1.54)	(0.02)
	60. 막걸리	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	1.20	1.05	1.19	2.12	94.32	0.03
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(0.12)	(0.67)	(0.53)	(0.64)	(0.74)	(1.29)	(0.01)
기타	61. 햄버거	분율	685	0.00	0.42	0.00	0.00	1.52	7.32	19.97	27.96	22.54	20.27	0.39
		(표준오차)		(-)	(0.41)	(-)	(-)	(0.53)	(1.30)	(1.93)	(2.07)	(1.84)	(2.10)	(0.06)
	62. 피자	분율	685	0.00	0.00	0.00	0.56	0.63	5.27	25.16	34.73	20.26	13.39	0.35
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.44)	(0.29)	(1.36)	(1.84)	(2.08)	(2.00)	(1.44)	(0.02)
	63. 튀긴 음식	분율	685	0.11	0.00	0.34	5.84	18.93	25.55	27.90	14.97	5.04	1.32	1.27
		(표준오차)		(0.11)	(-)	(0.22)	(1.23)	(2.08)	(2.24)	(2.10)	(1.84)	(1.19)	(0.51)	(0.07)

표 2-I-17. 식품섭취빈도 : 전체, 만19-64세, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	4,438	50.19	43.02	5.96	0.18	0.20	0.09	0.05	0.11	0.08	0.12	17.00
		(표준오차)		(1.16)	(0.96)	(0.53)	(0.09)	(0.08)	(0.05)	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.06)	(0.11)
	2. 보리/ 잡곡	분율	4,435	19.26	25.96	18.79	3.29	6.34	5.71	4.81	3.50	4.38	7.96	9.42
		(표준오차)		(0.82)	(0.80)	(0.67)	(0.35)	(0.50)	(0.46)	(0.48)	(0.41)	(0.48)	(0.61)	(0.18)
	3. 라면	분율	4,438	0.00	0.06	0.45	2.54	19.06	26.02	21.70	12.70	8.09	9.38	1.07
		(표준오차)		(-)[2]	(0.05)	(0.15)	(0.35)	(0.90)	(0.84)	(0.78)	(0.59)	(0.54)	(0.52)	(0.03)
	4. 국수	분율	4,438	0.00	0.00	0.35	1.29	10.72	23.55	24.52	21.72	11.16	6.70	0.80
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.13)	(0.22)	(0.59)	(0.91)	(0.68)	(0.75)	(0.65)	(0.53)	(0.02)
	5. 빵류	분율	4,437	0.00	0.04	2.72	3.92	17.19	22.81	18.28	15.77	9.17	10.09	1.21
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.32)	(0.38)	(0.82)	(0.92)	(0.73)	(0.74)	(0.59)	(0.59)	(0.04)
	6. 떡류	분율	4,437	0.00	0.00	0.34	0.73	8.08	16.63	20.98	24.66	16.19	12.39	0.63
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.11)	(0.15)	(0.56)	(0.70)	(0.83)	(0.79)	(0.64)	(0.78)	(0.02)
	7. 과자류	분율	4,437	0.00	0.25	1.81	4.57	16.95	17.34	13.74	16.31	11.05	17.97	1.12
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.27)	(0.39)	(0.74)	(0.75)	(0.58)	(0.65)	(0.64)	(0.86)	(0.03)
두류·서류	8. 두부	분율	4,438	0.03	0.37	2.55	7.41	34.83	27.81	14.55	7.10	2.72	2.63	1.86
		(표준오차)		(0.03)	(0.12)	(0.32)	(0.44)	(1.03)	(0.91)	(0.67)	(0.54)	(0.36)	(0.32)	(0.04)
	9. 콩류	분율	4,436	9.81	12.59	10.42	4.51	13.25	12.33	10.49	9.34	5.56	11.71	5.32
		(표준오차)		(0.58)	(0.67)	(0.58)	(0.36)	(0.63)	(0.60)	(0.60)	(0.61)	(0.48)	(0.79)	(0.17)
	10. 두유	분율	4,437	0.00	0.15	1.70	1.63	4.96	7.32	9.03	11.44	14.96	48.81	0.52
		(표준오차)		(-)	(0.06)	(0.26)	(0.21)	(0.41)	(0.49)	(0.67)	(0.61)	(0.77)	(1.05)	(0.03)
	11. 감자	분율	4,438	0.00	0.07	0.52	2.85	17.34	25.04	25.58	17.66	6.84	4.09	1.07
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.15)	(0.34)	(0.87)	(0.90)	(0.82)	(0.84)	(0.52)	(0.36)	(0.03)
	12. 고구마	분율	4,438	0.00	0.05	0.56	1.10	5.20	15.10	24.46	24.44	16.81	12.27	0.61
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.14)	(0.20)	(0.44)	(0.68)	(0.79)	(0.78)	(0.78)	(0.73)	(0.02)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	4,438	0.00	0.00	0.37	1.99	15.49	22.73	23.13	19.63	8.49	8.17	0.93
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.12)	(0.34)	(0.77)	(0.86)	(0.78)	(0.96)	(0.54)	(0.77)	(0.03)
	14. 닭고기	분율	4,438	0.00	0.05	0.13	1.96	12.54	25.74	29.74	17.71	6.03	6.10	0.91
		(표준오차)		(-)	(0.06)	(0.08)	(0.30)	(0.75)	(0.87)	(0.94)	(0.77)	(0.45)	(0.51)	(0.02)
	15. 돼지고기	분율	4,437	0.00	0.00	0.82	4.25	28.80	30.48	22.54	8.26	2.47	2.38	1.45
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.17)	(0.48)	(0.90)	(0.85)	(0.84)	(0.60)	(0.26)	(0.26)	(0.03)
	16. 햄,소시지	분율	4,438	0.00	0.00	0.33	0.62	8.21	15.38	16.97	15.23	9.20	34.07	0.56
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.12)	(0.13)	(0.58)	(0.74)	(0.88)	(0.67)	(0.58)	(1.36)	(0.02)
	17. 달걀	분율	4,438	0.02	0.24	8.52	14.07	39.66	19.50	9.07	4.93	1.85	2.15	2.59
		(표준오차)		(0.02)	(0.08)	(0.58)	(0.65)	(0.91)	(0.85)	(0.50)	(0.35)	(0.27)	(0.27)	(0.04)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만19~64세, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	4,438	0.00	0.00	0.15	0.91	11.02	23.11	26.63	21.55	7.57	9.07	0.78
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.18)	(0.68)	(0.71)	(0.76)	(0.73)	(0.53)	(0.64)	(0.02)
	19. 참치	분율	4,438	0.00	0.01	0.03	0.61	7.02	16.02	23.49	20.21	9.68	22.93	0.57
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.02)	(0.17)	(0.66)	(0.58)	(0.89)	(0.75)	(0.49)	(1.06)	(0.02)
	20. 조기	분율	4,438	0.00	0.00	0.07	0.61	6.86	12.97	21.39	24.62	14.29	19.19	0.54
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.14)	(0.53)	(0.73)	(0.80)	(0.80)	(0.77)	(0.90)	(0.02)
	21. 명태	분율	4,437	0.00	0.00	0.08	0.18	3.59	12.05	22.77	26.13	17.02	18.17	0.44
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.06)	(0.32)	(0.59)	(0.74)	(0.77)	(0.79)	(0.93)	(0.01)
	22. 멸치	분율	4,434	0.29	0.81	6.52	9.60	21.72	19.34	16.88	12.45	4.96	7.43	1.98
		(표준오차)		(0.08)	(0.15)	(0.51)	(0.56)	(0.78)	(0.76)	(0.75)	(0.65)	(0.45)	(0.58)	(0.05)
	23. 어묵류	분율	4,438	0.00	0.11	0.25	1.06	11.33	22.20	22.79	18.56	8.55	15.15	0.78
		(표준오차)		(-)	(0.06)	(0.10)	(0.19)	(0.64)	(0.82)	(0.86)	(0.76)	(0.57)	(0.79)	(0.02)
	24. 오징어	분율	4,437	0.00	0.00	0.27	0.69	6.02	15.42	22.68	24.58	13.26	17.07	0.57
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.09)	(0.16)	(0.52)	(0.82)	(0.91)	(0.78)	(0.65)	(0.69)	(0.02)
	25. 조개류	분율	4,438	0.00	0.00	0.14	0.62	4.69	11.41	20.60	25.29	15.58	21.65	0.48
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.13)	(0.45)	(0.75)	(0.82)	(0.83)	(0.75)	(1.11)	(0.02)
	26. 젓갈류	분율	4,438	0.08	0.15	0.70	1.20	6.69	9.37	12.29	17.44	14.99	37.10	0.54
		(표준오차)		(0.05)	(0.07)	(0.14)	(0.19)	(0.53)	(0.57)	(0.59)	(0.72)	(0.71)	(1.06)	(0.03)
채소류	27. 배추	분율	4,438	35.34	34.86	18.54	3.82	5.15	1.32	0.48	0.09	0.21	0.19	13.94
		(표준오차)		(1.17)	(0.93)	(0.85)	(0.39)	(0.44)	(0.20)	(0.13)	(0.05)	(0.09)	(0.07)	(0.17)
	28. 무	분율	4,438	3.96	8.20	20.81	11.39	25.77	15.76	6.92	4.14	1.18	1.88	4.86
		(표준오차)		(0.42)	(0.56)	(1.06)	(0.62)	(0.90)	(0.67)	(0.50)	(0.36)	(0.20)	(0.33)	(0.12)
	29. 무청	분율	4,437	0.25	0.77	4.52	6.66	17.63	21.19	18.77	14.17	7.01	9.03	1.62
		(표준오차)		(0.09)	(0.16)	(0.43)	(0.62)	(0.73)	(0.83)	(0.67)	(0.69)	(0.60)	(0.77)	(0.06)
	30. 콩나물	분율	4,438	0.02	0.07	0.97	3.67	29.41	31.75	20.07	9.36	2.81	1.86	1.46
		(표준오차)		(0.02)	(0.04)	(0.21)	(0.35)	(0.95)	(0.86)	(0.76)	(0.61)	(0.34)	(0.24)	(0.03)
	31. 시금치	분율	4,438	0.00	0.04	0.40	0.95	11.25	23.53	25.03	21.15	10.08	7.56	0.81
		(표준오차)		(-)	(0.03)	(0.13)	(0.18)	(0.68)	(0.95)	(0.75)	(0.82)	(0.76)	(0.65)	(0.02)
	32. 오이	분율	4,438	0.03	0.16	1.29	2.79	16.14	26.29	29.64	15.35	4.77	3.54	1.14
		(표준오차)		(0.02)	(0.08)	(0.25)	(0.36)	(0.90)	(0.90)	(1.06)	(0.82)	(0.38)	(0.39)	(0.04)
	33. 고추	분율	4,435	0.13	0.38	4.01	6.25	19.78	25.24	19.48	11.86	4.00	8.87	1.57
		(표준오차)		(0.06)	(0.10)	(0.41)	(0.51)	(0.84)	(0.85)	(0.79)	(0.60)	(0.40)	(0.67)	(0.04)
	34. 당근	분율	4,438	0.03	0.03	0.69	0.94	5.79	12.36	12.51	14.66	10.17	42.82	0.50
		(표준오차)		(0.03)	(0.02)	(0.14)	(0.15)	(0.50)	(0.66)	(0.67)	(0.64)	(0.63)	(1.53)	(0.02)
	35. 호박	분율	4,437	0.03	0.08	0.35	1.45	13.69	21.55	27.39	19.88	7.75	7.84	0.89
		(표준오차)		(0.03)	(0.04)	(0.11)	(0.21)	(0.70)	(0.76)	(0.90)	(0.83)	(0.52)	(0.65)	(0.03)
	36. 양배추	분율	4,438	0.03	0.12	0.87	1.25	7.75	15.87	22.46	24.28	12.02	15.36	0.70
		(표준오차)		(0.03)	(0.06)	(0.17)	(0.20)	(0.53)	(0.73)	(0.91)	(0.85)	(0.68)	(0.89)	(0.02)
	37. 토마토	분율	4,438	0.02	0.10	1.38	2.03	7.40	18.37	25.89	21.20	12.81	10.79	0.80
		(표준오차)		(0.02)	(0.06)	(0.22)	(0.32)	(0.59)	(0.83)	(0.83)	(0.80)	(0.70)	(0.72)	(0.04)
	38. 버섯류	분율	4,438	0.05	0.25	1.60	4.40	23.58	25.63	19.42	13.20	5.64	6.23	1.37
		(표준오차)		(0.03)	(0.10)	(0.23)	(0.41)	(0.78)	(0.76)	(0.82)	(0.69)	(0.50)	(0.53)	(0.03)
해조류	39. 미역	분율	4,438	0.00	0.01	0.45	1.72	13.86	26.92	30.37	16.96	5.93	3.78	0.96
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.14)	(0.23)	(0.63)	(0.74)	(0.89)	(0.81)	(0.47)	(0.41)	(0.02)
	40. 김	분율	4,438	0.44	1.74	10.26	14.32	32.16	22.28	12.34	4.58	0.99	0.88	2.88
		(표준오차)		(0.12)	(0.23)	(0.75)	(0.75)	(1.01)	(0.84)	(0.81)	(0.46)	(0.20)	(0.18)	(0.07)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만19~64세, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일 3회	1일 2회	1일 1회	1주 4-6회	1주 2-3회	1주 1회	1개월 2-3회	1개월 1회	1년 6-11회	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
과일류	41. 귤	분율	4,438	0.02	0.00	0.94	3.18	8.42	31.58	31.65	14.40	6.31	3.50	0.98
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(0.23)	(0.39)	(0.78)	(1.18)	(0.92)	(0.77)	(0.44)	(0.39)	(0.04)
	42. 감, 곶감	분율	4,438	0.00	0.00	0.07	0.73	2.88	15.53	24.56	21.64	18.91	15.68	0.49
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.03)	(0.15)	(0.37)	(0.82)	(0.81)	(0.73)	(0.85)	(0.89)	(0.01)
	43. 배	분율	4,438	0.00	0.01	0.22	0.50	2.28	9.57	22.64	27.65	24.61	12.52	0.43
		(표준오차)		(-)	(0.01)	(0.08)	(0.15)	(0.29)	(0.62)	(0.80)	(0.91)	(0.88)	(0.71)	(0.01)
	44. 수박	분율	4,438	0.00	0.00	0.09	0.65	3.31	21.85	31.20	21.84	14.21	6.85	0.59
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.16)	(0.44)	(0.99)	(0.85)	(0.86)	(0.63)	(0.52)	(0.02)
	45. 참외	분율	4,438	0.00	0.00	0.02	0.25	1.55	13.06	29.88	25.60	18.86	10.78	0.45
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.02)	(0.10)	(0.25)	(0.66)	(0.90)	(0.85)	(0.83)	(0.65)	(0.01)
	46. 딸기	분율	4,438	0.00	0.02	0.09	0.75	2.02	12.69	30.82	26.92	17.46	9.23	0.49
		(표준오차)		(-)	(0.02)	(0.06)	(0.31)	(0.31)	(0.80)	(0.92)	(0.88)	(0.85)	(0.56)	(0.02)
	47. 포도	분율	4,437	0.00	0.00	0.38	0.70	3.38	16.47	29.69	24.06	15.91	9.42	0.56
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.14)	(0.16)	(0.36)	(0.81)	(0.83)	(0.72)	(0.81)	(0.61)	(0.02)
	48. 복숭아	분율	4,438	0.00	0.00	0.10	0.36	1.37	8.95	22.53	24.63	22.12	19.96	0.37
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.11)	(0.23)	(0.63)	(0.81)	(0.80)	(0.80)	(0.88)	(0.01)
	49. 사과	분율	4,436	0.01	0.11	3.26	6.94	15.57	22.57	21.13	13.68	10.71	6.04	1.38
		(표준오차)		(0.01)	(0.04)	(0.36)	(0.49)	(0.67)	(0.79)	(0.79)	(0.79)	(0.61)	(0.43)	(0.04)
	50. 바나나	분율	4,438	0.00	0.00	1.22	2.62	11.12	18.24	19.99	18.96	14.38	13.48	0.86
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.23)	(0.31)	(0.59)	(0.77)	(0.85)	(0.73)	(0.74)	(0.75)	(0.03)
	51. 오렌지	분율	4,437	0.00	0.18	1.89	3.21	13.77	16.92	17.74	17.67	12.28	16.36	0.99
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.27)	(0.34)	(0.68)	(0.76)	(0.76)	(0.69)	(0.70)	(0.88)	(0.03)
우유류	52. 우유	분율	4,437	0.35	1.42	18.46	9.10	20.33	13.28	7.82	7.33	5.36	16.54	2.73
		(표준오차)		(0.13)	(0.23)	(0.84)	(0.58)	(0.75)	(0.61)	(0.44)	(0.51)	(0.44)	(0.74)	(0.07)
	53. 요구르트	분율	4,438	0.00	0.28	5.72	3.35	14.49	16.44	12.68	12.85	9.16	25.04	1.25
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.50)	(0.34)	(0.69)	(0.72)	(0.59)	(0.63)	(0.57)	(1.18)	(0.05)
	54. 아이스크림	분율	4,438	0.03	0.03	0.45	1.34	7.69	16.51	21.13	18.47	16.34	18.00	0.66
		(표준오차)		(0.03)	(0.03)	(0.13)	(0.22)	(0.57)	(0.80)	(0.84)	(0.76)	(0.71)	(0.79)	(0.02)
음료류	55. 탄산음료	분율	4,438	0.01	0.29	1.94	3.38	13.02	12.82	12.82	12.69	11.91	31.13	0.92
		(표준오차)		(0.01)	(0.12)	(0.27)	(0.42)	(0.72)	(0.61)	(0.60)	(0.58)	(0.78)	(1.05)	(0.04)
	56. 커피	분율	4,438	22.48	21.44	22.08	4.30	7.66	4.72	3.30	2.24	2.14	9.65	9.75
		(표준오차)		(0.87)	(0.77)	(0.77)	(0.37)	(0.47)	(0.36)	(0.35)	(0.29)	(0.29)	(0.56)	(0.17)
	57. 녹차	분율	4,437	2.38	2.43	8.59	3.02	12.03	10.86	8.71	9.34	8.96	33.69	2.09
		(표준오차)		(0.32)	(0.26)	(0.58)	(0.34)	(0.64)	(0.58)	(0.56)	(0.54)	(0.60)	(1.23)	(0.08)
주류	58. 맥주	분율	4,438	0.02	0.04	0.70	2.60	14.33	14.94	12.42	12.18	7.80	34.97	0.81
		(표준오차)		(0.02)	(0.03)	(0.16)	(0.30)	(0.75)	(0.78)	(0.61)	(0.53)	(0.51)	(0.97)	(0.03)
	59. 소주	분율	4,438	0.03	0.12	1.47	4.14	15.77	11.49	11.30	9.55	5.80	40.33	0.94
		(표준오차)		(0.02)	(0.06)	(0.23)	(0.41)	(0.72)	(0.61)	(0.59)	(0.57)	(0.38)	(0.99)	(0.03)
	60. 막걸리	분율	4,438	0.08	0.04	0.36	0.67	4.12	5.90	7.38	11.66	9.23	60.56	0.33
		(표준오차)		(0.04)	(0.03)	(0.10)	(0.15)	(0.38)	(0.57)	(0.50)	(0.66)	(0.51)	(1.11)	(0.02)
기타	61. 햄버거	분율	4,438	0.00	0.00	0.06	0.05	0.98	3.44	9.00	16.21	14.71	55.56	0.18
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.04)	(0.22)	(0.44)	(0.66)	(0.87)	(0.72)	(1.29)	(0.01)
	62. 피자	분율	4,438	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	2.52	11.70	24.46	19.66	41.40	0.19
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.04)	(0.08)	(0.32)	(0.89)	(0.96)	(0.91)	(1.42)	(0.01)
	63. 튀긴 음식	분율	4,438	0.01	0.00	0.67	0.95	7.89	14.15	21.59	25.27	14.96	14.51	0.64
		(표준오차)		(0.01)	(-)	(0.18)	(0.18)	(0.58)	(0.75)	(0.82)	(0.75)	(0.71)	(0.71)	(0.02)

표 2-I-18. 식품섭취빈도 : 전체, 만65세이상, 2010

(단위 : %)

식품 및 음식명	섭취빈도	N	1일				1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도[1] (회/주)
			3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
곡류	1. 쌀	분율	1,264	80.83	18.08	0.53	0.00	0.07	0.00	0.06	0.09	0.06	0.28	19.54
		(표준오차)		(1.65)	(1.58)	(0.17)	(-)[2]	(0.07)	(-)	(0.06)	(0.09)	(0.06)	(0.16)	(0.13)
	2. 보리/ 잡곡	분율	1,263	44.88	18.72	6.04	2.71	3.19	3.34	3.20	2.35	1.70	13.86	12.74
		(표준오차)		(2.00)	(1.51)	(0.86)	(0.68)	(0.68)	(0.65)	(0.70)	(0.55)	(0.50)	(1.64)	(0.42)
	3. 라면	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.77	4.01	7.85	16.35	17.91	19.13	33.98	0.38
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.32)	(0.54)	(1.00)	(1.10)	(1.12)	(1.44)	(1.80)	(0.02)
	4. 국수	분율	1,264	0.00	0.00	0.24	0.88	3.86	12.13	21.45	20.27	18.26	22.91	0.48
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.16)	(0.46)	(0.69)	(1.22)	(1.25)	(1.23)	(1.59)	(1.49)	(0.03)
	5. 빵류	분율	1,264	0.00	0.00	0.57	1.02	5.62	8.29	15.40	16.09	17.47	35.55	0.47
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.22)	(0.29)	(0.76)	(0.98)	(1.19)	(1.32)	(1.33)	(1.76)	(0.03)
	6. 떡류	분율	1,264	0.00	0.00	0.30	0.73	3.58	7.34	22.10	23.30	22.84	19.81	0.44
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.17)	(0.37)	(0.61)	(0.81)	(1.36)	(1.52)	(1.29)	(1.70)	(0.03)
	7. 과자류	분율	1,264	0.16	0.00	0.90	1.62	4.15	8.73	10.21	13.12	15.92	45.17	0.48
		(표준오차)		(0.16)	(-)	(0.32)	(0.45)	(0.72)	(0.99)	(1.01)	(1.30)	(1.30)	(2.12)	(0.05)
두류·서류	8. 두부	분율	1,264	0.00	0.18	1.06	3.62	18.31	17.38	24.44	16.72	9.54	8.75	1.11
		(표준오차)		(-)	(0.13)	(0.33)	(0.59)	(1.69)	(1.22)	(1.79)	(1.16)	(1.17)	(1.17)	(0.06)
	9. 콩류	분율	1,262	31.35	13.73	6.95	4.22	7.14	5.60	6.32	4.86	3.32	16.50	9.49
		(표준오차)		(1.94)	(1.34)	(0.89)	(0.71)	(0.90)	(0.82)	(0.91)	(0.68)	(0.53)	(1.51)	(0.40)
	10. 두유	분율	1,264	0.18	0.18	0.93	1.48	3.92	5.99	9.02	9.81	11.15	57.34	0.45
		(표준오차)		(0.12)	(0.14)	(0.33)	(0.43)	(0.61)	(0.94)	(0.93)	(1.08)	(1.29)	(2.08)	(0.05)
	11. 감자	분율	1,264	0.02	0.09	0.21	1.05	6.09	15.71	26.53	23.15	14.01	13.14	0.62
		(표준오차)		(0.02)	(0.09)	(0.20)	(0.29)	(0.88)	(1.26)	(1.57)	(1.46)	(1.33)	(1.43)	(0.04)
	12. 고구마	분율	1,264	0.00	0.00	0.28	0.89	3.33	15.30	22.83	20.93	19.20	17.25	0.51
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.15)	(0.26)	(0.53)	(1.38)	(1.38)	(1.49)	(1.56)	(1.24)	(0.03)
육류·난류	13. 쇠고기	분율	1,264	0.02	0.00	0.00	0.68	4.71	8.83	19.21	19.33	22.83	24.39	0.44
		(표준오차)		(0.02)	(-)	(-)	(0.24)	(0.69)	(1.03)	(1.43)	(1.31)	(1.73)	(1.65)	(0.03)
	14. 닭고기	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.12	2.02	5.23	14.72	19.84	22.75	35.32	0.28
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.10)	(0.52)	(0.77)	(1.28)	(1.42)	(1.61)	(2.24)	(0.02)
	15. 돼지고기	분율	1,264	0.00	0.00	0.06	1.57	8.78	17.56	27.47	16.61	15.27	12.68	0.70
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.51)	(1.12)	(1.32)	(1.59)	(1.24)	(1.35)	(1.25)	(0.03)
	16. 햄,소시지	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.09	2.97	3.31	6.05	85.79	0.07
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(0.34)	(0.31)	(0.53)	(0.61)	(0.79)	(1.26)	(0.01)
	17. 달걀	분율	1,264	0.05	0.05	3.40	6.34	19.95	17.28	19.10	12.45	7.64	13.76	1.39
		(표준오차)		(0.05)	(0.05)	(0.88)	(0.89)	(1.27)	(1.30)	(1.26)	(1.29)	(0.89)	(1.19)	(0.07)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수[3] 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만65세이상, 2010)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일			1주			1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
어패류	18. 고등어	분율	1,263	0.00	0.00	0.09	0.68	5.81	12.80	20.90	18.73	12.66	28.34	0.50
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.08)	(0.23)	(0.84)	(1.33)	(1.38)	(1.49)	(1.18)	(2.16)	(0.03)
	19. 참치	분율	1,264	0.00	0.00	0.06	0.06	1.83	4.18	6.82	8.89	9.75	68.40	0.17
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.06)	(0.41)	(0.62)	(0.90)	(1.05)	(1.02)	(1.77)	(0.01)
	20. 조기	분율	1,264	0.00	0.07	0.18	0.84	5.38	9.30	20.33	19.40	19.09	25.40	0.49
		(표준오차)		(-)	(0.07)	(0.11)	(0.34)	(0.76)	(1.02)	(1.48)	(1.27)	(1.62)	(2.13)	(0.03)
	21. 명태	분율	1,263	0.00	0.00	0.02	0.18	3.18	8.00	23.08	24.05	20.66	20.82	0.39
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.02)	(0.18)	(0.66)	(0.91)	(1.61)	(1.43)	(1.47)	(1.70)	(0.02)
	22. 멸치	분율	1,262	0.75	1.29	7.42	9.33	18.96	13.95	13.64	9.88	5.82	18.96	2.05
		(표준오차)		(0.24)	(0.35)	(1.04)	(0.97)	(1.39)	(1.33)	(1.09)	(0.94)	(0.80)	(1.44)	(0.10)
	23. 어묵류	분율	1,264	0.00	0.00	0.06	0.29	2.40	4.08	10.05	9.72	13.14	60.26	0.22
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.17)	(0.62)	(0.69)	(1.15)	(0.86)	(1.16)	(1.70)	(0.02)
	24. 오징어	분율	1,264	0.00	0.00	0.06	0.12	1.75	4.20	8.89	11.75	15.58	57.65	0.20
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.06)	(0.09)	(0.42)	(0.73)	(0.90)	(1.16)	(1.45)	(1.98)	(0.01)
	25. 조개류	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.94	3.02	4.54	12.75	15.14	15.74	47.88	0.30
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.42)	(0.65)	(0.69)	(1.42)	(1.37)	(1.45)	(2.54)	(0.04)
	26. 젓갈류	분율	1,263	0.50	0.11	1.83	2.66	8.34	9.68	10.41	12.34	10.60	43.53	0.79
		(표준오차)		(0.31)	(0.08)	(0.47)	(0.46)	(0.91)	(1.10)	(1.00)	(1.17)	(0.99)	(1.93)	(0.07)
채소류	27. 배추	분율	1,264	53.30	19.34	13.26	3.07	4.45	2.80	1.13	1.10	0.59	0.95	15.13
		(표준오차)		(2.54)	(1.78)	(1.24)	(0.74)	(0.69)	(0.67)	(0.47)	(0.34)	(0.31)	(0.30)	(0.34)
	28. 무	분율	1,263	6.51	3.83	15.03	12.27	20.47	13.93	11.03	6.68	3.42	6.83	4.30
		(표준오차)		(1.30)	(0.71)	(1.61)	(1.40)	(1.58)	(1.25)	(1.02)	(0.91)	(0.61)	(1.07)	(0.25)
	29. 무청	분율	1,262	0.88	0.16	6.72	12.54	17.86	17.59	20.24	9.90	5.03	9.08	2.07
		(표준오차)		(0.31)	(0.12)	(0.91)	(1.39)	(1.26)	(1.18)	(1.41)	(1.08)	(0.73)	(1.20)	(0.11)
	30. 콩나물	분율	1,264	0.00	0.00	0.08	2.03	17.33	22.90	25.65	16.41	6.87	8.71	0.97
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.55)	(1.45)	(1.36)	(1.64)	(1.07)	(1.02)	(1.00)	(0.04)
	31. 시금치	분율	1,264	0.00	0.00	0.09	0.26	5.04	11.52	20.38	22.88	16.70	23.12	0.46
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.13)	(0.94)	(1.20)	(1.40)	(1.60)	(1.51)	(1.73)	(0.03)
	32. 오이	분율	1,264	0.00	0.21	0.85	5.80	9.38	26.31	24.74	17.81	5.26	9.64	1.07
		(표준오차)		(-)	(0.16)	(0.32)	(1.38)	(1.22)	(1.62)	(1.49)	(1.62)	(0.88)	(1.39)	(0.07)
	33. 고추	분율	1,264	0.17	0.34	2.61	6.71	11.49	22.69	19.30	12.03	7.15	17.52	1.27
		(표준오차)		(0.17)	(0.20)	(0.64)	(1.02)	(1.31)	(1.59)	(1.50)	(1.18)	(0.79)	(1.67)	(0.10)
	34. 당근	분율	1,264	0.00	0.00	0.18	0.93	2.03	4.51	7.05	6.42	7.97	70.91	0.22
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.08)	(0.31)	(0.48)	(0.80)	(0.99)	(0.90)	(1.03)	(2.08)	(0.02)
	35. 호박	분율	1,263	0.37	0.06	0.27	2.47	7.59	19.83	30.30	20.09	8.26	10.75	0.85
		(표준오차)		(0.37)	(0.06)	(0.17)	(0.63)	(0.97)	(1.66)	(1.65)	(1.57)	(0.93)	(1.56)	(0.08)
	36. 양배추	분율	1,264	0.00	0.08	0.33	1.66	3.49	6.93	12.35	16.29	16.71	42.17	0.41
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.13)	(0.47)	(0.65)	(1.00)	(1.22)	(1.39)	(1.33)	(2.35)	(0.04)
	37. 토마토	분율	1,263	0.00	0.00	0.75	2.61	5.24	18.40	19.35	18.60	14.47	20.58	0.68
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.31)	(0.75)	(1.02)	(1.43)	(1.38)	(1.50)	(1.25)	(1.62)	(0.05)
	38. 버섯류	분율	1,264	0.00	0.11	1.33	1.80	12.24	14.62	15.95	17.15	12.75	24.06	0.80
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.39)	(0.47)	(1.08)	(1.26)	(1.21)	(1.38)	(1.17)	(1.79)	(0.05)
해조류	39. 미역	분율	1,264	0.02	0.01	0.11	1.51	12.20	16.03	31.59	22.86	9.48	6.20	0.80
		(표준오차)		(0.02)	(0.01)	(0.08)	(0.34)	(1.20)	(1.38)	(1.54)	(1.73)	(0.96)	(0.90)	(0.03)
	40. 김	분율	1,264	0.72	0.55	6.68	12.38	23.70	21.47	16.65	8.75	3.89	5.20	2.25
		(표준오차)		(0.30)	(0.17)	(0.97)	(1.22)	(1.39)	(1.28)	(1.30)	(1.13)	(0.61)	(1.06)	(0.11)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만65세이상, 2010)

식품 및 음식명	섭취빈도	N	1일				1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
			3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회		
과일류	41. 귤	분율	1,264	0.27	0.00	0.46	2.48	6.57	25.04	25.26	16.72	12.51	10.70	0.83
		(표준오차)		(0.26)	(-)	(0.21)	(0.66)	(1.23)	(1.47)	(1.45)	(1.39)	(1.29)	(1.30)	(0.08)
	42. 감, 곶감	분율	1,264	0.00	0.00	0.62	0.81	4.92	21.91	24.88	15.23	15.27	16.37	0.63
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.35)	(0.33)	(1.04)	(1.87)	(1.73)	(1.29)	(1.42)	(1.73)	(0.04)
	43. 배	분율	1,264	0.00	0.00	0.16	0.99	1.02	6.22	16.64	22.38	28.79	23.82	0.34
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.16)	(0.42)	(0.27)	(0.81)	(1.33)	(1.55)	(1.71)	(1.74)	(0.03)
	44. 수박	분율	1,264	0.00	0.00	0.04	0.39	1.56	14.23	27.47	21.72	17.96	16.63	0.44
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.04)	(0.22)	(0.49)	(1.46)	(1.80)	(1.49)	(1.39)	(1.54)	(0.02)
	45. 참외	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.29	1.04	10.16	20.41	21.15	22.32	24.63	0.34
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(0.15)	(0.40)	(1.12)	(1.39)	(1.48)	(1.75)	(2.06)	(0.02)
	46. 딸기	분율	1,264	0.00	0.00	0.16	0.04	0.90	6.39	19.00	20.16	21.98	31.36	0.29
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.16)	(0.04)	(0.39)	(1.08)	(1.50)	(1.43)	(1.68)	(1.95)	(0.03)
	47. 포도	분율	1,264	0.00	0.08	0.15	0.43	2.50	12.10	22.95	18.88	21.19	21.73	0.44
		(표준오차)		(-)	(0.08)	(0.11)	(0.28)	(0.62)	(1.26)	(1.56)	(1.42)	(1.54)	(1.61)	(0.03)
	48. 복숭아	분율	1,264	0.00	0.04	0.09	0.00	0.31	7.16	16.36	15.91	22.27	37.85	0.26
		(표준오차)		(-)	(0.04)	(0.09)	(-)	(0.17)	(0.97)	(1.27)	(1.39)	(1.46)	(2.08)	(0.01)
	49. 사과	분율	1,263	0.00	0.03	3.66	5.25	10.35	17.13	19.70	14.02	13.74	16.11	1.12
		(표준오차)		(-)	(0.03)	(0.69)	(0.74)	(1.25)	(1.51)	(1.37)	(1.16)	(1.19)	(1.75)	(0.07)
	50. 바나나	분율	1,264	0.00	0.00	0.10	0.54	6.40	10.53	11.59	16.02	18.86	35.96	0.43
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.07)	(0.19)	(0.97)	(1.22)	(0.97)	(1.29)	(1.48)	(2.33)	(0.03)
	51. 오렌지	분율	1,264	0.00	0.05	0.50	0.17	3.07	6.93	7.93	14.09	12.75	54.51	0.30
		(표준오차)		(-)	(0.05)	(0.36)	(0.12)	(0.56)	(0.97)	(0.96)	(1.31)	(1.21)	(2.13)	(0.04)
우유류	52. 우유	분율	1,264	0.39	0.68	9.76	5.59	8.77	7.47	8.80	5.87	8.56	44.12	1.51
		(표준오차)		(0.26)	(0.31)	(1.09)	(0.72)	(0.84)	(1.04)	(0.88)	(0.79)	(1.01)	(1.91)	(0.11)
	53. 요구르트	분율	1,264	0.00	0.19	2.21	1.42	4.86	4.86	6.61	6.67	9.48	63.72	0.49
		(표준오차)		(-)	(0.11)	(0.46)	(0.45)	(0.83)	(0.78)	(0.74)	(0.80)	(1.15)	(1.89)	(0.05)
	54. 아이스크림	분율	1,264	0.00	0.00	0.03	0.04	0.78	6.38	6.71	13.20	18.47	54.39	0.19
		(표준오차)		(-)	(-)	(0.03)	(0.04)	(0.28)	(0.91)	(0.76)	(1.39)	(1.29)	(1.90)	(0.01)
음료류	55. 탄산음료	분율	1,264	0.16	0.06	0.08	1.20	2.27	4.90	10.13	11.75	13.78	55.67	0.32
		(표준오차)		(0.13)	(0.06)	(0.08)	(0.34)	(0.50)	(0.71)	(0.94)	(1.23)	(1.39)	(2.11)	(0.04)
	56. 커피	분율	1,264	8.94	16.28	27.63	4.88	9.97	4.76	3.50	3.06	1.91	19.08	6.66
		(표준오차)		(0.91)	(1.23)	(1.55)	(0.68)	(1.04)	(0.71)	(0.55)	(0.63)	(0.45)	(1.40)	(0.22)
	57. 녹차	분율	1,263	2.22	0.70	4.58	1.45	4.76	5.94	5.07	6.99	7.15	61.14	1.19
		(표준오차)		(0.71)	(0.27)	(0.84)	(0.43)	(0.77)	(0.86)	(0.65)	(0.87)	(0.87)	(2.12)	(0.16)
주류	58. 맥주	분율	1,264	0.00	0.16	0.50	1.13	2.15	2.98	3.65	5.27	4.80	79.36	0.24
		(표준오차)		(-)	(0.16)	(0.26)	(0.34)	(0.41)	(0.50)	(0.55)	(0.78)	(0.76)	(1.48)	(0.04)
	59. 소주	분율	1,264	0.54	0.31	3.47	2.47	7.05	5.27	6.40	4.59	4.88	65.00	0.81
		(표준오차)		(0.25)	(0.19)	(0.73)	(0.48)	(0.82)	(0.68)	(0.84)	(0.77)	(0.77)	(1.78)	(0.09)
	60. 막걸리	분율	1,263	0.22	0.22	1.00	0.76	2.00	2.68	4.08	3.64	5.50	79.91	0.30
		(표준오차)		(0.13)	(0.15)	(0.33)	(0.26)	(0.39)	(0.48)	(0.63)	(0.57)	(0.83)	(1.45)	(0.05)
기타	61. 햄버거	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.94	1.70	3.46	93.60	0.02
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.14)	(0.38)	(0.51)	(0.63)	(1.01)	(0.00)
	62. 피자	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.54	3.10	6.56	89.65	0.02
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.09)	(0.18)	(0.61)	(0.99)	(1.17)	(0.00)
	63. 튀긴 음식	분율	1,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	1.83	7.22	16.37	18.12	56.21	0.13
		(표준오차)		(-)	(-)	(-)	(-)	(0.12)	(0.48)	(0.84)	(1.28)	(1.48)	(2.03)	(0.01)

표 2-Ⅱ-1. 영양소별 1일 섭취량 추이[1] : 전체, 만1세이상, 1969-2010

구 분	국민영양조사												
	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
에너지(kcal)	2,105	2,150	2,072	1,904	2,059	2,054	1,992	1,926	2,134	1,833	2,098	2,052	2,052
단백질(g)	65.6	64.6	67.0	64.7	64.4	68.0	63.6	60.4	71.0	59.5	69.6	67.2	69.9
지방(g)	16.9	17.2	13.1	19.2	19.2	15.5	19.0	20.0	28.0	22.6	26.2	21.8	20.3
탄수화물(g)	423	434	422	368	401	405	399	380	397	346	395	396	394
칼슘(mg)	444	466	404	486	382	444	407	402	487	412	699	598	559
철(mg)	24.8	11.2	13.1	12.9	11.0	14.1	12.4	12.0	14.0	10.3	12.4	13.5	15.8
비타민 A(㎍RE)	1,400	939	962	1,504	891	1,781	1,362	1,293	1,428	1,064	1,324	1,688	1,804
티아민(mg)	1.76	1.10	1.22	1.09	1.09	1.30	1.21	1.20	1.40	1.20	1.31	1.13	1.78
리보플라빈(mg)	1.28	0.78	0.78	0.77	0.78	0.90	0.77	0.80	0.90	0.80	0.93	1.08	1.24
나이아신(mg)	27.8	16.3	14.7	13.6	16.0	15.0	15.34	16.0	19.0	16.1	21.3	19.1	20.1
비타민 C(mg)	89.9	82.9	83.7	73.4	67.7	100.6	78.9	75.0	91.0	68.3	98.19	87.9	67.2

구 분	국민영양조사													
	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
에너지(kcal)	1,991	2,012	1,901	1,936	1,930	1,819	1,935	1,871	1,868	1,930	1,875	1,848	1,770	1,839
단백질(g)	67.4	69.6	69.3	74.5	74.2	79.2	91.6	83.6	78.9	73.0	74.2	72.6	71.9	73.3
지방(g)	21.1	23.5	24.0	29.5	28.1	29.7	30.0	27.9	28.9	35.6	34.5	36.9	35.9	38.5
탄수화물(g)	381	380	351	342	343	308	330	323	316	325	313	301	286	295
칼슘(mg)	466	506	481	569	593	464	495	498	517	518	538	523	556	531
철(mg)	13.3	15.1	13.9	15.6	17.0	22.8	22.2	22.2	22.7	23.0	22.9	22.4	22.0	21.9
비타민 A(㎍RE)	1,676	2,052	1,681	1,846	2,226	1,204	1,337	1,657	1,662	550	535	440	411	443
티아민(mg)	1.00	1.14	1.17	1.34	1.24	1.03	1.19	1.15	1.15	1.27	1.22	1.37	1.12	1.16
리보플라빈(mg)	0.86	1.00	1.04	1.21	1.19	1.11	1.20	1.18	1.27	1.24	1.22	1.11	1.19	1.20
나이아신(mg)	20.7	23.7	22.7	25.7	27.2	17.7	20.9	19.5	21.6	17.5	17.4	16.5	16.6	16.7
비타민 C(mg)	76.0	69.5	58.6	64.7	84.3	51.2	76.2	65.8	81.2	92.2	102.5	92.6	93.5	98.3

구 분		국민건강영양조사													
		'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
		(N=10,400)		(N=9,968)		(N=8,930)		(N=4,091)		(N=8,631)		(N=9,391)		(N=8,019)	
		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)	
에너지(kcal)		1,931.1	(18.5)	1,880.8	(16.9)	1,979.1	(15.4)	1,830.8	(19.7)	1,868.4	(14.9)	1,884.6	(13.1)	2,050.5	(16.5)
단백질(g)		72.8	(0.9)	70.1	(0.7)	75.0	(0.7)	65.9	(0.9)	66.7	(0.6)	67.5	(0.6)	74.0	(0.7)
지방(g)		40.8	(0.6)	41.6	(0.6)	45.2	(0.6)	37.7	(0.7)	38.9	(0.6)	39.9	(0.5)	44.8	(0.6)
탄수화물(g)		314.1	(2.9)	294.5	(2.6)	301.1	(2.2)	293.7	(3.0)	299.1	(2.2)	300.6	(2.1)	321.1	(2.6)
조섬유(g)		6.5	(0.1)	6.7	(0.1)	7.2	(0.1)	6.4	(0.1)	6.8	(0.1)	6.8	(0.1)	7.1	(0.1)
칼슘(mg)		501.3	(7.7)	494.6	(6.3)	552.5	(6.8)	468.7	(8.1)	488.2	(5.7)	491.5	(5.0)	529.6	(5.7)
인(mg)		1,058.8	(11.0)	1,133.1	(10.3)	1,229.3	(10.3)	1,081.4	(13.1)	1,118.2	(9.2)	1,125.7	(8.0)	1,205.3	(10.1)
나트륨(mg)		4,516.9	(61.6)	4,877.3	(55.1)	5,256.6	(55.4)	4,464.1	(64.3)	4,630.2	(49.1)	4,645.4	(43.2)	4,877.5	(55.8)
칼륨(mg)		2,500.4	(29.8)	2,794.8	(29.4)	2,773.2	(24.5)	2,710.6	(40.1)	2,843.0	(29.4)	2,848.1	(26.0)	3,006.5	(32.3)
철(mg)		12.3	(0.2)	12.1	(0.2)	13.8	(0.2)	13.1	(0.3)	13.4	(0.2)	13.5	(0.2)	14.6	(0.2)
비타민 A(㎍RE)		606.8	(11.8)	619.4	(11.3)	781.3	(12.2)	736.1	(19.1)	771.4	(16.0)	768.5	(14.8)	806.1	(20.4)
티아민(mg)		1.34	(0.02)	1.27	(0.02)	1.31	(0.01)	1.24	(0.02)	1.24	(0.01)	1.26	(0.01)	1.37	(0.01)
리보플라빈(mg)		1.09	(0.01)	1.15	(0.01)	1.21	(0.01)	1.07	(0.02)	1.16	(0.01)	1.19	(0.01)	1.29	(0.01)
나이아신(mg)		15.4	(0.2)	16.6	(0.2)	17.0	(0.2)	14.7	(0.2)	15.1	(0.2)	15.5	(0.1)	17.0	(0.2)
비타민 C(mg)		122.7	(2.4)	133.2	(2.4)	99.1	(1.6)	93.2	(2.9)	100.1	(1.9)	100.4	(1.8)	105.7	(2.0)
급원별 에너지 섭취분율(%)[2]	단백질	14.9	(0.1)	15.1	(0.1)	15.5	(0.1)	14.7	(0.1)	14.6	(0.1)	14.6	(0.1)	14.7	(0.1)
	지방	18.2	(0.2)	19.3	(0.2)	20.3	(0.2)	18.2	(0.3)	18.3	(0.2)	18.7	(0.2)	19.3	(0.2)
	탄수화물	66.8	(0.2)	65.7	(0.2)	64.2	(0.2)	67.1	(0.3)	67.1	(0.2)	66.8	(0.2)	66.1	(0.2)

1) '69~'95년 원시자료 확보 불가로 이전 보고서에 수록된 값 제시

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-II-2. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 전체, 만1세이상, 1998-2010

구 분		'98 (N=10,400) 평균(표준오차)	'01 (N=9,968) 평균(표준오차)	'05 (N=8,930) 평균(표준오차)	'07 (N=4,091) 평균(표준오차)	'08 (N=8,631) 평균(표준오차)	'09 (N=9,391) 평균(표준오차)	'10 (N=8,019) 평균(표준오차)
에너지(kcal)		1,933.5 (17.9)	1,896.7 (16.5)	1,979.1 (15.3)	1,829.6 (18.8)	1,867.5 (14.6)	1,883.4 (12.8)	2,050.3 (16.4)
단백질(g)		73.2 (1.0)	70.9 (0.7)	75.0 (0.7)	66.0 (0.9)	66.7 (0.6)	67.6 (0.6)	74.3 (0.7)
지방(g)		40.1 (0.6)	41.7 (0.6)	45.2 (0.5)	37.9 (0.7)	39.3 (0.5)	40.5 (0.5)	45.8 (0.5)
탄수화물(g)		315.5 (2.9)	296.9 (2.6)	301.0 (2.2)	292.7 (2.9)	297.7 (2.2)	298.8 (2.0)	318.8 (2.5)
조섬유(g)		6.6 (0.1)	6.9 (0.1)	7.2 (0.1)	6.3 (0.1)	6.7 (0.1)	6.7 (0.1)	7.0 (0.1)
칼슘(mg)		500.5 (7.5)	495.5 (6.2)	552.4 (6.8)	468.9 (8.0)	488.5 (5.8)	491.9 (4.9)	529.9 (5.7)
인(mg)		1,060.6 (10.8)	1,142.8 (10.0)	1,229.4 (10.2)	1,080.1 (12.6)	1,116.7 (9.2)	1,124.4 (7.9)	1,204.2 (9.7)
나트륨(mg)		4,581.6 (62.4)	4,966.9 (55.5)	5,260.2 (55.6)	4,452.9 (63.3)	4,607.6 (47.4)	4,617.5 (42.4)	4,830.5 (53.2)
칼륨(mg)		2,522.4 (29.7)	2,831.7 (29.0)	2,774.4 (24.4)	2,704.0 (39.7)	2,830.2 (28.6)	2,832.7 (24.7)	2,985.4 (30.2)
철(mg)		12.5 (0.2)	12.3 (0.2)	13.8 (0.2)	13.1 (0.2)	13.3 (0.2)	13.4 (0.2)	14.4 (0.2)
비타민 A(㎍RE)		609.5 (11.9)	628.8 (11.4)	781.7 (12.1)	734.4 (18.6)	770.8 (16.2)	766.4 (14.8)	800.9 (19.8)
티아민(mg)		1.33 (0.01)	1.28 (0.02)	1.31 (0.01)	1.24 (0.02)	1.24 (0.01)	1.26 (0.01)	1.38 (0.01)
리보플라빈(mg)		1.08 (0.01)	1.15 (0.01)	1.21 (0.01)	1.07 (0.02)	1.16 (0.01)	1.20 (0.01)	1.30 (0.01)
나이아신(mg)		15.5 (0.2)	16.8 (0.2)	17.0 (0.2)	14.7 (0.2)	15.1 (0.2)	15.4 (0.1)	17.0 (0.2)
비타민 C(mg)		123.7 (2.3)	134.6 (2.4)	99.1 (1.6)	93.0 (2.9)	99.7 (1.9)	100.2 (1.8)	105.3 (2.0)
급원별 에너지 섭취분율(%)[2]	단백질	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.5 (0.1)	14.7 (0.1)	14.6 (0.1)	14.6 (0.1)	14.7 (0.1)
	지방	17.9 (0.2)	19.1 (0.2)	20.3 (0.1)	18.4 (0.2)	18.6 (0.1)	19.0 (0.1)	19.7 (0.2)
	탄수화물	67.2 (0.2)	65.8 (0.2)	64.2 (0.2)	66.9 (0.3)	66.8 (0.2)	66.4 (0.2)	65.6 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-Ⅱ-3. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2010

구 분		'98 (N=4,984) 평균(표준오차)	'01 (N=4,760) 평균(표준오차)	'05 (N=4,167) 평균(표준오차)	'07 (N=1,821) 평균(표준오차)	'08 (N=3,692) 평균(표준오차)	'09 (N=4,182) 평균(표준오차)	'10 (N=3,550) 평균(표준오차)
에너지(kcal)		2,148.2 (22.7)	2,079.7 (20.9)	2,220.2 (21.5)	2,116.9 (28.7)	2,155.6 (21.9)	2,181.7 (19.6)	2,382.5 (22.9)
단백질(g)		81.7 (1.1)	78.9 (0.9)	84.4 (0.9)	77.7 (1.3)	77.3 (1.0)	79.1 (0.9)	87.1 (1.1)
지방(g)		46.3 (0.8)	47.4 (0.8)	51.3 (0.8)	44.1 (1.0)	46.1 (0.8)	47.6 (0.8)	53.3 (0.9)
탄수화물(g)		340.3 (3.5)	314.9 (3.1)	327.6 (3.0)	325.6 (3.9)	330.6 (3.0)	333.0 (2.7)	356.0 (3.2)
조섬유(g)		7.0 (0.1)	7.1 (0.1)	7.9 (0.1)	7.1 (0.1)	7.3 (0.1)	7.4 (0.1)	7.7 (0.1)
칼슘(mg)		544.0 (9.8)	531.3 (7.5)	592.5 (8.4)	528.9 (11.9)	539.9 (7.5)	550.1 (6.6)	584.1 (7.7)
인(mg)		1,177.9 (13.2)	1,254.3 (13.2)	1,359.5 (13.6)	1,245.3 (18.6)	1,270.6 (13.1)	1,288.0 (11.8)	1,380.6 (13.7)
나트륨(mg)		5,034.6 (71.5)	5,280.3 (60.8)	5,852.2 (73.9)	5,186.5 (84.5)	5,380.7 (72.4)	5,453.8 (65.0)	5,708.6 (76.6)
칼륨(mg)		2,702.5 (33.5)	2,992.7 (32.2)	3,032.6 (31.2)	3,038.4 (50.8)	3,143.1 (36.9)	3,165.2 (33.8)	3,346.1 (38.5)
철(mg)		13.5 (0.2)	13.1 (0.2)	15.1 (0.2)	15.2 (0.3)	15.0 (0.3)	15.2 (0.2)	16.4 (0.3)
비타민 A(㎍RE)		668.8 (14.2)	680.0 (16.7)	844.6 (16.5)	822.3 (31.2)	861.4 (23.5)	841.5 (17.7)	910.8 (28.5)
티아민(mg)		1.49 (0.02)	1.40 (0.02)	1.48 (0.02)	1.44 (0.03)	1.43 (0.02)	1.47 (0.02)	1.60 (0.02)
리보플라빈(mg)		1.21 (0.02)	1.27 (0.02)	1.35 (0.02)	1.23 (0.02)	1.32 (0.02)	1.36 (0.02)	1.48 (0.02)
나이아신(mg)		17.3 (0.2)	18.4 (0.2)	19.1 (0.2)	17.3 (0.3)	17.5 (0.2)	18.2 (0.2)	19.9 (0.2)
비타민 C(mg)		121.3 (2.5)	128.0 (2.5)	103.4 (2.0)	96.3 (2.9)	103.5 (2.2)	105.3 (2.2)	110.3 (2.3)
급원별 에너지 섭취분율(%)[1]	단백질	15.3 (0.1)	15.5 (0.1)	15.8 (0.1)	15.3 (0.1)	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.2 (0.1)
	지방	18.9 (0.2)	20.2 (0.2)	21.1 (0.2)	18.9 (0.3)	19.3 (0.2)	19.7 (0.2)	20.2 (0.2)
	탄수화물	65.8 (0.2)	64.3 (0.2)	63.1 (0.2)	65.8 (0.4)	65.7 (0.3)	65.2 (0.3)	64.5 (0.3)

1) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-II-4. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 남자, 만1세이상, 1998-2010

구 분		'98 (N=4,984) 평균(표준오차)	'01 (N=4,760) 평균(표준오차)	'05 (N=4,167) 평균(표준오차)	'07 (N=1,821) 평균(표준오차)	'08 (N=3,692) 평균(표준오차)	'09 (N=4,182) 평균(표준오차)	'10 (N=3,550) 평균(표준오차)
에너지(kcal)		2,151.6 (22.8)	2,107.0 (21.8)	2,213.6 (20.6)	2,106.5 (27.9)	2,146.4 (21.1)	2,170.1 (18.7)	2,369.3 (22.3)
단백질(g)		82.1 (1.1)	80.2 (0.9)	84.1 (0.9)	77.2 (1.3)	77.0 (0.9)	78.8 (0.9)	86.8 (1.0)
지방(g)		45.3 (0.7)	47.3 (0.8)	50.8 (0.7)	43.8 (1.0)	46.1 (0.8)	47.6 (0.7)	53.5 (0.8)
탄수화물(g)		342.1 (3.5)	319.2 (3.3)	327.3 (2.9)	324.2 (3.7)	329.0 (3.0)	330.8 (2.7)	353.1 (3.1)
조섬유(g)		7.2 (0.1)	7.3 (0.1)	7.9 (0.1)	7.1 (0.1)	7.2 (0.1)	7.3 (0.1)	7.6 (0.1)
칼슘(mg)		541.2 (9.5)	533.7 (7.9)	592.2 (8.5)	526.3 (11.6)	538.0 (7.7)	548.1 (6.6)	580.9 (7.6)
인(mg)		1,179.1 (13.2)	1,272.0 (13.7)	1,357.4 (13.4)	1,238.6 (17.7)	1,265.0 (13.1)	1,281.4 (11.7)	1,372.5 (12.9)
나트륨(mg)		5,125.9 (73.3)	5,454.1 (63.9)	5,861.5 (71.9)	5,168.6 (81.1)	5,341.6 (69.5)	5,404.3 (63.6)	5,639.9 (71.1)
칼륨(mg)		2,727.8 (34.4)	3,054.7 (34.4)	3,031.6 (30.7)	3,026.3 (48.4)	3,123.7 (36.2)	3,143.1 (32.7)	3,313.8 (35.4)
철(mg)		13.7 (0.2)	13.4 (0.2)	15.1 (0.2)	15.1 (0.3)	14.9 (0.3)	15.0 (0.2)	16.2 (0.3)
비타민 A(㎍RE)		671.3 (14.3)	695.3 (17.6)	843.6 (16.2)	817.2 (28.9)	857.4 (24.2)	834.2 (17.3)	903.2 (27.6)
티아민(mg)		1.48 (0.02)	1.41 (0.02)	1.47 (0.02)	1.43 (0.03)	1.43 (0.02)	1.46 (0.02)	1.60 (0.02)
리보플라빈(mg)		1.19 (0.02)	1.28 (0.02)	1.34 (0.02)	1.22 (0.02)	1.32 (0.02)	1.36 (0.02)	1.48 (0.02)
나이아신(mg)		17.5 (0.2)	18.9 (0.2)	19.0 (0.2)	17.2 (0.3)	17.5 (0.2)	18.1 (0.2)	19.8 (0.2)
비타민 C(mg)		122.3 (2.5)	129.4 (2.6)	103.3 (2.0)	96.1 (3.0)	103.0 (2.2)	104.7 (2.3)	109.5 (2.2)
급원별 에너지 섭취분율(%)[2]	단백질	15.4 (0.1)	15.6 (0.1)	15.9 (0.1)	15.2 (0.1)	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.2 (0.1)
	지방	18.4 (0.2)	19.8 (0.2)	20.9 (0.2)	18.8 (0.3)	19.3 (0.2)	19.8 (0.2)	20.4 (0.2)
	탄수화물	66.2 (0.2)	64.6 (0.2)	63.3 (0.2)	65.9 (0.3)	65.7 (0.2)	65.1 (0.2)	64.4 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-Ⅱ-5. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2010

구 분		'98 (N=5,416) 평균(표준오차)	'01 (N=5,208) 평균(표준오차)	'05 (N=4,763) 평균(표준오차)	'07 (N=2,270) 평균(표준오차)	'08 (N=4,939) 평균(표준오차)	'09 (N=5,209) 평균(표준오차)	'10 (N=4,469) 평균(표준오차)
에너지(kcal)		1,724.7 (17.6)	1,701.5 (16.5)	1,735.6 (13.3)	1,542.3 (20.9)	1,578.9 (12.3)	1,585.4 (13.1)	1,716.7 (15.3)
단백질(g)		64.4 (1.0)	62.3 (0.7)	65.5 (0.6)	54.1 (0.9)	56.0 (0.6)	55.8 (0.5)	60.8 (0.7)
지방(g)		35.6 (0.6)	36.3 (0.6)	39.0 (0.6)	31.2 (0.8)	31.6 (0.5)	32.1 (0.4)	36.3 (0.7)
탄수화물(g)		289.2 (2.9)	276.1 (2.6)	274.3 (2.1)	261.5 (3.7)	267.3 (2.1)	268.0 (2.5)	286.0 (2.8)
조섬유(g)		6.1 (0.1)	6.4 (0.1)	6.5 (0.1)	5.7 (0.1)	6.3 (0.1)	6.3 (0.1)	6.5 (0.1)
칼슘(mg)		460.8 (7.2)	461.6 (6.8)	512.1 (7.5)	408.0 (7.8)	436.0 (6.1)	432.4 (6.1)	474.9 (6.7)
인(mg)		945.6 (10.6)	1,023.8 (10.1)	1,097.8 (9.7)	916.2 (13.1)	964.5 (8.7)	962.3 (8.3)	1,029.0 (10.3)
나트륨(mg)		4,024.6 (63.3)	4,513.8 (64.4)	4,655.3 (53.6)	3,735.6 (77.0)	3,874.0 (48.5)	3,831.1 (45.3)	4,041.7 (60.0)
칼륨(mg)		2,308.1 (30.4)	2,616.2 (33.6)	2,511.3 (24.3)	2,380.0 (43.1)	2,540.7 (31.6)	2,528.6 (31.5)	2,664.9 (37.2)
철(mg)		11.2 (0.2)	11.3 (0.2)	12.4 (0.2)	11.1 (0.3)	11.7 (0.2)	11.8 (0.2)	12.8 (0.2)
비타민 A(㎍RE)		547.9 (12.8)	564.8 (10.7)	717.3 (11.8)	649.1 (21.1)	680.6 (14.6)	694.9 (21.2)	700.8 (18.4)
티아민(mg)		1.20 (0.02)	1.15 (0.02)	1.14 (0.01)	1.04 (0.02)	1.05 (0.01)	1.05 (0.01)	1.15 (0.01)
리보플라빈(mg)		0.97 (0.01)	1.03 (0.01)	1.07 (0.01)	0.91 (0.02)	0.99 (0.01)	1.02 (0.01)	1.10 (0.01)
나이아신(mg)		13.6 (0.2)	14.8 (0.2)	14.8 (0.2)	12.1 (0.2)	12.6 (0.1)	12.7 (0.1)	14.1 (0.2)
비타민 C(mg)		124.1 (2.7)	137.8 (2.8)	94.7 (1.7)	90.0 (3.8)	96.6 (2.3)	95.5 (2.2)	101.0 (2.8)
급원별 에너지 섭취분율(%)[1]	단백질	14.6 (0.1)	14.6 (0.1)	15.2 (0.1)	14.0 (0.1)	14.2 (0.1)	14.0 (0.1)	14.1 (0.1)
	지방	17.6 (0.2)	18.4 (0.2)	19.5 (0.2)	17.6 (0.3)	17.4 (0.2)	17.6 (0.2)	18.3 (0.3)
	탄수화물	67.8 (0.2)	67.0 (0.2)	65.3 (0.2)	68.4 (0.4)	68.5 (0.2)	68.3 (0.2)	67.6 (0.3)

1) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-II-6. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)[1] : 여자, 만1세이상, 1998-2010

구 분		'98 (N=5,416) 평균(표준오차)	'01 (N=5,208) 평균(표준오차)	'05 (N=4,763) 평균(표준오차)	'07 (N=2,270) 평균(표준오차)	'08 (N=4,939) 평균(표준오차)	'09 (N=5,209) 평균(표준오차)	'10 (N=4,469) 평균(표준오차)
에너지(kcal)		1,728.5 (17.1)	1,713.1 (16.0)	1,742.2 (13.2)	1,548.9 (19.8)	1,583.4 (12.3)	1,589.5 (12.9)	1,724.7 (15.3)
단백질(g)		64.8 (1.0)	62.8 (0.7)	65.9 (0.6)	54.5 (0.8)	56.3 (0.6)	56.2 (0.5)	61.5 (0.7)
지방(g)		35.2 (0.6)	36.8 (0.6)	39.5 (0.5)	32.0 (0.7)	32.4 (0.5)	33.1 (0.4)	37.8 (0.6)
탄수화물(g)		290.6 (3.0)	277.3 (2.6)	274.4 (2.1)	260.9 (3.6)	265.9 (2.1)	266.0 (2.4)	283.8 (2.7)
조섬유(g)		6.2 (0.1)	6.4 (0.1)	6.5 (0.1)	5.6 (0.1)	6.2 (0.1)	6.1 (0.1)	6.4 (0.1)
칼슘(mg)		461.8 (7.1)	462.9 (6.6)	513.1 (7.5)	410.9 (7.7)	438.1 (6.2)	434.8 (5.9)	478.3 (6.7)
인(mg)		948.8 (10.4)	1,030.3 (9.8)	1,101.2 (9.7)	919.6 (12.8)	966.0 (8.6)	963.8 (8.3)	1,033.2 (10.2)
나트륨(mg)		4,065.3 (63.1)	4,548.8 (62.4)	4,659.7 (53.8)	3,737.8 (75.2)	3,866.8 (47.4)	3,819.8 (45.9)	4,014.9 (59.3)
칼륨(mg)		2,330.0 (30.4)	2,640.1 (32.5)	2,518.1 (23.9)	2,380.4 (42.9)	2,532.2 (30.4)	2,516.6 (30.5)	2,655.5 (36.4)
철(mg)		11.3 (0.2)	11.3 (0.2)	12.4 (0.2)	11.0 (0.2)	11.6 (0.2)	11.6 (0.2)	12.6 (0.2)
비타민 A(㎍RE)		551.5 (13.0)	572.1 (10.9)	719.4 (11.8)	650.0 (20.6)	682.2 (14.5)	694.9 (21.0)	696.9 (17.6)
티아민(mg)		1.20 (0.01)	1.16 (0.02)	1.15 (0.01)	1.04 (0.02)	1.05 (0.01)	1.06 (0.01)	1.16 (0.01)
리보플라빈(mg)		0.97 (0.01)	1.04 (0.01)	1.08 (0.01)	0.92 (0.01)	1.01 (0.01)	1.04 (0.01)	1.12 (0.01)
나이아신(mg)		13.7 (0.2)	15.0 (0.2)	14.9 (0.2)	12.2 (0.2)	12.7 (0.1)	12.7 (0.1)	14.2 (0.2)
비타민 C(mg)		125.4 (2.7)	139.3 (2.8)	95.1 (1.7)	90.1 (3.7)	96.6 (2.3)	95.6 (2.2)	101.2 (3.0)
급원별 에너지 섭취분율(%)[2]	단백질	14.6 (0.1)	14.7 (0.1)	15.2 (0.1)	14.1 (0.1)	14.2 (0.1)	14.1 (0.1)	14.2 (0.1)
	지방	17.4 (0.2)	18.5 (0.2)	19.7 (0.2)	18.0 (0.3)	17.8 (0.2)	18.2 (0.1)	19.0 (0.2)
	탄수화물	68.0 (0.2)	66.8 (0.2)	65.0 (0.2)	67.9 (0.3)	68.0 (0.2)	67.7 (0.2)	66.8 (0.3)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-II-7. 영양소별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2010

구 분	전체 (N=8,019) 평균 (표준오차)	남자 (N=3,550) 평균 (표준오차)	여자 (N=4,469) 평균 (표준오차)
에너지(kcal)	2,050.5 (16.5)	2,382.5 (22.9)	1,716.7 (15.3)
단백질(g)	74.0 (0.7)	87.1 (1.1)	60.8 (0.7)
지방(g)	35.5 (0.6)	43.7 (0.9)	27.3 (0.5)
탄수화물(g)	44.8 (0.6)	53.3 (0.9)	36.3 (0.7)
조섬유(g)	20.1 (0.4)	24.9 (0.6)	15.3 (0.4)
칼슘(mg)	321.1 (2.6)	356.0 (3.2)	286.0 (2.8)
인(mg)	7.1 (0.1)	7.7 (0.1)	6.5 (0.1)
나트륨(mg)	529.6 (5.7)	584.1 (7.7)	474.9 (6.7)
칼륨(mg)	1,205.3 (10.1)	1,380.6 (13.7)	1,029.0 (10.3)
철(mg)	4,877.5 (55.8)	5,708.6 (76.6)	4,041.7 (60.0)
비타민 A(㎍RE)	3,006.5 (32.3)	3,346.1 (38.5)	2,664.9 (37.2)
티아민(mg)	14.6 (0.2)	16.4 (0.3)	12.8 (0.2)
리보플라빈(mg)	806.1 (20.4)	910.8 (28.5)	700.8 (18.4)
나이아신(mg)	1.37 (0.01)	1.60 (0.02)	1.15 (0.01)
비타민 C(mg)	1.29 (0.01)	1.48 (0.02)	1.10 (0.01)
단백질급원 에너지섭취분율(%)[1)]	17.0 (0.2)	19.9 (0.2)	14.1 (0.2)
지방급원 에너지섭취분율(%)	105.7 (2.0)	110.3 (2.3)	101.0 (2.8)
탄수화물급원 에너지섭취분율(%)	14.7 (0.1)	15.2 (0.1)	14.1 (0.1)

1) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-II-8. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 전체, 만1세이상, 2010

식품군 \ 구분	섭취량 (g)	에너지 (kcal)	단백질 (g)	지방 (g)	탄수화물 (g)	조섬유 (g)	칼슘 (mg)	인 (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	312.9 (2.8)	1,063.4 (8.8)	21.2 (0.2)	8.62 (0.24)	218.6 (1.9)	1.47 (0.03)	38.1 (0.9)	386.6 (3.5)
감자・전분류	35.3 (1.6)	39.7 (1.8)	0.8 (0.0)	0.28 (0.03)	8.8 (0.4)	0.18 (0.01)	4.7 (0.3)	21.5 (1.0)
당류	9.8 (0.4)	35.4 (1.3)	0.1 (0.0)	0.22 (0.03)	8.7 (0.3)	0.01 (0.00)	1.1 (0.1)	1.4 (0.2)
두류	37.0 (1.1)	45.3 (1.4)	4.1 (0.1)	2.32 (0.07)	2.9 (0.1)	0.30 (0.01)	40.1 (1.2)	65.3 (1.9)
종실류	2.9 (0.2)	12.6 (0.8)	0.4 (0.0)	1.00 (0.07)	0.7 (0.0)	0.12 (0.01)	9.8 (0.3)	10.4 (0.6)
채소류	301.7 (4.2)	76.1 (1.1)	5.5 (0.1)	1.02 (0.02)	17.5 (0.2)	2.83 (0.04)	141.8 (2.9)	135.1 (1.9)
버섯류	5.0 (0.3)	1.6 (0.1)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.4 (0.0)	0.05 (0.00)	0.2 (0.0)	3.0 (0.2)
과일류	181.5 (7.2)	84.9 (3.8)	1.3 (0.0)	0.37 (0.02)	22.6 (1.0)	1.10 (0.07)	12.2 (0.6)	34.2 (1.6)
해조류	4.6 (0.3)	6.2 (0.3)	0.6 (0.0)	0.29 (0.02)	1.0 (0.0)	0.08 (0.00)	17.1 (0.6)	18.4 (0.8)
음료류	126.1 (5.2)	66.7 (2.1)	0.7 (0.0)	0.96 (0.03)	14.5 (0.5)	0.08 (0.01)	11.8 (0.5)	24.0 (0.7)
주류	140.0 (7.9)	100.3 (5.8)	0.7 (0.1)	0.00 (0.00)	2.6 (0.2)	0.00 (0.00)	3.1 (0.2)	16.1 (1.1)
조미료류	37.1 (0.8)	58.0 (1.4)	2.7 (0.1)	2.51 (0.09)	7.5 (0.2)	0.78 (0.02)	21.8 (0.5)	43.9 (0.9)
유지류(식물성)	8.4 (0.2)	67.8 (1.7)	0.1 (0.0)	7.14 (0.18)	1.0 (0.1)	0.01 (0.00)	2.0 (0.1)	6.8 (0.3)
기타(식물성)	1.4 (0.2)	2.6 (0.5)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.6 (0.1)	0.01 (0.00)	0.7 (0.1)	4.3 (0.8)
식물성식품 계	1,203.6 (15.1)	1,660.5 (13.2)	38.5 (0.4)	24.75 (0.38)	307.4 (2.6)	7.02 (0.12)	304.5 (3.7)	771.1 (6.8)
육류	102.1 (2.5)	190.3 (4.8)	17.7 (0.5)	12.15 (0.35)	1.2 (0.0)	0.00 (0.00)	8.9 (0.2)	145.0 (3.5)
난류	26.5 (0.8)	36.1 (1.1)	3.3 (0.1)	1.91 (0.06)	0.5 (0.0)	0.01 (0.00)	12.0 (0.4)	43.4 (1.3)
어패류	56.9 (1.8)	74.3 (2.2)	11.0 (0.3)	2.15 (0.09)	1.9 (0.1)	0.00 (0.00)	84.0 (2.4)	144.8 (4.0)
우유류	115.2 (3.3)	87.9 (2.7)	3.6 (0.1)	3.72 (0.12)	10.1 (0.4)	0.06 (0.01)	120.2 (3.6)	100.7 (3.1)
유지류(동물성)	0.2 (0.0)	1.3 (0.2)	0.0 (0.0)	0.15 (0.02)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
동물성식품 계	301.1 (4.4)	390.0 (6.1)	35.5 (0.6)	20.09 (0.39)	13.7 (0.4)	0.07 (0.01)	225.1 (4.1)	434.1 (6.5)
총계	1,504.7 (16.9)	2,050.5 (16.5)	74.0 (0.7)	44.84 (0.60)	321.1 (2.6)	7.09 (0.12)	529.6 (5.7)	1,205.3 (10.1)
식물성식품 섭취분율(%)	79.5 (0.2)	81.9 (0.2)	57.5 (0.4)	60.01 (0.39)	95.4 (0.1)	99.05 (0.08)	63.0 (0.4)	66.4 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	20.5 (0.2)	18.1 (0.2)	42.5 (0.4)	39.99 (0.39)	4.6 (0.1)	0.95 (0.08)	37.0 (0.4)	33.6 (0.3)

(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 전체, 만1세이상, 2010)

식품군 \ 구분	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A (㎍RE)	티아민 (㎍)	리보플라빈 (㎍)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	684.8 (16.3)	497.3 (5.3)	2.34 (0.04)	25.4 (1.3)	424.7 (5.0)	215.9 (5.6)	4.8 (0.1)	1.2 (0.1)
감자・전분류	7.0 (0.6)	143.4 (7.3)	0.28 (0.01)	2.2 (0.3)	30.1 (1.5)	17.4 (0.9)	0.3 (0.0)	8.9 (0.5)
당류	1.5 (0.3)	3.6 (0.4)	0.04 (0.00)	0.2 (0.0)	1.2 (0.2)	1.7 (0.3)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
두류	14.8 (1.0)	93.5 (4.0)	0.82 (0.02)	0.3 (0.1)	34.1 (1.3)	21.1 (0.8)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류	0.7 (0.2)	16.2 (1.1)	0.13 (0.01)	0.1 (0.0)	10.9 (0.7)	5.7 (0.5)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류	1,357.8 (28.9)	831.5 (11.9)	3.53 (0.10)	369.1 (11.2)	190.8 (3.0)	210.5 (4.2)	1.7 (0.0)	49.9 (0.8)
버섯류	0.3 (0.0)	15.2 (0.8)	0.05 (0.00)	0.0 (0.0)	7.6 (0.4)	12.3 (0.7)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
과일류	33.6 (4.0)	319.0 (13.6)	1.13 (0.07)	83.5 (8.1)	79.1 (4.3)	67.3 (3.5)	0.6 (0.0)	32.1 (1.8)
해조류	117.0 (5.1)	122.7 (4.4)	0.57 (0.03)	74.9 (3.7)	21.8 (1.0)	73.5 (3.1)	0.2 (0.0)	2.0 (0.1)
음료류	19.9 (0.8)	127.7 (4.0)	0.63 (0.06)	39.0 (10.4)	18.8 (1.3)	22.1 (1.1)	1.0 (0.0)	5.0 (0.4)
주류	5.8 (0.4)	20.1 (1.4)	0.05 (0.00)	0.0 (0.0)	8.1 (0.6)	22.0 (1.5)	0.4 (0.0)	0.3 (0.0)
조미료류	2,110.6 (38.7)	185.8 (3.5)	1.04 (0.02)	96.9 (2.6)	77.0 (2.6)	71.5 (1.5)	0.7 (0.0)	1.8 (0.1)
유지류(식물성)	5.5 (0.3)	12.4 (0.6)	0.02 (0.00)	0.2 (0.1)	1.2 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)	0.5 (0.1)	9.3 (1.7)	0.19 (0.04)	0.1 (0.0)	11.9 (2.0)	8.9 (1.6)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
식물성식품 계	4,359.8 (50.7)	2,397.7 (28.7)	10.82 (0.17)	691.8 (19.1)	917.3 (8.9)	750.6 (9.3)	10.2 (0.1)	101.7 (2.0)
육류	121.5 (4.4)	232.7 (5.9)	1.57 (0.05)	25.8 (3.6)	317.9 (9.4)	179.8 (5.1)	4.1 (0.1)	1.8 (0.1)
난류	39.7 (1.2)	40.0 (1.2)	0.45 (0.01)	32.6 (1.1)	17.1 (0.6)	95.3 (3.1)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류	284.1 (9.9)	169.2 (4.9)	1.53 (0.05)	21.8 (3.5)	53.8 (3.1)	92.4 (3.6)	2.3 (0.1)	0.3 (0.0)
우유류	70.8 (2.3)	166.8 (4.9)	0.20 (0.01)	33.4 (1.2)	67.7 (3.3)	172.3 (5.1)	0.2 (0.0)	1.8 (0.1)
유지류(동물성)	1.2 (0.1)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.7 (0.1)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.4 (0.1)	0.1 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.8 (0.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계	517.7 (11.9)	608.8 (9.3)	3.76 (0.08)	114.4 (5.3)	456.7 (9.8)	540.7 (8.7)	6.8 (0.1)	4.0 (0.1)
총계	4,877.5 (55.8)	3,006.5 (32.3)	14.58 (0.20)	806.1 (20.4)	1,373.9 (14.0)	1,291.3 (13.4)	17.0 (0.2)	105.7 (2.0)
식물성식품 섭취분율(%)	88.2 (0.2)	79.4 (0.2)	74.06 (0.34)	83.6 (0.3)	72.2 (0.4)	62.0 (0.4)	66.1 (0.4)	94.4 (0.2)
동물성식품 섭취분율(%)	11.8 (0.2)	20.6 (0.2)	25.94 (0.34)	16.4 (0.3)	27.8 (0.4)	38.0 (0.4)	33.9 (0.4)	5.6 (0.2)

표 2-II-9. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 남자, 만1세이상, 2010

구분 / 식품군	섭취량 (g)	에너지 (kcal)	단백질 (g)	지방 (g)	탄수화물 (g)	조섬유 (g)	칼슘 (mg)	인 (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	346.6 (4.0)	1,194.1 (12.6)	23.7 (0.3)	9.57 (0.37)	245.7 (2.5)	1.63 (0.04)	41.2 (1.4)	432.5 (4.9)
감자・전분류	32.9 (1.9)	37.7 (2.0)	0.8 (0.1)	0.39 (0.06)	8.0 (0.4)	0.16 (0.01)	3.9 (0.3)	21.2 (1.3)
당류	11.1 (0.4)	40.6 (1.4)	0.1 (0.0)	0.19 (0.04)	10.0 (0.3)	0.01 (0.00)	1.0 (0.1)	1.3 (0.2)
두류	42.9 (1.7)	51.6 (1.9)	4.8 (0.2)	2.71 (0.10)	3.2 (0.1)	0.33 (0.02)	47.0 (1.8)	75.2 (2.7)
종실류	3.1 (0.3)	13.9 (1.3)	0.5 (0.1)	1.13 (0.11)	0.8 (0.1)	0.14 (0.01)	11.2 (0.5)	11.7 (1.0)
채소류	341.2 (5.4)	86.8 (1.4)	6.3 (0.1)	1.18 (0.02)	19.9 (0.3)	3.23 (0.05)	158.6 (3.6)	155.1 (2.5)
버섯류	5.2 (0.4)	1.6 (0.1)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.4 (0.0)	0.05 (0.00)	0.2 (0.0)	3.1 (0.2)
과일류	162.4 (7.7)	75.2 (3.7)	1.1 (0.1)	0.33 (0.02)	20.0 (1.0)	0.95 (0.07)	10.8 (0.7)	29.7 (1.6)
해조류	4.7 (0.3)	6.9 (0.4)	0.7 (0.0)	0.33 (0.02)	1.0 (0.0)	0.08 (0.00)	17.9 (0.8)	20.3 (1.1)
음료류	147.7 (6.9)	81.4 (3.0)	0.8 (0.0)	1.14 (0.05)	17.7 (0.7)	0.09 (0.01)	13.7 (0.6)	28.4 (0.9)
주류	229.3 (14.4)	170.1 (10.9)	1.1 (0.1)	0.00 (0.00)	4.0 (0.3)	0.00 (0.00)	5.0 (0.4)	25.5 (2.0)
조미료류	43.7 (1.1)	67.5 (2.1)	3.2 (0.1)	2.77 (0.14)	9.1 (0.3)	0.95 (0.03)	26.1 (0.7)	51.7 (1.2)
유지류(식물성)	10.3 (0.3)	82.3 (2.4)	0.1 (0.0)	8.63 (0.27)	1.4 (0.1)	0.01 (0.00)	2.6 (0.2)	8.8 (0.5)
기타(식물성)	1.4 (0.2)	2.4 (0.5)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.5 (0.1)	0.01 (0.00)	0.9 (0.2)	3.9 (0.8)
식물성식품 계	1,382.7 (21.1)	1,912.2 (18.3)	43.5 (0.5)	28.40 (0.52)	341.8 (3.1)	7.63 (0.13)	340.1 (5.0)	868.4 (8.5)
육류	128.9 (3.9)	247.9 (8.1)	22.7 (0.7)	16.05 (0.59)	1.5 (0.1)	0.00 (0.00)	11.2 (0.4)	184.2 (5.5)
난류	31.7 (1.2)	43.1 (1.6)	3.9 (0.2)	2.27 (0.08)	0.6 (0.0)	0.01 (0.00)	14.4 (0.5)	52.0 (1.9)
어패류	69.6 (2.5)	90.9 (3.1)	13.5 (0.5)	2.64 (0.12)	2.2 (0.1)	0.00 (0.00)	100.3 (3.2)	177.0 (5.7)
우유류	113.8 (4.2)	86.8 (3.2)	3.5 (0.1)	3.76 (0.15)	9.8 (0.4)	0.05 (0.01)	118.0 (4.6)	98.9 (3.9)
유지류(동물성)	0.2 (0.0)	1.4 (0.2)	0.0 (0.0)	0.16 (0.03)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
동물성식품 계	344.4 (6.2)	470.3 (9.1)	43.7 (0.9)	24.89 (0.62)	14.2 (0.4)	0.06 (0.01)	244.0 (5.4)	512.2 (9.3)
총계	1,727.1 (23.2)	2,382.5 (22.9)	87.1 (1.1)	53.29 (0.88)	356.0 (3.2)	7.69 (0.13)	584.1 (7.7)	1,380.6 (13.7)
식물성식품 섭취분율(%)	79.3 (0.3)	81.1 (0.3)	55.2 (0.5)	58.15 (0.54)	95.7 (0.1)	99.21 (0.08)	63.0 (0.5)	65.1 (0.4)
동물성식품 섭취분율(%)	20.7 (0.3)	18.9 (0.3)	44.8 (0.5)	41.85 (0.54)	4.3 (0.1)	0.79 (0.08)	37.0 (0.5)	34.9 (0.4)

(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 남자, 만1세이상, 2010)

구분 / 식품군	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A (㎍RE)	티아민 (㎍)	리보플라빈 (㎍)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	784.5 (25.7)	558.2 (6.9)	2.51 (0.05)	28.9 (1.8)	484.0 (8.4)	247.7 (10.5)	5.3 (0.1)	1.4 (0.2)
감자・전분류	8.1 (1.0)	133.8 (8.7)	0.29 (0.02)	1.5 (0.2)	30.3 (2.0)	16.3 (1.1)	0.3 (0.0)	8.0 (0.5)
당류	1.5 (0.3)	3.5 (0.6)	0.05 (0.00)	0.1 (0.0)	1.0 (0.2)	1.6 (0.5)	0.0 (0.0)	0.2 (0.0)
두류	16.9 (1.7)	103.6 (5.0)	0.92 (0.03)	0.3 (0.2)	37.8 (1.7)	23.6 (1.0)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류	0.5 (0.1)	17.8 (1.8)	0.14 (0.01)	0.1 (0.0)	11.9 (1.1)	6.0 (0.7)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류	1,570.9 (39.6)	951.2 (15.4)	3.90 (0.12)	406.3 (14.2)	218.7 (3.9)	241.2 (5.7)	1.9 (0.0)	56.9 (1.1)
버섯류	0.3 (0.0)	15.7 (1.2)	0.05 (0.01)	0.0 (0.0)	7.8 (0.6)	12.3 (0.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
과일류	31.0 (4.3)	281.1 (14.6)	0.94 (0.07)	72.0 (8.1)	69.8 (5.2)	56.3 (3.5)	0.5 (0.0)	28.0 (2.1)
해조류	120.2 (5.5)	132.0 (5.9)	0.60 (0.04)	84.1 (5.4)	24.4 (1.5)	81.8 (4.5)	0.3 (0.0)	2.2 (0.1)
음료류	24.6 (1.3)	151.7 (5.5)	0.90 (0.12)	64.0 (19.5)	23.0 (2.3)	26.5 (1.9)	1.1 (0.0)	6.3 (0.7)
주류	9.3 (0.7)	31.2 (2.4)	0.08 (0.01)	0.0 (0.0)	12.8 (1.1)	35.3 (2.8)	0.5 (0.0)	0.5 (0.1)
조미료류	2,529.7 (52.1)	222.8 (5.1)	1.25 (0.03)	120.8 (4.2)	95.2 (3.5)	86.2 (2.3)	0.8 (0.0)	2.2 (0.1)
유지류(식물성)	7.2 (0.5)	16.0 (0.9)	0.02 (0.00)	0.2 (0.1)	1.3 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)	0.7 (0.2)	8.5 (1.7)	0.17 (0.05)	0.1 (0.1)	10.9 (2.1)	8.1 (1.6)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
식물성식품 계	5,105.3 (69.1)	2,627.1 (33.1)	11.84 (0.22)	778.4 (26.8)	1,029.0 (12.6)	843.4 (14.1)	11.5 (0.1)	106.0 (2.3)
육류	147.3 (7.4)	298.2 (9.7)	1.97 (0.08)	31.3 (4.9)	416.6 (15.9)	233.3 (8.7)	5.3 (0.2)	2.1 (0.2)
난류	47.4 (1.8)	47.8 (1.9)	0.54 (0.02)	38.4 (1.5)	20.6 (0.9)	114.0 (4.8)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류	338.7 (14.4)	208.4 (6.9)	1.82 (0.07)	29.3 (5.8)	67.5 (4.5)	114.2 (5.3)	2.8 (0.1)	0.4 (0.0)
우유류	68.1 (2.7)	164.4 (6.3)	0.20 (0.01)	32.6 (1.4)	67.2 (3.8)	172.0 (6.9)	0.2 (0.0)	1.8 (0.1)
유지류(동물성)	1.4 (0.2)	0.1 (0.0)	0.00 (0.00)	0.8 (0.1)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.4 (0.2)	0.1 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	1.0 (0.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계	603.2 (17.7)	719.0 (13.7)	4.54 (0.12)	132.5 (8.1)	572.0 (15.8)	634.4 (13.0)	8.4 (0.2)	4.3 (0.2)
총계	5,708.6 (76.6)	3,346.1 (38.5)	16.38 (0.27)	910.8 (28.5)	1,601.1 (20.9)	1,477.7 (19.8)	19.9 (0.2)	110.3 (2.3)
식물성식품 섭취분율(%)	88.3 (0.2)	78.2 (0.3)	72.26 (0.43)	83.4 (0.4)	70.0 (0.5)	60.5 (0.5)	63.3 (0.5)	94.4 (0.2)
동물성식품 섭취분율(%)	11.7 (0.2)	21.8 (0.3)	27.74 (0.43)	16.6 (0.4)	30.0 (0.5)	39.5 (0.5)	36.7 (0.5)	5.6 (0.2)

표 2-II-10. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 여자, 만1세이상, 2010

구분 / 식품군	섭취량 (g)	에너지 (kcal)	단백질 (g)	지방 (g)	탄수화물 (g)	조섬유 (g)	칼슘 (mg)	인 (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	279.0 (3.1)	931.9 (9.2)	18.7 (0.2)	7.67 (0.28)	191.3 (2.0)	1.32 (0.03)	34.9 (1.0)	340.6 (3.7)
감자・전분류	37.6 (2.4)	41.8 (2.6)	0.8 (0.1)	0.17 (0.02)	9.6 (0.6)	0.19 (0.02)	5.6 (0.5)	21.7 (1.4)
당류	8.4 (0.5)	30.2 (1.7)	0.1 (0.0)	0.24 (0.04)	7.3 (0.4)	0.01 (0.00)	1.2 (0.2)	1.5 (0.2)
두류	31.0 (1.3)	38.9 (1.5)	3.5 (0.1)	1.93 (0.08)	2.7 (0.1)	0.27 (0.01)	33.1 (1.2)	55.3 (2.0)
종실류	2.7 (0.2)	11.3 (0.9)	0.4 (0.0)	0.86 (0.07)	0.7 (0.1)	0.11 (0.01)	8.5 (0.3)	9.0 (0.6)
채소류	261.9 (4.5)	65.3 (1.1)	4.7 (0.1)	0.86 (0.02)	15.1 (0.3)	2.43 (0.04)	124.8 (2.9)	115.0 (1.9)
버섯류	4.8 (0.3)	1.6 (0.1)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.4 (0.0)	0.05 (0.00)	0.2 (0.0)	3.0 (0.2)
과일류	200.6 (8.8)	94.8 (4.6)	1.4 (0.1)	0.41 (0.03)	25.3 (1.2)	1.26 (0.10)	13.6 (0.7)	38.8 (2.1)
해조류	4.6 (0.3)	5.4 (0.2)	0.6 (0.0)	0.24 (0.01)	0.9 (0.0)	0.07 (0.00)	16.4 (0.8)	16.5 (0.7)
음료류	104.4 (5.6)	51.9 (1.9)	0.5 (0.0)	0.78 (0.03)	11.2 (0.5)	0.07 (0.01)	9.9 (0.6)	19.7 (0.8)
주류	50.3 (4.1)	30.0 (2.3)	0.2 (0.0)	0.00 (0.00)	1.2 (0.1)	0.00 (0.00)	1.2 (0.1)	6.8 (0.7)
조미료류	30.4 (0.8)	48.4 (1.6)	2.2 (0.1)	2.25 (0.12)	5.8 (0.2)	0.62 (0.02)	17.5 (0.5)	35.9 (0.9)
유지류(식물성)	6.5 (0.2)	53.1 (1.7)	0.1 (0.0)	5.65 (0.19)	0.7 (0.0)	0.01 (0.00)	1.4 (0.1)	4.9 (0.3)
기타(식물성)	1.4 (0.3)	2.8 (0.7)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.6 (0.2)	0.01 (0.00)	0.5 (0.1)	4.7 (1.2)
식물성식품 계	1,023.5 (15.2)	1,407.5 (12.8)	33.5 (0.4)	21.08 (0.45)	272.7 (2.7)	6.41 (0.14)	268.7 (3.9)	673.3 (7.3)
육류	75.2 (2.2)	132.3 (4.0)	12.6 (0.4)	8.23 (0.28)	0.9 (0.0)	0.00 (0.00)	6.6 (0.2)	105.7 (3.4)
난류	21.3 (0.7)	29.0 (1.0)	2.6 (0.1)	1.54 (0.05)	0.4 (0.0)	0.01 (0.00)	9.6 (0.3)	34.8 (1.2)
어패류	44.1 (1.6)	57.5 (2.0)	8.4 (0.3)	1.66 (0.08)	1.6 (0.1)	0.00 (0.00)	67.5 (2.7)	112.5 (3.6)
우유류	116.7 (3.7)	89.1 (3.6)	3.7 (0.1)	3.69 (0.16)	10.4 (0.5)	0.07 (0.01)	122.4 (4.2)	102.5 (3.5)
유지류(동물성)	0.2 (0.0)	1.1 (0.2)	0.0 (0.0)	0.13 (0.02)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
동물성식품 계	257.5 (4.6)	309.2 (6.3)	27.3 (0.5)	15.26 (0.37)	13.3 (0.5)	0.08 (0.01)	206.2 (4.8)	355.6 (6.4)
총계	1,281.0 (17.1)	1,716.7 (15.3)	60.8 (0.7)	36.34 (0.66)	286.0 (2.8)	6.50 (0.14)	474.9 (6.7)	1,029.0 (10.3)
식물성식품 섭취분율(%)	79.8 (0.3)	82.6 (0.3)	59.9 (0.5)	61.89 (0.48)	95.0 (0.2)	98.90 (0.12)	63.0 (0.5)	67.7 (0.4)
동물성식품 섭취분율(%)	20.2 (0.3)	17.4 (0.3)	40.1 (0.5)	38.11 (0.48)	5.0 (0.2)	1.10 (0.12)	37.0 (0.5)	32.3 (0.4)

(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 여자, 만1세이상, 2010)

구분 / 식품군	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A (㎍RE)	티아민 (㎍)	리보플라빈 (㎍)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류	584.6 (16.0)	436.0 (5.9)	2.17 (0.05)	21.9 (1.6)	365.1 (4.2)	184.0 (3.8)	4.3 (0.1)	1.0 (0.2)
감자・전분류	5.9 (0.5)	153.0 (10.7)	0.26 (0.01)	3.0 (0.4)	30.0 (2.1)	18.6 (1.3)	0.3 (0.0)	9.8 (0.7)
당류	1.5 (0.3)	3.7 (0.5)	0.04 (0.00)	0.2 (0.0)	1.4 (0.4)	1.8 (0.4)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
두류	12.6 (1.3)	83.3 (4.1)	0.71 (0.03)	0.3 (0.1)	30.3 (1.4)	18.6 (0.8)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류	0.9 (0.3)	14.5 (1.1)	0.12 (0.01)	0.1 (0.0)	10.0 (0.8)	5.5 (0.7)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류	1,143.5 (29.6)	711.1 (12.6)	3.16 (0.10)	331.7 (10.8)	162.7 (3.0)	179.6 (3.9)	1.4 (0.0)	42.9 (0.9)
버섯류	0.3 (0.0)	14.7 (1.0)	0.05 (0.00)	0.0 (0.0)	7.3 (0.5)	12.4 (0.9)	0.1 (0.0)	0.2 (0.0)
과일류	36.2 (5.0)	357.1 (16.8)	1.31 (0.09)	95.0 (9.7)	88.3 (5.1)	78.2 (4.5)	0.7 (0.0)	36.3 (2.2)
해조류	113.7 (7.1)	113.4 (4.8)	0.54 (0.03)	65.6 (3.1)	19.1 (0.9)	65.1 (2.6)	0.2 (0.0)	1.8 (0.1)
음료류	15.1 (0.8)	103.6 (4.5)	0.36 (0.04)	13.9 (4.6)	14.5 (1.5)	17.7 (1.1)	0.8 (0.0)	3.6 (0.3)
주류	2.4 (0.2)	8.9 (0.9)	0.02 (0.00)	0.0 (0.0)	3.4 (0.3)	8.7 (0.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
조미료류	1,689.2 (39.0)	148.6 (3.4)	0.83 (0.02)	72.9 (2.5)	58.7 (2.2)	56.6 (1.4)	0.5 (0.0)	1.3 (0.0)
유지류(식물성)	3.7 (0.3)	8.8 (0.6)	0.02 (0.00)	0.2 (0.1)	1.1 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)	0.3 (0.1)	10.2 (2.5)	0.20 (0.06)	0.0 (0.0)	12.8 (2.9)	9.8 (2.4)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
식물성식품 계	3,610.0 (56.5)	2,167.0 (33.0)	9.78 (0.20)	604.7 (17.4)	804.9 (9.4)	657.3 (9.0)	9.0 (0.1)	97.4 (2.8)
육류	95.6 (4.9)	166.7 (5.3)	1.17 (0.04)	20.4 (2.8)	218.6 (8.6)	126.0 (4.0)	3.0 (0.1)	1.5 (0.1)
난류	31.9 (1.1)	32.1 (1.1)	0.36 (0.01)	26.8 (1.1)	13.6 (0.5)	76.6 (2.9)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류	229.2 (8.2)	129.7 (4.7)	1.25 (0.04)	14.2 (2.3)	40.1 (2.6)	70.5 (3.2)	1.8 (0.1)	0.3 (0.0)
우유류	73.6 (3.0)	169.3 (5.5)	0.21 (0.01)	34.2 (1.3)	68.2 (3.6)	172.7 (5.3)	0.2 (0.0)	1.9 (0.1)
유지류(동물성)	1.1 (0.2)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)	0.4 (0.1)	0.1 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.7 (0.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계	431.7 (10.4)	497.9 (9.3)	2.99 (0.06)	96.1 (3.9)	340.6 (9.4)	446.5 (8.3)	5.1 (0.1)	3.7 (0.2)
총계	4,041.7 (60.0)	2,664.9 (37.2)	12.77 (0.21)	700.8 (18.4)	1,145.5 (14.4)	1,103.9 (13.7)	14.1 (0.2)	101.0 (2.8)
식물성식품 섭취분율(%)	88.0 (0.2)	80.5 (0.3)	75.88 (0.40)	83.8 (0.4)	74.4 (0.5)	63.5 (0.5)	68.8 (0.5)	94.5 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	12.0 (0.2)	19.5 (0.3)	24.12 (0.40)	16.2 (0.4)	25.6 (0.5)	36.5 (0.5)	31.2 (0.5)	5.5 (0.3)

표 2-II-11. 영양소별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	8,019	2,050.5 (16.5)	74.0 (0.7)	44.8 (0.6)	321.1 (2.6)	7.1 (0.1)
19세이상	5,944	2,090.2 (17.3)	76.0 (0.8)	43.5 (0.7)	328.0 (2.7)	7.7 (0.1)
연령(세)						
1-9	1,104	1,471.3 (23.7)	51.4 (1.0)	35.5 (0.8)	237.6 (3.9)	3.7 (0.1)
10-18	971	2,212.8 (45.1)	77.8 (1.9)	60.2 (1.7)	336.7 (6.6)	5.7 (0.2)
19-29	692	2,201.2 (48.4)	82.7 (2.3)	58.7 (1.9)	311.0 (6.1)	6.2 (0.2)
30-39	1,148	2,252.9 (38.4)	85.8 (2.1)	52.5 (1.4)	336.5 (5.1)	7.8 (0.2)
40-49	1,103	2,148.9 (29.3)	79.0 (1.3)	43.9 (1.1)	334.3 (4.4)	8.4 (0.2)
50-59	1,107	2,088.9 (35.1)	73.6 (1.5)	36.4 (1.1)	343.7 (6.1)	8.7 (0.3)
60-69	999	1,877.0 (27.3)	63.7 (1.5)	28.9 (1.1)	333.3 (5.1)	8.4 (0.2)
70+	895	1,588.7 (32.0)	50.5 (1.3)	19.8 (0.7)	294.0 (5.8)	6.3 (0.2)
1-2	243	1,113.5 (31.1)	38.1 (1.2)	26.9 (1.1)	181.5 (5.9)	2.5 (0.1)
3-5	351	1,334.0 (32.8)	46.0 (1.2)	33.4 (1.3)	214.4 (5.2)	3.3 (0.1)
6-11	779	1,809.1 (27.8)	63.7 (1.3)	44.0 (1.2)	289.9 (4.3)	4.8 (0.2)
12-18	702	2,277.1 (55.2)	80.2 (2.2)	62.9 (2.1)	343.4 (8.0)	5.8 (0.2)
19-29	692	2,201.2 (48.4)	82.7 (2.3)	58.7 (1.9)	311.0 (6.1)	6.2 (0.2)
30-49	2,251	2,200.1 (25.0)	82.3 (1.2)	48.1 (0.9)	335.4 (3.5)	8.1 (0.2)
50-64	1,613	2,046.6 (28.6)	71.9 (1.2)	35.2 (1.0)	341.3 (5.0)	8.7 (0.2)
65+	1,388	1,669.2 (28.7)	53.7 (1.1)	21.7 (0.6)	306.9 (5.5)	6.9 (0.2)
거주지역						
동	6,343	2,059.1 (18.3)	75.3 (0.9)	46.5 (0.7)	319.8 (2.8)	7.1 (0.1)
읍면	1,676	2,019.0 (36.2)	69.5 (1.5)	38.8 (1.4)	325.8 (6.4)	7.2 (0.3)
소득수준[1)]						
하	1,952	1,983.2 (27.0)	70.0 (1.3)	42.2 (1.1)	311.1 (3.9)	6.6 (0.2)
중하	1,987	2,036.5 (31.4)	72.2 (1.3)	44.9 (1.3)	318.8 (4.1)	6.8 (0.2)
중상	2,000	2,077.4 (30.0)	75.5 (1.3)	45.2 (1.3)	325.9 (4.4)	7.5 (0.2)
상	1,979	2,127.0 (28.2)	79.3 (1.4)	47.6 (1.1)	332.5 (4.5)	7.7 (0.2)
거주지역(표준화)[2)]						
동	6,343	2,045.6 (17.6)	74.8 (0.8)	46.4 (0.6)	317.7 (2.7)	7.0 (0.1)
읍면	1,676	2,065.7 (38.4)	72.1 (1.5)	43.9 (1.2)	322.8 (5.9)	6.9 (0.2)
소득수준(표준화)						
하	1,952	1,982.0 (26.9)	70.2 (1.2)	42.6 (1.0)	309.7 (3.8)	6.5 (0.2)
중하	1,987	2,027.2 (31.5)	72.1 (1.4)	45.4 (1.2)	315.8 (4.0)	6.7 (0.1)
중상	2,000	2,079.8 (29.4)	76.0 (1.3)	46.7 (1.2)	323.2 (4.2)	7.3 (0.2)
상	1,979	2,136.3 (27.4)	79.8 (1.3)	49.0 (1.1)	331.4 (4.5)	7.5 (0.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A(㎍RE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	529.6 (5.7)	1,205.3 (10.1)	4,877.5 (55.8)	3,006.5 (32.3)	14.6 (0.2)	806.1 (20.4)
19세이상	535.2 (6.3)	1,236.3 (10.8)	5,240.4 (62.5)	3,175.6 (35.0)	15.5 (0.2)	864.4 (24.2)
연령(세)						
1-9	479.6 (11.4)	900.2 (14.1)	2,374.2 (53.3)	1,957.6 (33.5)	8.6 (0.2)	507.6 (19.7)
10-18	529.7 (15.0)	1,225.8 (25.4)	4,353.2 (110.9)	2,678.0 (66.1)	12.7 (0.3)	647.8 (22.5)
19-29	507.6 (15.0)	1,224.0 (27.9)	4,937.2 (142.5)	2,953.5 (64.2)	14.3 (0.5)	808.4 (38.8)
30-39	566.3 (12.2)	1,353.1 (25.1)	5,820.1 (130.3)	3,422.3 (61.8)	15.6 (0.4)	958.6 (50.7)
40-49	581.6 (14.9)	1,304.3 (19.0)	5,620.2 (128.0)	3,392.5 (58.6)	17.0 (0.5)	931.3 (44.3)
50-59	561.7 (13.3)	1,250.1 (21.9)	5,445.3 (135.4)	3,391.8 (75.4)	16.6 (0.5)	958.3 (52.1)
60-69	503.4 (12.2)	1,136.6 (21.0)	4,669.3 (119.8)	3,075.6 (68.3)	15.3 (0.5)	778.5 (42.9)
70+	399.1 (14.3)	921.2 (19.9)	3,913.1 (114.0)	2,271.1 (65.6)	12.8 (0.6)	527.8 (28.9)
1-2	498.0 (23.6)	748.6 (24.8)	1,400.6 (53.4)	1,606.2 (61.8)	6.9 (0.3)	482.0 (36.4)
3-5	466.6 (17.4)	830.8 (20.4)	2,039.1 (72.1)	1,782.4 (45.4)	7.7 (0.3)	439.3 (21.5)
6-11	510.4 (14.0)	1,064.3 (18.4)	3,300.8 (78.7)	2,336.8 (50.4)	10.9 (0.3)	573.5 (25.4)
12-18	521.5 (17.5)	1,244.9 (29.9)	4,503.2 (134.9)	2,718.4 (78.7)	12.8 (0.4)	661.9 (26.7)
19-29	507.6 (15.0)	1,224.0 (27.9)	4,937.2 (142.5)	2,953.5 (64.2)	14.3 (0.5)	808.4 (38.8)
30-49	574.0 (9.0)	1,328.3 (15.1)	5,718.6 (92.0)	3,407.2 (44.7)	16.3 (0.3)	944.8 (34.6)
50-64	553.1 (10.8)	1,233.6 (18.1)	5,284.1 (114.9)	3,343.9 (64.9)	16.3 (0.4)	926.8 (42.7)
65+	424.6 (12.6)	974.5 (16.6)	4,117.7 (96.7)	2,491.3 (56.3)	13.5 (0.5)	590.9 (32.9)
거주지역						
동	534.4 (6.4)	1,218.0 (11.4)	4,846.2 (59.9)	3,039.4 (35.7)	14.6 (0.2)	806.7 (20.4)
읍면	512.4 (13.5)	1,159.0 (20.1)	4,991.8 (139.0)	2,886.0 (72.0)	14.5 (0.5)	803.8 (56.2)
소득수준						
하	486.6 (9.5)	1,142.8 (15.9)	4,685.4 (93.0)	2,807.5 (45.2)	13.1 (0.3)	720.8 (28.1)
중하	521.9 (12.4)	1,179.0 (18.0)	4,875.2 (103.1)	2,928.1 (48.4)	14.2 (0.4)	763.5 (25.2)
중상	549.7 (11.7)	1,233.4 (17.7)	4,882.4 (83.1)	3,119.6 (57.6)	15.3 (0.4)	849.9 (38.8)
상	569.6 (10.0)	1,283.1 (18.6)	5,141.7 (118.6)	3,235.4 (53.6)	16.1 (0.4)	916.6 (49.0)
거주지역(표준화)						
동	532.4 (6.2)	1,210.1 (10.7)	4,785.7 (56.4)	3,010.8 (33.5)	14.5 (0.2)	798.4 (19.7)
읍면	519.4 (14.1)	1,181.3 (21.8)	4,956.7 (119.7)	2,887.8 (64.7)	14.2 (0.5)	803.8 (45.8)
소득수준(표준화)						
하	486.0 (9.1)	1,142.3 (15.5)	4,656.9 (88.5)	2,802.8 (43.6)	13.0 (0.3)	721.2 (27.9)
중하	522.0 (12.1)	1,175.2 (17.7)	4,828.1 (97.0)	2,904.8 (45.7)	14.0 (0.4)	758.3 (25.0)
중상	551.7 (12.0)	1,233.9 (17.2)	4,817.3 (82.5)	3,089.4 (52.8)	15.2 (0.4)	842.5 (39.9)
상	569.3 (9.6)	1,284.6 (17.7)	5,094.0 (117.4)	3,205.7 (50.8)	15.8 (0.3)	903.6 (45.3)

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%)[3]		
					단백질	지방	탄수화물
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	1.37 (0.01)	1.29 (0.01)	17.0 (0.2)	105.7 (2.0)	14.7 (0.1)	19.3 (0.2)	66.1 (0.2)
19세이상	1.39 (0.02)	1.29 (0.02)	17.8 (0.2)	110.7 (2.1)	14.8 (0.1)	18.4 (0.2)	66.8 (0.3)
연령(세)							
1-9	0.99 (0.03)	1.10 (0.02)	10.6 (0.2)	81.5 (4.4)	13.9 (0.1)	21.2 (0.3)	64.8 (0.4)
10-18	1.55 (0.04)	1.41 (0.03)	16.5 (0.4)	90.9 (6.3)	14.1 (0.2)	23.6 (0.4)	62.3 (0.5)
19-29	1.53 (0.04)	1.44 (0.04)	18.8 (0.5)	103.9 (4.3)	15.5 (0.2)	23.8 (0.4)	60.7 (0.5)
30-39	1.55 (0.04)	1.46 (0.03)	19.8 (0.5)	118.9 (3.4)	15.6 (0.2)	21.1 (0.3)	63.3 (0.4)
40-49	1.45 (0.03)	1.36 (0.03)	18.9 (0.4)	117.2 (3.6)	15.2 (0.2)	18.4 (0.3)	66.4 (0.4)
50-59	1.34 (0.03)	1.28 (0.03)	17.7 (0.4)	122.9 (4.1)	14.7 (0.2)	15.8 (0.3)	69.5 (0.4)
60-69	1.19 (0.02)	1.06 (0.02)	15.1 (0.3)	109.1 (3.6)	13.6 (0.2)	13.4 (0.4)	73.1 (0.5)
70+	0.92 (0.03)	0.76 (0.02)	11.8 (0.3)	69.9 (3.2)	12.7 (0.1)	10.8 (0.3)	76.6 (0.4)
1-2	0.77 (0.03)	1.00 (0.04)	7.6 (0.2)	82.0 (6.7)	13.7 (0.3)	21.5 (0.7)	64.8 (0.8)
3-5	0.90 (0.04)	1.04 (0.03)	9.2 (0.3)	76.5 (5.2)	13.8 (0.2)	21.8 (0.5)	64.4 (0.6)
6-11	1.21 (0.03)	1.24 (0.03)	13.3 (0.2)	86.2 (4.8)	14.0 (0.1)	21.3 (0.4)	64.7 (0.4)
12-18	1.61 (0.05)	1.44 (0.04)	17.1 (0.5)	91.3 (7.7)	14.1 (0.2)	23.9 (0.5)	61.9 (0.5)
19-29	1.53 (0.04)	1.44 (0.04)	18.8 (0.5)	103.9 (4.3)	15.5 (0.2)	23.8 (0.4)	60.7 (0.5)
30-49	1.49 (0.02)	1.41 (0.02)	19.3 (0.3)	118.0 (2.6)	15.4 (0.1)	19.7 (0.2)	64.9 (0.3)
50-64	1.32 (0.03)	1.24 (0.02)	17.2 (0.3)	120.8 (3.2)	14.5 (0.1)	15.5 (0.3)	70.0 (0.4)
65+	0.99 (0.02)	0.83 (0.02)	12.7 (0.3)	80.9 (2.9)	12.8 (0.1)	11.2 (0.2)	76.0 (0.3)
거주지역							
동	1.39 (0.02)	1.32 (0.01)	17.3 (0.2)	107.0 (2.2)	14.8 (0.1)	19.9 (0.2)	65.3 (0.3)
읍면	1.32 (0.03)	1.19 (0.03)	15.8 (0.4)	100.9 (4.7)	14.1 (0.2)	17.1 (0.5)	68.8 (0.6)
소득수준							
하	1.32 (0.02)	1.22 (0.03)	15.9 (0.3)	97.6 (3.5)	14.4 (0.1)	18.9 (0.3)	66.7 (0.4)
중하	1.32 (0.03)	1.26 (0.02)	16.6 (0.3)	102.6 (3.0)	14.4 (0.1)	19.3 (0.3)	66.3 (0.4)
중상	1.40 (0.03)	1.32 (0.02)	17.6 (0.3)	110.5 (3.2)	14.8 (0.1)	19.2 (0.3)	66.0 (0.4)
상	1.47 (0.03)	1.39 (0.02)	18.2 (0.3)	115.3 (3.4)	15.0 (0.2)	19.7 (0.3)	65.3 (0.4)
거주지역(표준화)							
동	1.38 (0.01)	1.31 (0.01)	17.2 (0.2)	106.2 (2.2)	14.8 (0.1)	19.9 (0.2)	65.3 (0.2)
읍면	1.39 (0.04)	1.27 (0.04)	16.3 (0.4)	102.3 (5.2)	14.3 (0.2)	19.0 (0.4)	66.7 (0.5)
소득수준(표준화)							
하	1.32 (0.02)	1.23 (0.03)	15.9 (0.3)	97.7 (3.5)	14.5 (0.1)	19.1 (0.3)	66.4 (0.3)
중하	1.32 (0.03)	1.26 (0.02)	16.5 (0.3)	102.0 (3.0)	14.5 (0.1)	19.6 (0.3)	65.9 (0.3)
중상	1.41 (0.03)	1.33 (0.02)	17.6 (0.3)	109.6 (3.2)	14.9 (0.1)	19.8 (0.3)	65.3 (0.4)
상	1.49 (0.03)	1.40 (0.02)	18.2 (0.3)	114.7 (3.5)	15.1 (0.2)	20.2 (0.3)	64.7 (0.4)

표 2-II-12. 영양소별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	3,550	2,382.5 (22.9)	87.1 (1.1)	53.3 (0.9)	356.0 (3.2)	7.7 (0.1)
19세이상	2,475	2,468.4 (23.6)	91.0 (1.2)	52.8 (1.0)	366.2 (3.4)	8.4 (0.2)
연령(세)						
1-9	552	1,562.7 (34.6)	54.3 (1.4)	37.6 (1.2)	251.7 (5.6)	3.8 (0.1)
10-18	523	2,446.9 (63.0)	87.4 (2.7)	66.8 (2.5)	367.9 (8.8)	6.2 (0.2)
19-29	270	2,556.9 (75.1)	97.1 (3.7)	69.5 (3.2)	346.4 (8.2)	6.9 (0.3)
30-39	445	2,688.2 (58.0)	103.3 (3.3)	63.7 (2.2)	380.5 (7.5)	8.5 (0.2)
40-49	478	2,523.6 (45.5)	93.2 (2.1)	51.5 (1.6)	373.7 (6.7)	9.1 (0.3)
50-59	442	2,419.2 (44.8)	85.6 (1.8)	42.6 (1.5)	375.1 (7.7)	9.0 (0.3)
60-69	451	2,184.9 (39.7)	76.5 (2.1)	35.7 (1.8)	368.1 (7.7)	9.5 (0.3)
70+	389	1,887.5 (50.4)	62.8 (2.3)	26.3 (1.2)	329.8 (9.0)	7.4 (0.5)
1-2	115	1,162.3 (41.8)	39.1 (1.6)	27.8 (1.5)	189.9 (7.7)	2.5 (0.2)
3-5	172	1,424.4 (40.3)	47.7 (1.5)	34.5 (1.7)	232.1 (6.2)	3.4 (0.2)
6-11	407	1,907.7 (37.5)	67.7 (1.8)	46.6 (1.5)	303.3 (6.6)	4.9 (0.2)
12-18	381	2,537.9 (72.1)	90.8 (3.1)	70.2 (2.8)	378.0 (10.1)	6.4 (0.3)
19-29	270	2,556.9 (75.1)	97.1 (3.7)	69.5 (3.2)	346.4 (8.2)	6.9 (0.3)
30-49	923	2,605.4 (37.0)	98.2 (1.9)	57.5 (1.4)	377.1 (5.0)	8.8 (0.2)
50-64	673	2,374.1 (35.6)	84.2 (1.6)	41.6 (1.4)	374.1 (6.1)	9.2 (0.3)
65+	609	1,975.5 (42.1)	66.2 (1.7)	28.4 (1.0)	342.9 (7.8)	8.1 (0.4)
거주지역						
동	2,810	2,372.8 (26.0)	87.9 (1.3)	54.7 (1.0)	352.7 (3.6)	7.6 (0.1)
읍면	740	2,418.2 (44.4)	84.5 (1.8)	48.2 (1.7)	367.8 (6.8)	8.0 (0.3)
소득수준[1)]						
하	874	2,306.2 (44.6)	82.1 (1.8)	50.6 (1.6)	344.3 (5.9)	7.1 (0.2)
중하	876	2,364.9 (49.6)	85.3 (2.1)	53.4 (2.0)	352.4 (5.4)	7.4 (0.2)
중상	877	2,402.7 (44.6)	87.9 (2.0)	53.3 (1.9)	359.6 (6.2)	8.0 (0.2)
상	883	2,466.5 (39.5)	93.6 (2.2)	56.0 (1.7)	370.0 (6.0)	8.5 (0.3)
거주지역(표준화)[2)]						
동	2,810	2,349.2 (24.2)	86.9 (1.1)	53.9 (1.0)	350.3 (3.4)	7.5 (0.1)
읍면	740	2,452.7 (48.0)	86.3 (2.0)	53.0 (1.5)	365.0 (6.8)	7.6 (0.3)
소득수준(표준화)						
하	874	2,297.1 (45.4)	82.1 (1.9)	50.7 (1.5)	341.9 (5.5)	7.1 (0.2)
중하	876	2,343.0 (48.9)	84.7 (2.1)	53.4 (2.0)	348.6 (5.0)	7.2 (0.2)
중상	877	2,382.2 (41.4)	87.3 (1.9)	53.5 (1.8)	356.2 (5.7)	7.8 (0.2)
상	883	2,457.6 (37.5)	93.1 (2.0)	56.5 (1.7)	368.0 (5.9)	8.3 (0.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A(㎍RE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	584.1 (7.7)	1,380.6 (13.7)	5,708.6 (76.6)	3,346.1 (38.5)	16.4 (0.3)	910.8 (28.5)
19세이상	594.7 (8.4)	1,436.0 (14.4)	6,227.9 (84.4)	3,579.1 (39.7)	17.6 (0.3)	990.5 (34.5)
연령(세)						
1-9	498.2 (16.0)	943.4 (19.7)	2,485.9 (85.4)	2,015.9 (46.0)	8.9 (0.3)	532.2 (28.1)
10-18	581.5 (21.3)	1,359.8 (35.9)	4,907.7 (159.4)	2,907.0 (96.5)	14.2 (0.5)	708.6 (32.1)
19-29	545.0 (22.2)	1,401.9 (40.5)	5,771.0 (208.4)	3,258.6 (101.7)	16.2 (0.9)	941.2 (67.9)
30-39	626.2 (18.2)	1,575.5 (38.1)	6,903.0 (191.0)	3,887.3 (82.9)	17.9 (0.5)	1,157.2 (92.4)
40-49	640.8 (20.7)	1,498.8 (28.4)	6,583.0 (187.9)	3,778.2 (80.7)	19.7 (0.8)	995.5 (64.6)
50-59	616.5 (18.0)	1,414.4 (27.6)	6,317.2 (174.9)	3,686.4 (88.4)	17.7 (0.5)	1,034.8 (69.3)
60-69	571.8 (18.9)	1,328.0 (29.6)	5,599.6 (180.9)	3,509.0 (93.6)	17.6 (0.7)	871.6 (51.9)
70+	471.0 (21.4)	1,109.2 (34.3)	4,974.8 (201.7)	2,740.1 (103.4)	14.6 (0.7)	655.2 (54.1)
1-2	517.3 (36.9)	769.1 (31.6)	1,438.7 (73.8)	1,657.3 (78.3)	6.8 (0.4)	447.7 (46.9)
3-5	474.9 (20.4)	865.8 (26.7)	2,158.9 (100.0)	1,832.1 (62.0)	7.9 (0.4)	475.6 (30.9)
6-11	540.6 (20.6)	1,119.1 (24.7)	3,474.2 (107.0)	2,410.6 (73.7)	11.6 (0.5)	606.9 (39.0)
12-18	576.0 (24.8)	1,394.8 (40.6)	5,107.3 (181.8)	2,972.1 (108.9)	14.3 (0.5)	731.3 (37.9)
19-29	545.0 (22.2)	1,401.9 (40.5)	5,771.0 (208.4)	3,258.6 (101.7)	16.2 (0.9)	941.2 (67.9)
30-49	633.6 (13.1)	1,536.9 (22.7)	6,742.0 (139.8)	3,832.4 (58.5)	18.8 (0.5)	1,075.8 (57.3)
50-64	610.9 (14.8)	1,405.5 (22.5)	6,183.8 (143.8)	3,677.3 (74.4)	17.7 (0.5)	1,021.3 (54.7)
65+	498.2 (18.5)	1,166.7 (25.7)	5,128.0 (162.5)	2,959.5 (77.5)	15.6 (0.7)	683.6 (40.8)
거주지역						
동	584.9 (8.5)	1,386.4 (15.9)	5,633.4 (87.2)	3,353.6 (44.0)	16.3 (0.3)	903.5 (29.3)
읍면	581.2 (16.5)	1,359.3 (24.0)	5,986.2 (141.0)	3,318.2 (77.6)	16.6 (0.6)	937.8 (74.6)
소득수준						
하	531.3 (14.6)	1,302.2 (23.5)	5,470.5 (136.8)	3,120.4 (64.8)	14.3 (0.4)	810.4 (42.4)
중하	574.7 (17.1)	1,349.1 (25.9)	5,669.9 (140.8)	3,235.4 (68.2)	15.9 (0.5)	848.3 (38.8)
중상	607.0 (16.1)	1,403.5 (25.2)	5,583.0 (129.3)	3,439.8 (74.5)	17.2 (0.5)	955.5 (63.7)
상	632.4 (14.9)	1,479.1 (26.3)	6,168.1 (192.7)	3,637.3 (68.5)	18.5 (0.5)	1,054.0 (73.1)
거주지역(표준화)						
동	581.5 (8.2)	1,374.8 (14.6)	5,570.1 (79.5)	3,327.1 (40.5)	16.2 (0.3)	894.0 (27.5)
읍면	575.1 (16.5)	1,367.8 (25.1)	5,812.4 (127.0)	3,268.7 (73.0)	16.1 (0.6)	927.1 (61.8)
소득수준(표준화)						
하	525.5 (13.8)	1,297.5 (24.0)	5,445.0 (134.5)	3,107.2 (63.8)	14.2 (0.3)	811.3 (41.8)
중하	572.5 (16.7)	1,339.0 (24.6)	5,607.8 (129.5)	3,200.5 (62.0)	15.7 (0.5)	838.3 (38.6)
중상	604.2 (16.0)	1,393.0 (23.8)	5,487.2 (123.3)	3,393.2 (68.3)	17.1 (0.5)	945.4 (64.9)
상	627.6 (14.4)	1,469.5 (23.6)	6,078.1 (187.2)	3,588.0 (61.7)	18.3 (0.5)	1,036.5 (68.5)

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%)[3]		
					단백질	지방	탄수화물
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	1.60 (0.02)	1.48 (0.02)	19.9 (0.2)	110.3 (2.3)	15.2 (0.1)	20.2 (0.2)	64.5 (0.3)
19세이상	1.64 (0.02)	1.50 (0.02)	21.2 (0.3)	115.7 (2.2)	15.5 (0.1)	19.5 (0.3)	65.0 (0.3)
연령(세)							
1-9	1.03 (0.04)	1.16 (0.03)	11.1 (0.3)	84.8 (5.0)	13.8 (0.2)	21.3 (0.4)	64.9 (0.5)
10-18	1.76 (0.07)	1.57 (0.05)	18.4 (0.6)	96.4 (10.5)	14.4 (0.2)	23.7 (0.5)	61.9 (0.6)
19-29	1.80 (0.07)	1.65 (0.07)	21.9 (0.8)	102.8 (5.0)	16.0 (0.3)	24.5 (0.6)	59.5 (0.8)
30-39	1.83 (0.05)	1.69 (0.05)	23.6 (0.7)	125.8 (4.9)	16.1 (0.3)	22.1 (0.4)	61.8 (0.6)
40-49	1.68 (0.04)	1.53 (0.04)	22.2 (0.5)	121.4 (4.4)	15.8 (0.2)	19.1 (0.4)	65.0 (0.5)
50-59	1.52 (0.04)	1.42 (0.04)	20.5 (0.6)	123.1 (4.7)	15.4 (0.2)	16.8 (0.4)	67.8 (0.5)
60-69	1.40 (0.04)	1.24 (0.04)	18.0 (0.5)	117.4 (5.1)	14.3 (0.3)	14.5 (0.6)	71.2 (0.8)
70+	1.11 (0.04)	0.95 (0.04)	14.8 (0.6)	83.0 (4.5)	13.5 (0.2)	12.4 (0.4)	74.1 (0.5)
1-2	0.80 (0.04)	1.06 (0.06)	7.7 (0.3)	86.7 (10.0)	13.5 (0.3)	21.5 (1.0)	65.0 (1.2)
3-5	0.95 (0.06)	1.08 (0.04)	9.7 (0.4)	83.2 (8.5)	13.4 (0.2)	21.3 (0.6)	65.3 (0.7)
6-11	1.26 (0.04)	1.30 (0.04)	14.0 (0.4)	86.2 (5.4)	14.1 (0.2)	21.6 (0.5)	64.3 (0.6)
12-18	1.85 (0.08)	1.61 (0.06)	19.2 (0.7)	98.1 (12.7)	14.5 (0.3)	24.1 (0.5)	61.4 (0.6)
19-29	1.80 (0.07)	1.65 (0.07)	21.9 (0.8)	102.8 (5.0)	16.0 (0.3)	24.5 (0.6)	59.5 (0.8)
30-49	1.76 (0.03)	1.61 (0.03)	22.9 (0.4)	123.6 (3.4)	16.0 (0.2)	20.6 (0.3)	63.4 (0.4)
50-64	1.50 (0.03)	1.39 (0.03)	20.1 (0.5)	123.3 (4.0)	15.2 (0.2)	16.5 (0.4)	68.3 (0.5)
65+	1.19 (0.03)	1.02 (0.03)	15.6 (0.5)	92.5 (3.7)	13.7 (0.2)	12.8 (0.4)	73.6 (0.5)
거주지역							
동	1.60 (0.02)	1.50 (0.02)	20.1 (0.3)	110.6 (2.6)	15.3 (0.1)	20.8 (0.2)	63.9 (0.3)
읍면	1.59 (0.04)	1.41 (0.04)	19.1 (0.5)	109.1 (4.9)	14.8 (0.2)	18.3 (0.6)	66.9 (0.7)
소득수준							
하	1.53 (0.04)	1.39 (0.04)	18.5 (0.4)	102.7 (5.4)	14.9 (0.2)	20.1 (0.4)	65.1 (0.5)
중하	1.53 (0.04)	1.43 (0.04)	19.4 (0.5)	105.8 (3.4)	15.1 (0.2)	20.2 (0.4)	64.7 (0.5)
중상	1.64 (0.05)	1.50 (0.03)	20.4 (0.5)	114.0 (3.9)	15.3 (0.2)	20.3 (0.5)	64.4 (0.5)
상	1.72 (0.04)	1.59 (0.04)	21.4 (0.5)	121.3 (4.1)	15.6 (0.3)	20.3 (0.4)	64.1 (0.5)
거주지역(표준화)							
동	1.59 (0.02)	1.48 (0.02)	19.9 (0.2)	109.9 (2.4)	15.3 (0.1)	20.6 (0.2)	64.1 (0.3)
읍면	1.65 (0.05)	1.48 (0.05)	19.3 (0.5)	107.7 (5.7)	14.9 (0.2)	19.8 (0.5)	65.4 (0.6)
소득수준(표준화)							
하	1.53 (0.04)	1.40 (0.04)	18.6 (0.4)	102.1 (4.9)	14.9 (0.2)	20.2 (0.3)	64.9 (0.4)
중하	1.52 (0.04)	1.43 (0.04)	19.2 (0.5)	105.0 (3.3)	15.1 (0.2)	20.3 (0.3)	64.5 (0.4)
중상	1.62 (0.05)	1.50 (0.03)	20.2 (0.4)	112.6 (3.9)	15.3 (0.2)	20.5 (0.4)	64.2 (0.5)
상	1.72 (0.04)	1.59 (0.04)	21.3 (0.5)	119.8 (4.0)	15.6 (0.2)	20.6 (0.4)	63.9 (0.5)

표 2-II-13. 영양소별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4,469	1,716.7 (15.3)	60.8 (0.7)	36.3 (0.7)	286.0 (2.8)	6.5 (0.1)
19세이상	3,469	1,722.6 (16.2)	61.4 (0.8)	34.4 (0.6)	290.9 (2.9)	7.0 (0.2)
연령(세)						
1-9	552	1,372.4 (26.5)	48.4 (1.1)	33.2 (1.0)	222.4 (4.7)	3.5 (0.2)
10-18	448	1,934.6 (51.6)	66.5 (2.0)	52.5 (2.4)	299.5 (7.8)	5.1 (0.2)
19-29	422	1,831.7 (41.0)	67.8 (2.1)	47.5 (1.6)	274.2 (6.7)	5.6 (0.2)
30-39	703	1,790.2 (29.9)	67.1 (1.5)	40.6 (1.0)	289.7 (5.1)	7.1 (0.4)
40-49	625	1,764.6 (33.4)	64.4 (1.4)	36.1 (1.3)	294.0 (5.0)	7.7 (0.3)
50-59	665	1,757.7 (38.4)	61.6 (1.8)	30.2 (1.2)	312.2 (7.4)	8.3 (0.3)
60-69	548	1,600.9 (27.1)	52.3 (1.2)	22.7 (1.0)	302.1 (5.3)	7.3 (0.3)
70+	506	1,403.5 (32.1)	43.0 (1.2)	15.8 (0.6)	271.7 (6.1)	5.6 (0.2)
1-2	128	1,059.9 (45.0)	37.0 (1.8)	25.9 (1.5)	172.3 (9.0)	2.6 (0.2)
3-5	179	1,239.7 (45.0)	44.2 (1.7)	32.2 (1.8)	196.0 (7.0)	3.1 (0.2)
6-11	372	1,704.5 (38.5)	59.4 (1.6)	41.3 (1.7)	275.7 (5.7)	4.7 (0.3)
12-18	321	1,953.4 (62.2)	67.1 (2.3)	53.8 (2.8)	300.5 (9.6)	5.0 (0.2)
19-29	422	1,831.7 (41.0)	67.8 (2.1)	47.5 (1.6)	274.2 (6.7)	5.6 (0.2)
30-49	1,328	1,777.1 (24.1)	65.7 (1.1)	38.3 (0.9)	291.9 (3.9)	7.4 (0.3)
50-64	940	1,722.1 (30.0)	59.8 (1.4)	28.9 (1.0)	308.9 (5.9)	8.2 (0.3)
65+	779	1,459.4 (26.2)	45.0 (1.0)	17.2 (0.6)	282.2 (5.2)	6.0 (0.2)
거주지역						
동	3,533	1,742.1 (16.5)	62.5 (0.8)	38.2 (0.7)	286.5 (3.0)	6.5 (0.2)
읍면	936	1,625.2 (32.9)	54.7 (1.2)	29.6 (1.2)	284.3 (7.1)	6.3 (0.3)
소득수준[1)]						
하	1,078	1,654.3 (23.8)	57.8 (1.2)	33.6 (1.1)	277.2 (4.0)	6.0 (0.2)
중하	1,111	1,709.3 (31.5)	59.2 (1.3)	36.4 (1.3)	285.3 (5.0)	6.3 (0.2)
중상	1,123	1,751.1 (27.0)	63.0 (1.2)	37.1 (1.2)	292.1 (4.7)	7.0 (0.4)
상	1,096	1,777.9 (31.9)	64.6 (1.2)	38.9 (1.5)	293.9 (4.8)	6.9 (0.2)
거주지역(표준화)[2)]						
동	3,533	1,740.1 (16.1)	62.5 (0.7)	38.7 (0.7)	284.8 (2.9)	6.4 (0.2)
읍면	936	1,649.8 (38.8)	56.9 (1.5)	34.1 (1.4)	277.7 (6.4)	6.1 (0.3)
소득수준(표준화)						
하	1,078	1,657.1 (22.4)	58.1 (1.1)	34.3 (0.9)	276.1 (4.0)	6.0 (0.2)
중하	1,111	1,706.7 (31.1)	59.4 (1.3)	37.2 (1.2)	282.6 (4.8)	6.2 (0.2)
중상	1,123	1,771.4 (27.6)	64.4 (1.2)	39.6 (1.3)	289.4 (4.7)	6.8 (0.4)
상	1,096	1,797.6 (29.5)	65.8 (1.2)	41.0 (1.3)	292.6 (4.7)	6.7 (0.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A(㎍RE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	474.9 (6.7)	1,029.0 (10.3)	4,041.7 (60.0)	2,664.9 (37.2)	12.8 (0.2)	700.8 (18.4)
19세이상	477.5 (7.8)	1,042.3 (12.0)	4,280.8 (70.4)	2,783.4 (42.8)	13.5 (0.2)	741.8 (21.6)
연령(세)						
1-9	459.5 (14.8)	853.5 (19.3)	2,253.4 (65.9)	1,894.4 (53.4)	8.4 (0.3)	480.9 (25.9)
10-18	468.2 (18.9)	1,066.7 (28.0)	3,694.4 (110.7)	2,405.9 (72.2)	11.0 (0.4)	575.5 (23.4)
19-29	468.7 (17.9)	1,039.3 (29.3)	4,071.2 (145.2)	2,636.6 (73.8)	12.3 (0.4)	670.4 (37.3)
30-39	502.6 (14.5)	1,116.8 (22.1)	4,669.1 (132.6)	2,928.1 (75.7)	13.2 (0.4)	747.5 (25.1)
40-49	520.8 (17.4)	1,104.7 (23.5)	4,632.6 (145.7)	2,996.8 (81.1)	14.4 (0.5)	865.5 (45.5)
50-59	506.8 (17.5)	1,085.4 (27.4)	4,571.1 (164.5)	3,096.3 (87.4)	15.4 (0.6)	881.6 (52.4)
60-69	442.0 (13.3)	965.0 (18.3)	3,834.9 (136.2)	2,686.9 (72.3)	13.3 (0.6)	695.0 (56.9)
70+	354.5 (16.6)	804.7 (20.2)	3,255.2 (120.0)	1,980.6 (65.6)	11.6 (0.8)	448.9 (26.9)
1-2	476.8 (28.0)	725.9 (38.2)	1,358.6 (86.5)	1,550.0 (87.9)	6.9 (0.4)	519.7 (55.1)
3-5	457.9 (25.4)	794.3 (29.3)	1,914.1 (83.8)	1,730.5 (67.8)	7.6 (0.4)	401.4 (26.8)
6-11	478.3 (17.5)	1,006.1 (25.4)	3,117.0 (115.3)	2,258.5 (65.7)	10.3 (0.4)	538.1 (29.6)
12-18	453.8 (21.9)	1,058.9 (33.0)	3,753.1 (129.1)	2,403.3 (89.8)	10.9 (0.5)	575.8 (27.7)
19-29	468.7 (17.9)	1,039.3 (29.3)	4,071.2 (145.2)	2,636.6 (73.8)	12.3 (0.4)	670.4 (37.3)
30-49	511.9 (11.2)	1,110.6 (17.6)	4,650.4 (98.7)	2,963.3 (60.8)	13.8 (0.3)	807.9 (27.4)
50-64	495.8 (13.9)	1,063.3 (21.7)	4,393.0 (131.3)	3,013.7 (72.9)	14.9 (0.5)	833.1 (44.6)
65+	374.2 (13.1)	842.8 (16.1)	3,425.6 (108.8)	2,170.6 (56.5)	12.1 (0.6)	527.3 (35.4)
거주지역						
동	483.3 (7.8)	1,047.7 (11.7)	4,050.3 (61.3)	2,721.9 (41.7)	12.9 (0.2)	708.9 (19.3)
읍면	444.6 (13.2)	961.4 (18.3)	4,010.7 (164.2)	2,459.6 (71.0)	12.4 (0.5)	671.6 (44.7)
소득수준						
하	441.2 (10.9)	980.5 (16.4)	3,885.9 (108.5)	2,488.8 (55.6)	11.9 (0.4)	629.6 (24.9)
중하	469.4 (12.8)	1,009.6 (19.4)	4,083.8 (115.4)	2,622.1 (60.9)	12.5 (0.4)	679.0 (28.0)
중상	492.3 (12.8)	1,062.8 (18.0)	4,179.6 (95.0)	2,798.3 (67.9)	13.4 (0.4)	744.0 (33.6)
상	505.0 (11.4)	1,081.5 (18.9)	4,086.0 (96.9)	2,822.1 (61.7)	13.6 (0.4)	775.2 (35.7)
거주지역(표준화)						
동	483.1 (7.6)	1,045.3 (11.3)	4,003.1 (59.6)	2,697.2 (40.1)	12.7 (0.2)	700.8 (18.8)
읍면	460.5 (15.4)	981.8 (23.4)	4,053.6 (163.0)	2,482.8 (74.7)	12.1 (0.5)	672.8 (36.7)
소득수준(표준화)						
하	443.1 (10.6)	984.3 (15.6)	3,875.6 (103.4)	2,495.0 (54.2)	11.8 (0.4)	631.2 (24.7)
중하	471.5 (12.5)	1,009.4 (19.4)	4,047.2 (112.9)	2,609.1 (58.6)	12.3 (0.4)	676.6 (26.3)
중상	499.6 (13.9)	1,073.1 (18.2)	4,150.9 (102.0)	2,789.1 (65.2)	13.2 (0.4)	738.3 (33.7)
상	508.6 (10.6)	1,090.4 (18.7)	4,066.8 (98.5)	2,808.0 (61.2)	13.2 (0.3)	765.8 (33.4)

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%)[3]		
					단백질	지방	탄수화물
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	1.15 (0.01)	1.10 (0.01)	14.1 (0.2)	101.0 (2.8)	14.1 (0.1)	18.3 (0.3)	67.6 (0.3)
19세이상	1.14 (0.02)	1.09 (0.02)	14.5 (0.2)	105.8 (3.0)	14.2 (0.1)	17.2 (0.2)	68.6 (0.3)
연령(세)							
1-9	0.95 (0.03)	1.04 (0.03)	10.0 (0.3)	77.9 (6.3)	14.0 (0.2)	21.2 (0.4)	64.8 (0.6)
10-18	1.31 (0.04)	1.23 (0.04)	14.3 (0.5)	84.3 (5.2)	13.7 (0.2)	23.4 (0.6)	62.9 (0.7)
19-29	1.24 (0.04)	1.21 (0.04)	15.5 (0.5)	105.0 (6.6)	15.1 (0.3)	23.1 (0.5)	61.8 (0.6)
30-39	1.24 (0.03)	1.21 (0.03)	15.7 (0.4)	111.7 (4.4)	15.0 (0.2)	20.1 (0.4)	64.8 (0.4)
40-49	1.20 (0.03)	1.18 (0.03)	15.5 (0.4)	112.8 (6.2)	14.6 (0.2)	17.6 (0.4)	67.8 (0.5)
50-59	1.17 (0.04)	1.14 (0.04)	14.9 (0.4)	122.8 (5.3)	13.9 (0.2)	14.9 (0.4)	71.2 (0.5)
60-69	1.00 (0.02)	0.89 (0.02)	12.5 (0.3)	101.6 (4.4)	12.9 (0.2)	12.3 (0.5)	74.8 (0.6)
70+	0.80 (0.03)	0.64 (0.02)	10.0 (0.3)	61.8 (3.4)	12.1 (0.2)	9.8 (0.3)	78.1 (0.4)
1-2	0.73 (0.04)	0.93 (0.05)	7.4 (0.4)	76.9 (8.5)	13.9 (0.5)	21.5 (0.9)	64.6 (1.2)
3-5	0.85 (0.04)	0.99 (0.04)	8.8 (0.4)	69.6 (5.5)	14.2 (0.4)	22.4 (0.6)	63.4 (0.8)
6-11	1.16 (0.04)	1.18 (0.04)	12.6 (0.3)	86.2 (7.6)	13.8 (0.2)	21.0 (0.5)	65.2 (0.6)
12-18	1.32 (0.05)	1.22 (0.04)	14.5 (0.6)	82.8 (6.6)	13.7 (0.2)	23.8 (0.8)	62.6 (0.9)
19-29	1.24 (0.04)	1.21 (0.04)	15.5 (0.5)	105.0 (6.6)	15.1 (0.3)	23.1 (0.5)	61.8 (0.6)
30-49	1.22 (0.03)	1.19 (0.02)	15.6 (0.3)	112.2 (4.1)	14.8 (0.1)	18.9 (0.3)	66.4 (0.4)
50-64	1.14 (0.03)	1.09 (0.03)	14.4 (0.3)	118.3 (4.2)	13.7 (0.2)	14.5 (0.4)	71.7 (0.5)
65+	0.85 (0.02)	0.70 (0.02)	10.7 (0.2)	72.9 (3.2)	12.2 (0.1)	10.2 (0.3)	77.6 (0.4)
거주지역							
동	1.17 (0.02)	1.14 (0.01)	14.5 (0.2)	103.3 (3.1)	14.3 (0.1)	18.9 (0.3)	66.7 (0.3)
읍면	1.05 (0.03)	0.97 (0.03)	12.6 (0.3)	92.8 (5.9)	13.4 (0.2)	15.9 (0.6)	70.8 (0.7)
소득수준							
하	1.10 (0.03)	1.05 (0.02)	13.3 (0.3)	92.3 (4.5)	13.9 (0.2)	17.7 (0.4)	68.4 (0.5)
중하	1.12 (0.03)	1.08 (0.03)	13.8 (0.3)	99.5 (4.6)	13.8 (0.1)	18.4 (0.4)	67.9 (0.5)
중상	1.16 (0.03)	1.13 (0.03)	14.7 (0.3)	107.0 (4.3)	14.4 (0.2)	18.0 (0.4)	67.6 (0.5)
상	1.22 (0.03)	1.18 (0.02)	14.9 (0.3)	109.1 (4.7)	14.5 (0.2)	19.0 (0.5)	66.5 (0.5)
거주지역(표준화)							
동	1.17 (0.01)	1.14 (0.01)	14.4 (0.2)	102.6 (3.2)	14.3 (0.1)	19.3 (0.2)	66.4 (0.3)
읍면	1.11 (0.03)	1.05 (0.03)	13.0 (0.4)	96.9 (6.8)	13.8 (0.2)	18.2 (0.5)	68.0 (0.6)
소득수준(표준화)							
하	1.11 (0.02)	1.07 (0.02)	13.3 (0.3)	93.1 (4.6)	14.0 (0.2)	18.1 (0.4)	67.9 (0.4)
중하	1.13 (0.03)	1.09 (0.03)	13.8 (0.3)	99.1 (4.5)	13.8 (0.1)	18.9 (0.3)	67.3 (0.4)
중상	1.18 (0.02)	1.17 (0.03)	15.0 (0.3)	107.3 (4.5)	14.6 (0.2)	19.2 (0.4)	66.3 (0.5)
상	1.24 (0.03)	1.21 (0.02)	15.0 (0.3)	109.4 (5.3)	14.6 (0.2)	19.9 (0.4)	65.5 (0.5)

표 2-II-14. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	671.2	8.0	32.7	32.7	백미	770.5	9.7	32.3	32.3	백미	571.2	9.0	33.3	33.3
2	돼지고기	94.3	3.7	4.6	37.3	돼지고기	127.7	6.5	5.4	37.7	돼지고기	60.7	2.9	3.5	36.8
3	라면	57.2	2.8	2.8	40.1	소주	98.4	7.9	4.1	41.8	우유	49.5	1.7	2.9	39.7
4	소주	55.2	4.1	2.7	42.8	라면	75.2	4.7	3.2	45.0	빵	48.6	3.1	2.8	42.5
5	빵	52.9	2.8	2.6	45.4	빵	57.3	4.8	2.4	47.4	떡	45.8	3.4	2.7	45.2
6	우유	51.1	1.6	2.5	47.9	우유	52.7	2.4	2.2	49.6	라면	39.1	2.4	2.3	47.5
7	떡	40.5	2.7	2.0	49.9	콩기름	46.7	2.1	2.0	51.6	국수	33.9	3.0	2.0	49.4
8	국수	40.2	3.0	2.0	51.8	국수	46.6	4.0	2.0	53.5	쇠고기	28.4	1.6	1.7	51.1
9	콩기름	36.9	1.3	1.8	53.6	쇠고기	45.3	3.0	1.9	55.4	달걀	28.1	1.0	1.6	52.7
10	쇠고기	36.9	2.0	1.8	55.4	달걀	42.2	1.6	1.8	57.2	콩기름	27.2	1.0	1.6	54.3
11	달걀	35.2	1.1	1.7	57.1	커피	40.5	1.5	1.7	58.9	커피	26.3	1.0	1.5	55.8
12	커피	33.4	1.0	1.6	58.8	맥주	39.5	3.5	1.7	60.6	찹쌀	25.0	1.5	1.5	57.3
13	닭고기	27.1	2.0	1.3	60.1	떡	35.2	3.2	1.5	62.0	사과	21.8	1.6	1.3	58.6
14	찹쌀	25.8	1.3	1.3	61.4	닭고기	34.4	3.3	1.5	63.5	보리	21.4	1.1	1.3	59.8
15	맥주	25.6	2.0	1.3	62.6	설탕	26.6	1.0	1.1	64.6	과자,비스켓,쿠키	20.0	1.7	1.2	61.0
16	보리	22.0	0.9	1.1	63.7	찹쌀	26.5	1.6	1.1	65.7	닭고기	19.8	1.5	1.2	62.1
17	설탕	21.1	0.7	1.0	64.7	밀가루	23.0	1.7	1.0	66.7	고구마	19.3	2.4	1.1	63.3
18	현미	19.7	1.7	1.0	65.7	두부	22.9	1.1	1.0	67.6	현미	18.4	1.7	1.1	64.3
19	사과	19.6	1.4	1.0	66.6	보리	22.7	1.1	1.0	68.6	밀가루	16.2	1.0	0.9	65.3
20	밀가루	19.6	1.1	1.0	67.6	현미	21.1	2.2	0.9	69.5	설탕	15.6	0.6	0.9	66.2
21	두부	18.9	0.7	0.9	68.5	막걸리	21.0	2.8	0.9	70.3	대두	15.1	0.9	0.9	67.1
22	대두	17.6	0.9	0.9	69.4	대두	20.2	1.2	0.9	71.2	두부	15.0	0.8	0.9	67.9
23	과자,비스켓,쿠키	17.4	1.2	0.9	70.2	사과	17.4	1.5	0.7	71.9	케이크	13.4	2.7	0.8	68.7
24	참기름	14.5	0.5	0.7	70.9	참기름	17.1	0.6	0.7	72.6	감	13.4	1.9	0.8	69.5
25	메밀국수/냉면국수	14.1	1.9	0.7	71.6	김치,배추김치	15.8	0.4	0.7	73.3	귤	13.0	1.4	0.8	70.2
26	고구마	13.6	1.5	0.7	72.3	메밀국수/냉면국수	15.6	2.5	0.7	74.0	메밀국수/냉면국수	12.6	2.0	0.7	71.0
27	마요네즈	13.5	0.8	0.7	72.9	과자,비스켓,쿠키	14.7	1.5	0.6	74.6	마요네즈	12.6	1.0	0.7	71.7
28	감자	13.0	0.9	0.6	73.6	마요네즈	14.3	1.2	0.6	75.2	감자	12.2	1.2	0.7	72.4
29	케이크	12.9	2.4	0.6	74.2	감자	13.8	1.0	0.6	75.8	아이스크림	12.1	2.5	0.7	73.1
30	김치,배추김치	12.9	0.3	0.6	74.8	커피프림	13.0	0.8	0.5	76.3	포도	11.9	2.7	0.7	73.8

표 2-II-15. 단백질 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	백미	11.65	0.14	15.7	15.7	백미	13.36	0.17	15.3	15.3	백미	9.94	0.16	16.3	16.3
2	돼지고기	6.60	0.24	8.9	24.7	돼지고기	8.80	0.41	10.1	25.4	돼지고기	4.38	0.22	7.2	23.5
3	닭고기	4.68	0.30	6.3	31.0	닭고기	6.00	0.52	6.9	32.3	닭고기	3.35	0.23	5.5	29.1
4	쇠고기	3.64	0.17	4.9	35.9	쇠고기	4.40	0.26	5.1	37.4	쇠고기	2.87	0.15	4.7	33.8
5	달걀	3.22	0.10	4.3	40.2	달걀	3.86	0.15	4.4	41.8	달걀	2.57	0.09	4.2	38.0
6	우유	2.60	0.08	3.5	43.8	우유	2.66	0.12	3.1	44.8	우유	2.54	0.09	4.2	42.2
7	두부	2.01	0.08	2.7	46.5	두부	2.43	0.12	2.8	47.6	두부	1.57	0.08	2.6	44.8
8	대두	1.59	0.09	2.2	48.6	대두	1.82	0.11	2.1	49.7	대두	1.36	0.08	2.2	47.0
9	김치,배추김치	1.43	0.03	1.9	50.5	오징어	1.76	0.20	2.0	51.7	빵	1.22	0.08	2.0	49.0
10	오징어	1.40	0.12	1.9	52.4	김치,배추김치	1.76	0.04	2.0	53.8	김치,배추김치	1.10	0.03	1.8	50.8
11	빵	1.32	0.07	1.8	54.2	라면	1.56	0.10	1.8	55.6	오징어	1.03	0.09	1.7	52.5
12	라면	1.18	0.06	1.6	55.8	명태/동태	1.44	0.17	1.7	57.2	국수	0.93	0.08	1.5	54.0
13	국수	1.13	0.08	1.5	57.3	빵	1.42	0.11	1.6	58.8	떡	0.90	0.06	1.5	55.5
14	명태/동태	1.08	0.11	1.5	58.8	국수	1.32	0.11	1.5	60.4	멸치	0.83	0.04	1.4	56.9
15	멸치	1.02	0.03	1.4	60.2	멸치	1.21	0.05	1.4	61.7	라면	0.80	0.05	1.3	58.2
16	고등어	0.94	0.08	1.3	61.4	고등어	1.12	0.11	1.3	63.0	고등어	0.77	0.08	1.3	59.5
17	떡	0.80	0.05	1.1	62.5	다랑어	0.90	0.13	1.0	64.1	명태/동태	0.71	0.08	1.2	60.6
18	된장	0.75	0.03	1.0	63.5	어묵	0.88	0.08	1.0	65.1	된장	0.65	0.03	1.1	61.7
19	다랑어	0.72	0.08	1.0	64.5	된장	0.85	0.04	1.0	66.0	보리	0.60	0.03	1.0	62.7
20	어묵	0.72	0.05	1.0	65.5	조기	0.79	0.11	0.9	66.9	어묵	0.57	0.04	0.9	63.6
21	오리고기	0.63	0.10	0.9	66.3	오리고기	0.79	0.16	0.9	67.9	다랑어	0.54	0.07	0.9	64.5
22	조기	0.62	0.07	0.8	67.2	막걸리	0.73	0.10	0.8	68.7	찹쌀	0.50	0.03	0.8	65.3
23	보리	0.62	0.03	0.8	68.0	떡	0.71	0.07	0.8	69.5	밀가루	0.50	0.03	0.8	66.2
24	밀가루	0.60	0.03	0.8	68.8	밀가루	0.70	0.05	0.8	70.3	돼지고기가공품,햄	0.48	0.06	0.8	67.0
25	돼지고기가공품,햄	0.58	0.05	0.8	69.6	돼지고기가공품,햄	0.68	0.08	0.8	71.1	감자	0.48	0.05	0.8	67.8
26	콩나물	0.55	0.02	0.7	70.4	콩나물	0.68	0.03	0.8	71.9	오리고기	0.46	0.09	0.8	68.5
27	간장	0.55	0.01	0.7	71.1	커피	0.64	0.02	0.7	72.6	간장	0.46	0.02	0.8	69.3
28	커피	0.52	0.01	0.7	71.8	보리	0.64	0.03	0.7	73.3	조기	0.45	0.06	0.7	70.0
29	찹쌀	0.52	0.03	0.7	72.5	간장	0.63	0.02	0.7	74.1	요구르트,호상	0.43	0.04	0.7	70.7
30	감자	0.49	0.03	0.7	73.2	찹쌀	0.53	0.03	0.6	74.7	콩나물	0.42	0.02	0.7	71.4

표 2-II-16. 지방 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	돼지고기	7.09	0.30	15.8	15.8	돼지고기	9.70	0.53	18.2	18.2	돼지고기	4.47	0.21	12.3	12.3
2	콩기름	4.15	0.14	9.3	25.1	콩기름	5.25	0.23	9.9	28.1	콩기름	3.04	0.11	8.4	20.7
3	우유	2.63	0.08	5.9	31.0	라면	2.93	0.18	5.5	33.6	우유	2.52	0.09	6.9	27.6
4	쇠고기	2.28	0.13	5.1	36.0	쇠고기	2.83	0.21	5.3	38.9	쇠고기	1.73	0.10	4.8	32.4
5	라면	2.23	0.11	5.0	41.0	우유	2.75	0.13	5.2	44.0	라면	1.53	0.10	4.2	36.6
6	달걀	1.84	0.06	4.1	45.1	달걀	2.21	0.08	4.1	48.2	달걀	1.47	0.05	4.1	40.6
7	참기름	1.63	0.05	3.6	48.8	참기름	1.92	0.07	3.6	51.8	참기름	1.34	0.06	3.7	44.3
8	빵	1.41	0.08	3.2	51.9	빵	1.52	0.14	2.9	54.6	빵	1.30	0.10	3.6	47.9
9	마요네즈	1.36	0.08	3.0	55.0	두부	1.50	0.08	2.8	57.5	마요네즈	1.28	0.10	3.5	51.4
10	두부	1.24	0.05	2.8	57.7	마요네즈	1.45	0.12	2.7	60.2	두부	0.97	0.05	2.7	54.1
11	백미	0.94	0.01	2.1	59.8	백미	1.07	0.01	2.0	62.2	과자,비스켓,쿠키	0.93	0.08	2.6	56.6
12	커피	0.89	0.03	2.0	61.8	커피	1.07	0.05	2.0	64.2	백미	0.81	0.01	2.2	58.9
13	대두	0.81	0.04	1.8	63.6	닭고기	0.93	0.15	1.7	65.9	커피	0.72	0.03	2.0	60.8
14	과자,비스켓,쿠키	0.79	0.06	1.8	65.4	대두	0.92	0.06	1.7	67.7	케이크	0.71	0.14	1.9	62.8
15	닭고기	0.75	0.09	1.7	67.1	커피프림	0.82	0.05	1.5	69.2	대두	0.70	0.04	1.9	64.7
16	케이크	0.69	0.13	1.5	68.6	케이크	0.68	0.18	1.3	70.5	아이스크림	0.57	0.12	1.6	66.3
17	커피프림	0.60	0.03	1.3	69.9	과자,비스켓,쿠키	0.65	0.07	1.2	71.7	닭고기	0.57	0.07	1.6	67.9
18	아이스크림	0.53	0.07	1.2	71.1	과자,스낵과자	0.57	0.08	1.1	72.8	과자,스낵과자	0.42	0.04	1.2	69.0
19	과자,스낵과자	0.49	0.04	1.1	72.2	아이스크림	0.50	0.08	0.9	73.7	커피프림	0.37	0.03	1.0	70.0
20	고등어	0.40	0.03	0.9	73.1	소시지	0.48	0.10	0.9	74.6	고등어	0.32	0.03	0.9	70.9
21	소시지	0.40	0.06	0.9	74.0	고등어	0.48	0.05	0.9	75.5	소시지	0.31	0.05	0.9	71.8
22	깨	0.36	0.01	0.8	74.8	김치,배추김치	0.44	0.01	0.8	76.3	포도씨유	0.30	0.09	0.8	72.6
23	김치,배추김치	0.36	0.01	0.8	75.6	오리고기	0.44	0.08	0.8	77.1	깨	0.30	0.01	0.8	73.5
24	오리고기	0.35	0.05	0.8	76.4	깨	0.41	0.02	0.8	77.9	된장	0.29	0.02	0.8	74.3
25	쇠고기,부산물	0.34	0.05	0.8	77.1	만두	0.40	0.08	0.8	78.7	쇠고기,부산물	0.29	0.05	0.8	75.1
26	된장	0.33	0.02	0.7	77.9	땅콩	0.39	0.10	0.7	79.4	김치,배추김치	0.27	0.01	0.8	75.8
27	만두	0.32	0.05	0.7	78.6	쇠고기,부산물	0.38	0.08	0.7	80.1	오리고기	0.27	0.05	0.7	76.6
28	땅콩	0.30	0.05	0.7	79.2	돼지고기가공품,햄	0.36	0.06	0.7	80.8	햄버거	0.25	0.06	0.7	77.2
29	햄버거	0.29	0.05	0.7	79.9	개고기	0.36	0.12	0.7	81.5	만두	0.24	0.04	0.7	77.9
30	돼지고기가공품,햄	0.28	0.03	0.6	80.5	된장	0.36	0.02	0.7	82.2	두유	0.24	0.03	0.7	78.6

표 2-II-17. 탄수화물 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	백미	148.00	1.75	46.1	46.1	백미	169.87	2.13	47.7	47.7	백미	126.01	1.98	44.1	44.1
2	떡	8.69	0.57	2.7	48.8	라면	10.80	0.69	3.0	50.8	떡	9.83	0.72	3.4	47.5
3	빵	8.49	0.47	2.7	51.5	국수	9.52	0.81	2.7	53.4	빵	7.73	0.50	2.7	50.2
4	국수	8.27	0.63	2.6	54.0	빵	9.26	0.78	2.6	56.0	국수	7.00	0.63	2.5	52.6
5	라면	8.15	0.41	2.5	56.6	떡	7.56	0.68	2.1	58.2	사과	6.01	0.45	2.1	54.8
6	커피	6.06	0.17	1.9	58.5	커피	7.39	0.27	2.1	60.2	라면	5.49	0.34	1.9	56.7
7	찹쌀	5.58	0.29	1.7	60.2	설탕	6.86	0.27	1.9	62.2	찹쌀	5.42	0.33	1.9	58.6
8	설탕	5.45	0.17	1.7	61.9	찹쌀	5.74	0.35	1.6	63.8	커피	4.72	0.17	1.7	60.2
9	사과	5.40	0.39	1.7	63.6	보리	4.96	0.24	1.4	65.2	고구마	4.70	0.57	1.6	61.9
10	보리	4.81	0.20	1.5	65.1	사과	4.80	0.42	1.4	66.5	보리	4.67	0.23	1.6	63.5
11	현미	4.34	0.37	1.4	66.4	밀가루	4.65	0.35	1.3	67.8	우유	4.15	0.15	1.5	64.9
12	우유	4.26	0.14	1.3	67.7	현미	4.64	0.48	1.3	69.1	현미	4.05	0.37	1.4	66.4
13	밀가루	3.95	0.23	1.2	69.0	우유	4.37	0.20	1.2	70.4	설탕	4.03	0.16	1.4	67.8
14	고구마	3.31	0.37	1.0	70.0	메밀국수/냉면국수	3.54	0.55	1.0	71.3	감	3.68	0.54	1.3	69.1
15	메밀국수/냉면국수	3.20	0.43	1.0	71.0	김치,배추김치	3.43	0.09	1.0	72.3	귤	3.37	0.37	1.2	70.2
16	감	3.05	0.43	1.0	72.0	고추장	3.39	0.18	1.0	73.3	밀가루	3.25	0.20	1.1	71.4
17	귤	2.99	0.34	0.9	72.9	콜라	3.13	0.43	0.9	74.1	포도	3.10	0.71	1.1	72.5
18	김치,배추김치	2.79	0.06	0.9	73.8	맥주	3.06	0.27	0.9	75.0	메밀국수/냉면국수	2.87	0.46	1.0	73.5
19	포도	2.71	0.54	0.8	74.6	감자	2.79	0.20	0.8	75.8	과자,비스켓,쿠키	2.68	0.23	0.9	74.4
20	감자	2.68	0.18	0.8	75.4	귤	2.62	0.42	0.7	76.5	감자	2.57	0.25	0.9	75.3
21	고추장	2.67	0.11	0.8	76.3	양파	2.58	0.09	0.7	77.2	배	2.39	0.31	0.8	76.1
22	콜라	2.42	0.27	0.8	77.0	과일음료	2.49	0.25	0.7	77.9	김치,배추김치	2.14	0.06	0.8	76.9
23	배	2.36	0.27	0.7	77.8	감	2.42	0.39	0.7	78.6	고추장	1.95	0.09	0.7	77.6
24	과자,비스켓,쿠키	2.35	0.17	0.7	78.5	배	2.33	0.30	0.7	79.3	양파	1.80	0.06	0.6	78.2
25	양파	2.19	0.06	0.7	79.2	포도	2.32	0.47	0.7	79.9	요구르트,호상	1.73	0.16	0.6	78.8
26	과일음료	1.99	0.17	0.6	79.8	과자,비스켓,쿠키	2.02	0.21	0.6	80.5	콜라	1.70	0.22	0.6	79.4
27	맥주	1.98	0.15	0.6	80.4	고구마	1.92	0.31	0.5	81.0	케이크	1.65	0.35	0.6	80.0
28	케이크	1.56	0.29	0.5	80.9	마늘	1.81	0.06	0.5	81.5	아이스크림	1.53	0.33	0.5	80.5
29	샤베트	1.47	0.21	0.5	81.3	고추	1.70	0.06	0.5	82.0	옥수수	1.52	0.28	0.5	81.0
30	아이스크림	1.47	0.20	0.5	81.8	대두	1.68	0.10	0.5	82.5	과일음료	1.50	0.18	0.5	81.5

표 2-II-18. 조섬유 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	김치,배추김치	928.8	20.5	13.1	13.1	김치,배추김치	1142.3	28.8	14.9	14.9	김치,배추김치	714.1	20.7	11.0	11.0
2	백미	595.4	8.0	8.4	21.5	백미	672.1	9.3	8.7	23.6	참외	526.2	98.7	8.1	19.1
3	참외	438.2	75.2	6.2	27.7	고추	483.6	18.1	6.3	29.9	백미	518.2	9.4	8.0	27.1
4	고추	392.4	11.8	5.5	33.2	라면	375.5	29.5	4.9	34.8	고추	300.7	12.5	4.6	31.7
5	라면	297.5	18.0	4.2	37.4	참외	350.7	71.2	4.6	39.3	라면	219.2	18.1	3.4	35.1
6	대두	195.8	10.4	2.8	40.2	대두	225.1	13.8	2.9	42.3	사과	186.7	14.4	2.9	38.0
7	무청	175.8	18.7	2.5	42.6	고추장	213.2	11.1	2.8	45.0	무청	172.0	20.0	2.7	40.6
8	고추장	169.4	7.2	2.4	45.0	무청	179.6	22.0	2.3	47.4	대두	166.4	10.3	2.6	43.2
9	사과	169.1	12.7	2.4	47.4	파	170.7	6.4	2.2	49.6	현미	140.8	12.7	2.2	45.3
10	현미	150.5	12.9	2.1	49.5	현미	160.3	16.7	2.1	51.7	고구마	135.6	16.6	2.1	47.4
11	파	141.5	4.2	2.0	51.5	무	155.0	8.4	2.0	53.7	감	131.4	19.6	2.0	49.4
12	무	137.6	7.0	1.9	53.5	사과	151.6	14.4	2.0	55.7	고추장	125.3	6.1	1.9	51.4
13	된장	127.7	6.4	1.8	55.3	콩나물	151.5	7.5	2.0	57.6	옥수수	120.5	25.7	1.9	53.2
14	콩나물	124.9	4.8	1.8	57.0	된장	140.2	7.5	1.8	59.5	배	120.4	17.2	1.9	55.1
15	배	116.7	15.1	1.6	58.7	양파	122.6	4.1	1.6	61.1	무	120.1	10.1	1.9	56.9
16	감	108.9	16.0	1.5	60.2	김치,열무김치	118.2	15.2	1.5	62.6	된장	115.1	6.9	1.8	58.7
17	김치,열무김치	105.1	11.3	1.5	61.7	배	113.0	16.5	1.5	64.1	파	112.1	4.6	1.7	60.4
18	양파	104.1	3.0	1.5	63.2	김치,깍두기	89.1	6.3	1.2	65.2	콩나물	98.2	5.3	1.5	61.9
19	고구마	95.4	10.7	1.4	64.5	감	86.6	14.6	1.1	66.4	김치,열무김치	91.9	10.0	1.4	63.4
20	옥수수	90.3	18.1	1.3	65.8	배추	68.1	5.3	0.9	67.2	양파	85.5	2.8	1.3	64.7
21	김치,깍두기	69.2	4.2	1.0	66.7	빵	63.5	4.9	0.8	68.1	요구르트,호상	68.6	10.7	1.1	65.7
22	오이	64.3	5.2	0.9	67.7	오이	61.9	5.3	0.8	68.9	오이	66.7	6.1	1.0	66.8
23	배추	64.0	4.4	0.9	68.6	마늘	61.5	2.0	0.8	69.7	토마토	62.2	7.0	1.0	67.7
24	깻잎	60.3	9.1	0.9	69.4	깻잎	60.5	11.4	0.8	70.5	깻잎	60.1	7.4	0.9	68.6
25	토마토	60.1	6.6	0.9	70.3	옥수수	60.3	15.5	0.8	71.2	배추	59.9	5.5	0.9	69.6
26	빵	57.3	3.3	0.8	71.1	토마토	58.0	8.1	0.8	72.0	복숭아	52.5	11.0	0.8	70.4
27	요구르트,호상	56.3	8.5	0.8	71.9	당근	57.2	2.6	0.7	72.7	빵	51.0	3.7	0.8	71.2
28	들깨	52.3	6.1	0.7	72.6	두부	57.2	4.1	0.7	73.5	김치,깍두기	49.2	3.7	0.8	71.9
29	당근	51.3	1.9	0.7	73.3	들깨	56.3	9.7	0.7	74.2	찹쌀	49.1	2.9	0.8	72.7
30	찹쌀	50.7	2.6	0.7	74.0	고구마	55.4	9.1	0.7	74.9	들깨	48.2	6.5	0.7	73.4

표 2-II-19. 칼슘 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	우유	91.39	2.97	17.3	17.3	우유	92.79	4.23	15.9	15.9	우유	89.97	3.21	19.0	19.0
2	김치,배추김치	33.58	0.74	6.3	23.6	김치,배추김치	41.30	1.04	7.1	23.0	김치,배추김치	25.82	0.75	5.4	24.4
3	멸치	31.84	0.97	6.0	29.6	멸치	37.89	1.48	6.5	29.5	멸치	25.76	1.00	5.4	29.8
4	두부	27.52	1.04	5.2	34.8	두부	33.13	1.65	5.7	35.1	두부	21.89	1.06	4.6	34.4
5	무청	19.68	2.08	3.7	38.5	무청	20.12	2.46	3.4	38.6	무청	19.25	2.23	4.1	38.5
6	파	11.76	0.37	2.2	40.7	파	14.19	0.56	2.4	41.0	요구르트,호상	12.82	1.18	2.7	41.2
7	달걀	11.71	0.35	2.2	43.0	달걀	14.08	0.54	2.4	43.4	미역	10.16	0.68	2.1	43.3
8	요구르트,호상	10.26	0.85	1.9	44.9	대두	11.33	0.69	1.9	45.3	달걀	9.33	0.32	2.0	45.3
9	미역	10.09	0.57	1.9	46.8	미역	10.01	0.68	1.7	47.1	파	9.31	0.40	2.0	47.2
10	대두	9.98	0.52	1.9	48.7	김치,열무김치	9.14	1.17	1.6	48.6	대두	8.62	0.53	1.8	49.1
11	김치,열무김치	8.13	0.88	1.5	50.2	깨	8.79	0.40	1.5	50.1	아이스크림	7.47	1.56	1.6	50.6
12	깨	7.64	0.26	1.4	51.7	백미	8.58	0.11	1.5	51.6	김치,열무김치	7.10	0.77	1.5	52.1
13	백미	7.52	0.08	1.4	53.1	커피	8.45	0.32	1.5	53.0	깻잎	7.08	0.90	1.5	53.6
14	깻잎	7.13	1.10	1.4	54.4	요구르트,호상	7.71	0.83	1.3	54.4	빵	6.58	0.54	1.4	55.0
15	빵	7.01	0.50	1.3	55.7	미꾸리	7.67	1.60	1.3	55.7	깨	6.48	0.28	1.4	56.4
16	아이스크림	6.92	0.92	1.3	57.1	빵	7.44	0.79	1.3	57.0	백미	6.46	0.10	1.4	57.7
17	커피	6.78	0.20	1.3	58.3	깻잎	7.18	1.39	1.2	58.2	미꾸리	5.87	1.36	1.2	59.0
18	미꾸리	6.77	1.11	1.3	59.6	고추장	6.87	0.42	1.2	59.4	치즈	5.82	1.03	1.2	60.2
19	새우	6.04	1.40	1.1	60.8	무	6.57	0.36	1.1	60.5	새우	5.52	1.63	1.2	61.3
20	무	5.86	0.30	1.1	61.9	새우	6.55	1.55	1.1	61.6	무	5.14	0.44	1.1	62.4
21	고추장	5.31	0.26	1.0	62.9	아이스크림	6.38	0.90	1.1	62.7	커피	5.10	0.17	1.1	63.5
22	치즈	5.24	0.80	1.0	63.9	된장	5.95	0.29	1.0	63.7	된장	4.47	0.22	0.9	64.4
23	된장	5.21	0.22	1.0	64.8	라면	5.64	0.45	1.0	64.7	김	4.28	0.22	0.9	65.3
24	김	4.88	0.25	0.9	65.8	김	5.47	0.36	0.9	65.6	귤	3.92	0.46	0.8	66.2
25	라면	4.33	0.29	0.8	66.6	어패류젓	5.40	0.75	0.9	66.5	고추장	3.74	0.18	0.8	67.0
26	어패류젓	4.25	0.50	0.8	67.4	명태/동태	5.31	0.61	0.9	67.5	고구마	3.62	0.44	0.8	67.7
27	양파	4.18	0.12	0.8	68.2	양파	4.91	0.16	0.8	68.3	오이	3.58	0.33	0.8	68.5
28	명태/동태	4.02	0.38	0.8	68.9	콩나물	4.81	0.24	0.8	69.1	양파	3.45	0.12	0.7	69.2
29	콩나물	3.92	0.15	0.7	69.7	김치,깍두기	4.71	0.33	0.8	69.9	배추	3.32	0.28	0.7	69.9
30	김치,깍두기	3.66	0.22	0.7	70.4	치즈	4.67	0.82	0.8	70.7	어패류젓	3.10	0.32	0.7	70.6

표 2-II-20. 인 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	백미	256.0	2.9	21.2	21.2	백미	293.4	3.6	21.3	21.3	백미	218.3	3.4	21.2	21.2
2	우유	75.1	2.4	6.2	27.5	돼지고기	77.6	3.5	5.6	26.9	우유	73.7	2.6	7.2	28.4
3	돼지고기	59.0	2.1	4.9	32.4	우유	76.4	3.5	5.5	32.4	돼지고기	40.3	2.1	3.9	32.3
4	달걀	42.4	1.3	3.5	35.9	김치,배추김치	51.0	1.3	3.7	36.1	달걀	33.8	1.2	3.3	35.6
5	김치,배추김치	41.4	0.9	3.4	39.3	달걀	50.9	1.9	3.7	39.8	김치,배추김치	31.9	0.9	3.1	38.7
6	쇠고기	31.2	1.5	2.6	41.9	쇠고기	37.9	2.3	2.7	42.5	쇠고기	24.4	1.3	2.4	41.1
7	두부	29.8	1.1	2.5	44.4	두부	36.3	1.8	2.6	45.2	멸치	24.1	1.0	2.3	43.4
8	멸치	29.4	1.0	2.4	46.8	멸치	34.8	1.5	2.5	47.7	대두	23.9	1.5	2.3	45.7
9	대두	27.7	1.4	2.3	49.1	닭고기	32.7	3.1	2.4	50.0	두부	23.2	1.1	2.3	48.0
10	닭고기	25.7	1.8	2.1	51.2	대두	31.4	1.9	2.3	52.3	닭고기	18.6	1.4	1.8	49.8
11	오징어	18.2	1.6	1.5	52.8	오징어	23.0	2.5	1.7	54.0	빵	14.9	1.0	1.5	51.2
12	커피	17.6	0.5	1.5	54.2	커피	21.1	0.7	1.5	55.5	현미	14.6	1.3	1.4	52.7
13	빵	16.1	0.9	1.3	55.5	맥주	18.7	1.6	1.4	56.9	커피	14.1	0.5	1.4	54.0
14	현미	15.7	1.3	1.3	56.8	라면	18.5	1.2	1.3	58.2	오징어	13.4	1.2	1.3	55.3
15	김	14.1	0.7	1.2	58.0	빵	17.2	1.4	1.3	59.5	김	12.2	0.6	1.2	56.5
16	라면	14.1	0.7	1.2	59.2	현미	16.7	1.7	1.2	60.7	찹쌀	11.9	0.7	1.2	57.7
17	찹쌀	12.3	0.6	1.0	60.2	명태/동태	16.4	1.9	1.2	61.9	보리	11.5	0.6	1.1	58.8
18	명태/동태	12.2	1.2	1.0	61.2	김	16.0	1.1	1.2	63.0	요구르트,호상	11.2	1.1	1.1	59.9
19	맥주	12.1	0.9	1.0	62.2	찹쌀	12.6	0.7	0.9	63.9	감자	10.7	1.1	1.0	60.9
20	보리	11.8	0.5	1.0	63.2	간장	12.5	0.4	0.9	64.8	라면	9.6	0.6	0.9	61.8
21	감자	11.2	0.8	0.9	64.1	고등어	12.3	1.3	0.9	65.7	떡	9.5	0.7	0.9	62.8
22	간장	10.9	0.3	0.9	65.0	보리	12.2	0.6	0.9	66.6	간장	9.2	0.3	0.9	63.7
23	돼지고기가공품,햄	10.6	0.9	0.9	65.9	돼지고기가공품,햄	12.1	1.4	0.9	67.5	돼지고기가공품,햄	9.1	1.1	0.9	64.5
24	고등어	10.3	0.8	0.9	66.8	감자	11.6	0.8	0.8	68.3	된장	9.0	0.5	0.9	65.4
25	된장	10.3	0.5	0.9	67.6	된장	11.6	0.6	0.8	69.2	오이	8.7	0.9	0.8	66.3
26	요구르트,호상	9.0	0.8	0.7	68.4	마늘	10.0	0.3	0.7	69.9	고등어	8.4	0.8	0.8	67.1
27	오이	8.5	0.8	0.7	69.1	국수	9.9	0.9	0.7	70.6	고구마	8.1	1.0	0.8	67.9
28	떡	8.4	0.6	0.7	69.8	양파	9.2	0.3	0.7	71.3	명태/동태	8.0	0.9	0.8	68.6
29	국수	8.2	0.7	0.7	70.4	콩나물	8.8	0.4	0.6	71.9	참외	7.7	1.4	0.8	69.4
30	마늘	8.0	0.2	0.7	71.1	다랑어	8.5	1.1	0.6	72.5	옥수수	6.9	1.4	0.7	70.1

표 2-II-21. 나트륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	소금	941.7	27.3	19.3	19.3	소금	1147.2	36.3	20.1	20.1	소금	735.1	29.8	18.2	18.2
2	김치,배추김치	818.8	18.1	16.8	36.1	김치,배추김치	1007.0	25.4	17.6	37.7	김치,배추김치	629.5	18.3	15.6	33.8
3	간장	430.0	10.3	8.8	44.9	간장	494.8	13.7	8.7	46.4	간장	364.8	12.1	9.0	42.8
4	된장	286.5	12.8	5.9	50.8	된장	333.5	16.9	5.8	52.2	된장	239.3	12.0	5.9	48.7
5	라면	216.1	11.1	4.4	55.2	라면	280.8	18.0	4.9	57.2	김치,총각김치	182.1	20.2	4.5	53.2
6	고추장	204.7	8.7	4.2	59.4	고추장	260.4	13.8	4.6	61.7	라면	151.1	10.1	3.7	57.0
7	김치,총각김치	177.7	18.9	3.6	63.1	김치,총각김치	173.3	24.3	3.0	64.8	고추장	148.6	6.9	3.7	60.6
8	백미	118.6	1.7	2.4	65.5	백미	137.3	2.4	2.4	67.2	백미	99.7	1.8	2.5	63.1
9	국수	93.8	10.1	1.9	67.4	국수	111.6	14.3	2.0	69.1	국수	75.9	9.2	1.9	65.0
10	쌈장	77.9	5.8	1.6	69.0	쌈장	105.8	9.6	1.9	71.0	미역	74.3	6.7	1.8	66.8
11	미역	71.4	5.0	1.5	70.5	어패류젓	84.5	10.0	1.5	72.5	어패류젓	57.3	5.9	1.4	68.2
12	어패류젓	71.0	7.1	1.5	71.9	김치,깍두기	75.9	5.3	1.3	73.8	쌈장	50.0	5.1	1.2	69.5
13	김치,깍두기	58.9	3.6	1.2	73.1	미역	68.4	5.2	1.2	75.0	청국장	48.3	6.9	1.2	70.7
14	청국장	50.1	5.7	1.0	74.2	어묵	55.1	4.7	1.0	76.0	김치,나박김치	46.1	8.6	1.1	71.8
15	메밀국수/냉면국수	48.7	6.5	1.0	75.2	단무지	54.7	3.6	1.0	76.9	우유	45.8	1.8	1.1	72.9
16	우유	45.9	1.5	0.9	76.1	메밀국수/냉면국수	53.5	8.2	0.9	77.8	떡	45.1	3.3	1.1	74.1
17	어묵	45.5	3.0	0.9	77.0	청국장	51.8	7.5	0.9	78.8	메밀국수/냉면국수	43.9	7.2	1.1	75.1
18	단무지	44.9	2.4	0.9	78.0	김치,열무김치	49.0	6.3	0.9	79.6	김치,깍두기	41.9	3.1	1.0	76.2
19	김치,나박김치	44.4	7.4	0.9	78.9	달걀	46.6	1.8	0.8	80.4	빵	39.3	3.0	1.0	77.2
20	김치,열무김치	43.6	4.7	0.9	79.8	우유	46.0	2.1	0.8	81.2	김치,열무김치	38.1	4.1	0.9	78.1
21	빵	40.9	2.6	0.8	80.6	김치,나박김치	42.6	9.3	0.8	82.0	어묵	35.8	2.4	0.9	79.0
22	떡	39.9	2.8	0.8	81.4	빵	42.6	4.4	0.8	82.7	단무지	35.0	3.0	0.9	79.8
23	달걀	38.9	1.2	0.8	82.2	돼지고기가공품,햄	42.0	4.3	0.7	83.5	분말조미료	33.8	2.9	0.8	80.7
24	분말조미료	37.7	4.4	0.8	83.0	분말조미료	41.4	7.2	0.7	84.2	깻잎	32.7	4.3	0.8	81.5
25	돼지고기가공품,햄	36.7	3.1	0.8	83.7	김	39.8	3.0	0.7	84.9	김치,동치미	32.6	5.1	0.8	82.3
26	김	34.7	2.0	0.7	84.4	떡	34.7	3.3	0.6	85.5	돼지고기가공품,햄	31.2	3.8	0.8	83.1
27	김치,동치미	31.9	4.1	0.7	85.1	김치,동치미	31.3	4.6	0.6	86.0	달걀	31.1	1.1	0.8	83.8
28	깻잎	30.6	3.9	0.6	85.7	깻잎	28.7	4.4	0.5	86.5	김	29.5	1.7	0.7	84.6
29	고등어	23.3	3.5	0.5	86.2	춘장	28.2	3.4	0.5	87.0	칼국수	24.9	4.1	0.6	85.2
30	춘장	22.2	2.4	0.5	86.7	고등어	26.2	4.2	0.5	87.5	고등어	20.4	4.1	0.5	85.7

표 2-II-22. 칼륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	295.8	3.4	9.8	9.8	백미	339.4	4.2	10.1	10.1	백미	252.0	3.9	9.5	9.5
2	김치,배추김치	214.3	4.7	7.1	17.0	김치,배추김치	263.6	6.6	7.9	18.0	김치,배추김치	164.8	4.8	6.2	15.6
3	우유	124.7	4.0	4.2	21.1	우유	126.8	5.8	3.8	21.8	우유	122.7	4.3	4.6	20.2
4	커피	96.3	2.6	3.2	24.3	돼지고기	117.7	5.6	3.5	25.3	감자	80.9	8.5	3.0	23.3
5	돼지고기	88.6	3.3	3.0	27.3	커피	114.7	3.7	3.4	28.8	커피	77.7	2.9	2.9	26.2
6	감자	83.1	6.0	2.8	30.0	감자	85.2	6.4	2.6	31.3	고구마	64.7	7.9	2.4	28.6
7	미역	61.8	3.7	2.1	32.1	닭고기	76.7	7.3	2.3	33.6	참외	64.6	12.1	2.4	31.0
8	닭고기	59.1	4.1	2.0	34.1	쇠고기	69.7	4.5	2.1	35.7	미역	61.9	4.1	2.3	33.4
9	쇠고기	57.7	2.9	1.9	36.0	고추	67.3	2.6	2.0	37.7	돼지고기	59.3	2.9	2.2	35.6
10	대두	55.9	3.4	1.9	37.8	대두	62.6	4.4	1.9	39.6	감	53.9	8.2	2.0	37.6
11	고추	54.6	1.8	1.8	39.6	미역	61.7	4.7	1.8	41.4	귤	51.3	6.1	1.9	39.5
12	참외	53.8	9.2	1.8	41.4	무	53.5	2.9	1.6	43.0	대두	49.1	3.3	1.8	41.4
13	무	47.6	2.5	1.6	43.0	김치,깍두기	50.9	3.6	1.5	44.5	쇠고기	45.7	2.6	1.7	43.1
14	고구마	45.5	5.1	1.5	44.5	김치,열무김치	47.8	6.1	1.4	46.0	고추	41.8	1.7	1.6	44.7
15	귤	45.2	5.7	1.5	46.0	달걀	47.0	1.9	1.4	47.4	무	41.7	3.6	1.6	46.2
16	감	44.4	6.6	1.5	47.5	김	46.9	3.0	1.4	48.8	닭고기	41.5	2.9	1.6	47.8
17	김치,열무김치	42.5	4.6	1.4	48.9	라면	46.7	3.0	1.4	50.2	사과	37.4	2.7	1.4	49.2
18	김	41.9	2.0	1.4	50.3	양파	44.1	1.5	1.3	51.5	김치,열무김치	37.1	4.0	1.4	50.6
19	김치,깍두기	39.5	2.4	1.3	51.6	시금치	43.6	2.9	1.3	52.8	김	36.9	1.7	1.4	52.0
20	달걀	39.2	1.2	1.3	52.9	참외	43.1	8.7	1.3	54.1	오이	35.7	3.5	1.3	53.3
21	양파	37.5	1.1	1.3	54.2	된장	40.5	1.9	1.2	55.3	배	35.6	4.9	1.3	54.6
22	시금치	36.5	2.0	1.2	55.4	마늘	40.3	1.3	1.2	56.5	토마토	32.3	3.0	1.2	55.9
23	라면	35.7	1.8	1.2	56.6	귤	39.1	7.0	1.2	57.6	달걀	31.4	1.1	1.2	57.0
24	된장	35.7	1.5	1.2	57.8	파	35.7	1.8	1.1	58.7	양파	30.9	1.0	1.2	58.2
25	오이	34.9	3.0	1.2	58.9	고추장	35.3	1.8	1.1	59.8	된장	30.9	1.5	1.2	59.4
26	배	34.8	4.3	1.2	60.1	감	35.0	6.0	1.1	60.8	시금치	29.3	2.2	1.1	60.5
27	사과	33.9	2.4	1.1	61.2	간장	34.7	1.0	1.0	61.8	김치,깍두기	28.1	2.1	1.1	61.5
28	마늘	32.0	0.7	1.1	62.3	오이	34.2	3.1	1.0	62.9	애호박	28.0	2.3	1.1	62.6
29	토마토	31.8	2.8	1.1	63.3	배	33.9	4.7	1.0	63.9	간장	25.1	0.9	0.9	63.5
30	간장	29.9	0.7	1.0	64.3	국수	33.5	2.8	1.0	64.9	라면	24.7	1.6	0.9	64.4

표 2-II-23. 철 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	무청	849.8	90.3	5.8	5.8	백미	900.6	14.3	5.5	5.5	무청	831.9	96.6	6.5	6.5
2	백미	794.8	10.7	5.5	11.3	무청	867.6	106.5	5.3	10.8	백미	688.4	11.6	5.4	11.9
3	김치,배추김치	571.6	12.6	3.9	15.2	김치,배추김치	703.0	17.7	4.3	15.1	감	471.7	78.4	3.7	15.6
4	쇠고기	450.7	21.6	3.1	18.3	음료류,이온음료	588.4	117.0	3.6	18.7	김치,배추김치	439.4	12.8	3.4	19.0
5	달걀	442.5	14.4	3.0	21.3	달걀	532.9	22.1	3.3	21.9	쇠고기	377.6	23.9	3.0	22.0
6	돼지고기	385.4	15.6	2.6	24.0	쇠고기	523.5	29.2	3.2	25.1	달걀	351.6	13.3	2.8	24.8
7	감	384.1	64.3	2.6	26.6	돼지고기	500.7	24.2	3.1	28.2	참외	311.7	58.5	2.4	27.2
8	음료류,이온음료	373.2	61.3	2.6	29.2	된장	416.6	23.6	2.5	30.7	김	310.1	15.5	2.4	29.6
9	김	360.4	19.0	2.5	31.6	두부	415.8	20.4	2.5	33.3	대두	297.7	17.9	2.3	32.0
10	된장	350.4	17.6	2.4	34.0	김	410.4	28.7	2.5	35.8	된장	283.8	16.2	2.2	34.2
11	두부	349.0	13.2	2.4	36.4	대두	388.1	22.9	2.4	38.1	두부	281.8	14.0	2.2	36.4
12	대두	343.0	17.8	2.4	38.8	멸치	328.2	14.8	2.0	40.1	돼지고기	269.5	15.1	2.1	38.5
13	멸치	276.8	9.5	1.9	40.7	고추	317.2	12.2	1.9	42.1	멸치	225.2	8.6	1.8	40.3
14	참외	259.6	44.6	1.8	42.5	감	296.9	59.3	1.8	43.9	고추	197.0	8.3	1.5	41.8
15	고추	257.3	8.4	1.8	44.2	닭고기	294.3	29.1	1.8	45.7	빵	186.0	13.7	1.5	43.3
16	닭고기	229.1	16.5	1.6	45.8	쇠고기,부산물	252.9	44.2	1.5	47.2	떡	171.1	15.8	1.3	44.6
17	빵	193.3	11.4	1.3	47.1	참외	207.8	42.2	1.3	48.5	닭고기	163.5	11.2	1.3	45.9
18	쇠고기,부산물	192.3	26.9	1.3	48.4	시금치	202.7	13.4	1.2	49.7	음료류,이온음료	156.8	42.3	1.2	47.1
19	시금치	176.2	10.4	1.2	49.7	빵	200.5	17.6	1.2	51.0	바지락조개	156.8	15.8	1.2	48.3
20	바지락조개	172.8	16.3	1.2	50.8	바지락조개	188.7	22.3	1.2	52.1	시금치	149.5	12.0	1.2	49.5
21	무	155.1	8.2	1.1	51.9	무	173.5	9.6	1.1	53.2	인삼	140.3	34.8	1.1	50.6
22	떡	154.5	14.6	1.1	53.0	콩나물	171.6	8.6	1.1	54.2	무	136.6	11.8	1.1	51.7
23	파	141.9	4.2	1.0	53.9	파	171.0	6.4	1.0	55.3	쇠고기,부산물	131.3	20.7	1.0	52.7
24	사과	141.0	26.1	1.0	54.9	다랑어	153.2	34.9	0.9	56.2	사과	126.5	9.7	1.0	53.7
25	콩나물	139.1	5.5	1.0	55.9	김치,열무김치	149.7	19.2	0.9	57.1	찹쌀	125.3	7.7	1.0	54.7
26	김치,열무김치	133.1	14.4	0.9	56.8	커피	149.5	7.3	0.9	58.0	옥수수	121.4	25.7	1.0	55.6
27	인삼	132.2	23.8	0.9	57.7	고추장	147.2	7.7	0.9	58.9	보리	120.2	5.8	0.9	56.6
28	찹쌀	130.3	7.1	0.9	58.6	간장	146.8	4.6	0.9	59.8	깻잎	118.3	12.8	0.9	57.5
29	간장	125.8	3.3	0.9	59.4	떡	138.0	20.4	0.8	60.7	김치,열무김치	116.4	12.6	0.9	58.4
30	보리	124.4	5.2	0.9	60.3	찹쌀	135.3	8.8	0.8	61.5	우유	113.6	5.7	0.9	59.3

표 2-II-24. 비타민 A 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)				남자 (N=3,550)				여자 (N=4,469)			
	식품명	섭취량 (㎍RE)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍RE)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍RE)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	당근	81.5	3.0	10.1	10.1	당근	90.9	4.1	10.0	10.0	당근	72.1	3.9	10.3	10.3
2	고추	68.6	2.1	8.5	18.6	고추	84.8	3.3	9.3	19.3	김	57.1	3.0	8.2	18.4
3	김	66.5	3.6	8.2	26.9	김	75.8	5.4	8.3	27.6	감	55.8	9.5	8.0	26.4
4	감	45.4	7.8	5.6	32.5	채소음료	60.6	19.5	6.7	34.3	고추	52.3	2.2	7.5	33.9
5	깻잎	42.8	7.6	5.3	37.8	김치,열무김치	46.9	6.0	5.2	39.4	깻잎	42.0	6.1	6.0	39.8
6	김치,열무김치	41.7	4.5	5.2	43.0	깻잎	43.7	9.5	4.8	44.2	김치,열무김치	36.4	4.0	5.2	45.0
7	채소음료	36.3	10.4	4.5	47.5	김치,배추김치	42.2	1.1	4.6	48.8	시금치	30.5	2.5	4.4	49.4
8	시금치	35.3	2.1	4.4	51.9	시금치	40.1	2.7	4.4	53.2	수박	26.5	4.3	3.8	53.2
9	김치,배추김치	34.3	0.8	4.3	56.1	달걀	35.4	1.4	3.9	57.1	김치,배추김치	26.4	0.8	3.8	56.9
10	달걀	29.7	1.0	3.7	59.8	감	35.0	7.2	3.9	61.0	달걀	23.9	1.0	3.4	60.3
11	수박	27.3	4.2	3.4	63.2	고추장	29.4	1.6	3.2	64.2	우유	22.8	0.8	3.3	63.6
12	우유	23.4	0.8	2.9	66.1	수박	28.1	4.8	3.1	67.3	토마토	17.2	1.9	2.5	66.0
13	고추장	23.1	1.0	2.9	69.0	우유	24.1	1.1	2.7	69.9	고추장	16.7	0.8	2.4	68.4
14	파	18.6	0.6	2.3	71.3	파	22.5	0.9	2.5	72.4	파	14.7	0.7	2.1	70.5
15	토마토	16.1	1.7	2.0	73.3	장어	20.9	5.8	2.3	74.7	채소음료	11.9	4.6	1.7	72.2
16	장어	14.8	3.4	1.8	75.1	부추	15.7	1.9	1.7	76.4	부추	10.8	1.0	1.5	73.7
17	부추	13.2	1.2	1.6	76.7	토마토	15.0	2.0	1.7	78.1	장어	8.7	2.3	1.2	75.0
18	닭고기	9.4	0.7	1.2	77.9	닭고기	11.9	1.1	1.3	79.4	귤	8.0	1.9	1.1	76.1
19	쇠고기	7.5	1.4	0.9	78.8	라면	9.9	0.7	1.1	80.5	미역	7.5	0.6	1.1	77.2
20	라면	7.3	0.4	0.9	79.7	쇠고기	8.1	2.1	0.9	81.4	쇠고기	6.9	1.4	1.0	78.2
21	미역	7.3	0.5	0.9	80.6	상추	7.6	0.8	0.8	82.2	아욱	6.9	1.9	1.0	79.1
22	상추	7.1	0.5	0.9	81.5	취나물	7.5	1.2	0.8	83.0	닭고기	6.8	0.5	1.0	80.1
23	아욱	6.8	1.5	0.9	82.4	미역	7.2	0.5	0.8	83.8	김치,총각김치	6.7	0.7	1.0	81.1
24	취나물	6.8	0.8	0.8	83.2	아욱	6.8	1.6	0.8	84.6	상추	6.6	0.5	1.0	82.0
25	김치,총각김치	6.5	0.7	0.8	84.0	김치,총각김치	6.4	0.9	0.7	85.3	취나물	6.0	1.0	0.9	82.9
26	귤	6.5	1.6	0.8	84.8	시리얼	6.2	0.9	0.7	85.9	무청	4.9	0.6	0.7	83.6
27	시리얼	5.5	0.6	0.7	85.5	쇠고기,부산물	5.5	4.4	0.6	86.5	시리얼	4.8	0.6	0.7	84.3
28	무청	5.1	0.5	0.6	86.1	무청	5.2	0.6	0.6	87.1	라면	4.7	0.3	0.7	84.9
29	쇠고기,부산물	4.5	3.3	0.6	86.7	귤	5.0	1.4	0.6	87.7	단호박	4.5	1.6	0.7	85.6
30	쑥갓	3.9	0.3	0.5	87.2	김치,깍두기	4.8	0.3	0.5	88.2	쇠고기,부산물	3.4	2.4	0.5	86.1

표 2-II-25. 티아민 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)				남자 (N=3,550)				여자 (N=4,469)			
	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	돼지고기	239.5	8.8	17.4	17.4	돼지고기	318.8	15.0	19.9	19.9	백미	175.3	2.7	15.3	15.3
2	백미	204.8	2.3	14.9	32.3	백미	234.2	2.9	14.6	34.5	돼지고기	159.7	8.0	13.9	29.3
3	라면	77.4	4.0	5.6	38.0	라면	102.0	6.6	6.4	40.9	라면	52.6	3.3	4.6	33.8
4	김치,배추김치	42.9	1.0	3.1	41.1	김치,배추김치	52.7	1.3	3.3	44.2	귤	38.3	4.6	3.3	37.2
5	닭고기	37.9	2.5	2.8	43.9	닭고기	48.3	4.1	3.0	47.2	김치,배추김치	33.0	1.0	2.9	40.1
6	귤	34.0	4.3	2.5	46.3	된장	40.0	2.7	2.5	49.7	우유	31.5	1.1	2.8	42.8
7	된장	32.6	2.0	2.4	48.7	우유	32.6	1.5	2.0	51.8	닭고기	27.4	2.0	2.4	45.2
8	우유	32.0	1.0	2.3	51.0	귤	29.7	5.3	1.9	53.6	된장	25.1	1.8	2.2	47.4
9	요구르트,액상	22.9	2.7	1.7	52.7	고추장	27.2	1.6	1.7	55.3	요구르트,액상	22.3	2.9	1.9	49.3
10	고추장	21.1	1.0	1.5	54.2	요구르트,액상	23.5	3.4	1.5	56.8	빵	19.1	1.6	1.7	51.0
11	빵	19.3	1.1	1.4	55.6	김	20.9	1.5	1.3	58.1	감자	18.4	1.9	1.6	52.6
12	감자	19.0	1.4	1.4	57.0	대두	20.5	1.5	1.3	59.4	김	15.8	0.8	1.4	54.0
13	김	18.4	1.0	1.3	58.4	달걀	20.3	0.9	1.3	60.6	고추장	15.0	0.7	1.3	55.3
14	대두	17.6	1.1	1.3	59.6	빵	19.6	1.7	1.2	61.8	대두	14.7	1.0	1.3	56.6
15	달걀	16.8	0.6	1.2	60.9	감자	19.6	1.5	1.2	63.1	찹쌀	14.1	0.9	1.2	57.8
16	찹쌀	14.4	0.7	1.1	61.9	김치,깍두기	17.8	1.3	1.1	64.2	달걀	13.3	0.5	1.2	59.0
17	김치,깍두기	13.8	0.8	1.0	62.9	쇠고기	15.7	1.0	1.0	65.2	보리	12.8	0.6	1.1	60.1
18	보리	13.3	0.6	1.0	63.9	찹쌀	14.7	0.9	0.9	66.1	현미	12.1	1.1	1.1	61.2
19	현미	13.0	1.1	0.9	64.8	콩나물	14.5	0.7	0.9	67.0	인삼	10.8	3.0	0.9	62.1
20	쇠고기	12.8	0.6	0.9	65.8	현미	13.8	1.4	0.9	67.8	애호박	10.3	0.8	0.9	63.0
21	콩나물	11.8	0.5	0.9	66.6	보리	13.7	0.7	0.9	68.7	쇠고기	10.0	0.5	0.9	63.9
22	시리얼	11.0	1.2	0.8	67.4	양파	12.3	0.4	0.8	69.5	김치,깍두기	9.8	0.7	0.9	64.7
23	애호박	10.7	0.7	0.8	68.2	시리얼	12.2	1.8	0.8	70.2	시리얼	9.8	1.3	0.9	65.6
24	김치,열무김치	10.5	1.1	0.8	69.0	장어	12.1	3.6	0.8	71.0	김치,열무김치	9.2	1.0	0.8	66.4
25	양파	10.4	0.3	0.8	69.7	김치,열무김치	11.8	1.5	0.7	71.7	고구마	9.0	1.1	0.8	67.2
26	국수	10.1	1.1	0.7	70.4	국수	11.6	1.6	0.7	72.5	콩나물	9.0	0.5	0.8	68.0
27	밀가루	9.5	0.6	0.7	71.1	밀가루	11.3	0.9	0.7	73.2	양파	8.6	0.3	0.8	68.7
28	인삼	9.5	2.0	0.7	71.8	애호박	11.2	0.8	0.7	73.9	국수	8.5	0.9	0.7	69.4
29	고추	8.6	0.3	0.6	72.4	고추	10.6	0.4	0.7	74.5	감	8.5	1.3	0.7	70.2
30	장어	8.6	2.1	0.6	73.1	파	10.3	0.4	0.6	75.2	포도	7.7	1.8	0.7	70.8

표 2-II-26. 리보플라빈 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	우유	132.4	4.3	10.3	10.3	우유	136.0	6.4	9.2	9.2	우유	128.9	4.3	11.7	11.7
2	달걀	90.7	3.0	7.0	17.3	달걀	109.2	4.7	7.4	16.6	달걀	72.2	2.7	6.5	18.2
3	백미	74.8	0.9	5.8	23.1	돼지고기	99.1	5.6	6.7	23.3	백미	63.9	1.0	5.8	24.0
4	돼지고기	72.2	3.1	5.6	28.7	백미	85.6	1.2	5.8	29.1	김	53.6	2.5	4.9	28.9
5	김	61.8	3.0	4.8	33.5	김	69.9	4.5	4.7	33.8	돼지고기	45.1	2.2	4.1	32.9
6	라면	52.9	2.8	4.1	37.6	라면	69.9	4.6	4.7	38.6	라면	35.9	2.3	3.3	36.2
7	김치,배추김치	42.9	1.0	3.3	40.9	닭고기	53.2	4.7	3.6	42.2	김치,배추김치	33.0	1.0	3.0	39.2
8	닭고기	41.7	2.8	3.2	44.1	김치,배추김치	52.7	1.3	3.6	45.7	닭고기	30.1	2.1	2.7	41.9
9	쇠고기	37.2	1.9	2.9	47.0	쇠고기	45.4	2.9	3.1	48.8	쇠고기	28.9	1.5	2.6	44.5
10	고추	24.8	0.8	1.9	48.9	고추	30.7	1.2	2.1	50.9	고추	19.0	0.8	1.7	46.2
11	빵	21.0	3.9	1.6	50.5	빵	24.4	7.5	1.7	52.5	귤	18.9	2.4	1.7	47.9
12	김치,열무김치	20.3	2.2	1.6	52.1	김치,열무김치	22.9	2.9	1.6	54.1	요구르트,호상	18.1	1.8	1.6	49.6
13	고등어	18.1	1.5	1.4	53.5	고등어	21.6	2.3	1.5	55.5	김치,열무김치	17.8	1.9	1.6	51.2
14	시금치	16.6	0.9	1.3	54.8	맥주	21.3	1.9	1.4	57.0	빵	17.6	1.9	1.6	52.8
15	귤	16.2	2.1	1.3	56.0	시금치	20.1	1.3	1.4	58.3	감	17.2	2.9	1.6	54.3
16	된장	15.8	0.8	1.2	57.3	마늘	19.1	0.6	1.3	59.6	딸기	15.0	3.1	1.4	55.7
17	마늘	15.1	0.4	1.2	58.4	된장	18.9	1.1	1.3	60.9	고등어	14.6	1.4	1.3	57.0
18	요구르트,호상	14.8	1.3	1.2	59.6	고추장	16.9	1.2	1.1	62.1	시금치	13.2	1.0	1.2	58.2
19	감	14.0	2.3	1.1	60.7	파	15.6	0.6	1.1	63.1	된장	12.8	0.7	1.2	59.4
20	고추장	13.9	0.8	1.1	61.7	막걸리	13.7	1.9	0.9	64.0	마늘	11.1	0.4	1.0	60.4
21	맥주	13.8	1.1	1.1	62.8	귤	13.6	2.2	0.9	65.0	깻잎	11.1	1.8	1.0	61.4
22	파	12.9	0.4	1.0	63.8	시리얼	13.0	2.0	0.9	65.8	고추장	10.8	0.7	1.0	62.4
23	딸기	11.7	2.2	0.9	64.7	콩나물	13.0	0.7	0.9	66.7	파	10.2	0.4	0.9	63.3
24	깻잎	11.4	2.2	0.9	65.6	대두	12.4	0.8	0.8	67.6	감자	10.0	1.1	0.9	64.2
25	시리얼	11.4	1.2	0.9	66.5	깻잎	11.8	2.7	0.8	68.4	미역	9.9	0.7	0.9	65.1
26	대두	10.8	0.6	0.8	67.3	커피	11.7	1.0	0.8	69.1	아이스크림	9.8	1.7	0.9	66.0
27	콩나물	10.5	0.4	0.8	68.1	요구르트,호상	11.6	1.3	0.8	69.9	시리얼	9.7	1.3	0.9	66.9
28	감자	10.3	0.7	0.8	68.9	감	10.9	2.1	0.7	70.7	대두	9.1	0.6	0.8	67.7
29	미역	9.9	0.6	0.8	69.7	감자	10.6	0.8	0.7	71.4	인삼	8.9	2.4	0.8	68.5
30	커피	9.5	0.6	0.7	70.4	미역	9.8	0.7	0.7	72.0	콩나물	7.9	0.5	0.7	69.2

표 2-II-27. 나이아신 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)				남자 (N=3,550)				여자 (N=4,469)			
	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (㎍)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	백미	2,723.6	31.7	16.0	16.0	백미	3,125.8	38.6	15.7	15.7	백미	2,319.1	36.3	16.5	16.5
2	돼지고기	2,003.2	74.9	11.8	27.8	돼지고기	2,640.5	122.5	13.3	29.0	돼지고기	1,362.4	70.1	9.7	26.1
3	쇠고기	875.3	41.7	5.2	33.0	쇠고기	1060.1	63.2	5.3	34.3	쇠고기	689.5	36.2	4.9	31.0
4	커피	778.8	24.4	4.6	37.5	커피	925.3	35.0	4.7	39.0	커피	631.4	26.9	4.5	35.5
5	닭고기	575.2	36.3	3.4	40.9	닭고기	738.3	60.3	3.7	42.7	김치,배추김치	439.8	12.7	3.1	38.6
6	김치,배추김치	571.7	12.6	3.4	44.3	김치,배추김치	703.0	17.7	3.5	46.2	닭고기	411.2	29.3	2.9	41.5
7	고등어	335.5	27.3	2.0	46.3	맥주	406.7	40.1	2.0	48.2	떡	276.2	21.9	2.0	43.5
8	고추	304.9	9.3	1.8	48.0	고등어	399.8	41.6	2.0	50.3	고등어	270.9	26.6	1.9	45.4
9	다랑어	294.4	34.5	1.7	49.8	고추	375.4	14.2	1.9	52.1	고추	234.0	9.8	1.7	47.1
10	맥주	268.8	23.5	1.6	51.4	다랑어	371.1	51.1	1.9	54.0	찹쌀	218.1	13.9	1.6	48.6
11	떡	254.8	18.5	1.5	52.9	멸치	270.9	11.5	1.4	55.4	다랑어	217.3	30.9	1.5	50.2
12	멸치	228.1	7.4	1.3	54.2	오리고기	250.2	52.7	1.3	56.6	빵	207.5	15.8	1.5	51.7
13	찹쌀	220.5	11.8	1.3	55.5	떡	233.6	23.3	1.2	57.8	보리	198.4	10.7	1.4	53.1
14	빵	218.0	12.5	1.3	56.8	돼지고기가공품,햄	229.2	27.9	1.2	58.9	현미	188.1	17.0	1.3	54.4
15	보리	206.4	9.3	1.2	58.0	빵	228.5	20.4	1.2	60.1	멸치	185.0	7.0	1.3	55.7
16	돼지고기가공품,햄	205.3	19.3	1.2	59.2	찹쌀	222.9	13.8	1.1	61.2	돼지고기가공품,햄	181.2	23.5	1.3	57.0
17	현미	201.3	17.3	1.2	60.4	보리	214.4	10.9	1.1	62.3	감자	168.8	17.4	1.2	58.2
18	오리고기	197.9	33.4	1.2	61.5	현미	214.4	22.3	1.1	63.4	국수	168.3	16.3	1.2	59.4
19	국수	187.2	16.1	1.1	62.6	오징어	211.0	25.0	1.1	64.4	귤	161.6	18.2	1.2	60.5
20	감자	176.0	12.3	1.0	63.7	국수	205.9	21.4	1.0	65.5	오리고기	145.3	27.1	1.0	61.6
21	김	166.6	8.6	1.0	64.7	조기	197.9	27.5	1.0	66.5	김	143.9	7.3	1.0	62.6
22	오징어	165.7	15.4	1.0	65.6	김	189.2	13.0	1.0	67.4	우유	133.8	9.2	1.0	63.5
23	조기	158.0	18.8	0.9	66.6	감자	183.2	13.5	0.9	68.3	시리얼	132.1	17.7	0.9	64.5
24	시리얼	148.3	15.7	0.9	67.4	라면	176.4	11.1	0.9	69.2	맥주	130.2	16.4	0.9	65.4
25	귤	145.6	16.2	0.9	68.3	달걀	170.5	6.6	0.9	70.1	오징어	120.2	11.4	0.9	66.2
26	달걀	142.5	4.4	0.8	69.1	시리얼	164.4	24.7	0.8	70.9	토마토	119.4	11.0	0.9	67.1
27	라면	134.0	6.6	0.8	69.9	막걸리	137.2	18.5	0.7	71.6	조기	118.0	17.0	0.8	67.9
28	우유	122.7	5.6	0.7	70.6	땅콩	132.2	33.8	0.7	72.3	달걀	114.3	4.2	0.8	68.7
29	토마토	117.1	10.1	0.7	71.3	명태/동태	130.4	15.7	0.7	72.9	고구마	105.5	12.9	0.8	69.5
30	땅콩	100.4	18.3	0.6	71.9	귤	129.6	20.3	0.7	73.6	라면	91.3	5.6	0.7	70.1

표 2-II-28. 비타민 C 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2010

구분 / 순위	전체 (N=8,019)					남자 (N=3,550)					여자 (N=4,469)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준오차	섭취분율 (%)	누적분율 (%)
1	귤	12.88	1.50	12.2	12.2	김치,배추김치	12.30	0.31	11.2	11.2	귤	14.62	1.64	14.5	14.5
2	김치,배추김치	10.00	0.22	9.5	21.7	귤	11.15	1.83	10.1	21.3	김치,배추김치	7.69	0.22	7.6	22.1
3	감자	6.11	0.45	5.8	27.4	감자	6.23	0.47	5.7	26.9	딸기	6.25	1.29	6.2	28.3
4	딸기	4.88	0.91	4.6	32.1	과일음료	5.10	0.64	4.6	31.5	감자	5.99	0.63	5.9	34.2
5	시금치	4.20	0.23	4.0	36.0	고추	5.02	0.44	4.6	36.1	고구마	3.77	0.46	3.7	37.9
6	고추	4.10	0.34	3.9	39.9	시금치	4.97	0.32	4.5	40.6	시금치	3.43	0.26	3.4	41.3
7	과일음료	3.89	0.41	3.7	43.6	파	3.80	0.17	3.4	44.0	고추	3.18	0.29	3.1	44.5
8	무	3.27	0.17	3.1	46.7	무	3.69	0.20	3.3	47.4	무	2.84	0.25	2.8	47.3
9	파	3.14	0.11	3.0	49.6	딸기	3.52	0.78	3.2	50.6	오렌지	2.76	0.38	2.7	50.0
10	오렌지	2.88	0.39	2.7	52.4	오렌지	2.99	0.58	2.7	53.3	과일음료	2.68	0.34	2.7	52.7
11	수박	2.67	0.42	2.5	54.9	수박	2.75	0.47	2.5	55.8	수박	2.59	0.42	2.6	55.2
12	고구마	2.65	0.30	2.5	57.4	양배추	2.69	0.20	2.4	58.2	파	2.47	0.12	2.5	57.7
13	양배추	2.29	0.13	2.2	59.6	양파	2.45	0.08	2.2	60.4	감	2.46	0.38	2.4	60.1
14	양파	2.08	0.06	2.0	61.5	김치,깍두기	2.42	0.17	2.2	62.6	참외	2.05	0.38	2.0	62.1
15	감	2.01	0.29	1.9	63.4	김치,열무김치	2.21	0.28	2.0	64.6	양배추	1.90	0.14	1.9	64.0
16	김치,열무김치	1.96	0.21	1.9	65.3	김	1.78	0.11	1.6	66.2	토마토	1.83	0.20	1.8	65.8
17	김치,깍두기	1.88	0.11	1.8	67.1	마늘	1.65	0.05	1.5	67.7	김치,열무김치	1.72	0.19	1.7	67.5
18	토마토	1.73	0.19	1.6	68.7	토마토	1.64	0.23	1.5	69.2	양파	1.71	0.06	1.7	69.2
19	참외	1.70	0.29	1.6	70.3	감	1.57	0.25	1.4	70.6	사과	1.52	0.11	1.5	70.7
20	김	1.58	0.07	1.5	71.8	배추	1.55	0.13	1.4	72.0	배추	1.46	0.14	1.4	72.2
21	배추	1.51	0.12	1.4	73.3	고구마	1.54	0.25	1.4	73.4	김	1.38	0.06	1.4	73.5
22	사과	1.38	0.10	1.3	74.6	참외	1.36	0.28	1.2	74.7	김치,깍두기	1.33	0.10	1.3	74.8
23	마늘	1.31	0.03	1.2	75.8	돼지고기가공품,햄	1.32	0.18	1.2	75.9	돼지고기가공품,햄	1.06	0.14	1.1	75.9
24	돼지고기가공품,햄	1.19	0.12	1.1	76.9	사과	1.23	0.11	1.1	77.0	김치,총각김치	1.05	0.12	1.0	76.9
25	김치,총각김치	1.03	0.11	1.0	77.9	시리얼	1.19	0.20	1.1	78.1	오이	1.01	0.10	1.0	77.9
26	시리얼	1.00	0.12	1.0	78.8	부추	1.11	0.14	1.0	79.1	마늘	0.96	0.04	1.0	78.9
27	오이	0.99	0.09	0.9	79.8	김치,총각김치	1.01	0.14	0.9	80.0	키위	0.87	0.19	0.9	79.7
28	부추	0.94	0.09	0.9	80.7	오이	0.97	0.09	0.9	80.8	우유	0.86	0.03	0.9	80.6
29	우유	0.91	0.03	0.9	81.5	우유	0.95	0.05	0.9	81.7	시리얼	0.81	0.16	0.8	81.4
30	키위	0.86	0.18	0.8	82.3	애호박	0.86	0.07	0.8	82.5	배	0.80	0.11	0.8	82.2

표 2-II-29. 영양소별 영양섭취기준[1]에 대한 섭취비율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	91.9 (0.9)	90.2 (0.8)	96.5 (0.7)	88.5 (1.0)	90.5 (0.6)	91.1 (0.6)	99.1 (0.7)
단백질	115.6 (1.5)	123.8 (1.3)	166.9 (1.6)	144.2 (2.1)	146.0 (1.3)	146.7 (1.2)	160.0 (1.4)
칼슘	71.4 (1.1)	70.3 (0.9)	75.8 (1.0)	64.0 (1.2)	66.7 (0.8)	67.1 (0.7)	73.9 (0.8)
인	149.5 (1.6)	159.9 (1.4)	172.1 (1.5)	151.0 (1.9)	156.3 (1.3)	157.2 (1.2)	168.6 (1.4)
나트륨	- -[2]	- -	374.4 (3.9)	317.1 (4.5)	330.1 (3.4)	331.4 (3.2)	345.8 (3.9)
칼륨	- -	- -	60.7 (0.5)	59.0 (0.9)	61.9 (0.6)	61.9 (0.5)	88.2 (0.9)
철	90.7 (1.2)	94.7 (1.3)	127.6 (1.6)	121.7 (2.3)	124.0 (1.7)	125.4 (1.7)	142.6 (2.2)
비타민 A	92.9 (1.8)	94.5 (1.7)	121.6 (1.9)	112.3 (2.9)	119.0 (2.6)	118.1 (2.3)	123.4 (3.0)
티아민	125.3 (1.5)	118.2 (1.6)	122.9 (1.2)	114.8 (2.0)	114.7 (1.2)	115.9 (1.1)	125.9 (1.2)
리보플라빈	85.8 (1.2)	90.6 (1.0)	96.8 (1.0)	84.0 (1.4)	91.0 (1.0)	93.2 (0.9)	101.0 (0.9)
나이아신	108.6 (1.4)	117.2 (1.3)	120.6 (1.2)	103.1 (1.5)	106.0 (1.1)	107.8 (0.9)	118.3 (1.1)
비타민 C	233.0 (4.5)	197.0 (3.5)	107.7 (1.8)	99.8 (3.2)	107.5 (2.1)	107.4 (2.0)	113.2 (2.2)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	94.0 (1.0)	91.7 (0.9)	98.5 (0.9)	93.2 (1.3)	94.9 (0.9)	96.0 (0.8)	104.8 (0.9)
단백질	120.2 (1.6)	128.7 (1.5)	176.3 (2.0)	159.1 (2.8)	158.9 (1.8)	161.4 (1.8)	178.1 (1.9)
칼슘	77.2 (1.5)	75.5 (1.1)	82.6 (1.2)	73.3 (1.7)	75.0 (1.1)	76.4 (0.9)	78.8 (1.0)
인	165.7 (1.9)	176.7 (1.8)	188.2 (1.9)	172.0 (2.7)	175.6 (1.8)	177.9 (1.7)	191.1 (1.9)
나트륨	- -	- -	414.6 (5.1)	366.6 (6.0)	381.8 (5.0)	387.0 (4.6)	402.5 (5.2)
칼륨	- -	- -	66.3 (0.7)	66.2 (1.1)	68.5 (0.8)	68.9 (0.7)	98.1 (1.1)
철	109.6 (1.6)	109.9 (1.6)	148.4 (2.1)	148.1 (3.3)	146.4 (2.7)	147.9 (2.0)	166.3 (2.9)
비타민 A	102.6 (2.2)	104.3 (2.5)	123.7 (2.4)	118.2 (4.3)	126.5 (3.9)	122.1 (2.6)	131.1 (3.9)
티아민	127.8 (1.7)	119.9 (1.7)	132.3 (1.6)	127.2 (2.8)	126.6 (1.7)	128.8 (1.5)	141.6 (1.7)
리보플라빈	88.4 (1.3)	94.1 (1.3)	97.6 (1.2)	87.0 (1.6)	94.4 (1.3)	96.4 (1.2)	105.0 (1.3)
나이아신	110.8 (1.5)	119.3 (1.4)	128.1 (1.5)	114.2 (2.1)	116.1 (1.5)	119.7 (1.4)	131.6 (1.5)
비타민 C	231.5 (4.9)	191.5 (3.8)	112.1 (2.2)	102.7 (3.2)	111.2 (2.4)	112.9 (2.4)	119.0 (2.5)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	89.8 (0.9)	88.9 (0.8)	94.6 (0.7)	83.9 (1.1)	86.0 (0.6)	86.3 (0.7)	93.4 (0.8)
단백질	111.2 (1.7)	119.3 (1.4)	157.5 (1.6)	129.2 (2.1)	133.0 (1.3)	132.0 (1.3)	141.8 (1.7)
칼슘	65.8 (1.0)	65.7 (1.0)	69.0 (1.0)	54.7 (1.1)	58.3 (0.8)	57.7 (0.8)	68.9 (1.0)
인	134.2 (1.5)	144.8 (1.4)	155.7 (1.4)	129.9 (1.8)	136.9 (1.2)	136.4 (1.2)	146.1 (1.5)
나트륨	- -	- -	333.9 (3.8)	267.1 (5.4)	278.0 (3.4)	275.3 (3.3)	288.8 (4.2)
칼륨	- -	- -	54.9 (0.5)	51.8 (0.9)	55.4 (0.7)	55.0 (0.7)	78.1 (1.1)
철	72.7 (1.1)	81.0 (1.4)	106.6 (1.5)	95.2 (2.3)	101.5 (1.7)	102.6 (2.0)	118.7 (2.2)
비타민 A	83.6 (1.9)	85.7 (1.6)	119.6 (2.1)	106.4 (3.4)	111.4 (2.3)	114.1 (3.5)	115.8 (3.0)
티아민	122.9 (1.8)	116.7 (1.7)	113.3 (1.3)	102.2 (2.0)	102.7 (1.3)	102.8 (1.2)	110.1 (1.4)
리보플라빈	83.3 (1.3)	87.5 (1.1)	96.1 (1.1)	81.0 (1.5)	87.6 (1.1)	89.8 (1.1)	97.1 (1.2)
나이아신	106.6 (1.5)	115.4 (1.5)	113.0 (1.2)	91.9 (1.5)	95.8 (1.1)	95.8 (0.9)	104.9 (1.2)
비타민 C	234.4 (5.1)	202.0 (4.0)	103.2 (2.0)	96.9 (4.2)	103.8 (2.6)	101.8 (2.4)	107.5 (3.1)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량); 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량(또는 영양권장량)

2) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 나트륨과 칼륨에 대한 영양권장량 미비

표 2-II-30. 영양소별 영양섭취기준[1]에 대한 섭취비율 추이(표준화)[2] : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	91.4 (0.8)	90.1 (0.8)	96.5 (0.7)	88.5 (0.9)	90.5 (0.6)	91.1 (0.6)	99.2 (0.7)
단백질	114.8 (1.5)	122.6 (1.2)	166.9 (1.5)	145.3 (1.9)	147.6 (1.3)	148.9 (1.2)	162.9 (1.4)
칼슘	71.1 (1.1)	70.2 (0.9)	75.9 (0.9)	64.2 (1.1)	67.0 (0.8)	67.4 (0.7)	74.0 (0.8)
인	149.8 (1.5)	161.0 (1.4)	172.2 (1.4)	151.3 (1.8)	156.5 (1.3)	157.4 (1.1)	168.9 (1.3)
나트륨	- -[3]	- -	374.7 (3.9)	315.7 (4.5)	327.5 (3.3)	328.0 (3.0)	341.9 (3.7)
칼륨	- -	- -	60.7 (0.5)	59.0 (0.9)	61.9 (0.6)	61.9 (0.5)	88.1 (0.9)
철	91.7 (1.3)	95.1 (1.3)	127.7 (1.6)	121.2 (2.3)	122.8 (1.7)	123.7 (1.6)	139.4 (2.0)
비타민 A	92.0 (1.8)	94.6 (1.7)	121.7 (1.9)	112.5 (2.8)	119.7 (2.7)	118.7 (2.3)	123.7 (2.9)
티아민	123.7 (1.3)	117.9 (1.5)	122.8 (1.2)	115.6 (2.0)	115.9 (1.2)	117.5 (1.0)	128.1 (1.2)
리보플라빈	84.3 (1.1)	89.9 (1.0)	96.8 (0.9)	84.7 (1.3)	92.3 (0.9)	94.9 (0.8)	103.3 (0.9)
나이아신	108.9 (1.3)	118.0 (1.3)	120.6 (1.1)	103.5 (1.4)	106.6 (1.0)	108.6 (0.9)	119.6 (1.1)
비타민 C	232.8 (4.4)	197.4 (3.5)	107.7 (1.8)	100.2 (3.2)	108.2 (2.1)	108.5 (2.1)	114.7 (2.3)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	93.1 (1.0)	91.3 (0.9)	98.3 (0.9)	93.0 (1.2)	94.9 (0.9)	95.9 (0.8)	104.7 (0.9)
단백질	118.1 (1.5)	126.1 (1.4)	175.2 (1.9)	158.9 (2.6)	159.5 (1.8)	162.5 (1.7)	179.7 (1.9)
칼슘	76.7 (1.4)	75.6 (1.1)	82.7 (1.2)	73.3 (1.6)	75.0 (1.1)	76.4 (0.9)	78.6 (1.0)
인	166.0 (1.9)	179.0 (1.9)	188.6 (1.9)	172.0 (2.4)	175.5 (1.8)	177.6 (1.6)	190.8 (1.8)
나트륨	- -	- -	417.0 (5.0)	366.1 (5.8)	379.4 (4.9)	383.4 (4.5)	398.4 (4.9)
칼륨	- -	- -	66.3 (0.7)	66.0 (1.0)	68.2 (0.8)	68.7 (0.7)	97.7 (1.0)
철	111.4 (1.6)	112.0 (1.7)	149.0 (2.1)	148.2 (3.4)	145.9 (2.6)	147.1 (1.9)	164.8 (2.7)
비타민 A	101.2 (2.1)	104.4 (2.6)	123.3 (2.4)	117.8 (4.0)	126.8 (4.1)	122.1 (2.5)	131.3 (3.8)
티아민	125.3 (1.5)	118.5 (1.6)	131.2 (1.5)	127.2 (2.7)	127.0 (1.7)	129.5 (1.5)	142.8 (1.8)
리보플라빈	85.9 (1.2)	92.4 (1.3)	96.7 (1.2)	86.9 (1.5)	94.8 (1.2)	97.4 (1.1)	106.4 (1.3)
나이아신	110.8 (1.5)	120.3 (1.5)	127.4 (1.5)	114.1 (2.1)	116.2 (1.5)	119.8 (1.3)	132.1 (1.4)
비타민 C	230.6 (4.7)	190.7 (3.7)	111.6 (2.2)	102.8 (3.2)	111.5 (2.4)	113.5 (2.5)	119.9 (2.5)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	89.7 (0.9)	89.0 (0.8)	94.7 (0.7)	84.0 (1.1)	86.0 (0.6)	86.2 (0.7)	93.6 (0.8)
단백질	111.4 (1.7)	119.4 (1.3)	158.7 (1.5)	131.5 (2.0)	135.6 (1.3)	135.0 (1.2)	145.9 (1.6)
칼슘	65.9 (1.0)	65.7 (1.0)	69.3 (1.0)	55.3 (1.1)	58.9 (0.8)	58.5 (0.8)	69.6 (1.0)
인	134.6 (1.5)	145.4 (1.4)	156.2 (1.4)	130.5 (1.8)	137.4 (1.2)	137.0 (1.2)	147.0 (1.5)
나트륨	- -	- -	332.8 (3.8)	265.7 (5.3)	275.6 (3.3)	272.3 (3.2)	285.5 (4.2)
칼륨	- -	- -	55.2 (0.5)	52.0 (0.9)	55.5 (0.7)	55.0 (0.7)	78.5 (1.1)
철	73.0 (1.1)	80.5 (1.3)	105.7 (1.5)	93.6 (2.1)	98.9 (1.5)	99.1 (1.8)	113.2 (1.8)
비타민 A	83.5 (1.9)	86.2 (1.6)	120.0 (2.1)	107.0 (3.3)	112.2 (2.3)	114.8 (3.5)	116.1 (2.9)
티아민	122.5 (1.6)	117.5 (1.7)	114.5 (1.3)	104.0 (1.9)	104.6 (1.2)	105.2 (1.2)	113.1 (1.3)
리보플라빈	82.8 (1.2)	87.9 (1.0)	97.0 (1.0)	82.6 (1.4)	89.7 (1.1)	92.4 (1.1)	100.4 (1.2)
나이아신	107.2 (1.5)	116.4 (1.5)	113.8 (1.2)	93.0 (1.5)	97.0 (1.1)	97.2 (0.9)	106.9 (1.2)
비타민 C	235.7 (5.1)	203.3 (3.9)	104.1 (1.9)	97.9 (4.1)	105.2 (2.6)	103.4 (2.5)	109.6 (3.3)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량); 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량(또는 영양권장량)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 나트륨과 칼륨에 대한 영양권장량 미비

표 2-II-31. 영양소별 영양섭취기준[1]에 대한 섭취비율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	8,019	99.1 (0.7)	160.0 (1.4)	73.9 (0.8)	168.6 (1.4)	345.8 (3.9)	88.2 (0.9)
19세이상	5,944	98.4 (0.7)	150.7 (1.5)	75.6 (0.9)	176.6 (1.5)	366.3 (4.4)	90.6 (1.0)
연령(세)							
1-9	1,104	103.9 (1.5)	231.4 (3.4)	76.9 (1.9)	150.2 (2.3)	230.4 (4.3)	80.8 (1.4)
10-18	971	100.2 (1.9)	168.1 (3.8)	60.4 (1.7)	130.9 (2.6)	297.8 (7.5)	77.8 (1.9)
19-29	692	92.3 (1.9)	154.5 (4.1)	70.9 (2.0)	174.9 (4.0)	329.1 (9.5)	84.1 (1.8)
30-39	1,148	102.6 (1.5)	166.5 (3.8)	78.8 (1.6)	193.3 (3.6)	388.0 (8.7)	97.5 (1.8)
40-49	1,103	99.1 (1.3)	156.3 (2.5)	82.7 (2.1)	186.3 (2.7)	374.7 (8.5)	96.9 (1.7)
50-59	1,107	103.8 (1.6)	154.0 (3.0)	80.2 (1.9)	178.6 (3.1)	389.0 (9.7)	96.9 (2.2)
60-69	999	98.5 (1.3)	133.6 (3.0)	71.9 (1.7)	162.4 (3.0)	357.8 (9.0)	87.9 (2.0)
70+	895	90.3 (1.7)	107.0 (2.7)	57.0 (2.0)	131.6 (2.8)	341.9 (9.9)	64.9 (1.9)
1-2	243	111.4 (3.1)	253.9 (8.1)	99.6 (4.7)	149.7 (5.0)	200.1 (7.6)	94.5 (3.6)
3-5	351	95.3 (2.3)	230.0 (6.0)	77.8 (2.9)	166.2 (4.1)	226.6 (8.0)	77.5 (2.0)
6-11	779	107.0 (1.6)	211.9 (4.1)	67.5 (1.8)	133.0 (2.3)	262.1 (6.1)	77.3 (1.6)
12-18	702	98.1 (2.3)	161.6 (4.3)	57.9 (1.9)	133.3 (3.0)	300.2 (9.0)	77.7 (2.2)
19-29	692	92.3 (1.9)	154.5 (4.1)	70.9 (2.0)	174.9 (4.0)	329.1 (9.5)	84.1 (1.8)
30-49	2,251	100.8 (1.0)	161.3 (2.2)	80.8 (1.2)	189.8 (2.2)	381.2 (6.1)	97.2 (1.3)
50-64	1,613	101.8 (1.3)	150.6 (2.5)	79.0 (1.5)	176.2 (2.6)	377.4 (8.2)	95.5 (1.9)
65+	1,388	94.3 (1.5)	113.3 (2.3)	60.7 (1.8)	139.2 (2.4)	353.6 (8.3)	71.2 (1.6)
거주지역							
동	6,343	99.2 (0.8)	163.0 (1.6)	74.5 (0.9)	170.3 (1.6)	341.8 (4.0)	89.2 (1.0)
읍면	1,676	99.0 (1.5)	149.0 (2.8)	71.7 (1.9)	162.6 (3.0)	360.7 (10.3)	84.3 (2.0)
소득수준[2]							
하	1,952	95.7 (1.1)	152.0 (2.4)	67.7 (1.3)	159.3 (2.2)	331.8 (6.3)	82.5 (1.3)
중하	1,987	98.2 (1.3)	156.0 (2.6)	72.8 (1.7)	165.0 (2.6)	345.2 (7.0)	85.8 (1.4)
중상	2,000	100.8 (1.3)	163.5 (2.7)	76.9 (1.6)	173.1 (2.5)	346.9 (5.7)	91.5 (1.6)
상	1,979	102.9 (1.2)	170.6 (2.6)	79.4 (1.4)	179.9 (2.7)	364.8 (7.9)	94.7 (1.5)
거주지역(표준화)[3]							
동	6,343	99.2 (0.8)	164.5 (1.6)	74.4 (0.8)	169.7 (1.5)	338.8 (3.9)	88.9 (1.0)
읍면	1,676	98.8 (1.6)	156.0 (2.9)	72.4 (1.9)	165.7 (3.1)	350.1 (8.3)	85.1 (1.9)
소득수준(표준화)							
하	1,952	95.7 (1.1)	153.6 (2.4)	67.8 (1.2)	159.8 (2.1)	329.5 (6.1)	82.7 (1.3)
중하	1,987	98.1 (1.4)	158.4 (2.7)	73.1 (1.7)	165.4 (2.5)	342.1 (6.7)	85.8 (1.3)
중상	2,000	100.8 (1.3)	167.4 (2.6)	77.1 (1.6)	173.0 (2.4)	341.3 (5.6)	91.3 (1.6)
상	1,979	103.2 (1.2)	174.8 (2.5)	79.4 (1.3)	180.2 (2.5)	360.2 (7.9)	94.6 (1.5)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	142.6 (2.2)	123.4 (3.0)	125.9 (1.2)	101.0 (0.9)	118.3 (1.1)	113.2 (2.2)
19세이상	153.5 (2.5)	125.5 (3.5)	119.5 (1.3)	94.8 (1.0)	117.2 (1.2)	110.2 (2.1)
연령(세)						
1-9	114.1 (2.4)	141.9 (5.6)	161.3 (4.0)	147.8 (2.8)	131.8 (2.5)	166.1 (8.8)
10-18	93.0 (2.6)	96.8 (3.0)	141.6 (3.7)	107.2 (2.3)	115.4 (2.9)	94.3 (6.0)
19-29	124.9 (4.7)	112.9 (5.1)	130.1 (3.2)	104.3 (2.6)	122.7 (3.3)	102.7 (4.1)
30-39	136.9 (3.5)	133.3 (6.8)	131.8 (2.9)	105.2 (1.9)	129.1 (2.9)	117.8 (3.4)
40-49	150.2 (4.7)	132.9 (6.2)	124.8 (2.5)	100.3 (1.9)	124.9 (2.2)	117.1 (3.6)
50-59	194.7 (5.4)	147.4 (7.9)	116.4 (2.6)	94.9 (2.2)	117.5 (2.8)	122.9 (4.1)
60-69	179.7 (6.4)	119.9 (6.7)	103.0 (2.0)	78.2 (1.7)	100.0 (2.1)	109.1 (3.6)
70+	152.0 (6.9)	82.0 (4.4)	80.4 (2.2)	57.1 (1.7)	79.4 (2.2)	69.9 (3.2)
1-2	114.8 (4.5)	160.7 (12.1)	153.0 (6.8)	166.1 (6.4)	126.3 (3.9)	205.1 (16.8)
3-5	110.7 (4.0)	146.4 (7.2)	180.3 (8.1)	148.4 (4.3)	131.9 (4.2)	191.3 (13.0)
6-11	116.9 (3.3)	123.8 (5.6)	150.2 (3.4)	137.1 (2.7)	132.3 (2.4)	127.1 (7.0)
12-18	86.7 (2.7)	92.9 (3.4)	140.6 (4.5)	100.6 (2.5)	112.1 (3.4)	88.2 (7.2)
19-29	124.9 (4.7)	112.9 (5.1)	130.1 (3.2)	104.3 (2.6)	122.7 (3.3)	102.7 (4.1)
30-49	143.6 (3.1)	133.1 (4.7)	128.3 (1.7)	102.7 (1.3)	127.0 (1.8)	117.4 (2.6)
50-64	191.7 (4.8)	142.4 (6.5)	114.0 (2.2)	91.8 (1.8)	114.2 (2.2)	120.8 (3.2)
65+	160.1 (6.2)	91.9 (5.1)	86.5 (1.7)	62.5 (1.5)	84.8 (1.8)	80.9 (2.9)
거주지역						
동	141.0 (2.1)	123.6 (3.0)	127.5 (1.3)	103.4 (1.0)	120.9 (1.2)	114.8 (2.4)
읍면	148.2 (6.2)	122.9 (8.1)	120.0 (2.6)	92.3 (2.3)	108.8 (2.3)	107.6 (5.4)
소득수준						
하	126.5 (2.8)	110.6 (3.9)	121.6 (2.2)	96.3 (1.9)	111.3 (1.7)	105.5 (3.9)
중하	138.1 (3.8)	117.2 (3.7)	121.4 (2.3)	98.5 (1.9)	115.2 (2.2)	109.8 (3.5)
중상	150.4 (3.8)	130.6 (5.6)	127.9 (2.6)	103.2 (1.8)	122.4 (2.1)	118.1 (3.5)
상	159.4 (4.1)	139.2 (7.0)	134.3 (2.3)	107.8 (1.7)	126.0 (2.1)	122.9 (3.7)
거주지역(표준화)						
동	139.7 (2.0)	123.6 (3.0)	128.3 (1.3)	104.3 (1.0)	121.1 (1.2)	115.6 (2.4)
읍면	137.7 (4.8)	123.0 (6.5)	128.2 (2.8)	100.2 (2.6)	113.5 (2.4)	111.8 (6.2)
소득수준(표준화)						
하	125.0 (2.6)	111.2 (4.0)	123.1 (2.1)	97.8 (1.9)	112.2 (1.7)	106.8 (4.0)
중하	135.8 (3.5)	117.8 (3.6)	123.2 (2.3)	100.5 (1.9)	116.2 (2.2)	111.2 (3.6)
중상	146.4 (3.5)	130.8 (5.8)	130.4 (2.5)	106.1 (1.7)	124.2 (2.0)	119.6 (3.7)
상	154.2 (3.7)	138.5 (6.5)	137.6 (2.4)	110.8 (1.7)	127.7 (2.1)	124.7 (4.0)

표 2-II-32. 영양소별 영양섭취기준[1]에 대한 섭취비율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	3,550	104.8 (0.9)	178.1 (1.9)	78.8 (1.0)	191.1 (1.9)	402.5 (5.2)	98.1 (1.1)
19세이상	2,475	105.2 (1.0)	170.4 (2.1)	81.2 (1.1)	205.1 (2.1)	433.3 (5.9)	102.3 (1.1)
연령(세)							
1-9	552	108.5 (2.0)	243.2 (5.3)	79.8 (2.7)	152.7 (2.8)	241.0 (7.0)	83.3 (1.8)
10-18	523	100.1 (2.3)	177.8 (5.1)	64.0 (2.3)	136.0 (3.6)	334.7 (10.7)	84.3 (2.8)
19-29	270	98.3 (2.9)	176.5 (6.7)	72.7 (3.0)	200.3 (5.8)	384.7 (13.9)	93.1 (2.9)
30-39	445	112.0 (2.4)	187.9 (5.9)	83.5 (2.4)	225.1 (5.4)	460.2 (12.7)	111.1 (2.4)
40-49	478	105.2 (1.9)	169.5 (3.9)	85.4 (2.8)	214.1 (4.1)	438.9 (12.5)	107.9 (2.3)
50-59	442	110.0 (2.0)	171.1 (3.6)	88.1 (2.6)	202.1 (3.9)	451.2 (12.5)	105.3 (2.5)
60-69	451	103.5 (1.8)	152.9 (4.2)	81.7 (2.7)	189.7 (4.2)	427.7 (13.9)	100.3 (2.7)
70+	389	94.4 (2.5)	125.5 (4.6)	67.3 (3.1)	158.5 (4.9)	433.2 (17.6)	78.3 (3.0)
1-2	115	116.2 (4.2)	260.4 (10.6)	103.5 (7.4)	153.8 (6.3)	205.5 (10.5)	97.5 (4.6)
3-5	172	101.7 (2.9)	238.6 (7.3)	79.1 (3.4)	173.2 (5.3)	239.9 (11.1)	79.7 (2.7)
6-11	407	108.5 (2.1)	226.5 (5.9)	71.6 (2.7)	132.5 (3.0)	276.2 (8.3)	79.9 (2.4)
12-18	381	98.5 (2.7)	171.7 (5.7)	61.3 (2.7)	139.5 (4.1)	340.5 (12.1)	84.9 (3.1)
19-29	270	98.3 (2.9)	176.5 (6.7)	72.7 (3.0)	200.3 (5.8)	384.7 (13.9)	93.1 (2.9)
30-49	923	108.6 (1.5)	178.6 (3.5)	84.5 (1.7)	219.6 (3.2)	449.5 (9.3)	109.5 (1.7)
50-64	673	107.9 (1.6)	168.4 (3.2)	87.3 (2.1)	200.8 (3.2)	441.7 (10.3)	105.1 (2.1)
65+	609	98.8 (2.1)	132.5 (3.4)	71.2 (2.6)	166.7 (3.7)	439.0 (14.0)	84.6 (2.2)
거주지역							
동	2,810	104.1 (1.0)	180.1 (2.3)	78.7 (1.1)	191.6 (2.2)	395.6 (5.8)	98.5 (1.2)
읍면	740	107.4 (1.7)	170.8 (3.3)	79.3 (2.3)	189.1 (3.5)	428.2 (10.5)	96.6 (2.1)
소득수준[2]							
하	874	101.5 (1.8)	169.0 (3.4)	71.3 (1.9)	179.2 (3.3)	386.2 (9.4)	91.8 (1.8)
중하	876	103.7 (2.0)	174.0 (3.9)	77.6 (2.3)	186.9 (3.8)	399.1 (9.5)	94.9 (1.9)
중상	877	105.9 (1.8)	180.1 (3.7)	82.3 (2.1)	195.1 (3.4)	394.7 (8.8)	101.0 (2.1)
상	883	108.6 (1.6)	189.9 (4.0)	85.3 (2.1)	205.4 (4.0)	434.4 (13.1)	106.2 (1.9)
거주지역(표준화)[3]							
동	2,810	104.0 (1.0)	180.4 (2.2)	78.6 (1.1)	191.2 (2.0)	393.5 (5.4)	98.2 (1.2)
읍면	740	107.5 (1.9)	176.6 (3.6)	77.8 (2.2)	189.8 (3.3)	409.6 (8.5)	96.0 (2.1)
소득수준(표준화)							
하	874	101.4 (1.8)	169.8 (3.5)	70.9 (1.8)	179.9 (3.3)	385.0 (9.2)	91.6 (1.8)
중하	876	103.6 (2.0)	176.2 (3.9)	77.6 (2.2)	186.7 (3.4)	396.5 (8.9)	94.6 (1.8)
중상	877	105.5 (1.7)	181.5 (3.7)	82.0 (2.1)	193.6 (3.2)	388.5 (8.6)	100.2 (2.0)
상	883	108.6 (1.5)	192.0 (3.7)	84.7 (1.9)	204.3 (3.3)	427.9 (12.6)	105.5 (1.8)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	166.3 (2.9)	131.1 (3.9)	141.6 (1.7)	105.0 (1.3)	131.6 (1.5)	119.0 (2.5)
19세이상	183.1 (3.4)	135.1 (4.7)	136.8 (1.8)	100.0 (1.5)	132.5 (1.7)	115.7 (2.2)
연령(세)						
1-9	116.8 (3.4)	148.0 (7.7)	168.1 (5.6)	147.8 (4.0)	138.3 (3.6)	175.7 (11.4)
10-18	102.6 (3.5)	96.1 (4.0)	151.8 (5.3)	104.7 (3.0)	121.6 (3.8)	98.7 (9.7)
19-29	162.3 (8.5)	125.5 (9.1)	150.2 (5.4)	110.3 (4.6)	136.9 (5.1)	102.8 (5.0)
30-39	178.8 (5.1)	154.3 (12.3)	152.8 (4.5)	112.6 (3.1)	147.5 (4.3)	125.8 (4.9)
40-49	196.7 (8.0)	132.7 (8.6)	140.4 (3.7)	102.2 (2.9)	138.9 (3.4)	121.4 (4.4)
50-59	196.4 (6.0)	147.8 (9.9)	126.3 (3.2)	94.5 (2.6)	128.4 (3.6)	123.1 (4.7)
60-69	195.4 (7.9)	124.5 (7.4)	116.3 (2.9)	82.6 (2.3)	112.3 (3.1)	117.4 (5.1)
70+	162.5 (7.9)	93.6 (7.7)	92.7 (3.5)	63.2 (2.8)	92.2 (3.8)	83.0 (4.5)
1-2	114.0 (6.1)	149.2 (15.6)	160.3 (9.0)	175.9 (9.8)	128.9 (5.2)	216.8 (24.9)
3-5	113.1 (5.8)	158.5 (10.3)	189.6 (12.7)	154.7 (6.1)	138.4 (5.6)	207.9 (21.2)
6-11	121.2 (5.2)	129.9 (9.0)	156.4 (4.2)	129.5 (3.8)	139.5 (3.6)	132.7 (8.5)
12-18	98.1 (3.5)	93.0 (4.7)	151.5 (6.3)	99.6 (3.4)	118.8 (4.4)	92.5 (11.6)
19-29	162.3 (8.5)	125.5 (9.1)	150.2 (5.4)	110.3 (4.6)	136.9 (5.1)	102.8 (5.0)
30-49	187.8 (4.8)	143.4 (7.6)	146.5 (2.7)	107.4 (2.1)	143.2 (2.7)	123.6 (3.4)
50-64	196.7 (5.3)	145.9 (7.8)	124.9 (2.6)	92.9 (2.2)	125.7 (2.9)	123.3 (4.0)
65+	173.7 (7.7)	97.7 (5.8)	99.4 (2.8)	67.9 (2.2)	97.3 (2.9)	92.5 (3.7)
거주지역						
동	164.9 (3.0)	130.4 (4.1)	142.2 (1.9)	106.5 (1.5)	133.5 (1.7)	119.7 (2.7)
읍면	171.5 (7.2)	133.5 (10.0)	139.5 (3.6)	99.4 (3.0)	124.6 (3.0)	116.3 (5.9)
소득수준						
하	143.9 (3.7)	116.7 (5.7)	136.3 (3.1)	99.5 (2.9)	123.2 (2.6)	111.3 (5.4)
중하	161.5 (5.6)	122.1 (5.2)	134.6 (3.4)	101.8 (2.6)	127.8 (3.2)	114.1 (3.9)
중상	175.5 (5.1)	138.7 (8.7)	144.5 (4.0)	107.3 (2.2)	134.9 (2.9)	123.5 (4.4)
상	188.8 (5.3)	150.3 (10.0)	151.9 (3.3)	112.5 (2.6)	141.1 (3.2)	129.6 (4.5)
거주지역(표준화)						
동	164.8 (2.9)	130.4 (3.9)	142.0 (1.9)	106.7 (1.4)	133.2 (1.6)	120.4 (2.7)
읍면	163.6 (6.4)	132.7 (8.1)	147.4 (4.3)	106.5 (3.2)	128.2 (2.9)	118.0 (6.8)
소득수준(표준화)						
하	143.7 (3.5)	117.3 (5.7)	137.1 (3.3)	100.5 (2.9)	123.9 (2.8)	111.5 (5.1)
중하	160.3 (5.5)	122.5 (5.2)	135.9 (3.4)	103.5 (2.6)	128.5 (3.1)	115.8 (4.0)
중상	173.4 (5.0)	138.8 (9.0)	144.9 (3.9)	108.4 (2.1)	135.1 (2.7)	124.0 (4.4)
상	185.6 (5.0)	149.3 (9.3)	153.9 (3.5)	114.3 (2.5)	141.8 (3.1)	130.4 (4.6)

표 2-II-33. 영양소별 영양섭취기준[1]에 대한 섭취비율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	4,469	93.4 (0.8)	141.8 (1.7)	68.9 (1.0)	146.1 (1.5)	288.8 (4.2)	78.1 (1.1)
19세이상	3,469	91.9 (0.8)	131.6 (1.7)	70.2 (1.2)	148.9 (1.7)	301.2 (4.9)	79.3 (1.2)
연령(세)							
1-9	552	99.0 (1.8)	218.5 (4.9)	73.8 (2.5)	147.4 (3.4)	219.0 (5.9)	78.1 (2.4)
10-18	448	100.3 (2.6)	156.6 (4.7)	56.2 (2.2)	124.8 (3.3)	254.1 (7.6)	70.1 (2.1)
19-29	422	86.0 (1.9)	131.7 (3.9)	69.1 (2.5)	148.5 (4.2)	271.4 (9.7)	74.8 (2.0)
30-39	703	92.6 (1.5)	143.8 (3.2)	73.8 (2.0)	159.5 (3.2)	311.3 (8.8)	83.1 (2.2)
40-49	625	92.8 (1.8)	142.7 (3.1)	80.0 (2.7)	157.8 (3.4)	308.8 (9.7)	85.6 (2.3)
50-59	665	97.6 (2.1)	136.8 (3.9)	72.4 (2.5)	155.1 (3.9)	326.5 (11.7)	88.5 (2.5)
60-69	548	94.1 (1.6)	116.3 (2.6)	63.1 (1.9)	137.9 (2.6)	295.1 (10.5)	76.8 (2.1)
70+	506	87.7 (2.0)	95.5 (2.7)	50.6 (2.4)	115.0 (2.9)	285.3 (10.5)	56.6 (1.9)
1-2	128	106.0 (4.5)	246.7 (12.1)	95.4 (5.6)	145.2 (7.6)	194.1 (12.4)	91.2 (5.2)
3-5	179	88.6 (3.2)	220.9 (8.7)	76.3 (4.2)	158.9 (5.9)	212.7 (9.3)	75.2 (2.9)
6-11	372	105.5 (2.3)	196.3 (5.1)	63.2 (2.3)	133.5 (3.3)	247.3 (9.0)	74.5 (2.1)
12-18	321	97.7 (3.1)	149.1 (5.1)	53.7 (2.5)	125.7 (3.9)	250.2 (8.6)	68.7 (2.6)
19-29	422	86.0 (1.9)	131.7 (3.9)	69.1 (2.5)	148.5 (4.2)	271.4 (9.7)	74.8 (2.0)
30-49	1,328	92.7 (1.2)	143.2 (2.4)	77.0 (1.7)	158.7 (2.5)	310.0 (6.6)	84.3 (1.7)
50-64	940	95.7 (1.7)	132.9 (3.1)	70.8 (2.0)	151.9 (3.1)	313.8 (9.4)	86.1 (2.1)
65+	779	91.2 (1.6)	100.1 (2.3)	53.5 (1.9)	120.4 (2.3)	295.2 (9.4)	62.0 (1.6)
거주지역							
동	3,533	94.2 (0.9)	145.8 (1.9)	70.2 (1.1)	148.7 (1.7)	287.4 (4.2)	79.8 (1.2)
읍면	936	90.6 (1.9)	127.6 (3.0)	64.2 (1.9)	136.4 (2.8)	294.1 (12.2)	72.1 (2.1)
소득수준[2]							
하	1,078	89.7 (1.2)	134.7 (2.8)	64.0 (1.6)	139.1 (2.3)	276.5 (7.4)	73.1 (1.6)
중하	1,111	92.8 (1.6)	138.0 (2.9)	68.1 (1.8)	143.1 (2.8)	291.5 (8.0)	76.8 (1.8)
중상	1,123	95.6 (1.4)	146.8 (3.0)	71.4 (1.8)	151.1 (2.6)	299.0 (6.6)	81.9 (1.9)
상	1,096	97.1 (1.6)	150.9 (3.0)	73.3 (1.6)	153.6 (2.5)	293.2 (6.6)	82.8 (1.7)
거주지역(표준화)[3]							
동	3,533	94.4 (0.9)	148.5 (1.8)	70.3 (1.1)	148.7 (1.6)	284.6 (4.2)	79.7 (1.2)
읍면	936	89.3 (2.1)	134.2 (3.4)	66.8 (2.3)	139.7 (3.5)	288.0 (11.4)	73.6 (2.2)
소득수준(표준화)							
하	1,078	89.8 (1.2)	137.4 (2.7)	64.4 (1.6)	139.8 (2.2)	275.0 (7.1)	73.7 (1.6)
중하	1,111	92.5 (1.6)	140.4 (3.0)	68.7 (1.8)	143.8 (2.8)	288.1 (7.8)	76.9 (1.7)
중상	1,123	96.2 (1.5)	153.2 (2.9)	72.5 (1.9)	152.6 (2.6)	295.0 (6.9)	82.5 (1.9)
상	1,096	97.6 (1.5)	156.6 (2.8)	74.0 (1.6)	155.1 (2.7)	289.8 (6.8)	83.2 (1.8)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	118.7 (2.2)	115.8 (3.0)	110.1 (1.4)	97.1 (1.2)	104.9 (1.2)	107.5 (3.1)
19세이상	124.8 (2.6)	116.3 (3.4)	102.7 (1.5)	89.8 (1.3)	102.4 (1.3)	104.9 (3.0)
연령(세)						
1-9	111.2 (3.5)	135.4 (7.5)	154.0 (4.1)	147.8 (3.7)	124.9 (3.1)	155.7 (11.0)
10-18	81.5 (3.0)	97.5 (4.0)	129.5 (4.4)	110.1 (3.4)	108.0 (3.8)	89.2 (5.3)
19-29	86.1 (2.8)	99.9 (5.4)	109.3 (3.4)	98.1 (3.0)	107.9 (3.4)	102.6 (6.4)
30-39	92.3 (3.0)	111.0 (3.7)	109.5 (3.0)	97.2 (2.0)	109.5 (2.8)	109.4 (4.4)
40-49	102.6 (3.5)	133.0 (7.0)	108.9 (3.1)	98.3 (2.7)	110.5 (2.5)	112.7 (6.2)
50-59	193.0 (7.3)	146.9 (8.7)	106.5 (3.4)	95.2 (3.1)	106.6 (3.0)	122.8 (5.3)
60-69	165.7 (7.3)	115.8 (9.5)	91.1 (2.3)	74.2 (2.0)	89.1 (2.0)	101.6 (4.4)
70+	145.5 (9.5)	74.8 (4.5)	72.8 (2.3)	53.4 (1.9)	71.5 (2.2)	61.8 (3.4)
1-2	115.7 (6.8)	173.2 (18.4)	145.1 (8.3)	155.4 (7.5)	123.5 (6.1)	192.2 (21.3)
3-5	108.1 (5.1)	133.8 (8.9)	170.7 (7.7)	141.9 (5.8)	125.2 (5.4)	174.0 (13.8)
6-11	112.4 (4.1)	117.4 (6.2)	143.6 (5.1)	145.2 (4.4)	124.6 (3.2)	121.2 (10.9)
12-18	72.5 (3.0)	92.7 (4.5)	127.1 (5.0)	101.8 (3.5)	103.7 (4.4)	82.8 (6.6)
19-29	86.1 (2.8)	99.9 (5.4)	109.3 (3.4)	98.1 (3.0)	107.9 (3.4)	102.6 (6.4)
30-49	97.6 (2.5)	122.3 (4.2)	109.2 (2.3)	97.8 (1.8)	110.0 (1.9)	111.0 (4.0)
50-64	186.8 (6.2)	138.9 (7.4)	103.2 (2.6)	90.7 (2.4)	102.7 (2.4)	118.3 (4.2)
65+	150.9 (7.2)	87.9 (5.9)	77.7 (1.7)	58.7 (1.6)	76.1 (1.7)	72.9 (3.2)
거주지역						
동	116.9 (2.3)	116.7 (3.1)	112.7 (1.5)	100.3 (1.3)	108.2 (1.3)	109.8 (3.4)
읍면	125.2 (6.4)	112.4 (7.3)	100.8 (2.7)	85.3 (2.6)	93.2 (2.2)	98.9 (6.6)
소득수준						
하	108.8 (3.5)	104.5 (4.2)	106.7 (2.6)	93.0 (2.3)	99.2 (2.1)	99.6 (5.1)
중하	114.7 (4.2)	112.3 (4.5)	108.3 (2.6)	95.1 (2.4)	102.6 (2.4)	105.6 (4.8)
중상	125.3 (3.8)	122.5 (5.4)	111.2 (2.4)	99.2 (2.2)	109.8 (2.4)	112.8 (4.3)
상	129.1 (4.8)	127.7 (5.7)	116.3 (2.9)	102.9 (2.1)	110.4 (2.2)	115.9 (5.3)
거주지역(표준화)						
동	114.2 (1.9)	116.6 (3.1)	114.4 (1.4)	102.2 (1.2)	109.1 (1.3)	110.9 (3.5)
읍면	108.9 (4.7)	112.7 (6.1)	107.5 (3.0)	93.6 (3.2)	97.7 (2.6)	105.6 (7.8)
소득수준(표준화)						
하	105.8 (3.2)	105.5 (4.3)	109.0 (2.4)	95.4 (2.2)	100.6 (2.1)	101.9 (5.3)
중하	111.0 (3.4)	112.9 (4.4)	110.2 (2.7)	97.4 (2.4)	103.8 (2.5)	106.8 (4.9)
중상	117.8 (3.0)	122.6 (5.5)	115.4 (2.4)	103.9 (2.1)	113.3 (2.5)	115.5 (4.9)
상	120.3 (3.2)	127.3 (5.4)	120.4 (2.8)	107.4 (1.9)	113.0 (2.3)	118.8 (6.1)

표 2-II-34. 영양소별 영양섭취기준[1] 미만 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	35.4 (0.9)	37.2 (0.9)	29.4 (0.8)	37.5 (1.1)	35.1 (0.8)	34.8 (0.7)	26.9 (0.8)
단백질	27.7 (0.9)	22.2 (0.7)	10.7 (0.4)	16.5 (0.8)	15.0 (0.6)	15.8 (0.5)	13.0 (0.5)
지방	- -[2]	- -	30.6 (0.7)	38.5 (1.4)	38.8 (0.9)	38.3 (0.8)	34.9 (1.0)
칼슘	64.5 (1.0)	65.1 (0.8)	63.3 (0.8)	73.8 (1.1)	71.1 (0.8)	70.7 (0.6)	65.9 (0.8)
인	11.0 (0.6)	7.8 (0.5)	8.3 (0.4)	13.5 (0.7)	10.8 (0.4)	11.2 (0.4)	8.9 (0.4)
철	49.3 (0.9)	47.5 (0.8)	31.4 (0.8)	38.4 (1.1)	34.8 (0.8)	34.3 (0.7)	26.7 (0.7)
비타민 A	55.2 (0.9)	52.1 (0.9)	35.2 (0.8)	43.6 (1.1)	39.8 (0.8)	40.8 (0.8)	38.4 (0.9)
티아민	24.7 (0.8)	27.8 (0.8)	33.2 (0.8)	36.2 (1.1)	35.4 (0.8)	35.5 (0.7)	29.9 (0.8)
리보플라빈	49.5 (1.1)	44.0 (1.0)	49.7 (0.8)	58.2 (1.3)	53.7 (0.8)	51.6 (0.8)	45.3 (0.8)
나이아신	33.9 (1.0)	28.9 (0.7)	26.7 (0.7)	35.8 (1.2)	34.0 (0.8)	32.5 (0.7)	27.5 (0.7)
비타민 C	17.8 (0.7)	22.2 (0.7)	46.4 (0.9)	50.1 (1.4)	46.6 (0.9)	46.9 (0.9)	44.1 (0.9)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	33.8 (1.1)	35.1 (1.1)	27.9 (1.0)	31.3 (1.2)	30.8 (1.0)	30.1 (1.0)	22.0 (1.0)
단백질	24.2 (1.0)	19.4 (0.8)	9.1 (0.6)	11.7 (0.9)	10.6 (0.7)	11.3 (0.7)	8.7 (0.6)
지방	- -	- -	27.1 (0.8)	34.4 (1.6)	33.1 (1.1)	33.6 (1.0)	29.6 (1.1)
칼슘	59.6 (1.2)	60.3 (1.0)	58.3 (1.0)	66.8 (1.6)	64.5 (1.2)	63.2 (0.9)	61.1 (1.1)
인	6.8 (0.5)	5.0 (0.4)	6.3 (0.5)	8.5 (0.7)	6.7 (0.5)	7.0 (0.5)	5.5 (0.5)
철	34.0 (1.0)	34.6 (0.9)	21.5 (0.9)	23.9 (1.3)	22.8 (0.8)	21.7 (0.8)	16.1 (0.8)
비타민 A	49.0 (1.1)	44.9 (1.1)	34.2 (0.9)	40.3 (1.5)	37.6 (1.1)	37.1 (0.9)	35.5 (1.1)
티아민	23.9 (1.0)	27.0 (0.9)	27.9 (0.9)	28.1 (1.3)	27.5 (0.9)	27.3 (0.9)	22.3 (1.0)
리보플라빈	47.1 (1.2)	40.9 (1.1)	50.1 (1.0)	56.0 (1.7)	52.4 (1.0)	49.7 (1.1)	43.1 (1.1)
나이아신	31.7 (1.1)	27.3 (0.9)	21.9 (0.9)	26.4 (1.5)	25.6 (0.9)	23.7 (0.9)	19.3 (0.8)
비타민 C	15.9 (0.7)	21.8 (0.8)	42.7 (1.0)	46.6 (1.5)	42.8 (1.2)	43.1 (1.0)	39.8 (1.2)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	36.9 (1.0)	39.1 (1.1)	31.0 (0.9)	43.7 (1.5)	39.4 (0.9)	39.6 (0.8)	31.9 (1.0)
단백질	31.1 (1.0)	24.7 (0.8)	12.2 (0.6)	21.3 (1.2)	19.5 (0.7)	20.3 (0.7)	17.2 (0.8)
지방	- -	- -	34.1 (0.9)	42.5 (1.7)	44.5 (1.0)	43.0 (0.9)	40.4 (1.3)
칼슘	69.2 (1.1)	69.5 (0.9)	68.3 (0.9)	80.8 (1.1)	77.8 (0.8)	78.1 (0.8)	70.6 (0.9)
인	15.1 (0.7)	10.3 (0.7)	10.2 (0.6)	18.6 (1.1)	15.0 (0.6)	15.5 (0.7)	12.4 (0.7)
철	63.8 (1.1)	59.1 (0.9)	41.4 (1.0)	53.1 (1.5)	46.9 (1.1)	46.9 (1.0)	37.4 (1.0)
비타민 A	61.0 (1.1)	58.5 (0.9)	36.2 (1.0)	46.9 (1.4)	41.9 (1.0)	44.5 (0.9)	41.4 (1.1)
티아민	25.4 (0.9)	28.4 (0.9)	38.6 (1.0)	44.4 (1.4)	43.5 (1.0)	43.7 (0.9)	37.6 (1.1)
리보플라빈	51.7 (1.2)	46.8 (1.1)	49.3 (0.9)	60.5 (1.4)	55.0 (1.0)	53.6 (0.9)	47.6 (1.1)
나이아신	35.9 (1.0)	30.4 (0.9)	31.5 (0.9)	45.2 (1.6)	42.4 (1.1)	41.3 (0.9)	35.7 (1.0)
비타민 C	19.5 (0.8)	22.5 (0.8)	50.2 (1.0)	53.6 (2.0)	50.4 (1.0)	50.7 (1.1)	48.3 (1.3)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 권장량)의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량(또는 권장량의 75%)

2) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

표 2-II-35. 영양소별 영양섭취기준[1] 미만 섭취자 분율 추이(표준화[2]) : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	35.8 (0.9)	37.4 (0.9)	29.5 (0.8)	37.6 (1.1)	35.2 (0.8)	34.9 (0.7)	27.0 (0.8)
단백질	28.5 (0.8)	22.7 (0.6)	10.7 (0.4)	16.2 (0.8)	14.6 (0.5)	15.3 (0.5)	12.4 (0.5)
지방	- -[3]	- -	30.6 (0.6)	37.6 (1.2)	37.5 (0.8)	36.6 (0.7)	32.8 (0.8)
칼슘	64.8 (1.0)	65.3 (0.8)	63.3 (0.8)	73.6 (1.0)	70.8 (0.8)	70.2 (0.6)	65.7 (0.8)
인	11.0 (0.5)	7.6 (0.4)	8.2 (0.4)	13.4 (0.7)	10.7 (0.4)	11.1 (0.4)	8.8 (0.4)
철	48.5 (0.9)	47.1 (0.8)	31.4 (0.8)	38.6 (1.1)	35.3 (0.8)	34.9 (0.7)	27.6 (0.7)
비타민 A	55.8 (0.9)	52.2 (0.8)	35.2 (0.8)	43.3 (1.1)	39.4 (0.8)	40.3 (0.8)	38.0 (0.9)
티아민	25.2 (0.8)	27.9 (0.7)	33.3 (0.7)	35.8 (1.0)	34.8 (0.7)	34.5 (0.6)	28.8 (0.7)
리보플라빈	50.7 (1.0)	44.6 (0.9)	49.7 (0.8)	57.6 (1.2)	52.7 (0.8)	50.3 (0.7)	43.6 (0.8)
나이아신	33.7 (0.9)	28.5 (0.7)	26.7 (0.7)	35.5 (1.2)	33.5 (0.8)	31.7 (0.7)	26.6 (0.7)
비타민 C	17.4 (0.7)	22.0 (0.7)	46.4 (0.9)	49.9 (1.3)	46.4 (0.9)	46.7 (0.9)	43.8 (1.0)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	34.6 (1.1)	35.6 (1.1)	28.0 (1.0)	31.6 (1.2)	30.9 (1.0)	30.3 (0.9)	22.2 (1.0)
단백질	25.6 (1.0)	20.5 (0.8)	9.3 (0.6)	11.9 (0.9)	10.6 (0.7)	11.3 (0.7)	8.7 (0.6)
지방	- -	- -	28.0 (0.8)	34.8 (1.5)	33.0 (1.0)	33.1 (0.9)	28.8 (1.0)
칼슘	60.1 (1.1)	60.4 (1.0)	58.3 (1.0)	66.8 (1.5)	64.3 (1.2)	63.1 (0.9)	61.3 (1.0)
인	6.6 (0.5)	4.9 (0.4)	6.3 (0.5)	8.4 (0.7)	6.7 (0.5)	7.1 (0.5)	5.6 (0.5)
철	32.7 (1.0)	33.2 (1.0)	21.4 (0.9)	24.0 (1.3)	23.0 (0.8)	22.0 (0.7)	16.4 (0.8)
비타민 A	49.9 (1.1)	45.1 (1.1)	34.7 (0.9)	40.4 (1.4)	37.7 (1.1)	37.1 (0.9)	35.3 (1.1)
티아민	24.7 (1.0)	27.6 (0.9)	28.6 (0.9)	28.4 (1.3)	27.5 (0.9)	27.1 (0.9)	22.1 (1.0)
리보플라빈	49.2 (1.1)	42.2 (1.1)	50.9 (1.0)	56.0 (1.6)	52.2 (1.0)	49.1 (1.0)	42.4 (1.1)
나이아신	31.8 (1.1)	26.8 (0.9)	22.3 (0.8)	26.7 (1.5)	25.7 (0.9)	23.8 (0.9)	19.2 (0.8)
비타민 C	15.5 (0.7)	21.5 (0.8)	42.9 (1.0)	46.6 (1.4)	42.9 (1.2)	43.2 (1.0)	39.7 (1.2)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	36.9 (1.0)	39.0 (1.1)	31.1 (0.9)	43.6 (1.5)	39.4 (0.9)	39.6 (0.9)	31.8 (1.0)
단백질	31.2 (1.0)	24.6 (0.8)	11.8 (0.6)	20.1 (1.1)	18.4 (0.7)	19.1 (0.7)	15.9 (0.8)
지방	- -	- -	33.1 (0.8)	40.4 (1.5)	42.1 (0.9)	40.1 (0.8)	36.7 (1.1)
칼슘	69.2 (1.0)	69.6 (0.9)	68.2 (0.9)	80.4 (1.1)	77.5 (0.8)	77.5 (0.8)	70.1 (0.9)
인	14.9 (0.7)	10.1 (0.6)	10.1 (0.6)	18.0 (1.1)	14.6 (0.6)	15.0 (0.7)	11.9 (0.7)
철	63.5 (1.1)	59.4 (0.9)	41.8 (1.0)	53.7 (1.5)	48.0 (1.0)	48.4 (1.0)	39.2 (1.0)
비타민 A	61.2 (1.0)	58.3 (0.9)	35.7 (1.0)	46.2 (1.4)	41.0 (0.9)	43.7 (0.9)	40.7 (1.2)
티아민	25.4 (0.9)	27.9 (0.9)	37.8 (0.9)	43.1 (1.3)	42.1 (0.9)	42.0 (0.9)	35.6 (1.0)
리보플라빈	52.0 (1.1)	46.4 (1.0)	48.4 (0.9)	59.1 (1.4)	53.3 (1.0)	51.6 (0.9)	44.8 (1.0)
나이아신	35.4 (1.0)	29.9 (0.8)	30.9 (0.9)	44.0 (1.6)	41.2 (1.0)	39.7 (0.8)	33.9 (1.0)
비타민 C	19.1 (0.8)	22.3 (0.7)	49.8 (1.0)	53.0 (1.9)	50.0 (1.0)	50.1 (1.1)	47.8 (1.4)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 권장량)의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량(또는 권장량의 75%)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

표 2-II-36. 영양소별 영양섭취기준[1] 미만 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	8,019	26.9 (0.8)	13.0 (0.5)	34.9 (1.0)	65.9 (0.8)	8.9 (0.4)
19세이상	5,944	27.9 (0.8)	14.4 (0.6)	39.5 (1.2)	64.5 (0.8)	7.8 (0.4)
연령(세)						
1-9	1,104	19.6 (1.7)	2.0 (0.5)	24.6 (2.0)	61.1 (1.9)	8.9 (1.0)
10-18	971	26.1 (2.1)	11.7 (1.3)	13.0 (1.4)	77.9 (1.8)	16.4 (1.4)
19-29	692	36.9 (2.2)	15.3 (1.6)	16.4 (1.7)	70.1 (2.0)	8.5 (1.3)
30-39	1,148	25.3 (1.5)	9.5 (1.0)	24.9 (1.4)	60.3 (1.6)	4.9 (0.7)
40-49	1,103	26.0 (1.5)	11.6 (1.2)	35.6 (1.9)	57.8 (1.9)	7.0 (1.0)
50-59	1,107	22.2 (1.7)	10.7 (1.2)	51.0 (1.9)	61.2 (1.8)	5.3 (0.9)
60-69	999	23.2 (1.7)	16.0 (1.5)	66.1 (2.5)	70.0 (1.8)	6.5 (1.0)
70+	895	35.3 (2.0)	35.4 (2.0)	79.3 (1.5)	78.5 (1.9)	20.9 (1.8)
1-2	243	16.3 (2.8)	1.8 (0.8)	44.5 (3.5)	38.8 (3.6)	7.9 (2.0)
3-5	351	26.5 (3.2)	1.8 (0.7)	15.8 (2.4)	60.9 (3.1)	6.2 (1.6)
6-11	779	16.5 (1.5)	2.5 (0.7)	18.5 (2.1)	70.0 (2.2)	14.9 (1.5)
12-18	702	28.6 (2.6)	13.8 (1.6)	12.7 (1.6)	80.5 (2.0)	15.2 (1.5)
19-29	692	36.9 (2.2)	15.3 (1.6)	16.4 (1.7)	70.1 (2.0)	8.5 (1.3)
30-49	2,251	25.7 (1.1)	10.6 (0.8)	30.3 (1.2)	59.0 (1.2)	5.9 (0.6)
50-64	1,613	23.1 (1.4)	11.0 (1.0)	53.6 (1.9)	62.7 (1.5)	5.2 (0.7)
65+	1,388	30.2 (1.7)	30.6 (1.5)	76.7 (1.5)	76.7 (1.6)	16.7 (1.3)
거주지역						
동	6,343	27.0 (0.8)	11.9 (0.6)	31.8 (1.1)	65.3 (0.8)	8.8 (0.4)
읍면	1,676	26.8 (2.0)	16.9 (1.2)	46.3 (2.8)	68.0 (1.8)	9.5 (0.8)
소득수준[2]						
하	1,952	30.3 (1.5)	15.8 (1.0)	36.7 (1.8)	71.0 (1.3)	10.5 (0.8)
중하	1,987	28.5 (1.3)	13.9 (1.1)	34.5 (1.6)	67.2 (1.7)	9.6 (0.9)
중상	2,000	24.6 (1.4)	10.8 (0.9)	35.9 (1.6)	64.1 (1.4)	7.7 (0.7)
상	1,979	23.2 (1.3)	10.4 (0.9)	32.7 (1.5)	59.9 (1.4)	7.5 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,343	26.9 (0.8)	11.7 (0.5)	31.5 (0.9)	65.3 (0.8)	8.8 (0.4)
읍면	1,676	28.2 (2.3)	15.4 (1.5)	37.2 (2.0)	67.5 (1.9)	8.7 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	1,952	30.1 (1.5)	15.2 (1.0)	35.6 (1.5)	70.9 (1.3)	10.3 (0.8)
중하	1,987	28.9 (1.4)	13.6 (1.2)	32.9 (1.3)	66.8 (1.6)	9.6 (0.9)
중상	2,000	24.8 (1.5)	10.3 (0.9)	32.8 (1.4)	64.1 (1.5)	7.7 (0.7)
상	1,979	22.7 (1.4)	9.5 (0.9)	29.8 (1.3)	60.0 (1.4)	7.0 (0.7)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	26.7 (0.7)	38.4 (0.9)	29.9 (0.8)	45.3 (0.8)	27.5 (0.7)	44.1 (0.9)
19세이상	22.8 (0.6)	38.2 (1.0)	33.2 (0.9)	49.6 (0.9)	28.3 (0.9)	42.9 (1.0)
연령(세)						
1-9	28.9 (1.9)	29.3 (1.9)	12.4 (1.3)	17.1 (1.4)	17.5 (1.4)	36.5 (2.0)
10-18	50.0 (2.0)	46.4 (2.2)	21.5 (1.6)	38.5 (2.1)	29.3 (2.0)	57.0 (2.5)
19-29	35.2 (2.1)	43.4 (2.2)	30.4 (1.9)	40.6 (2.3)	26.5 (1.9)	47.8 (2.3)
30-39	25.0 (1.5)	31.1 (2.0)	27.1 (1.8)	40.1 (1.9)	21.2 (1.5)	39.6 (1.7)
40-49	22.8 (1.6)	32.8 (2.0)	26.3 (1.7)	45.5 (1.8)	22.0 (1.6)	36.1 (1.6)
50-59	9.6 (1.2)	32.2 (1.9)	31.1 (1.8)	49.8 (1.8)	25.4 (1.8)	36.6 (1.9)
60-69	13.1 (1.4)	43.8 (2.1)	42.1 (2.1)	63.4 (2.1)	36.4 (2.2)	45.7 (1.9)
70+	27.8 (2.0)	61.3 (2.1)	63.1 (2.3)	83.5 (1.7)	59.7 (2.0)	64.8 (2.2)
1-2	30.0 (3.3)	23.5 (3.4)	16.7 (2.7)	15.4 (2.6)	25.8 (2.9)	33.7 (3.7)
3-5	30.5 (3.5)	27.5 (3.1)	6.5 (1.6)	15.7 (2.3)	14.2 (2.4)	27.6 (3.2)
6-11	29.0 (2.2)	35.9 (2.3)	12.9 (1.6)	18.8 (1.8)	18.8 (1.6)	42.1 (2.2)
12-18	54.6 (2.3)	47.9 (2.6)	24.3 (2.0)	43.4 (2.3)	30.6 (2.4)	61.3 (2.9)
19-29	35.2 (2.1)	43.4 (2.2)	30.4 (1.9)	40.6 (2.3)	26.5 (1.9)	47.8 (2.3)
30-49	23.9 (1.1)	32.0 (1.4)	26.7 (1.2)	42.9 (1.3)	21.6 (1.2)	37.8 (1.2)
50-64	10.1 (1.1)	34.0 (1.7)	33.4 (1.6)	52.0 (1.6)	27.3 (1.6)	38.6 (1.7)
65+	23.5 (1.5)	57.0 (1.7)	56.7 (1.8)	78.8 (1.5)	53.2 (1.7)	58.9 (1.8)
거주지역						
동	26.8 (0.8)	37.5 (1.0)	28.8 (0.9)	43.2 (0.9)	25.9 (0.7)	43.1 (1.0)
읍면	26.6 (1.3)	41.8 (2.2)	34.0 (1.7)	53.0 (2.0)	33.1 (1.9)	47.5 (2.3)
소득수준						
하	31.9 (1.5)	45.7 (1.5)	33.8 (1.4)	50.7 (1.5)	31.9 (1.3)	50.1 (1.7)
중하	29.0 (1.4)	38.9 (1.7)	31.7 (1.4)	47.8 (1.6)	29.5 (1.3)	45.6 (1.7)
중상	22.1 (1.3)	34.7 (1.7)	27.5 (1.5)	42.5 (1.5)	24.0 (1.3)	41.3 (1.7)
상	22.4 (1.2)	33.0 (1.5)	25.4 (1.3)	38.6 (1.5)	23.5 (1.3)	37.1 (1.6)
거주지역(표준화)						
동	27.0 (0.8)	37.5 (1.0)	28.5 (0.8)	42.7 (0.9)	25.8 (0.7)	43.1 (1.0)
읍면	30.3 (1.7)	40.6 (2.3)	30.8 (1.6)	46.9 (2.3)	30.0 (2.0)	46.5 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	32.2 (1.5)	45.4 (1.5)	32.9 (1.3)	49.5 (1.4)	31.2 (1.3)	49.8 (1.7)
중하	29.6 (1.3)	38.4 (1.7)	31.0 (1.4)	46.5 (1.6)	29.0 (1.4)	45.2 (1.7)
중상	23.4 (1.3)	34.3 (1.8)	26.2 (1.4)	40.0 (1.4)	22.9 (1.2)	41.1 (1.7)
상	23.2 (1.2)	32.4 (1.5)	23.8 (1.2)	36.5 (1.5)	22.4 (1.3)	36.9 (1.7)

표 2-II-37. 영양소별 영양섭취기준[1] 미만 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	3,550	22.0 (1.0)	8.7 (0.6)	29.6 (1.1)	61.1 (1.1)	5.5 (0.5)
19세이상	2,475	21.9 (1.1)	9.7 (0.7)	33.5 (1.4)	59.6 (1.2)	3.0 (0.4)
연령(세)						
1-9	552	15.6 (2.2)	0.8 (0.4)	23.2 (2.5)	57.5 (2.6)	9.3 (1.4)
10-18	523	27.1 (2.5)	8.6 (1.5)	11.2 (1.6)	72.2 (2.5)	17.0 (2.1)
19-29	270	31.1 (3.4)	11.7 (2.1)	13.5 (2.4)	68.6 (3.0)	4.3 (1.5)
30-39	445	19.0 (2.1)	6.4 (1.3)	21.1 (2.1)	55.7 (2.6)	1.7 (0.8)
40-49	478	20.3 (2.1)	8.9 (1.5)	30.8 (2.6)	57.0 (2.8)	2.4 (0.9)
50-59	442	16.1 (1.9)	6.6 (1.3)	44.2 (2.6)	52.4 (2.8)	1.4 (0.5)
60-69	451	18.0 (2.3)	10.0 (1.9)	61.0 (3.3)	60.6 (2.8)	3.3 (1.3)
70+	389	29.7 (2.5)	23.7 (2.6)	70.8 (2.5)	71.5 (3.1)	9.0 (2.0)
1-2	115	13.6 (4.5)	0.0 (-)[4]	42.7 (5.0)	35.6 (4.8)	5.5 (2.5)
3-5	172	17.1 (3.3)	0.3 (0.3)	16.2 (3.6)	58.9 (4.0)	5.7 (2.0)
6-11	407	16.8 (2.3)	1.4 (0.6)	17.4 (2.8)	65.2 (3.2)	18.3 (2.3)
12-18	381	28.9 (3.0)	10.3 (1.9)	10.3 (1.8)	74.4 (2.9)	14.8 (2.1)
19-29	270	31.1 (3.4)	11.7 (2.1)	13.5 (2.4)	68.6 (3.0)	4.3 (1.5)
30-49	923	19.7 (1.4)	7.7 (1.0)	26.0 (1.6)	56.3 (1.7)	2.1 (0.6)
50-64	673	16.7 (1.6)	6.6 (1.0)	47.4 (2.3)	53.9 (2.4)	1.4 (0.5)
65+	609	25.0 (2.2)	20.3 (1.9)	68.9 (2.2)	68.5 (2.6)	7.7 (1.5)
거주지역						
동	2,810	22.5 (1.1)	8.4 (0.7)	26.8 (1.2)	61.3 (1.2)	5.8 (0.5)
읍면	740	20.2 (2.3)	10.0 (1.2)	39.9 (2.9)	60.3 (2.2)	4.4 (1.0)
소득수준[2]						
하	874	27.0 (2.1)	11.7 (1.2)	31.2 (2.0)	68.4 (1.9)	6.9 (1.1)
중하	876	23.3 (1.9)	8.9 (1.3)	30.6 (1.9)	61.7 (2.4)	5.8 (1.0)
중상	877	20.5 (1.9)	7.2 (1.2)	28.6 (2.0)	59.7 (2.2)	4.6 (0.9)
상	883	16.1 (1.8)	6.7 (1.0)	28.0 (2.0)	53.3 (2.3)	4.5 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,810	22.4 (1.0)	8.4 (0.7)	27.4 (1.1)	61.4 (1.1)	5.7 (0.5)
읍면	740	21.1 (2.8)	9.8 (1.4)	33.4 (2.3)	62.0 (2.3)	4.3 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	874	27.1 (2.0)	11.6 (1.2)	30.9 (1.6)	68.9 (1.9)	6.9 (1.0)
중하	876	23.6 (1.9)	8.9 (1.4)	30.1 (1.7)	61.5 (2.3)	5.8 (0.9)
중상	877	20.8 (1.9)	7.1 (1.2)	27.5 (1.8)	60.2 (2.2)	4.8 (0.9)
상	883	16.0 (1.8)	6.6 (1.0)	26.7 (1.9)	54.0 (2.2)	4.5 (0.8)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	16.1 (0.8)	35.5 (1.1)	22.3 (1.0)	43.1 (1.1)	19.3 (0.8)	39.8 (1.2)
19세이상	10.1 (0.8)	34.4 (1.3)	24.5 (1.1)	46.8 (1.3)	18.6 (1.0)	38.1 (1.3)
연령(세)						
1-9	28.1 (3.0)	26.2 (2.4)	11.2 (1.8)	18.2 (1.9)	14.9 (2.0)	30.7 (2.4)
10-18	42.8 (2.7)	47.8 (3.2)	17.2 (2.1)	38.9 (2.7)	26.5 (2.9)	56.5 (3.1)
19-29	17.4 (3.0)	37.5 (3.4)	24.8 (2.7)	39.2 (3.4)	20.0 (2.6)	43.7 (3.6)
30-39	5.1 (1.1)	25.5 (2.6)	17.9 (2.2)	36.9 (2.6)	11.8 (1.8)	34.0 (2.4)
40-49	7.1 (1.3)	33.1 (2.8)	17.7 (2.0)	45.7 (2.4)	14.9 (1.9)	33.0 (2.4)
50-59	7.3 (1.5)	31.1 (2.7)	23.8 (2.3)	48.8 (2.6)	16.6 (1.9)	33.6 (2.5)
60-69	9.7 (1.8)	40.8 (3.0)	33.1 (2.7)	58.9 (2.7)	23.1 (2.6)	42.2 (2.8)
70+	21.6 (2.5)	56.8 (2.8)	55.1 (3.2)	80.1 (2.7)	46.1 (2.9)	55.7 (3.5)
1-2	26.4 (4.7)	21.5 (4.4)	12.8 (3.9)	14.0 (3.8)	23.5 (4.6)	31.9 (5.5)
3-5	28.6 (4.8)	24.6 (4.3)	3.9 (1.5)	12.8 (3.2)	11.1 (3.1)	24.7 (4.1)
6-11	29.0 (3.1)	34.3 (2.9)	11.5 (2.1)	20.4 (2.4)	18.4 (2.4)	36.1 (2.7)
12-18	45.7 (3.0)	48.8 (3.6)	19.8 (2.7)	44.3 (3.1)	26.3 (3.4)	60.1 (3.5)
19-29	17.4 (3.0)	37.5 (3.4)	24.8 (2.7)	39.2 (3.4)	20.0 (2.6)	43.7 (3.6)
30-49	6.1 (0.9)	29.3 (2.0)	17.8 (1.6)	41.3 (1.9)	13.4 (1.4)	33.5 (1.8)
50-64	7.7 (1.3)	32.5 (2.3)	25.9 (2.0)	49.8 (2.2)	17.6 (1.7)	35.9 (2.1)
65+	17.7 (1.8)	52.8 (2.4)	47.2 (2.5)	75.1 (2.2)	38.5 (2.6)	50.2 (2.7)
거주지역						
동	16.2 (0.9)	34.1 (1.3)	21.9 (1.2)	41.6 (1.2)	18.7 (1.0)	39.2 (1.3)
읍면	15.8 (1.2)	40.5 (2.8)	23.7 (2.1)	48.9 (2.5)	21.7 (1.8)	42.1 (2.5)
소득수준						
하	21.7 (1.8)	44.9 (2.2)	26.0 (1.7)	49.1 (2.1)	24.4 (1.7)	47.1 (2.1)
중하	17.2 (1.7)	35.7 (2.2)	25.1 (1.9)	46.8 (2.1)	20.9 (1.8)	41.8 (2.2)
중상	12.2 (1.5)	30.6 (2.0)	19.9 (1.8)	38.6 (2.0)	15.5 (1.6)	36.4 (2.2)
상	11.8 (1.2)	28.9 (1.9)	17.3 (1.7)	36.5 (2.1)	15.7 (1.7)	32.2 (2.1)
거주지역(표준화)						
동	16.1 (0.9)	34.2 (1.2)	22.2 (1.1)	41.7 (1.2)	18.8 (0.9)	39.2 (1.3)
읍면	17.1 (1.3)	40.2 (3.0)	22.3 (2.3)	44.6 (2.9)	20.5 (1.8)	40.9 (2.9)
소득수준(표준화)						
하	21.5 (1.7)	44.5 (2.2)	25.8 (1.7)	48.7 (2.1)	24.1 (1.7)	47.0 (2.2)
중하	17.3 (1.5)	35.4 (2.1)	25.0 (1.8)	46.2 (2.0)	21.1 (1.9)	41.2 (2.1)
중상	12.9 (1.6)	30.9 (2.0)	19.8 (1.7)	37.6 (1.9)	15.4 (1.5)	36.8 (2.2)
상	12.3 (1.2)	28.6 (1.8)	16.7 (1.7)	35.5 (2.1)	15.5 (1.6)	32.5 (2.1)

표 2-II-38. 영양소별 영양섭취기준[1] 미만 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	4,469	31.9 (1.0)	17.2 (0.8)	40.4 (1.3)	70.6 (0.9)	12.4 (0.7)
19세이상	3,469	33.7 (1.0)	19.0 (0.8)	45.4 (1.4)	69.3 (1.1)	12.4 (0.7)
연령(세)						
1-9	552	24.1 (2.2)	3.3 (0.9)	26.2 (2.6)	65.0 (2.8)	8.6 (1.4)
10-18	448	25.0 (2.8)	15.3 (2.2)	15.1 (2.3)	84.6 (2.3)	15.7 (1.8)
19-29	422	42.9 (2.7)	18.9 (2.2)	19.4 (2.2)	71.7 (2.6)	12.8 (2.0)
30-39	703	31.9 (2.2)	12.8 (1.5)	29.0 (2.0)	65.2 (2.2)	8.2 (1.3)
40-49	625	31.9 (2.2)	14.4 (1.9)	40.5 (2.7)	58.7 (2.4)	11.6 (1.8)
50-59	665	28.3 (2.6)	14.8 (1.8)	57.9 (2.5)	70.1 (2.3)	9.2 (1.6)
60-69	548	27.8 (2.3)	21.3 (2.1)	70.6 (2.8)	78.3 (2.1)	9.4 (1.4)
70+	506	38.9 (3.0)	42.7 (2.7)	84.6 (1.7)	82.8 (2.1)	28.2 (2.5)
1-2	128	19.3 (3.9)	3.8 (1.8)	46.5 (5.3)	42.2 (5.4)	10.6 (3.2)
3-5	179	36.2 (4.7)	3.3 (1.4)	15.3 (3.0)	62.9 (4.6)	6.8 (2.5)
6-11	372	16.2 (2.3)	3.7 (1.3)	19.8 (2.8)	75.1 (2.9)	11.4 (2.0)
12-18	321	28.3 (3.4)	18.2 (2.6)	15.7 (2.8)	88.1 (2.4)	15.7 (2.1)
19-29	422	42.9 (2.7)	18.9 (2.2)	19.4 (2.2)	71.7 (2.6)	12.8 (2.0)
30-49	1,328	31.9 (1.7)	13.6 (1.2)	34.9 (1.7)	61.8 (1.7)	9.9 (1.1)
50-64	940	29.4 (2.2)	15.3 (1.5)	59.8 (2.3)	71.5 (1.8)	8.9 (1.2)
65+	779	33.8 (2.3)	37.6 (2.0)	82.1 (1.6)	82.3 (1.8)	22.9 (2.0)
거주지역						
동	3,533	31.5 (1.0)	15.4 (0.8)	37.0 (1.4)	69.3 (1.1)	11.8 (0.7)
읍면	936	33.4 (2.6)	23.6 (1.7)	52.7 (3.5)	75.6 (1.9)	14.6 (1.4)
소득수준[2]						
하	1,078	33.6 (1.9)	19.9 (1.6)	42.3 (2.3)	73.6 (1.7)	14.2 (1.2)
중하	1,111	33.8 (2.0)	18.9 (1.6)	38.3 (2.0)	72.7 (1.9)	13.3 (1.3)
중상	1,123	28.8 (1.7)	14.5 (1.3)	43.3 (2.2)	68.6 (1.8)	10.8 (1.1)
상	1,096	30.4 (1.8)	14.2 (1.3)	37.6 (2.2)	66.7 (1.6)	10.6 (1.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,533	31.1 (1.0)	14.9 (0.8)	35.4 (1.2)	69.3 (1.1)	11.6 (0.7)
읍면	936	36.1 (2.9)	21.2 (2.3)	41.2 (2.9)	73.0 (2.4)	13.4 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	1,078	33.3 (1.9)	18.8 (1.5)	40.3 (2.1)	73.3 (1.7)	13.6 (1.2)
중하	1,111	34.2 (2.1)	18.3 (1.6)	35.7 (1.9)	72.0 (1.9)	13.2 (1.3)
중상	1,123	28.5 (1.7)	13.0 (1.3)	38.1 (1.8)	67.9 (1.9)	10.5 (1.1)
상	1,096	29.7 (1.8)	12.3 (1.2)	32.6 (1.8)	66.3 (1.7)	9.2 (1.1)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	37.4 (1.0)	41.4 (1.1)	37.6 (1.1)	47.6 (1.1)	35.7 (1.0)	48.3 (1.3)
19세이상	35.2 (1.0)	41.8 (1.2)	41.7 (1.2)	52.3 (1.2)	37.8 (1.2)	47.6 (1.3)
연령(세)						
1-9	29.9 (2.5)	32.6 (2.8)	13.8 (1.8)	16.0 (2.1)	20.3 (2.2)	42.8 (3.0)
10-18	58.7 (2.7)	44.9 (2.7)	26.7 (2.4)	38.0 (2.8)	32.6 (2.8)	57.6 (3.3)
19-29	53.8 (2.6)	49.5 (3.0)	36.3 (2.7)	42.0 (3.2)	33.1 (2.9)	52.0 (3.2)
30-39	46.0 (2.4)	37.1 (2.4)	36.9 (2.6)	43.4 (2.2)	31.2 (2.2)	45.6 (2.4)
40-49	39.0 (2.5)	32.5 (2.5)	35.2 (2.5)	45.4 (2.5)	29.3 (2.3)	39.3 (2.4)
50-59	11.9 (1.7)	33.2 (2.3)	38.5 (2.5)	50.9 (2.5)	34.2 (2.4)	39.6 (2.4)
60-69	16.1 (2.1)	46.4 (2.4)	50.2 (2.8)	67.4 (2.3)	48.4 (2.8)	48.9 (2.3)
70+	31.5 (2.8)	64.0 (2.7)	68.0 (2.7)	85.6 (1.8)	68.2 (2.4)	70.5 (2.3)
1-2	34.0 (4.9)	25.7 (4.7)	20.9 (3.9)	17.0 (3.7)	28.3 (4.3)	35.6 (5.3)
3-5	32.5 (4.1)	30.5 (4.0)	9.2 (2.9)	18.7 (3.4)	17.5 (3.5)	30.8 (4.3)
6-11	29.0 (3.1)	37.5 (3.3)	14.3 (2.4)	17.2 (2.6)	19.3 (2.3)	48.4 (3.3)
12-18	65.7 (3.2)	46.7 (3.2)	29.9 (2.8)	42.3 (3.1)	35.9 (3.2)	62.7 (3.9)
19-29	53.8 (2.6)	49.5 (3.0)	36.3 (2.7)	42.0 (3.2)	33.1 (2.9)	52.0 (3.2)
30-49	42.4 (1.9)	34.8 (1.8)	36.0 (1.9)	44.4 (1.8)	30.3 (1.7)	42.4 (1.8)
50-64	12.5 (1.5)	35.6 (2.1)	40.9 (2.2)	54.1 (2.1)	37.0 (2.1)	41.3 (2.0)
65+	27.5 (2.1)	59.9 (2.1)	63.3 (2.2)	81.3 (1.7)	63.2 (2.0)	64.8 (1.8)
거주지역						
동	37.4 (1.1)	40.9 (1.3)	35.8 (1.2)	44.9 (1.1)	33.3 (1.1)	47.0 (1.4)
읍면	37.3 (2.4)	43.1 (2.1)	44.2 (2.3)	57.1 (2.7)	44.4 (2.3)	53.0 (2.9)
소득수준						
하	42.3 (2.2)	46.6 (2.1)	41.8 (2.0)	52.2 (1.9)	39.6 (1.8)	53.2 (2.4)
중하	40.6 (2.1)	42.0 (2.3)	38.3 (2.0)	48.8 (2.2)	38.1 (1.9)	49.4 (2.5)
중상	31.9 (1.7)	38.8 (2.1)	35.1 (1.9)	46.5 (1.7)	32.6 (1.8)	46.1 (1.9)
상	33.2 (1.7)	37.1 (1.7)	33.8 (2.0)	40.7 (2.1)	31.5 (1.8)	42.1 (2.1)
거주지역(표준화)						
동	38.2 (1.0)	40.7 (1.3)	34.7 (1.1)	43.6 (1.1)	32.5 (1.0)	46.9 (1.4)
읍면	45.1 (2.9)	40.7 (2.4)	39.9 (2.6)	49.1 (3.5)	40.3 (2.6)	52.5 (3.7)
소득수준(표준화)						
하	43.2 (2.2)	45.8 (2.1)	40.1 (1.9)	50.2 (1.9)	38.5 (1.7)	52.4 (2.5)
중하	42.1 (1.9)	41.5 (2.3)	37.2 (2.0)	46.9 (2.2)	36.9 (2.0)	49.1 (2.5)
중상	34.8 (1.8)	37.5 (2.3)	32.5 (1.8)	42.5 (1.7)	30.0 (1.7)	45.4 (2.1)
상	35.0 (1.7)	36.2 (1.7)	31.1 (1.9)	37.4 (2.0)	29.2 (1.8)	41.3 (2.4)

표 2-II-39. 영양소별 영양섭취기준[1] 이상 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	15.8 (0.7)	14.3 (0.6)	19.0 (0.7)	12.5 (0.7)	14.0 (0.5)	14.4 (0.5)	20.6 (0.6)
지방	- -[2]	- -	22.4 (0.7)	16.5 (1.0)	16.6 (0.6)	18.2 (0.6)	20.4 (0.7)
칼슘	10.1 (0.5)	9.5 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
인	57.4 (1.0)	64.2 (0.8)	0.4 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)
철	20.1 (0.7)	20.9 (0.7)	1.7 (0.2)	1.8 (0.3)	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.8 (0.2)
비타민 A	20.8 (0.7)	21.7 (0.7)	3.2 (0.2)	2.7 (0.3)	3.4 (0.3)	3.2 (0.3)	3.3 (0.3)
비타민 C	64.6 (0.9)	58.4 (0.9)	0.0 (-)[3]	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.1)
나트륨	(-)	(-)	(N=7,887)[4]	(N=3,532)	(N=7,498)	(N=8,291)	(N=7,056)
	- -	- -	93.0 (0.3)	87.5 (0.7)	87.9 (0.5)	86.9 (0.5)	89.4 (0.5)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	17.2 (0.9)	15.3 (0.8)	20.6 (0.9)	14.7 (1.1)	17.2 (0.8)	17.8 (0.8)	25.5 (0.9)
지방	- -	- -	24.6 (0.9)	18.4 (1.2)	18.9 (0.9)	20.9 (0.9)	22.5 (1.0)
칼슘	12.1 (0.7)	11.5 (0.6)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
인	67.1 (1.1)	72.6 (0.9)	0.7 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.2)	0.7 (0.2)
철	31.4 (1.0)	28.8 (0.9)	2.4 (0.3)	2.6 (0.5)	2.0 (0.3)	2.0 (0.3)	2.2 (0.3)
비타민 A	24.1 (0.9)	25.0 (0.8)	3.4 (0.3)	3.0 (0.4)	4.2 (0.4)	3.4 (0.3)	4.0 (0.4)
비타민 C	65.4 (1.0)	57.1 (1.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
나트륨	(-)	(-)	(N=3,630)	(N=1,516)	(N=3,116)	(N=3,595)	(N=3,071)
	- -	- -	96.2 (0.4)	93.6 (0.8)	93.5 (0.6)	93.7 (0.5)	95.1 (0.5)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	14.5 (0.7)	13.4 (0.6)	17.4 (0.7)	10.3 (0.8)	10.8 (0.6)	10.9 (0.5)	15.6 (0.7)
지방	- -	- -	20.2 (0.7)	14.5 (1.1)	14.3 (0.7)	15.4 (0.7)	18.2 (0.8)
칼슘	8.2 (0.5)	7.7 (0.5)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 (-)	0.1 (0.1)
인	48.2 (1.1)	56.6 (1.0)	0.1 (0.0)	0.0 (-)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
철	9.4 (0.5)	13.9 (0.7)	1.0 (0.2)	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	1.0 (0.2)	1.3 (0.2)
비타민 A	17.7 (0.8)	18.7 (0.7)	2.9 (0.3)	2.3 (0.4)	2.6 (0.3)	3.0 (0.4)	2.7 (0.3)
비타민 C	63.8 (1.1)	59.5 (0.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
나트륨	(-)	(-)	(N=4,257)	(N=2,016)	(N=4,382)	(N=4,696)	(N=3,985)
	- -	- -	89.8 (0.5)	81.5 (1.0)	82.4 (0.8)	80.0 (0.7)	83.8 (0.8)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량)의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량(또는 영양권장량의 125%)

2) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율, 나트륨 영양섭취기준 미비

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

표 2-II-40. 영양소별 영양섭취기준[1] 이상 섭취자 분율 추이(표준화)[2] : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)
에너지	15.4 (0.7)	14.2 (0.6)	19.0 (0.7)	12.5 (0.6)	14.1 (0.5)	14.4 (0.5)	20.6 (0.6)
지방	- -[3]	- -	22.5 (0.6)	16.8 (0.9)	17.1 (0.6)	18.9 (0.5)	21.2 (0.7)
칼슘	10.0 (0.5)	9.5 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
인	57.5 (0.9)	64.6 (0.8)	0.4 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)
철	20.7 (0.7)	21.2 (0.7)	1.7 (0.2)	1.8 (0.3)	1.5 (0.2)	1.4 (0.2)	1.7 (0.2)
비타민 A	20.6 (0.7)	21.7 (0.7)	3.2 (0.2)	2.7 (0.3)	3.6 (0.3)	3.4 (0.3)	3.6 (0.3)
비타민 C	64.8 (0.9)	58.5 (0.8)	0.0 (-)[4]	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.1)
나트륨	(-)	(-)	(N=7,887)[5]	(N=3,532)	(N=7,498)	(N=8,291)	(N=7,056)
	- -	- -	93.0 (0.3)	87.7 (0.7)	88.1 (0.5)	87.1 (0.5)	89.7 (0.5)
남자	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)
에너지	16.4 (0.8)	15.1 (0.8)	20.4 (0.8)	14.6 (1.0)	17.2 (0.8)	17.8 (0.8)	25.4 (0.9)
지방	- -	- -	24.4 (0.9)	18.5 (1.2)	19.1 (0.8)	21.4 (0.8)	22.9 (1.0)
칼슘	11.9 (0.6)	11.6 (0.6)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)
인	67.3 (1.0)	73.5 (1.0)	0.7 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.2)	0.7 (0.2)
철	32.4 (1.1)	30.1 (0.9)	2.4 (0.3)	2.6 (0.5)	2.0 (0.3)	2.0 (0.3)	2.2 (0.3)
비타민 A	23.7 (0.9)	25.1 (0.8)	3.4 (0.3)	3.0 (0.4)	4.4 (0.4)	3.5 (0.3)	4.2 (0.4)
비타민 C	65.5 (1.0)	57.1 (1.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
나트륨	(-)	(-)	(N=3,630)	(N=1,516)	(N=3,116)	(N=3,595)	(N=3,071)
	- -	- -	96.0 (0.4)	93.6 (0.8)	93.4 (0.6)	93.7 (0.5)	95.0 (0.5)
여자	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)
에너지	14.3 (0.7)	13.4 (0.6)	17.5 (0.7)	10.4 (0.8)	10.8 (0.6)	10.9 (0.6)	15.6 (0.7)
지방	- -	- -	20.6 (0.7)	15.1 (1.1)	15.0 (0.7)	16.4 (0.7)	19.5 (0.8)
칼슘	8.2 (0.5)	7.7 (0.5)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 (-)	0.1 (0.1)
인	48.5 (1.1)	56.9 (1.0)	0.1 (0.0)	0.0 (-)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
철	9.5 (0.6)	13.6 (0.7)	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	0.9 (0.2)	0.9 (0.2)	1.3 (0.2)
비타민 A	17.6 (0.8)	18.9 (0.7)	2.9 (0.2)	2.4 (0.4)	2.8 (0.3)	3.2 (0.4)	2.9 (0.3)
비타민 C	64.2 (1.1)	59.8 (0.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
나트륨	(-)	(-)	(N=4,257)	(N=2,016)	(N=4,382)	(N=4,696)	(N=3,985)
	- -	- -	89.9 (0.5)	82.0 (1.1)	83.0 (0.7)	80.5 (0.7)	84.4 (0.8)

1) 영양섭취기준
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량)의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량(또는 영양권장량의 125%)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율, 나트륨 영양섭취기준 미비

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

표 2-II-41. 영양소별 영양섭취기준[1] 이상 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	8,019	20.6 (0.6)	20.4 (0.7)	0.2 (0.1)	0.4 (0.1)	1.8 (0.2)
19세이상	5,944	20.2 (0.7)	21.7 (0.8)	0.2 (0.1)	0.5 (0.1)	2.0 (0.2)
연령(세)						
1-9	1,104	23.5 (1.6)	8.4 (0.9)	0.0 (-)[4]	0.0 (-)	0.3 (0.2)
10-18	971	21.2 (1.7)	20.8 (1.9)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)	1.4 (0.4)
19-29	692	17.0 (1.7)	41.3 (2.5)	0.0 (-)	0.7 (0.4)	1.3 (0.5)
30-39	1,148	21.9 (1.5)	29.7 (1.6)	0.3 (0.2)	1.0 (0.3)	2.0 (0.5)
40-49	1,103	20.8 (1.5)	18.1 (1.5)	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)	2.9 (0.6)
50-59	1,107	24.2 (1.6)	12.6 (1.3)	0.4 (0.2)	0.1 (0.1)	2.1 (0.5)
60-69	999	19.5 (1.6)	7.8 (1.0)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	1.8 (0.6)
70+	895	14.5 (1.7)	3.4 (0.6)	0.1 (0.1)	0.3 (0.2)	1.4 (0.4)
1-2	243	29.3 (3.3)	5.6 (1.9)	0.1 (0.1)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
3-5	351	15.6 (2.3)	11.1 (1.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.2 (0.2)
6-11	779	25.6 (1.8)	9.5 (1.2)	0.0 (-)	0.0 (-)	1.4 (0.5)
12-18	702	20.2 (2.0)	22.9 (2.2)	0.4 (0.3)	0.1 (0.1)	1.0 (0.4)
19-29	692	17.0 (1.7)	41.3 (2.5)	0.0 (-)	0.7 (0.4)	1.3 (0.5)
30-49	2,251	21.3 (1.1)	23.8 (1.1)	0.3 (0.1)	0.6 (0.2)	2.5 (0.4)
50-64	1,613	22.4 (1.3)	12.1 (1.0)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)	2.1 (0.5)
65+	1,388	17.2 (1.4)	3.8 (0.5)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	1.4 (0.4)
거주지역						
동	6,343	20.8 (0.7)	21.9 (0.8)	0.2 (0.1)	0.4 (0.1)	1.7 (0.2)
읍면	1,676	19.8 (1.2)	14.7 (1.4)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	1.9 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,952	17.2 (1.2)	19.2 (1.4)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1.0 (0.2)
중하	1,987	20.4 (1.2)	20.2 (1.2)	0.1 (0.1)	0.7 (0.3)	1.8 (0.4)
중상	2,000	21.7 (1.4)	20.5 (1.5)	0.3 (0.1)	0.3 (0.2)	2.3 (0.5)
상	1,979	23.6 (1.2)	21.5 (1.4)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	2.1 (0.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,343	20.7 (0.7)	21.8 (0.8)	0.2 (0.1)	0.4 (0.1)	1.7 (0.2)
읍면	1,676	20.3 (1.3)	19.0 (1.6)	0.2 (0.1)	0.2 (0.2)	1.7 (0.6)
소득수준(표준화)						
하	1,952	17.1 (1.2)	19.7 (1.2)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1.0 (0.2)
중하	1,987	20.4 (1.2)	20.6 (1.1)	0.1 (0.1)	0.7 (0.3)	1.8 (0.4)
중상	2,000	21.7 (1.4)	21.7 (1.4)	0.3 (0.2)	0.3 (0.2)	2.4 (0.5)
상	1,979	23.8 (1.3)	22.5 (1.4)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	1.9 (0.4)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수

(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N[5]	분율(표준오차)
1세이상	3.3 (0.3)	0.1 (0.1)	7,056[6]	89.4 (0.5)
19세이상	2.4 (0.3)	0.0 (-)	5,944	89.6 (0.6)
연령(세)				
1-9	12.5 (1.3)	0.7 (0.3)	141[7]	81.2 (4.2)
10-18	2.5 (0.6)	0.3 (0.3)	971	88.9 (1.1)
19-29	2.5 (0.7)	0.0 (-)	692	89.4 (1.3)
30-39	2.3 (0.5)	0.0 (-)	1,148	94.0 (0.8)
40-49	2.5 (0.6)	0.0 (-)	1,103	91.2 (1.1)
50-59	3.1 (0.6)	0.0 (-)	1,107	92.8 (0.9)
60-69	2.7 (0.7)	0.0 (-)	999	85.4 (1.3)
70+	0.9 (0.3)	0.0 (-)	895	75.1 (1.9)
1-2	24.6 (3.5)	1.9 (1.1)	-	- -
3-5	12.8 (2.1)	0.4 (0.4)	-	- -
6-11	6.0 (1.0)	0.2 (0.2)	410[8]	82.4 (2.2)
12-18	2.0 (0.6)	0.4 (0.4)	702	90.4 (1.2)
19-29	2.5 (0.7)	0.0 (-)	692	89.4 (1.3)
30-49	2.4 (0.4)	0.0 (-)	2,251	92.6 (0.8)
50-64	3.2 (0.5)	0.0 (-)	1,613	91.8 (0.8)
65+	1.2 (0.5)	0.0 (-)	1,388	77.1 (1.4)
거주지역				
동	3.3 (0.3)	0.1 (0.1)	5,536	89.9 (0.6)
읍면	3.4 (0.7)	0.0 (-)	1,520	87.8 (1.1)
소득수준				
하	3.3 (0.5)	0.2 (0.2)	1,599	88.1 (0.9)
중하	3.2 (0.5)	0.1 (0.1)	1,623	89.4 (1.0)
중상	3.3 (0.5)	0.1 (0.1)	1,610	90.5 (0.9)
상	3.7 (0.6)	0.0 (-)	1,634	90.1 (0.9)
거주지역(표준화)				
동	3.5 (0.3)	0.1 (0.1)	5,536	89.8 (0.6)
읍면	3.7 (0.8)	0.0 (-)	1,520	89.5 (1.2)
소득수준(표준화)				
하	3.4 (0.5)	0.2 (0.1)	1,599	88.3 (0.9)
중하	3.5 (0.5)	0.1 (0.1)	1,623	89.5 (1.0)
중상	3.6 (0.5)	0.1 (0.1)	1,610	90.6 (0.9)
상	3.9 (0.6)	0.1 (0.1)	1,634	90.8 (0.9)

표 2-II-42. 영양소별 영양섭취기준[1] 이상 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	3,550	25.5 (0.9)	22.5 (1.0)	0.2 (0.1)	0.7 (0.2)	2.2 (0.3)
19세이상	2,475	25.8 (1.0)	24.4 (1.2)	0.3 (0.1)	0.8 (0.2)	2.5 (0.4)
연령(세)						
1-9	552	29.0 (2.4)	8.1 (1.3)	0.0 (-)[4]	0.0 (-)	0.4 (0.3)
10-18	523	21.5 (2.3)	21.4 (2.5)	0.3 (0.3)	0.2 (0.1)	1.5 (0.6)
19-29	270	22.2 (2.9)	42.9 (3.7)	0.0 (-)	1.1 (0.8)	2.1 (0.9)
30-39	445	31.1 (2.4)	32.7 (2.5)	0.3 (0.3)	1.7 (0.6)	2.4 (0.8)
40-49	478	25.0 (2.1)	19.7 (2.3)	0.4 (0.3)	0.6 (0.3)	4.0 (1.0)
50-59	442	30.2 (2.5)	14.7 (2.1)	0.4 (0.3)	0.1 (0.1)	1.6 (0.6)
60-69	451	22.2 (2.2)	10.9 (1.7)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	2.2 (0.9)
70+	389	15.8 (2.6)	4.7 (1.2)	0.0 (-)	0.7 (0.5)	2.2 (0.8)
1-2	115	35.5 (4.7)	5.4 (2.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
3-5	172	18.9 (3.4)	8.6 (2.7)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.0 (-)
6-11	407	30.3 (2.6)	11.0 (1.9)	0.0 (-)	0.0 (-)	2.2 (0.8)
12-18	381	20.3 (2.6)	23.0 (2.8)	0.4 (0.4)	0.2 (0.2)	0.8 (0.5)
19-29	270	22.2 (2.9)	42.9 (3.7)	0.0 (-)	1.1 (0.8)	2.1 (0.9)
30-49	923	28.0 (1.7)	26.2 (1.7)	0.4 (0.2)	1.2 (0.3)	3.2 (0.6)
50-64	673	27.7 (2.0)	14.4 (1.7)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)	1.9 (0.6)
65+	609	19.4 (2.0)	5.8 (1.0)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	2.0 (0.6)
거주지역						
동	2,810	25.1 (1.0)	24.1 (1.2)	0.2 (0.1)	0.8 (0.2)	2.1 (0.3)
읍면	740	27.0 (1.8)	16.7 (1.8)	0.3 (0.2)	0.3 (0.2)	2.4 (0.8)
소득수준[2]						
하	874	22.1 (1.8)	22.2 (2.0)	0.3 (0.2)	0.4 (0.3)	0.9 (0.3)
중하	876	24.3 (1.9)	22.4 (1.9)	0.2 (0.2)	1.1 (0.5)	2.2 (0.7)
중상	877	27.7 (2.2)	22.9 (2.2)	0.3 (0.2)	0.5 (0.3)	2.8 (0.8)
상	883	28.1 (1.8)	22.0 (2.0)	0.2 (0.1)	0.7 (0.3)	2.9 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,810	24.9 (1.0)	23.6 (1.1)	0.2 (0.1)	0.8 (0.2)	2.1 (0.3)
읍면	740	28.0 (2.0)	19.8 (2.1)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	2.4 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	874	22.0 (1.8)	23.0 (1.7)	0.3 (0.2)	0.4 (0.3)	1.0 (0.3)
중하	876	24.2 (1.9)	22.4 (1.8)	0.1 (0.1)	1.2 (0.6)	2.3 (0.7)
중상	877	27.4 (2.2)	23.2 (2.0)	0.3 (0.2)	0.5 (0.3)	2.8 (0.8)
상	883	28.2 (1.8)	22.5 (2.0)	0.2 (0.1)	0.7 (0.3)	2.8 (0.7)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수

(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N[5]	분율(표준오차)
1세이상	4.0 (0.4)	0.2 (0.1)	3,071[6]	95.1 (0.5)
19세이상	3.1 (0.4)	0.0 (-)	2,475	95.4 (0.5)
연령(세)				
1-9	13.1 (1.7)	1.2 (0.6)	73[7]	82.2 (5.7)
10-18	3.3 (0.9)	0.6 (0.6)	523	94.4 (1.0)
19-29	3.8 (1.2)	0.0 (-)	270	94.5 (1.5)
30-39	3.4 (0.8)	0.0 (-)	445	98.5 (0.7)
40-49	2.8 (0.8)	0.0 (-)	478	95.4 (1.2)
50-59	2.9 (0.9)	0.0 (-)	442	96.9 (0.9)
60-69	2.8 (0.9)	0.0 (-)	451	92.6 (1.5)
70+	1.5 (0.8)	0.0 (-)	389	88.5 (1.8)
1-2	21.2 (4.7)	3.6 (2.0)	-	- -
3-5	15.5 (2.7)	0.8 (0.8)	-	- -
6-11	6.7 (1.4)	0.2 (0.2)	215[8]	86.0 (2.8)
12-18	3.0 (1.1)	0.7 (0.7)	381	95.9 (0.9)
19-29	3.8 (1.2)	0.0 (-)	270	94.5 (1.5)
30-49	3.1 (0.6)	0.0 (-)	923	97.0 (0.7)
50-64	3.3 (0.7)	0.0 (-)	673	96.8 (0.8)
65+	1.2 (0.7)	0.0 (-)	609	88.1 (1.4)
거주지역				
동	4.0 (0.4)	0.2 (0.1)	2,410	95.1 (0.6)
읍면	4.1 (0.9)	0.0 (-)	661	95.0 (0.9)
소득수준				
하	3.9 (0.7)	0.4 (0.3)	696	93.7 (0.8)
중하	4.1 (0.7)	0.2 (0.1)	685	95.4 (1.0)
중상	4.1 (0.8)	0.1 (0.1)	686	95.3 (1.0)
상	3.9 (0.9)	0.0 (-)	698	95.9 (0.9)
거주지역(표준화)				
동	4.1 (0.4)	0.2 (0.1)	2,410	95.0 (0.6)
읍면	4.3 (0.9)	0.0 (-)	661	95.6 (1.1)
소득수준(표준화)				
하	4.0 (0.7)	0.3 (0.3)	696	93.8 (0.8)
중하	4.4 (0.8)	0.3 (0.2)	685	95.4 (1.1)
중상	4.4 (0.8)	0.2 (0.1)	686	95.2 (1.0)
상	4.1 (0.9)	0.0 (-)	698	96.0 (0.9)

표 2-II-43. 영양소별 영양섭취기준[1] 이상 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	4,469	15.6 (0.7)	18.2 (0.8)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.3 (0.2)
19세이상	3,469	14.7 (0.8)	19.0 (0.9)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.5 (0.3)
연령(세)						
1-9	552	17.5 (1.9)	8.8 (1.3)	0.0 (-)[4]	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
10-18	448	20.8 (2.6)	20.0 (2.6)	0.3 (0.3)	0.0 (-)	1.2 (0.5)
19-29	422	11.6 (1.7)	39.5 (2.9)	0.0 (-)	0.3 (0.3)	0.6 (0.3)
30-39	703	12.2 (1.5)	26.4 (2.1)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)	1.6 (0.6)
40-49	625	16.4 (1.8)	16.4 (2.0)	0.0 (-)	0.0 (-)	1.7 (0.6)
50-59	665	18.2 (2.0)	10.5 (1.3)	0.3 (0.2)	0.0 (-)	2.5 (0.7)
60-69	548	17.1 (1.9)	5.0 (1.2)	0.0 (-)	0.0 (-)	1.4 (0.6)
70+	506	13.7 (1.8)	2.6 (0.6)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	0.9 (0.3)
1-2	128	22.4 (4.2)	5.9 (2.4)	0.1 (0.1)	0.5 (0.5)	0.1 (0.1)
3-5	179	12.2 (3.0)	13.7 (2.7)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.3 (0.3)
6-11	372	20.7 (2.5)	7.9 (1.5)	0.0 (-)	0.0 (-)	0.5 (0.4)
12-18	321	20.0 (2.9)	22.8 (3.2)	0.4 (0.4)	0.0 (-)	1.1 (0.6)
19-29	422	11.6 (1.7)	39.5 (2.9)	0.0 (-)	0.3 (0.3)	0.6 (0.3)
30-49	1,328	14.4 (1.2)	21.3 (1.5)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.7 (0.4)
50-64	940	17.2 (1.6)	9.8 (1.1)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	2.3 (0.6)
65+	779	15.7 (1.5)	2.4 (0.5)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	1.0 (0.3)
거주지역						
동	3,533	16.5 (0.8)	19.7 (1.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.3 (0.2)
읍면	936	12.7 (1.5)	12.8 (1.4)	0.2 (0.1)	0.0 (-)	1.4 (0.5)
소득수준[2]						
하	1,078	12.1 (1.3)	16.0 (1.5)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	1.1 (0.4)
중하	1,111	16.6 (1.4)	18.0 (1.8)	0.0 (-)	0.2 (0.2)	1.3 (0.4)
중상	1,123	15.7 (1.5)	18.0 (1.6)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	1.9 (0.5)
상	1,096	19.0 (1.5)	21.0 (1.7)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	1.2 (0.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,533	16.5 (0.8)	20.0 (1.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.3 (0.2)
읍면	936	11.8 (1.6)	18.2 (2.1)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	1.1 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,078	12.0 (1.3)	16.3 (1.4)	0.1 (0.1)	0.0 (-)	1.1 (0.4)
중하	1,111	16.5 (1.4)	18.7 (1.7)	0.0 (-)	0.2 (0.2)	1.3 (0.4)
중상	1,123	15.8 (1.6)	20.4 (1.7)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)	1.8 (0.5)
상	1,096	19.0 (1.4)	22.7 (1.8)	0.2 (0.2)	0.0 (-)	1.0 (0.3)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수

(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N[5]	분율(표준오차)
1세이상	2.7 (0.3)	0.0 (-)	3,985[6]	83.8 (0.8)
19세이상	1.8 (0.3)	0.0 (-)	3,469	84.0 (0.9)
연령(세)				
1-9	11.8 (1.9)	0.3 (0.2)	68[7]	80.1 (5.8)
10-18	1.7 (0.6)	0.0 (-)	448	82.4 (2.0)
19-29	1.1 (0.5)	0.0 (-)	422	84.2 (1.9)
30-39	1.2 (0.4)	0.0 (-)	703	89.3 (1.5)
40-49	2.1 (0.7)	0.0 (-)	625	86.8 (1.9)
50-59	3.3 (0.8)	0.0 (-)	665	88.7 (1.4)
60-69	2.6 (0.8)	0.0 (-)	548	78.9 (2.1)
70+	0.6 (0.3)	0.0 (-)	506	66.8 (2.8)
1-2	28.4 (4.9)	0.1 (0.1)	-	- -
3-5	10.0 (2.9)	0.0 (-)	-	- -
6-11	5.2 (1.3)	0.3 (0.3)	195[8]	78.8 (3.6)
12-18	0.7 (0.4)	0.0 (-)	321	83.6 (2.3)
19-29	1.1 (0.5)	0.0 (-)	422	84.2 (1.9)
30-49	1.7 (0.4)	0.0 (-)	1,328	88.0 (1.3)
50-64	3.1 (0.7)	0.0 (-)	940	86.9 (1.2)
65+	1.3 (0.4)	0.0 (-)	779	69.6 (2.2)
거주지역				
동	2.7 (0.4)	0.0 (-)	3,126	84.6 (0.8)
읍면	2.7 (0.7)	0.0 (-)	859	80.7 (2.1)
소득수준				
하	2.6 (0.5)	0.0 (-)	903	82.4 (1.5)
중하	2.3 (0.5)	0.0 (-)	938	83.5 (1.5)
중상	2.5 (0.5)	0.0 (-)	924	85.7 (1.4)
상	3.4 (0.6)	0.1 (0.1)	936	84.3 (1.5)
거주지역(표준화)				
동	2.8 (0.4)	0.0 (-)	3,126	84.7 (0.9)
읍면	3.0 (0.8)	0.0 (-)	859	83.1 (2.2)
소득수준(표준화)				
하	2.8 (0.6)	0.0 (-)	903	83.0 (1.4)
중하	2.5 (0.6)	0.0 (-)	938	83.7 (1.5)
중상	2.7 (0.6)	0.0 (-)	924	86.2 (1.4)
상	3.7 (0.7)	0.1 (0.1)	936	85.7 (1.5)

표 2-II-44. 영양섭취부족자[1] 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	10,400	19.3 (0.8)	9,968	18.4 (0.7)	8,930	11.6 (0.5)	4,091	17.1 (0.8)	8,631	13.8 (0.5)	9,391	14.2 (0.5)	8,019	9.9 (0.5)
1세이상(표준화)[2]	10,400	19.5 (0.8)	9,968	18.5 (0.7)	8,930	11.6 (0.5)	4,091	17.1 (0.8)	8,631	13.7 (0.5)	9,391	14.2 (0.5)	8,019	10.0 (0.5)
연령(세)														
1-2	288	20.6 (2.8)	249	15.7 (2.5)	217	8.7 (2.2)	119	18.1 (3.5)	245	7.6 (1.8)	272	8.2 (1.6)	243	4.9 (1.5)
3-5	524	19.2 (2.5)	500	16.8 (2.0)	403	7.1 (1.3)	190	15.5 (3.1)	400	6.7 (1.6)	382	7.4 (1.5)	351	7.1 (1.6)
6-11	953	14.3 (1.6)	1,113	16.1 (1.3)	889	6.7 (1.1)	473	11.3 (1.8)	954	6.8 (0.9)	881	7.9 (1.4)	779	6.6 (1.2)
12-18	1,134	22.7 (1.8)	1,014	21.5 (1.7)	895	14.5 (1.3)	370	19.9 (2.3)	758	20.0 (1.6)	882	21.9 (1.6)	702	15.3 (1.6)
19-29	1,550	19.6 (1.3)	1,370	20.8 (1.4)	1,045	16.0 (1.3)	331	21.8 (2.5)	763	20.7 (1.8)	946	19.2 (1.6)	692	14.9 (1.5)
30-49	3,327	15.6 (0.9)	3,406	15.5 (0.9)	3,025	10.2 (0.7)	1,205	14.1 (1.1)	2,511	11.2 (0.7)	2,670	11.9 (0.7)	2,251	8.2 (0.7)
50-64	1,650	22.9 (1.6)	1,400	17.4 (1.4)	1,452	9.7 (0.9)	692	13.7 (1.5)	1,542	9.3 (0.8)	1,736	9.1 (0.9)	1,613	5.7 (0.7)
65+	974	28.7 (2.0)	916	27.8 (1.9)	1,004	15.8 (1.5)	711	27.5 (2.2)	1,458	20.5 (1.4)	1,622	22.6 (1.2)	1,388	14.3 (1.2)
거주지역														
동	6,597	17.6 (0.8)	7,873	18.0 (0.8)	7,191	11.4 (0.6)	2,946	17.4 (0.9)	6,536	13.6 (0.6)	7,137	13.9 (0.6)	6,343	10.0 (0.5)
읍면	3,803	25.3 (1.8)	2,095	20.0 (1.6)	1,739	12.3 (1.2)	1,145	16.2 (1.6)	2,095	14.6 (1.2)	2,254	15.7 (1.0)	1,676	9.6 (1.2)
소득수준[3]														
하	2,483	25.1 (1.5)	2,137	23.8 (1.5)	2,346	13.7 (0.9)	976	20.4 (1.6)	2,067	18.2 (1.2)	2,339	19.3 (1.0)	1,952	13.2 (1.1)
중하	2,655	19.2 (1.1)	2,269	20.6 (1.2)	2,256	11.8 (0.9)	976	15.8 (1.6)	2,085	13.6 (1.0)	2,302	14.9 (0.9)	1,987	10.9 (1.0)
중상	2,582	17.7 (1.0)	2,435	15.6 (1.0)	2,141	9.6 (0.8)	969	18.6 (1.6)	2,115	12.0 (0.8)	2,300	12.3 (0.9)	2,000	7.3 (0.8)
상	2,680	16.3 (1.0)	2,550	13.9 (0.8)	2,100	11.0 (0.9)	958	13.2 (1.4)	2,118	10.6 (0.9)	2,348	10.2 (0.7)	1,979	7.6 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	6,597	18.1 (0.8)	7,873	18.4 (0.8)	7,191	11.5 (0.6)	2,946	17.5 (1.0)	6,536	13.6 (0.6)	7,137	14.0 (0.6)	6,343	10.0 (0.5)
읍면	3,803	24.1 (1.9)	2,095	19.1 (1.6)	1,739	12.0 (1.3)	1,145	15.7 (1.5)	2,095	13.8 (1.5)	2,254	15.2 (1.0)	1,676	9.3 (1.3)
소득수준(표준화)														
하	2,483	24.9 (1.4)	2,137	23.5 (1.4)	2,346	13.8 (0.9)	976	20.3 (1.6)	2,067	18.1 (1.1)	2,339	19.2 (1.0)	1,952	13.2 (1.1)
중하	2,655	19.4 (1.1)	2,269	20.7 (1.2)	2,256	11.7 (0.9)	976	16.0 (1.6)	2,085	13.8 (1.0)	2,302	14.8 (0.9)	1,987	11.2 (1.0)
중상	2,582	18.3 (1.0)	2,435	16.0 (1.0)	2,141	9.7 (0.8)	969	19.1 (1.7)	2,115	12.1 (0.9)	2,300	12.3 (0.9)	2,000	7.4 (0.8)
상	2,680	16.5 (1.0)	2,550	14.2 (0.8)	2,100	11.1 (0.9)	958	13.1 (1.4)	2,118	10.7 (0.9)	2,348	10.2 (0.7)	1,979	7.2 (0.7)
남자														
1세이상	4,984	14.9 (0.8)	4,760	14.2 (0.7)	4,167	9.4 (0.6)	1,821	11.3 (0.9)	3,692	10.8 (0.6)	4,182	10.1 (0.6)	3,550	6.8 (0.5)
1세이상(표준화)	4,984	15.2 (0.8)	4,760	14.5 (0.8)	4,167	9.5 (0.6)	1,821	11.4 (0.9)	3,692	10.9 (0.7)	4,182	10.2 (0.6)	3,550	6.8 (0.5)
연령(세)														
1-2	154	18.9 (3.1)	127	15.2 (3.4)	113	4.9 (2.7)	72	16.0 (4.0)	105	8.8 (3.2)	158	5.7 (2.0)	115	2.8 (2.0)
3-5	263	16.7 (2.7)	269	13.0 (2.2)	211	6.6 (1.9)	101	16.9 (5.3)	222	7.2 (2.3)	204	6.3 (1.9)	172	4.7 (1.8)
6-11	519	11.7 (1.8)	597	13.3 (1.5)	447	6.6 (1.4)	245	12.0 (2.7)	495	5.0 (1.0)	452	7.1 (1.4)	407	6.3 (1.4)
12-18	568	21.1 (2.2)	514	18.9 (2.0)	478	15.2 (1.8)	205	20.9 (3.3)	390	19.8 (2.2)	454	19.3 (2.1)	381	16.3 (2.3)
19-29	707	15.6 (1.6)	615	17.3 (1.8)	451	12.5 (1.7)	133	13.6 (3.1)	282	16.6 (2.4)	418	14.9 (2.3)	270	10.3 (2.0)
30-49	1,642	10.8 (0.9)	1,641	10.6 (0.9)	1,390	7.0 (0.9)	490	5.0 (1.1)	977	7.8 (1.0)	1,064	6.2 (0.8)	923	3.5 (0.7)
50-64	753	15.8 (1.7)	643	13.8 (1.6)	675	8.7 (1.2)	284	7.1 (1.7)	655	6.7 (1.1)	759	6.2 (1.1)	673	3.5 (0.8)
65+	378	24.7 (2.6)	354	20.9 (2.5)	402	13.8 (2.2)	291	24.2 (2.9)	566	15.2 (1.6)	673	17.3 (1.6)	609	10.3 (1.4)

1) 영양섭취부족자 분율 : 에너지 섭취 수준이 필요추정량(또는 영양권장량)[4]의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량(또는 영양권장량의 75%) 미만인 분율

2) 연령표준화 : 2005년 추계인구로 표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 필요추정량, 평균필요량
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

(계속 : 영양섭취부족자 분율 추이, 성별, 만1세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
거주지역														
동	3,194	13.2 (0.9)	3,764	13.7 (0.8)	3,342	9.3 (0.7)	1,297	11.3 (1.1)	2,776	10.4 (0.7)	3,169	10.0 (0.7)	2,810	6.9 (0.6)
읍면	1,790	21.4 (1.9)	996	16.4 (1.8)	825	10.0 (1.2)	524	11.1 (1.4)	916	12.3 (1.5)	1,013	10.6 (1.1)	740	6.2 (1.0)
소득수준														
하	1,211	22.3 (1.6)	1,010	18.9 (1.6)	1,111	12.0 (1.2)	436	12.9 (1.8)	901	15.0 (1.5)	1,051	14.5 (1.3)	874	10.3 (1.4)
중하	1,249	13.9 (1.3)	1,080	16.3 (1.4)	1,032	10.3 (1.2)	444	9.2 (1.8)	886	11.5 (1.4)	1,017	10.9 (1.2)	876	7.1 (1.2)
중상	1,261	13.2 (1.2)	1,201	11.8 (1.2)	998	7.4 (1.0)	431	14.3 (2.1)	900	9.0 (1.2)	1,032	9.2 (1.1)	877	4.8 (0.9)
상	1,263	11.7 (1.1)	1,192	10.7 (1.0)	987	8.1 (1.0)	429	7.7 (1.8)	911	7.6 (1.1)	1,038	5.2 (0.7)	883	4.1 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	3,194	13.5 (0.9)	3,764	14.1 (0.9)	3,342	9.5 (0.7)	1,297	11.6 (1.1)	2,776	10.6 (0.7)	3,169	10.1 (0.7)	2,810	6.9 (0.6)
읍면	1,790	20.6 (1.8)	996	15.8 (1.8)	825	9.8 (1.3)	524	10.8 (1.6)	916	12.5 (1.9)	1,013	10.2 (1.2)	740	5.7 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	1,211	22.2 (1.5)	1,010	19.0 (1.6)	1,111	12.2 (1.2)	436	13.3 (1.7)	901	15.1 (1.5)	1,051	14.8 (1.3)	874	10.4 (1.4)
중하	1,249	13.8 (1.3)	1,080	16.5 (1.4)	1,032	10.2 (1.1)	444	9.3 (1.7)	886	11.9 (1.4)	1,017	10.8 (1.1)	876	7.3 (1.2)
중상	1,261	13.8 (1.2)	1,201	12.3 (1.2)	998	7.5 (1.0)	431	14.4 (2.2)	900	9.2 (1.2)	1,032	9.3 (1.1)	877	5.0 (0.9)
상	1,263	12.2 (1.1)	1,192	10.8 (1.0)	987	8.2 (1.1)	429	7.8 (1.6)	911	7.6 (1.1)	1,038	5.2 (0.7)	883	4.0 (0.7)
여자														
1세이상	5,416	23.4 (0.9)	5,208	22.1 (0.9)	4,763	13.7 (0.7)	2,270	23.0 (1.2)	4,939	16.8 (0.7)	5,209	18.4 (0.7)	4,469	13.1 (0.7)
1세이상(표준화)	5,416	23.5 (0.9)	5,208	22.0 (0.8)	4,763	13.7 (0.7)	2,270	22.7 (1.2)	4,939	16.6 (0.6)	5,209	18.3 (0.7)	4,469	13.1 (0.7)
연령(세)														
1-2	134	22.5 (4.4)	122	16.2 (3.8)	104	12.9 (3.7)	47	21.0 (6.1)	140	6.7 (1.9)	114	10.9 (2.9)	128	7.2 (2.4)
3-5	261	22.0 (3.0)	231	21.3 (3.1)	192	7.6 (2.0)	89	14.2 (4.0)	178	6.1 (2.0)	178	8.4 (2.2)	179	9.7 (2.7)
6-11	434	17.1 (2.3)	516	19.3 (1.9)	442	6.8 (1.5)	228	10.5 (2.3)	459	8.8 (1.5)	429	8.7 (1.9)	372	7.0 (1.8)
12-18	566	24.3 (2.2)	500	24.1 (2.4)	417	13.6 (1.7)	165	18.7 (3.6)	368	20.3 (2.0)	428	24.9 (2.6)	321	14.0 (2.2)
19-29	843	22.9 (1.7)	755	23.7 (1.9)	594	19.7 (1.9)	198	30.2 (3.8)	481	25.1 (2.1)	528	23.8 (2.1)	422	19.8 (2.5)
30-49	1,685	20.5 (1.2)	1,765	19.9 (1.2)	1,635	13.6 (1.1)	715	23.6 (1.8)	1,534	14.8 (1.1)	1,606	17.8 (1.1)	1,328	13.1 (1.3)
50-64	897	29.4 (2.0)	757	20.3 (1.8)	777	10.6 (1.4)	408	20.1 (2.4)	887	11.9 (1.2)	977	11.9 (1.3)	940	7.8 (1.2)
65+	596	31.1 (2.3)	562	32.1 (2.5)	602	17.2 (1.9)	420	29.7 (3.1)	892	24.2 (1.9)	949	26.1 (1.6)	779	17.1 (1.9)
거주지역														
동	3,403	21.9 (1.1)	4,109	21.9 (1.0)	3,849	13.6 (0.8)	1,649	23.3 (1.4)	3,760	16.7 (0.7)	3,968	17.9 (0.8)	3,533	13.2 (0.8)
읍면	2,013	28.9 (1.9)	1,099	23.2 (1.8)	914	14.6 (1.5)	621	21.9 (2.4)	1,179	17.0 (1.5)	1,241	20.9 (1.6)	936	12.9 (1.7)
소득수준														
하	1,272	27.9 (1.8)	1,127	28.0 (1.9)	1,235	15.5 (1.2)	540	28.0 (2.8)	1,166	21.5 (1.7)	1,288	24.3 (1.7)	1,078	16.1 (1.5)
중하	1,406	24.0 (1.4)	1,189	24.5 (1.7)	1,224	13.3 (1.4)	532	22.9 (2.1)	1,199	15.8 (1.3)	1,285	18.9 (1.3)	1,111	14.7 (1.4)
중상	1,321	22.4 (1.4)	1,234	19.3 (1.3)	1,143	11.7 (1.1)	538	22.9 (2.4)	1,215	15.0 (1.2)	1,268	15.5 (1.2)	1,123	9.9 (1.2)
상	1,417	20.5 (1.4)	1,358	16.7 (1.1)	1,113	14.0 (1.4)	529	18.9 (2.0)	1,207	13.6 (1.2)	1,310	15.2 (1.2)	1,096	11.1 (1.2)
거주지역(표준화)														
동	3,403	22.3 (1.1)	4,109	22.1 (0.9)	3,849	13.5 (0.8)	1,649	23.1 (1.3)	3,760	16.6 (0.7)	3,968	17.8 (0.8)	3,533	13.1 (0.8)
읍면	2,013	27.4 (2.1)	1,099	22.3 (1.8)	914	14.7 (1.6)	621	21.4 (2.5)	1,179	14.9 (1.7)	1,241	20.9 (1.9)	936	13.3 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	1,272	27.7 (1.8)	1,127	27.3 (1.8)	1,235	15.6 (1.2)	540	27.7 (2.8)	1,166	21.3 (1.7)	1,288	23.8 (1.7)	1,078	16.1 (1.5)
중하	1,406	24.2 (1.4)	1,189	24.5 (1.6)	1,224	13.2 (1.3)	532	22.9 (2.0)	1,199	15.7 (1.3)	1,285	19.1 (1.4)	1,111	15.0 (1.4)
중상	1,321	22.7 (1.4)	1,234	19.4 (1.3)	1,143	11.7 (1.1)	538	23.5 (2.5)	1,215	14.8 (1.2)	1,268	15.1 (1.2)	1,123	9.7 (1.2)
상	1,417	20.5 (1.5)	1,358	17.0 (1.1)	1,113	13.8 (1.3)	529	18.8 (1.9)	1,207	13.7 (1.2)	1,310	15.1 (1.2)	1,096	10.2 (1.1)

표 2-II-45. 영양섭취부족자 분율[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	8,019	9.9 (0.5)	3,550	6.8 (0.5)	4,469	13.1 (0.7)
19세이상	5,944	9.8 (0.5)	2,475	5.6 (0.6)	3,469	13.8 (0.8)
연령(세)						
1-9	1,104	6.5 (0.9)	552	5.5 (1.1)	552	7.6 (1.5)
10-18	971	13.5 (1.3)	523	14.2 (1.9)	448	12.7 (1.9)
19-29	692	14.9 (1.5)	270	10.3 (2.0)	422	19.8 (2.5)
30-39	1,148	7.4 (0.8)	445	2.5 (0.8)	703	12.5 (1.5)
40-49	1,103	8.9 (1.1)	478	4.4 (1.1)	625	13.6 (1.8)
50-59	1,107	5.7 (0.9)	442	3.5 (0.9)	665	7.8 (1.4)
60-69	999	6.8 (1.0)	451	5.1 (1.4)	548	8.4 (1.4)
70+	895	17.4 (1.7)	389	12.1 (2.1)	506	20.6 (2.4)
1-2	243	4.9 (1.5)	115	2.8 (2.0)	128	7.2 (2.4)
3-5	351	7.1 (1.6)	172	4.7 (1.8)	179	9.7 (2.7)
6-11	779	6.6 (1.2)	407	6.3 (1.4)	372	7.0 (1.8)
12-18	702	15.3 (1.6)	381	16.3 (2.3)	321	14.0 (2.2)
19-29	692	14.9 (1.5)	270	10.3 (2.0)	422	19.8 (2.5)
30-49	2,251	8.2 (0.7)	923	3.5 (0.7)	1,328	13.1 (1.3)
50-64	1,613	5.7 (0.7)	673	3.5 (0.8)	940	7.8 (1.2)
65+	1,388	14.3 (1.2)	609	10.3 (1.4)	779	17.1 (1.9)
거주지역						
동	6,343	10.0 (0.5)	2,810	6.9 (0.6)	3,533	13.2 (0.8)
읍면	1,676	9.6 (1.2)	740	6.2 (1.0)	936	12.9 (1.7)
소득수준[2]						
하	1,952	13.2 (1.1)	874	10.3 (1.4)	1,078	16.1 (1.5)
중하	1,987	10.9 (1.0)	876	7.1 (1.2)	1,111	14.7 (1.4)
중상	2,000	7.3 (0.8)	877	4.8 (0.9)	1,123	9.9 (1.2)
상	1,979	7.6 (0.8)	883	4.1 (0.8)	1,096	11.1 (1.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,343	10.0 (0.5)	2,810	6.9 (0.6)	3,533	13.1 (0.8)
읍면	1,676	9.3 (1.3)	740	5.7 (0.9)	936	13.3 (2.2)
소득수준(표준화)						
하	1,952	13.2 (1.1)	874	10.4 (1.4)	1,078	16.1 (1.5)
중하	1,987	11.2 (1.0)	876	7.3 (1.2)	1,111	15.0 (1.4)
중상	2,000	7.4 (0.8)	877	5.0 (0.9)	1,123	9.7 (1.2)
상	1,979	7.2 (0.7)	883	4.0 (0.7)	1,096	10.2 (1.1)

1) 영양섭취부족자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량[4]의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 평균필요량 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

표 2-II-46. 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함)[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	8,019	8.4 (0.4)	3,550	5.8 (0.5)	4,469	11.0 (0.6)
19세이상	5,944	8.3 (0.4)	2,475	4.9 (0.5)	3,469	11.5 (0.7)
연령(세)						
1-9	1,104	5.2 (0.9)	552	4.0 (1.0)	552	6.4 (1.4)
10-18	971	11.7 (1.3)	523	12.4 (1.8)	448	10.9 (1.8)
19-29	692	11.6 (1.4)	270	8.3 (1.8)	422	15.0 (2.2)
30-39	1,148	6.2 (0.8)	445	2.4 (0.8)	703	10.3 (1.4)
40-49	1,103	7.5 (1.1)	478	4.4 (1.1)	625	10.8 (1.7)
50-59	1,107	5.2 (0.8)	442	3.2 (0.9)	665	7.2 (1.4)
60-69	999	5.6 (0.9)	451	3.9 (1.3)	548	7.1 (1.3)
70+	895	16.6 (1.7)	389	10.7 (2.1)	506	20.2 (2.4)
1-2	243	3.7 (1.3)	115	1.6 (1.6)	128	5.9 (2.2)
3-5	351	4.8 (1.5)	172	2.5 (1.5)	179	7.2 (2.5)
6-11	779	5.8 (1.1)	407	5.1 (1.4)	372	6.4 (1.7)
12-18	702	13.3 (1.6)	381	14.4 (2.2)	321	11.9 (2.2)
19-29	692	11.6 (1.4)	270	8.3 (1.8)	422	15.0 (2.2)
30-49	2,251	6.9 (0.7)	923	3.4 (0.7)	1,328	10.5 (1.2)
50-64	1,613	5.2 (0.7)	673	3.1 (0.7)	940	7.3 (1.1)
65+	1,388	13.0 (1.2)	609	8.8 (1.5)	779	15.9 (1.7)
거주지역						
동	6,343	8.3 (0.4)	2,810	5.9 (0.5)	3,533	10.7 (0.7)
읍면	1,676	8.9 (1.2)	740	5.6 (1.0)	936	12.2 (1.7)
소득수준[2]						
하	1,952	11.5 (1.0)	874	9.3 (1.3)	1,078	13.9 (1.5)
중하	1,987	8.9 (0.9)	876	6.0 (1.1)	1,111	11.8 (1.4)
중상	2,000	6.0 (0.7)	877	4.0 (0.9)	1,123	8.0 (1.1)
상	1,979	6.5 (0.7)	883	3.5 (0.7)	1,096	9.7 (1.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,343	8.3 (0.4)	2,810	5.9 (0.5)	3,533	10.5 (0.7)
읍면	1,676	8.6 (1.3)	740	5.2 (0.9)	936	12.4 (2.3)
소득수준(표준화)						
하	1,952	11.4 (1.0)	874	9.2 (1.3)	1,078	13.7 (1.5)
중하	1,987	9.1 (0.9)	876	6.1 (1.0)	1,111	12.0 (1.4)
중상	2,000	6.0 (0.8)	877	4.2 (0.9)	1,123	7.6 (1.1)
상	1,979	6.1 (0.7)	883	3.4 (0.7)	1,096	8.7 (1.1)

1) 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함) : 에너지 섭취량이 필요추정량[4]의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 평균필요량 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

표 2-II-47. 에너지/지방과잉섭취자[1] 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -[3]	-	- -	8,930	7.0 (0.4)	4,091	3.5 (0.4)	8,631	4.6 (0.3)	9,391	4.7 (0.3)	8,019	7.0 (0.4)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,930	7.0 (0.4)	4,091	3.6 (0.4)	8,631	4.7 (0.3)	9,391	4.9 (0.3)	8,019	7.2 (0.4)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	217	6.1 (1.5)	119	2.4 (1.7)	245	1.1 (0.7)	272	0.6 (0.4)	243	0.9 (0.7)
3-5	-	- -	-	- -	403	5.0 (1.2)	190	0.9 (0.6)	400	2.5 (1.0)	382	1.2 (0.6)	351	3.2 (1.2)
6-11	-	- -	-	- -	889	9.3 (1.2)	473	1.6 (0.6)	954	2.4 (0.7)	881	4.1 (0.8)	779	4.0 (0.8)
12-18	-	- -	-	- -	895	7.1 (0.9)	370	2.1 (0.7)	758	2.7 (0.6)	882	2.1 (0.6)	702	8.5 (1.5)
19-29	-	- -	-	- -	1,045	9.0 (1.0)	331	5.8 (1.4)	763	7.8 (1.2)	946	8.7 (1.1)	692	10.0 (1.5)
30-49	-	- -	-	- -	3,025	8.1 (0.6)	1,205	5.1 (0.8)	2,511	6.0 (0.6)	2,670	6.1 (0.5)	2,251	9.1 (0.8)
50-64	-	- -	-	- -	1,452	4.5 (0.6)	692	1.7 (0.5)	1,542	3.5 (0.6)	1,736	3.6 (0.6)	1,613	5.5 (0.8)
65+	-	- -	-	- -	1,004	1.8 (0.5)	711	1.1 (0.5)	1,458	1.4 (0.5)	1,622	1.3 (0.3)	1,388	1.3 (0.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	7,191	7.4 (0.4)	2,946	3.5 (0.4)	6,536	4.9 (0.4)	7,137	5.0 (0.4)	6,343	7.6 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	1,739	5.1 (0.8)	1,145	3.7 (0.9)	2,095	3.2 (0.7)	2,254	3.7 (0.5)	1,676	4.9 (0.8)
소득수준[4]														
하	-	- -	-	- -	2,346	7.0 (0.8)	976	3.9 (0.8)	2,067	3.9 (0.7)	2,339	3.9 (0.6)	1,952	5.7 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,256	7.0 (0.7)	976	3.6 (0.8)	2,085	4.3 (0.6)	2,302	4.2 (0.6)	1,987	7.5 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	2,141	6.2 (0.6)	969	3.7 (0.8)	2,115	4.2 (0.6)	2,300	5.3 (0.6)	2,000	7.6 (1.1)
상	-	- -	-	- -	2,100	7.8 (0.7)	958	3.0 (0.7)	2,118	5.8 (0.6)	2,348	5.6 (0.6)	1,979	7.2 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	7,191	7.2 (0.4)	2,946	3.5 (0.4)	6,536	4.8 (0.4)	7,137	5.0 (0.4)	6,343	7.5 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	1,739	5.8 (1.0)	1,145	3.9 (0.9)	2,095	4.0 (0.8)	2,254	4.0 (0.5)	1,676	6.4 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,346	6.9 (0.8)	976	3.9 (0.8)	2,067	3.9 (0.7)	2,339	3.9 (0.6)	1,952	5.7 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,256	7.0 (0.7)	976	3.8 (0.8)	2,085	4.4 (0.6)	2,302	4.3 (0.6)	1,987	7.6 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	2,141	6.3 (0.6)	969	3.7 (0.8)	2,115	4.2 (0.6)	2,300	5.6 (0.6)	2,000	7.9 (1.1)
상	-	- -	-	- -	2,100	7.8 (0.6)	958	3.1 (0.7)	2,118	5.9 (0.7)	2,348	5.8 (0.7)	1,979	7.4 (0.8)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,167	8.0 (0.6)	1,821	4.9 (0.7)	3,692	6.4 (0.6)	4,182	6.9 (0.5)	3,550	9.8 (0.7)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,167	7.9 (0.5)	1,821	4.9 (0.7)	3,692	6.4 (0.6)	4,182	6.9 (0.5)	3,550	9.8 (0.7)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	113	5.1 (2.0)	72	1.9 (1.8)	105	2.0 (1.6)	158	0.8 (0.8)	115	0.0 (-)[5]
3-5	-	- -	-	- -	211	6.7 (1.9)	101	0.9 (0.9)	222	2.9 (1.1)	204	1.6 (1.0)	172	3.8 (2.1)
6-11	-	- -	-	- -	447	8.9 (1.6)	245	1.9 (0.8)	495	3.1 (0.9)	452	4.9 (1.0)	407	3.8 (1.0)
12-18	-	- -	-	- -	478	6.6 (1.2)	205	1.0 (0.6)	390	2.3 (0.9)	454	2.2 (0.7)	381	9.6 (2.0)
19-29	-	- -	-	- -	451	10.0 (1.5)	133	7.5 (2.2)	282	11.5 (2.2)	418	11.8 (2.0)	270	14.3 (2.6)
30-49	-	- -	-	- -	1,390	9.8 (1.0)	490	7.9 (1.5)	977	8.3 (0.9)	1,064	9.0 (0.9)	923	12.9 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	675	5.5 (0.9)	284	2.9 (1.0)	655	4.9 (1.1)	759	5.8 (1.0)	673	7.7 (1.3)
65+	-	- -	-	- -	402	2.5 (0.8)	291	1.0 (0.5)	566	1.9 (1.0)	673	1.9 (0.6)	609	2.5 (0.6)

1) 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량(또는 영양권장량)[6]의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율

2) 연령표준화 : 2005년 추계인구로 표준화

3) '-' : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

6) 필요추정량, 지방적정에너지섭취비율
- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

(계속 : 에너지/지방과잉섭취자 분율 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,342	8.5 (0.6)	1,297	4.6 (0.7)	2,776	6.8 (0.6)	3,169	7.2 (0.6)	2,810	10.5 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	825	5.9 (1.3)	524	6.0 (1.8)	916	4.4 (1.2)	1,013	5.2 (0.8)	740	7.2 (1.4)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,111	8.9 (1.2)	436	6.2 (1.6)	901	6.0 (1.4)	1,051	6.1 (1.1)	874	8.5 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	1,032	8.3 (1.0)	444	4.2 (1.3)	886	6.0 (1.1)	1,017	6.4 (1.0)	876	9.7 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	998	7.3 (0.9)	431	5.6 (1.5)	900	6.8 (1.2)	1,032	7.1 (1.0)	877	10.6 (1.8)
상	-	- -	-	- -	987	7.5 (0.9)	429	4.3 (1.2)	911	7.0 (1.0)	1,038	8.1 (1.1)	883	10.2 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,342	8.3 (0.6)	1,297	4.5 (0.7)	2,776	6.7 (0.6)	3,169	7.1 (0.6)	2,810	10.2 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	825	6.3 (1.5)	524	5.9 (1.5)	916	5.1 (1.3)	1,013	5.3 (0.9)	740	8.8 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,111	8.6 (1.1)	436	6.1 (1.4)	901	5.9 (1.3)	1,051	6.0 (1.1)	874	8.5 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	1,032	8.3 (1.0)	444	4.4 (1.4)	886	6.1 (1.1)	1,017	6.4 (1.0)	876	9.6 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	998	7.4 (0.9)	431	5.6 (1.5)	900	6.7 (1.2)	1,032	7.4 (1.1)	877	10.5 (1.7)
상	-	- -	-	- -	987	7.3 (0.8)	429	4.3 (1.2)	911	7.0 (1.1)	1,038	8.2 (1.1)	883	10.3 (1.5)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,763	5.9 (0.4)	2,270	2.1 (0.4)	4,939	2.8 (0.3)	5,209	2.6 (0.2)	4,469	4.2 (0.4)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,763	6.1 (0.4)	2,270	2.2 (0.4)	4,939	2.8 (0.3)	5,209	2.7 (0.3)	4,469	4.4 (0.4)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	104	7.2 (3.3)	47	3.0 (3.0)	140	0.4 (0.4)	114	0.3 (0.3)	128	1.9 (1.4)
3-5	-	- -	-	- -	192	3.1 (1.2)	89	0.9 (0.9)	178	2.0 (1.2)	178	0.8 (0.8)	179	2.6 (1.4)
6-11	-	- -	-	- -	442	9.8 (1.5)	228	1.3 (0.9)	459	1.7 (0.6)	429	3.3 (1.0)	372	4.2 (1.2)
12-18	-	- -	-	- -	417	7.8 (1.5)	165	3.4 (1.5)	368	3.2 (0.9)	428	2.1 (0.8)	321	7.2 (1.9)
19-29	-	- -	-	- -	594	8.0 (1.4)	198	4.1 (1.5)	481	3.7 (1.0)	528	5.3 (1.0)	422	5.6 (1.1)
30-49	-	- -	-	- -	1,635	6.3 (0.7)	715	2.3 (0.7)	1,534	3.5 (0.5)	1,606	2.9 (0.4)	1,328	5.1 (0.8)
50-64	-	- -	-	- -	777	3.6 (0.7)	408	0.5 (0.3)	887	2.1 (0.6)	977	1.4 (0.5)	940	3.3 (0.8)
65+	-	- -	-	- -	602	1.3 (0.5)	420	1.2 (0.7)	892	1.1 (0.4)	949	0.8 (0.3)	779	0.4 (0.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,849	6.3 (0.5)	1,649	2.4 (0.5)	3,760	2.9 (0.4)	3,968	2.7 (0.3)	3,533	4.7 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	914	4.2 (0.6)	621	1.2 (0.4)	1,179	1.9 (0.6)	1,241	2.1 (0.4)	936	2.7 (0.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,235	5.0 (0.7)	540	1.6 (0.6)	1,166	1.7 (0.4)	1,288	1.7 (0.4)	1,078	2.8 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	1,224	5.7 (0.9)	532	3.0 (1.0)	1,199	2.5 (0.5)	1,285	2.0 (0.5)	1,111	5.4 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	1,143	5.2 (0.7)	538	1.9 (0.8)	1,215	1.8 (0.5)	1,268	3.5 (0.6)	1,123	4.6 (0.8)
상	-	- -	-	- -	1,113	8.1 (0.9)	529	1.7 (0.6)	1,207	4.5 (0.7)	1,310	3.2 (0.6)	1,096	4.1 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,849	6.3 (0.4)	1,649	2.4 (0.5)	3,760	2.9 (0.4)	3,968	2.8 (0.3)	3,533	4.7 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	914	5.2 (0.8)	621	1.4 (0.5)	1,179	2.4 (0.8)	1,241	2.5 (0.5)	936	3.7 (1.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,235	5.1 (0.7)	540	1.6 (0.6)	1,166	1.7 (0.4)	1,288	1.7 (0.4)	1,078	2.8 (0.6)
중하	-	- -	-	- -	1,224	5.8 (0.9)	532	3.1 (1.0)	1,199	2.6 (0.5)	1,285	2.3 (0.5)	1,111	5.5 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	1,143	5.3 (0.7)	538	2.0 (0.8)	1,215	1.8 (0.5)	1,268	3.6 (0.6)	1,123	5.3 (0.9)
상	-	- -	-	- -	1,113	8.3 (0.9)	529	1.8 (0.7)	1,207	4.7 (0.7)	1,310	3.4 (0.6)	1,096	4.3 (0.7)

표 2-II-48. 에너지/지방과잉섭취자 분율[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	8,019	7.0 (0.4)	3,550	9.8 (0.7)	4,469	4.2 (0.4)
19세이상	5,944	7.3 (0.5)	2,475	10.8 (0.8)	3,469	4.0 (0.4)
연령(세)						
1-9	1,104	2.7 (0.6)	552	2.9 (0.8)	552	2.4 (0.8)
10-18	971	7.9 (1.3)	523	8.6 (1.7)	448	7.1 (1.6)
19-29	692	10.0 (1.5)	270	14.3 (2.6)	422	5.6 (1.1)
30-39	1,148	10.7 (1.2)	445	15.9 (2.1)	703	5.1 (1.0)
40-49	1,103	7.6 (1.0)	478	10.0 (1.5)	625	5.1 (1.4)
50-59	1,107	6.0 (0.9)	442	8.1 (1.5)	665	3.9 (1.0)
60-69	999	3.1 (0.7)	451	5.6 (1.4)	548	0.8 (0.4)
70+	895	0.8 (0.3)	389	1.4 (0.6)	506	0.4 (0.3)
1-2	243	0.9 (0.7)	115	0.0 (-)[5]	128	1.9 (1.4)
3-5	351	3.2 (1.2)	172	3.8 (2.1)	179	2.6 (1.4)
6-11	779	4.0 (0.8)	407	3.8 (1.0)	372	4.2 (1.2)
12-18	702	8.5 (1.5)	381	9.6 (2.0)	321	7.2 (1.9)
19-29	692	10.0 (1.5)	270	14.3 (2.6)	422	5.6 (1.1)
30-49	2,251	9.1 (0.8)	923	12.9 (1.3)	1,328	5.1 (0.8)
50-64	1,613	5.5 (0.8)	673	7.7 (1.3)	940	3.3 (0.8)
65+	1,388	1.3 (0.3)	609	2.5 (0.6)	779	0.4 (0.2)
거주지역						
동	6,343	7.6 (0.5)	2,810	10.5 (0.8)	3,533	4.7 (0.5)
읍면	1,676	4.9 (0.8)	740	7.2 (1.4)	936	2.7 (0.7)
소득수준[2]						
하	1,952	5.7 (0.7)	874	8.5 (1.3)	1,078	2.8 (0.7)
중하	1,987	7.5 (0.8)	876	9.7 (1.3)	1,111	5.4 (1.0)
중상	2,000	7.6 (1.1)	877	10.6 (1.8)	1,123	4.6 (0.8)
상	1,979	7.2 (0.8)	883	10.2 (1.4)	1,096	4.1 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,343	7.5 (0.5)	2,810	10.2 (0.8)	3,533	4.7 (0.5)
읍면	1,676	6.4 (0.9)	740	8.8 (1.6)	936	3.7 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	1,952	5.7 (0.7)	874	8.5 (1.3)	1,078	2.8 (0.6)
중하	1,987	7.6 (0.8)	876	9.6 (1.3)	1,111	5.5 (1.0)
중상	2,000	7.9 (1.1)	877	10.5 (1.7)	1,123	5.3 (0.9)
상	1,979	7.4 (0.8)	883	10.3 (1.5)	1,096	4.3 (0.7)

1) 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량[4]의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 지방적정에너지섭취비율 : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2010)

5) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

표 2-III-1. 아침식사 결식률[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	18,008	21.3 (0.7)	8,176	21.4 (1.0)	17,276	20.9 (0.8)	18,786	19.9 (0.7)	16,050	20.5 (0.8)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	18,008	21.4 (0.6)	8,176	21.8 (0.9)	17,276	21.5 (0.7)	18,786	20.6 (0.6)	16,050	21.3 (0.7)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	438	14.2 (2.7)	236	8.3 (2.5)	490	6.3 (1.8)	546	10.4 (2.2)	486	4.5 (1.2)
3-5	-	- -	-	- -	802	8.3 (1.4)	378	11.1 (2.9)	804	8.6 (1.5)	764	7.6 (1.3)	702	6.5 (1.6)
6-11	-	- -	-	- -	1,796	11.2 (1.2)	950	11.4 (1.7)	1,908	9.9 (1.2)	1,761	8.8 (1.0)	1,558	9.9 (1.3)
12-18	-	- -	-	- -	1,804	24.7 (1.6)	738	30.2 (3.4)	1,520	25.8 (1.9)	1,764	27.8 (1.7)	1,406	29.3 (2.3)
19-29	-	- -	-	- -	2,116	45.4 (1.8)	662	42.5 (2.4)	1,527	45.9 (2.4)	1,887	40.6 (1.8)	1,386	40.3 (2.1)
30-49	-	- -	-	- -	6,108	22.6 (0.8)	2,403	22.7 (1.4)	5,026	22.5 (1.0)	5,342	21.7 (0.9)	4,506	24.2 (1.1)
50-64	-	- -	-	- -	2,918	9.6 (0.9)	1,386	10.2 (1.4)	3,084	9.8 (0.9)	3,472	10.1 (0.9)	3,226	10.0 (1.1)
65+	-	- -	-	- -	2,026	3.9 (0.7)	1,423	6.0 (1.1)	2,917	4.0 (0.6)	3,250	4.5 (0.6)	2,780	3.2 (0.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	14,488	22.7 (0.8)	5,893	23.1 (1.1)	13,086	22.1 (0.9)	14,277	21.2 (0.7)	12,694	22.2 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	15.2 (1.0)	2,283	15.4 (1.7)	4,190	14.8 (1.2)	4,509	14.3 (1.5)	3,356	14.1 (1.6)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	4,712	24.1 (1.3)	1,954	23.2 (1.9)	4,139	24.1 (1.8)	4,678	22.9 (1.3)	3,910	21.9 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	4,554	22.9 (1.2)	1,951	21.8 (1.8)	4,172	20.2 (1.3)	4,603	19.9 (1.2)	3,974	21.2 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	4,328	19.5 (1.1)	1,942	22.8 (1.7)	4,232	20.4 (1.3)	4,605	19.1 (1.2)	4,002	19.4 (1.3)
상	-	- -	-	- -	4,244	18.2 (1.0)	1,913	18.1 (1.9)	4,238	18.8 (1.3)	4,698	17.3 (1.0)	3,960	18.5 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	14,488	22.0 (0.7)	5,893	23.0 (1.1)	13,086	21.9 (0.8)	14,277	21.1 (0.6)	12,694	22.0 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	18.7 (1.2)	2,283	17.8 (1.6)	4,190	18.7 (1.6)	4,509	18.2 (1.5)	3,356	18.2 (1.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	4,712	23.9 (1.1)	1,954	23.2 (1.6)	4,139	24.3 (1.5)	4,678	23.1 (1.1)	3,910	22.3 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	4,554	23.0 (1.1)	1,951	22.7 (1.6)	4,172	21.1 (1.2)	4,603	20.6 (1.1)	3,974	21.8 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	4,328	19.7 (1.1)	1,942	23.2 (1.6)	4,232	20.9 (1.3)	4,605	19.9 (1.2)	4,002	20.6 (1.2)
상	-	- -	-	- -	4,244	18.6 (1.0)	1,913	18.7 (1.7)	4,238	19.4 (1.3)	4,698	18.2 (1.0)	3,960	19.5 (1.3)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	8,400	20.9 (0.9)	3,643	20.9 (1.3)	7,394	21.3 (1.1)	8,367	21.3 (0.9)	7,110	21.5 (1.0)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	8,400	20.6 (0.8)	3,643	21.0 (1.2)	7,394	21.6 (1.0)	8,367	21.6 (0.8)	7,110	21.9 (0.9)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	228	10.9 (3.1)	146	8.6 (3.3)	210	10.0 (3.5)	316	10.7 (3.0)	230	3.7 (1.5)
3-5	-	- -	-	- -	420	9.8 (2.1)	202	10.3 (2.9)	444	8.3 (2.2)	408	6.5 (1.8)	344	5.6 (1.7)
6-11	-	- -	-	- -	906	12.1 (1.6)	492	10.4 (2.0)	990	9.5 (1.3)	904	9.0 (1.3)	814	9.3 (1.7)
12-18	-	- -	-	- -	962	23.6 (2.2)	406	26.4 (3.6)	784	23.6 (2.2)	908	29.1 (2.2)	764	28.7 (2.6)
19-29	-	- -	-	- -	908	43.6 (2.5)	268	39.8 (3.5)	563	46.8 (3.3)	831	42.6 (2.7)	540	39.7 (3.1)
30-49	-	- -	-	- -	2,810	22.1 (1.2)	977	24.7 (2.0)	1,958	24.2 (1.5)	2,130	24.0 (1.4)	1,850	27.2 (1.7)
50-64	-	- -	-	- -	1,356	8.2 (1.1)	570	6.6 (1.4)	1,314	7.3 (1.0)	1,518	9.6 (1.3)	1,346	8.8 (1.4)
65+	-	- -	-	- -	810	2.7 (0.8)	582	4.7 (1.6)	1,131	2.9 (0.7)	1,352	2.4 (0.6)	1,222	2.5 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,734	21.8 (1.0)	2,597	22.5 (1.5)	5,560	22.4 (1.3)	6,339	22.8 (1.0)	5,626	23.3 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,666	16.8 (1.4)	1,046	15.8 (1.9)	1,834	16.4 (1.6)	2,028	15.0 (1.7)	1,484	14.7 (1.9)

1) 아침식사 결식률 : {(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 아침식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,224	24.3 (1.6)	874	23.6 (2.5)	1,805	23.7 (2.3)	2,100	25.6 (1.8)	1,754	21.8 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	2,080	21.8 (1.5)	890	20.6 (2.4)	1,774	22.5 (1.9)	2,034	21.5 (1.5)	1,750	22.0 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	2,020	18.5 (1.4)	864	21.8 (2.1)	1,803	21.4 (1.8)	2,069	20.2 (1.7)	1,756	20.4 (1.9)
상	-	- -	-	- -	2,000	18.5 (1.5)	857	17.9 (2.4)	1,822	18.6 (1.8)	2,078	17.5 (1.3)	1,768	21.3 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,734	20.8 (0.9)	2,597	22.0 (1.3)	5,560	21.8 (1.0)	6,339	22.2 (0.8)	5,626	22.7 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,666	19.5 (1.5)	1,046	17.7 (2.2)	1,834	20.2 (2.1)	2,028	18.4 (1.6)	1,484	18.9 (1.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,224	23.6 (1.4)	874	23.1 (2.1)	1,805	23.5 (1.9)	2,100	25.5 (1.4)	1,754	22.2 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	2,080	21.4 (1.4)	890	21.9 (2.3)	1,774	23.3 (1.8)	2,034	21.6 (1.5)	1,750	22.2 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	2,020	18.4 (1.4)	864	21.9 (2.0)	1,803	21.3 (1.7)	2,069	20.6 (1.6)	1,756	20.9 (1.8)
상	-	- -	-	- -	2,000	18.7 (1.4)	857	17.9 (2.2)	1,822	18.9 (1.6)	2,078	18.5 (1.2)	1,768	22.0 (1.7)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	9,608	21.8 (0.8)	4,533	21.9 (1.1)	9,882	20.4 (0.8)	10,419	18.5 (0.8)	8,940	19.5 (1.0)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	9,608	22.3 (0.7)	4,533	22.6 (1.1)	9,882	21.3 (0.8)	10,419	19.4 (0.8)	8,940	20.6 (0.9)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	210	17.9 (4.0)	90	7.9 (3.4)	280	3.4 (1.2)	230	10.2 (3.3)	256	5.4 (1.9)
3-5	-	- -	-	- -	382	6.7 (1.8)	176	11.9 (4.2)	360	9.0 (2.1)	356	8.7 (1.9)	358	7.4 (2.4)
6-11	-	- -	-	- -	890	10.3 (1.5)	458	12.4 (2.3)	918	10.4 (1.7)	857	8.5 (1.3)	744	10.5 (2.1)
12-18	-	- -	-	- -	842	26.0 (2.2)	332	35.1 (4.2)	736	28.2 (2.7)	856	26.3 (2.3)	642	30.1 (3.3)
19-29	-	- -	-	- -	1,208	47.2 (2.1)	394	45.3 (3.2)	964	45.0 (2.7)	1,056	38.5 (2.3)	846	40.9 (2.7)
30-49	-	- -	-	- -	3,298	23.2 (1.0)	1,426	20.5 (1.7)	3,068	20.6 (1.1)	3,212	19.3 (1.1)	2,656	21.2 (1.2)
50-64	-	- -	-	- -	1,562	10.9 (1.4)	816	13.8 (2.4)	1,770	12.3 (1.3)	1,954	10.6 (1.1)	1,880	11.2 (1.4)
65+	-	- -	-	- -	1,216	4.8 (0.9)	841	6.8 (1.2)	1,786	4.8 (0.8)	1,898	6.0 (0.9)	1,558	3.7 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	7,754	23.5 (0.9)	3,296	23.8 (1.3)	7,526	21.9 (0.9)	7938	19.5 (0.9)	7068	21.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,854	13.6 (0.9)	1,237	15.0 (2.0)	2,356	13.1 (1.5)	2481	13.6 (1.6)	1872	13.6 (1.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,488	23.8 (1.5)	1,080	22.8 (2.1)	2,334	24.5 (1.9)	2,578	20.1 (1.5)	2,156	22.0 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	2,474	24.0 (1.5)	1,061	23.0 (2.3)	2,398	18.0 (1.3)	2,569	18.4 (1.4)	2,224	20.4 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	2,308	20.6 (1.4)	1,078	23.9 (2.4)	2,429	19.5 (1.5)	2,536	18.0 (1.3)	2,246	18.4 (1.8)
상	-	- -	-	- -	2,244	17.9 (1.2)	1,056	18.4 (1.9)	2,416	19.0 (1.5)	2,620	17.2 (1.4)	2,192	15.7 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	7,754	23.1 (0.8)	3,296	23.9 (1.2)	7,526	22.0 (0.9)	7,938	19.8 (0.8)	7,068	21.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,854	17.5 (1.1)	1,237	17.8 (1.7)	2,356	17.0 (1.8)	2,481	17.9 (1.8)	1,872	17.4 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,488	24.0 (1.4)	1,080	23.2 (1.9)	2,334	25.3 (1.4)	2,578	20.6 (1.4)	2,156	22.5 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	2,474	24.6 (1.5)	1,061	23.4 (1.9)	2,398	18.7 (1.4)	2,569	19.5 (1.4)	2,224	21.3 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	2,308	21.0 (1.3)	1,078	25.1 (2.4)	2,429	20.3 (1.5)	2,536	19.0 (1.3)	2,246	20.3 (1.6)
상	-	- -	-	- -	2,244	18.6 (1.2)	1,056	19.5 (1.7)	2,416	19.9 (1.5)	2,620	17.9 (1.3)	2,192	16.6 (1.6)

표 2-III-2. 점심식사 결식률[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	18,008	4.9 (0.3)	8,177	5.9 (0.4)	17,277	4.8 (0.3)	18,786	5.9 (0.3)	16,050	5.7 (0.4)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	18,008	4.9 (0.3)	8,177	5.9 (0.4)	17,277	4.8 (0.3)	18,786	5.9 (0.3)	16,050	5.7 (0.4)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	438	5.4 (1.4)	236	3.6 (1.8)	490	3.9 (1.3)	546	4.2 (1.0)	486	3.9 (1.4)
3-5	-	- -	-	- -	802	2.6 (0.8)	378	3.8 (1.7)	804	2.1 (0.5)	764	2.6 (0.8)	702	2.5 (0.7)
6-11	-	- -	-	- -	1,796	1.7 (0.4)	950	2.1 (0.5)	1,908	2.1 (0.5)	1,761	2.9 (0.6)	1,558	2.0 (0.6)
12-18	-	- -	-	- -	1,804	3.7 (0.6)	738	4.4 (1.2)	1,520	5.4 (0.8)	1,764	5.1 (0.6)	1,406	5.8 (0.9)
19-29	-	- -	-	- -	2,116	6.7 (0.8)	662	9.7 (1.3)	1,527	7.8 (1.0)	1,887	9.9 (1.0)	1,386	10.5 (1.4)
30-49	-	- -	-	- -	6,108	4.8 (0.4)	2,404	5.3 (0.7)	5,026	4.0 (0.4)	5,342	6.2 (0.5)	4,506	5.2 (0.4)
50-64	-	- -	-	- -	2,918	6.2 (0.7)	1,386	7.2 (1.1)	3,085	4.1 (0.5)	3,472	4.0 (0.5)	3,226	5.5 (0.6)
65+	-	- -	-	- -	2,026	5.3 (0.8)	1,423	5.1 (0.9)	2,917	6.0 (0.8)	3,250	6.0 (0.7)	2,780	4.2 (0.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	14,488	5.0 (0.3)	5,894	6.2 (0.5)	13,087	4.8 (0.3)	14,277	5.9 (0.4)	12,694	6.1 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	4.7 (0.6)	2,283	4.6 (0.7)	4,190	4.6 (0.5)	4,509	5.7 (0.8)	3,356	4.3 (0.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	4,712	5.6 (0.5)	1,954	6.6 (1.0)	4,139	5.7 (0.7)	4,678	7.7 (0.7)	3,910	6.8 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	4,554	4.2 (0.5)	1,951	5.7 (0.8)	4,172	5.7 (0.6)	4,603	6.6 (0.6)	3,974	6.7 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	4,328	5.0 (0.6)	1,942	5.6 (0.9)	4,232	4.0 (0.4)	4,605	5.0 (0.5)	4,002	4.6 (0.5)
상	-	- -	-	- -	4,244	4.9 (0.5)	1,914	5.2 (0.8)	4,238	3.7 (0.5)	4,698	4.2 (0.5)	3,960	4.6 (0.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	14,488	5.0 (0.3)	5,894	6.1 (0.5)	13,087	4.8 (0.3)	14,277	5.9 (0.4)	12,694	6.0 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	4.6 (0.5)	2,283	4.6 (0.8)	4,190	5.0 (0.6)	4,509	6.7 (1.0)	3,356	5.1 (0.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	4,712	5.6 (0.5)	1,954	6.6 (0.9)	4,139	5.6 (0.7)	4,678	7.7 (0.7)	3,910	6.9 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	4,554	4.2 (0.5)	1,951	5.6 (0.9)	4,172	5.8 (0.6)	4,603	6.8 (0.7)	3,974	6.7 (0.6)
중상	-	- -	-	- -	4,328	5.1 (0.6)	1,942	5.6 (0.9)	4,232	4.1 (0.4)	4,605	5.1 (0.5)	4,002	4.6 (0.5)
상	-	- -	-	- -	4,244	4.9 (0.5)	1,914	5.2 (0.8)	4,238	3.7 (0.5)	4,698	4.2 (0.5)	3,960	4.6 (0.6)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	8,400	4.4 (0.3)	3,644	5.4 (0.6)	7,394	4.1 (0.4)	8,367	4.7 (0.4)	7,110	5.4 (0.5)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	8,400	4.4 (0.3)	3,644	5.5 (0.6)	7,394	4.1 (0.4)	8,367	4.8 (0.4)	7,110	5.5 (0.6)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	228	6.8 (1.8)	146	4.2 (2.8)	210	4.4 (2.1)	316	4.2 (1.4)	230	4.7 (2.0)
3-5	-	- -	-	- -	420	2.8 (1.2)	202	3.2 (1.4)	444	1.3 (0.9)	408	3.9 (1.4)	344	2.0 (0.9)
6-11	-	- -	-	- -	906	1.4 (0.5)	492	3.1 (0.8)	990	2.0 (0.5)	904	2.3 (0.8)	814	2.8 (1.0)
12-18	-	- -	-	- -	962	3.6 (0.7)	406	4.3 (1.4)	784	6.0 (1.1)	908	3.8 (0.7)	764	6.7 (1.3)
19-29	-	- -	-	- -	908	6.0 (1.2)	268	9.8 (2.0)	563	6.1 (1.3)	831	7.9 (1.3)	540	11.4 (2.4)
30-49	-	- -	-	- -	2,810	3.9 (0.5)	978	4.4 (0.8)	1,958	3.4 (0.5)	2,130	5.4 (0.7)	1,850	4.7 (0.7)
50-64	-	- -	-	- -	1,356	6.6 (1.2)	570	6.8 (1.8)	1,314	3.5 (0.7)	1,518	2.3 (0.6)	1,346	3.8 (0.7)
65+	-	- -	-	- -	810	3.8 (1.1)	582	3.4 (0.9)	1,131	4.6 (1.0)	1,352	4.5 (0.8)	1,222	2.9 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,734	4.3 (0.4)	2,598	5.7 (0.7)	5,560	4.0 (0.4)	6,339	4.9 (0.4)	5,626	5.7 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	1,666	5.0 (0.8)	1,046	4.6 (0.9)	1,834	4.6 (0.6)	2,028	3.9 (0.7)	1,484	4.3 (0.8)

1) 점심식사 결식률 : {(1일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 점심식사여부 응답자 수)+(2일전 점심식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 점심식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	--	-	--	2,224	4.5 (0.5)	874	7.5 (1.6)	1,805	4.9 (0.8)	2,100	6.5 (0.9)	1,754	7.6 (1.1)
중하	-	--	-	--	2,080	3.9 (0.7)	890	4.2 (1.0)	1,774	4.6 (0.8)	2,034	6.2 (1.0)	1,750	5.9 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,020	5.1 (0.9)	864	5.1 (1.2)	1,803	3.5 (0.7)	2,069	3.2 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)
상	-	--	-	--	2,000	4.1 (0.6)	858	5.7 (1.4)	1,822	3.5 (0.6)	2,078	2.9 (0.5)	1,768	4.1 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	6,734	4.3 (0.4)	2,598	5.6 (0.7)	5,560	4.0 (0.4)	6,339	4.9 (0.4)	5,626	5.7 (0.6)
읍면	-	--	-	--	1,666	4.9 (0.8)	1,046	4.9 (0.9)	1,834	5.4 (0.9)	2,028	4.5 (0.9)	1,484	5.2 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	2,224	4.5 (0.5)	874	7.3 (1.6)	1,805	4.8 (0.8)	2,100	6.5 (0.8)	1,754	7.8 (1.1)
중하	-	--	-	--	2,080	3.9 (0.7)	890	4.4 (1.0)	1,774	4.7 (0.8)	2,034	6.3 (1.0)	1,750	6.0 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,020	5.1 (0.9)	864	4.9 (1.1)	1,803	3.6 (0.7)	2,069	3.2 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)
상	-	--	-	--	2,000	4.2 (0.7)	858	5.7 (1.4)	1,822	3.4 (0.6)	2,078	2.9 (0.5)	1,768	4.3 (0.8)
여자														
1세이상	-	--	-	--	9,608	5.5 (0.3)	4,533	6.3 (0.6)	9,883	5.5 (0.4)	10,419	7.0 (0.4)	8,940	6.0 (0.4)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	9,608	5.4 (0.3)	4,533	6.3 (0.6)	9,883	5.5 (0.4)	10,419	7.1 (0.4)	8,940	5.9 (0.4)
연령(세)														
1-2	-	--	-	--	210	3.9 (1.6)	90	2.9 (1.5)	280	3.5 (1.8)	230	4.2 (1.5)	256	3.1 (1.4)
3-5	-	--	-	--	382	2.4 (1.0)	176	4.4 (2.6)	360	3.3 (1.2)	356	1.2 (0.6)	358	3.0 (1.1)
6-11	-	--	-	--	890	2.1 (0.6)	458	1.1 (0.4)	918	2.2 (0.7)	857	3.6 (0.8)	744	1.1 (0.7)
12-18	-	--	-	--	842	3.8 (0.7)	332	4.5 (1.8)	736	4.7 (1.0)	856	6.6 (1.0)	642	4.8 (1.2)
19-29	-	--	-	--	1,208	7.4 (0.9)	394	9.7 (1.8)	964	9.7 (1.5)	1,056	12.0 (1.3)	846	9.6 (1.4)
30-49	-	--	-	--	3,298	5.7 (0.6)	1,426	6.2 (1.1)	3,068	4.6 (0.5)	3,212	7.0 (0.7)	2,656	5.8 (0.6)
50-64	-	--	-	--	1,562	5.9 (0.8)	816	7.7 (1.5)	1,771	4.7 (0.7)	1,954	5.7 (0.7)	1,880	7.2 (0.9)
65+	-	--	-	--	1,216	6.4 (0.9)	841	6.2 (1.2)	1,786	6.9 (1.0)	1,898	7.1 (0.8)	1,558	5.1 (0.8)
거주지역														
동	-	--	-	--	7,754	5.7 (0.4)	3,296	6.8 (0.7)	7,527	5.7 (0.5)	7,938	6.9 (0.4)	7,068	6.5 (0.5)
읍면	-	--	-	--	1,854	4.5 (0.8)	1,237	4.7 (1.1)	2,356	4.7 (0.7)	2,481	7.7 (1.2)	1,872	4.2 (0.8)
소득수준														
하	-	--	-	--	2,488	6.7 (0.7)	1,080	5.7 (1.0)	2,334	6.5 (1.0)	2,578	9.0 (0.9)	2,156	6.1 (0.8)
중하	-	--	-	--	2,474	4.5 (0.5)	1,061	7.3 (1.4)	2,398	6.8 (0.9)	2,569	7.0 (0.7)	2,224	7.4 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,308	4.9 (0.6)	1,078	6.2 (1.2)	2,429	4.6 (0.6)	2,536	6.9 (0.7)	2,246	5.4 (0.7)
상	-	--	-	--	2,244	5.7 (0.7)	1,056	4.7 (0.9)	2,416	3.9 (0.6)	2,620	5.5 (0.6)	2,192	5.0 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	7,754	5.7 (0.4)	3,296	6.7 (0.7)	7,527	5.6 (0.4)	7,938	6.9 (0.4)	7,068	6.3 (0.5)
읍면	-	--	-	--	1,854	4.4 (0.8)	1,237	4.5 (1.1)	2,356	4.4 (0.7)	2,481	9.2 (1.6)	1,872	5.1 (1.2)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	2,488	6.7 (0.7)	1,080	5.7 (1.1)	2,334	6.5 (0.9)	2,578	9.0 (0.9)	2,156	6.0 (0.8)
중하	-	--	-	--	2,474	4.4 (0.5)	1,061	7.1 (1.4)	2,398	6.9 (0.9)	2,569	7.1 (0.7)	2,224	7.4 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,308	4.9 (0.6)	1,078	6.4 (1.2)	2,429	4.5 (0.6)	2,536	7.1 (0.8)	2,246	5.2 (0.7)
상	-	--	-	--	2,244	5.7 (0.7)	1,056	4.7 (0.9)	2,416	3.9 (0.6)	2,620	5.5 (0.6)	2,192	4.8 (0.8)

표 2-III-3. 저녁식사 결식률[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	18,008	4.0 (0.2)	8,177	4.1 (0.4)	17,275	4.4 (0.3)	18,786	4.3 (0.3)	16,050	4.2 (0.3)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	18,008	4.0 (0.2)	8,177	4.1 (0.4)	17,275	4.4 (0.3)	18,786	4.4 (0.3)	16,050	4.1 (0.3)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	438	3.2 (1.2)	236	2.1 (0.9)	490	0.4 (0.3)	546	1.8 (0.6)	486	1.3 (0.7)
3-5	-	- -	-	- -	802	1.8 (0.5)	378	3.1 (1.4)	804	2.4 (0.6)	764	1.1 (0.3)	702	1.6 (0.5)
6-11	-	- -	-	- -	1,796	1.5 (0.2)	950	1.2 (0.4)	1,908	1.4 (0.3)	1,761	2.1 (0.4)	1,558	1.9 (0.5)
12-18	-	- -	-	- -	1,804	4.1 (0.6)	738	3.7 (1.0)	1,520	7.1 (0.9)	1,764	4.9 (0.7)	1,406	5.8 (1.0)
19-29	-	- -	-	- -	2,116	6.7 (0.7)	662	7.4 (1.2)	1,527	8.1 (1.0)	1,887	7.0 (0.8)	1,386	5.7 (0.7)
30-49	-	- -	-	- -	6,108	4.1 (0.3)	2,404	4.0 (0.6)	5,024	3.6 (0.3)	5,342	4.4 (0.4)	4,506	4.1 (0.4)
50-64	-	- -	-	- -	2,918	3.5 (0.4)	1,386	3.7 (0.7)	3,085	3.7 (0.5)	3,472	4.4 (0.5)	3,226	4.3 (0.5)
65+	-	- -	-	- -	2,026	2.4 (0.5)	1,423	3.4 (0.5)	2,917	3.2 (0.5)	3,250	2.5 (0.4)	2,780	3.2 (0.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	14,488	4.1 (0.2)	5,894	4.2 (0.4)	13,085	4.4 (0.3)	14,277	4.6 (0.3)	12,694	4.1 (0.3)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	3.5 (0.5)	2,283	3.9 (0.6)	4,190	4.4 (0.5)	4,509	3.4 (0.5)	3,356	4.4 (0.6)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	4,712	4.2 (0.4)	1,954	4.4 (0.6)	4,137	4.8 (0.6)	4,678	5.6 (0.5)	3,910	5.2 (0.5)
중하	-	- -	-	- -	4,554	3.9 (0.3)	1,951	4.1 (0.7)	4,172	4.2 (0.5)	4,603	4.3 (0.5)	3,974	4.3 (0.5)
중상	-	- -	-	- -	4,328	4.3 (0.4)	1,942	3.5 (0.6)	4,232	4.4 (0.5)	4,605	3.9 (0.4)	4,002	3.7 (0.5)
상	-	- -	-	- -	4,244	3.5 (0.5)	1,914	4.1 (0.6)	4,238	4.1 (0.5)	4,698	3.5 (0.5)	3,960	3.2 (0.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	14,488	4.0 (0.2)	5,894	4.1 (0.4)	13,085	4.4 (0.3)	14,277	4.5 (0.3)	12,694	4.0 (0.3)
읍면	-	- -	-	- -	3,520	3.9 (0.6)	2,283	4.0 (0.6)	4,190	4.5 (0.6)	4,509	3.8 (0.6)	3,356	4.6 (0.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	4,712	4.2 (0.4)	1,954	4.5 (0.6)	4,137	4.8 (0.5)	4,678	5.6 (0.5)	3,910	5.2 (0.5)
중하	-	- -	-	- -	4,554	3.8 (0.3)	1,951	4.3 (0.7)	4,172	4.2 (0.5)	4,603	4.4 (0.5)	3,974	4.2 (0.5)
중상	-	- -	-	- -	4,328	4.3 (0.4)	1,942	3.6 (0.7)	4,232	4.4 (0.5)	4,605	4.0 (0.4)	4,002	3.6 (0.5)
상	-	- -	-	- -	4,244	3.6 (0.5)	1,914	4.2 (0.6)	4,238	4.2 (0.5)	4,698	3.5 (0.4)	3,960	3.2 (0.4)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	8,400	2.6 (0.3)	3,644	2.1 (0.3)	7,392	3.5 (0.3)	8,367	3.2 (0.3)	7,110	3.0 (0.3)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	8,400	2.5 (0.3)	3,644	2.2 (0.3)	7,392	3.5 (0.3)	8,367	3.2 (0.3)	7,110	2.9 (0.3)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	228	2.5 (1.3)	146	2.8 (1.4)	210	0.7 (0.5)	316	1.9 (0.8)	230	0.7 (0.7)
3-5	-	- -	-	- -	420	2.0 (0.7)	202	1.6 (0.8)	444	2.4 (0.7)	408	1.6 (0.6)	344	1.2 (0.5)
6-11	-	- -	-	- -	906	1.0 (0.3)	492	0.6 (0.4)	990	1.6 (0.5)	904	1.8 (0.5)	814	1.7 (0.5)
12-18	-	- -	-	- -	962	2.2 (0.6)	406	2.7 (1.0)	784	4.5 (1.0)	908	3.6 (0.9)	764	3.9 (0.9)
19-29	-	- -	-	- -	908	4.7 (0.9)	268	4.7 (1.4)	563	6.7 (1.4)	831	4.4 (1.1)	540	3.8 (0.9)
30-49	-	- -	-	- -	2,810	2.3 (0.4)	978	1.9 (0.5)	1,956	3.0 (0.5)	2,130	3.2 (0.4)	1,850	3.0 (0.6)
50-64	-	- -	-	- -	1,356	2.7 (0.6)	570	0.9 (0.4)	1,314	3.0 (0.6)	1,518	3.9 (0.6)	1,346	3.2 (0.6)
65+	-	- -	-	- -	810	1.1 (0.4)	582	1.2 (0.5)	1,131	1.8 (0.6)	1,352	1.0 (0.3)	1,222	2.0 (0.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,734	2.6 (0.3)	2,598	2.0 (0.4)	5,558	3.4 (0.3)	6,339	3.4 (0.3)	5,626	3.1 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	1,666	2.4 (0.6)	1,046	2.5 (0.7)	1,834	3.9 (0.8)	2,028	2.3 (0.5)	1,484	2.6 (0.5)

1) 저녁식사 결식률 : {(1일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 저녁식사여부 응답자 수)+(2일전 저녁식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저녁식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,224	2.5 (0.4)	874	2.4 (0.6)	1,803	4.5 (0.8)	2,100	4.0 (0.6)	1,754	4.3 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,080	2.7 (0.5)	890	1.3 (0.4)	1,774	3.3 (0.6)	2,034	2.9 (0.5)	1,750	3.3 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	2,020	1.9 (0.4)	864	2.2 (0.8)	1,803	3.1 (0.6)	2,069	3.5 (0.5)	1,756	2.6 (0.6)
상	-	- -	-	- -	2,000	2.9 (0.6)	858	2.8 (0.7)	1,822	3.2 (0.6)	2,078	2.4 (0.4)	1,768	1.3 (0.4)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	6,734	2.6 (0.3)	2,598	2.0 (0.3)	5,558	3.3 (0.3)	6,339	3.3 (0.3)	5,626	3.0 (0.4)
읍면	-	--	-	--	1,666	2.8 (0.7)	1,046	2.6 (0.8)	1,834	4.2 (0.9)	2,028	2.4 (0.6)	1,484	2.7 (0.6)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	2,224	2.5 (0.4)	874	2.3 (0.6)	1,803	4.4 (0.7)	2,100	4.0 (0.6)	1,754	4.4 (0.7)
중하	-	--	-	--	2,080	2.6 (0.4)	890	1.3 (0.4)	1,774	3.3 (0.6)	2,034	2.8 (0.5)	1,750	3.1 (0.7)
중상	-	--	-	--	2,020	1.9 (0.4)	864	2.2 (0.8)	1,803	3.1 (0.6)	2,069	3.6 (0.6)	1,756	2.5 (0.5)
상	-	--	-	--	2,000	2.9 (0.6)	858	2.8 (0.7)	1,822	3.3 (0.6)	2,078	2.3 (0.4)	1,768	1.2 (0.3)
여자														
1세이상	-	--	-	--	9,608	5.4 (0.3)	4,533	6.1 (0.5)	9,883	5.3 (0.4)	10,419	5.5 (0.4)	8,940	5.4 (0.4)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	9,608	5.5 (0.3)	4,533	6.1 (0.5)	9,883	5.4 (0.4)	10,419	5.6 (0.4)	8,940	5.4 (0.4)
연령(세)														
1-2	-	--	-	--	210	3.9 (2.0)	90	1.1 (1.1)	280	0.3 (0.3)	230	1.8 (1.1)	256	1.9 (1.2)
3-5	-	--	-	--	382	1.6 (0.7)	176	4.5 (2.7)	360	2.4 (0.9)	356	0.5 (0.3)	358	2.0 (0.9)
6-11	-	--	-	--	890	2.0 (0.4)	458	1.7 (0.5)	918	1.2 (0.5)	857	2.4 (0.6)	744	2.0 (0.7)
12-18	-	--	-	--	842	6.4 (1.1)	332	4.9 (1.6)	736	10.0 (1.3)	856	6.4 (1.1)	642	8.2 (1.8)
19-29	-	--	-	--	1,208	8.8 (1.1)	394	10.1 (1.8)	964	9.7 (1.4)	1,056	9.8 (1.3)	846	7.7 (1.2)
30-49	-	--	-	--	3,298	6.0 (0.6)	1,426	6.3 (1.1)	3,068	4.2 (0.5)	3,212	5.7 (0.6)	2,656	5.2 (0.6)
50-64	-	--	-	--	1,562	4.2 (0.6)	816	6.4 (1.2)	1,771	4.3 (0.7)	1,954	4.9 (0.6)	1,880	5.4 (0.8)
65+	-	--	-	--	1,216	3.4 (0.7)	841	4.9 (0.8)	1,786	4.1 (0.6)	1,898	3.6 (0.6)	1,558	3.9 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	7,754	5.6 (0.4)	3,296	6.3 (0.6)	7,527	5.4 (0.4)	7,938	5.7 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	1,854	4.5 (0.7)	1,237	5.5 (0.9)	2,356	4.9 (0.7)	2,481	4.6 (0.6)	1,872	6.2 (1.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,488	6.0 (0.6)	1,080	6.6 (1.0)	2,334	5.0 (0.7)	2,578	7.2 (0.8)	2,156	6.1 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,474	5.0 (0.5)	1,061	7.2 (1.3)	2,398	5.1 (0.7)	2,569	5.7 (0.7)	2,224	5.3 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	2,308	6.6 (0.7)	1,078	4.8 (0.8)	2,429	5.6 (0.7)	2,536	4.4 (0.6)	2,246	4.7 (0.7)
상	-	- -	-	- -	2,244	4.1 (0.6)	1,056	5.5 (0.7)	2,416	5.0 (0.7)	2,620	4.7 (0.7)	2,192	5.2 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	7,754	5.5 (0.4)	3,296	6.2 (0.6)	7,527	5.4 (0.4)	7,938	5.7 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)
읍면	-	--	-	--	1,854	5.1 (0.8)	1,237	5.7 (0.9)	2,356	4.6 (0.7)	2,481	5.4 (0.8)	1,872	6.7 (1.2)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	2,488	6.0 (0.6)	1,080	6.7 (1.1)	2,334	5.0 (0.7)	2,578	7.2 (0.8)	2,156	6.1 (0.7)
중하	-	--	-	--	2,474	5.0 (0.5)	1,061	7.4 (1.3)	2,398	5.1 (0.7)	2,569	6.1 (0.8)	2,224	5.4 (0.7)
중상	-	--	-	--	2,308	6.7 (0.7)	1,078	4.9 (0.9)	2,429	5.7 (0.7)	2,536	4.5 (0.6)	2,246	4.6 (0.7)
상	-	--	-	--	2,244	4.2 (0.6)	1,056	5.5 (0.7)	2,416	5.1 (0.8)	2,620	4.7 (0.7)	2,192	5.2 (0.7)

표 2-III-4. 아침식사 결식률[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	16,050	20.5 (0.8)	7,110	21.5 (1.0)	8,940	19.5 (1.0)
19세이상	11,898	21.1 (0.9)	4,958	22.5 (1.2)	6,940	19.7 (1.1)
연령(세)						
1-9	2,208	7.0 (0.9)	1,104	6.9 (1.1)	1,104	7.0 (1.4)
10-18	1,944	26.0 (2.0)	1,048	25.2 (2.3)	896	26.9 (2.7)
19-29	1,386	40.3 (2.1)	540	39.7 (3.1)	846	40.9 (2.7)
30-39	2,296	30.5 (1.7)	890	37.0 (2.5)	1,406	23.6 (1.8)
40-49	2,210	18.2 (1.3)	960	17.6 (1.9)	1,250	18.8 (1.8)
50-59	2,214	11.7 (1.2)	884	9.8 (1.7)	1,330	13.5 (1.8)
60-69	2,002	3.8 (0.8)	906	4.1 (1.2)	1,096	3.6 (0.8)
70+	1,790	3.5 (0.7)	778	2.6 (0.9)	1,012	4.1 (1.0)
1-2	486	4.5 (1.2)	230	3.7 (1.5)	256	5.4 (1.9)
3-5	702	6.5 (1.6)	344	5.6 (1.7)	358	7.4 (2.4)
6-11	1,558	9.9 (1.3)	814	9.3 (1.7)	744	10.5 (2.1)
12-18	1,406	29.3 (2.3)	764	28.7 (2.6)	642	30.1 (3.3)
19-29	1,386	40.3 (2.1)	540	39.7 (3.1)	846	40.9 (2.7)
30-49	4,506	24.2 (1.1)	1,850	27.2 (1.7)	2,656	21.2 (1.2)
50-64	3,226	10.0 (1.1)	1,346	8.8 (1.4)	1,880	11.2 (1.4)
65+	2,780	3.2 (0.5)	1,222	2.5 (0.7)	1,558	3.7 (0.7)
거주지역						
동	12,694	22.2 (0.8)	5,626	23.3 (1.1)	7,068	21.1 (1.1)
읍면	3,356	14.1 (1.6)	1,484	14.7 (1.9)	1,872	13.6 (1.7)
소득수준[2]						
하	3,910	21.9 (1.4)	1,754	21.8 (1.8)	2,156	22.0 (1.7)
중하	3,974	21.2 (1.3)	1,750	22.0 (1.8)	2,224	20.4 (1.5)
중상	4,002	19.4 (1.3)	1,756	20.4 (1.9)	2,246	18.4 (1.8)
상	3,960	18.5 (1.4)	1,768	21.3 (2.1)	2,192	15.7 (1.6)
거주지역(표준화)[3]						
동	12,694	22.0 (0.8)	5,626	22.7 (1.1)	7,068	21.3 (1.0)
읍면	3,356	18.2 (1.5)	1,484	18.9 (1.7)	1,872	17.4 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	3,910	22.3 (1.3)	1,754	22.2 (1.6)	2,156	22.5 (1.5)
중하	3,974	21.8 (1.2)	1,750	22.2 (1.8)	2,224	21.3 (1.4)
중상	4,002	20.6 (1.2)	1,756	20.9 (1.8)	2,246	20.3 (1.6)
상	3,960	19.5 (1.3)	1,768	22.0 (1.7)	2,192	16.6 (1.6)

1) 아침식사 결식률 : {(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-5. 점심식사 결식률[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	16,050	5.7 (0.4)	7,110	5.4 (0.5)	8,940	6.0 (0.4)
19세이상	11,898	6.2 (0.4)	4,958	5.6 (0.7)	6,940	6.7 (0.5)
연령(세)						
1-9	2,208	2.3 (0.5)	1,104	2.8 (0.8)	1,104	1.8 (0.5)
10-18	1,944	5.3 (0.7)	1,048	6.1 (1.1)	896	4.3 (1.0)
19-29	1,386	10.5 (1.4)	540	11.4 (2.4)	846	9.6 (1.4)
30-39	2,296	4.6 (0.6)	890	4.7 (1.0)	1,406	4.5 (0.8)
40-49	2,210	5.8 (0.7)	960	4.7 (0.9)	1,250	6.9 (1.1)
50-59	2,214	5.6 (0.7)	884	3.4 (0.8)	1,330	7.7 (1.1)
60-69	2,002	4.4 (0.6)	906	3.8 (0.9)	1,096	4.8 (1.0)
70+	1,790	4.7 (0.8)	778	3.4 (1.0)	1,012	5.5 (1.0)
1-2	486	3.9 (1.4)	230	4.7 (2.0)	256	3.1 (1.4)
3-5	702	2.5 (0.7)	344	2.0 (0.9)	358	3.0 (1.1)
6-11	1,558	2.0 (0.6)	814	2.8 (1.0)	744	1.1 (0.7)
12-18	1,406	5.8 (0.9)	764	6.7 (1.3)	642	4.8 (1.2)
19-29	1,386	10.5 (1.4)	540	11.4 (2.4)	846	9.6 (1.4)
30-49	4,506	5.2 (0.4)	1,850	4.7 (0.7)	2,656	5.8 (0.6)
50-64	3,226	5.5 (0.6)	1,346	3.8 (0.7)	1,880	7.2 (0.9)
65+	2,780	4.2 (0.6)	1,222	2.9 (0.7)	1,558	5.1 (0.8)
거주지역						
동	12,694	6.1 (0.4)	5,626	5.7 (0.7)	7,068	6.5 (0.5)
읍면	3,356	4.3 (0.5)	1,484	4.3 (0.8)	1,872	4.2 (0.8)
소득수준[2]						
하	3,910	6.8 (0.7)	1,754	7.6 (1.1)	2,156	6.1 (0.8)
중하	3,974	6.7 (0.7)	1,750	5.9 (0.9)	2,224	7.4 (0.9)
중상	4,002	4.6 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)	2,246	5.4 (0.7)
상	3,960	4.6 (0.6)	1,768	4.1 (0.8)	2,192	5.0 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	12,694	6.0 (0.4)	5,626	5.7 (0.6)	7,068	6.3 (0.5)
읍면	3,356	5.1 (0.8)	1,484	5.2 (1.1)	1,872	5.1 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	3,910	6.9 (0.7)	1,754	7.8 (1.1)	2,156	6.0 (0.8)
중하	3,974	6.7 (0.6)	1,750	6.0 (0.9)	2,224	7.4 (0.9)
중상	4,002	4.6 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)	2,246	5.2 (0.7)
상	3,960	4.6 (0.6)	1,768	4.3 (0.8)	2,192	4.8 (0.8)

1) 점심식사 결식률 : {(1일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 점심식사여부 응답자 수)+(2일전 점심식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-6. 저녁식사 결식률[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	16,050	4.2 (0.3)	7,110	3.0 (0.3)	8,940	5.4 (0.4)
19세이상	11,898	4.3 (0.3)	4,958	3.1 (0.4)	6,940	5.5 (0.4)
연령(세)						
1-9	2,208	1.6 (0.4)	1,104	1.2 (0.4)	1,104	2.1 (0.6)
10-18	1,944	5.1 (0.8)	1,048	3.6 (0.8)	896	6.8 (1.4)
19-29	1,386	5.7 (0.7)	540	3.8 (0.9)	846	7.7 (1.2)
30-39	2,296	3.9 (0.6)	890	2.7 (0.8)	1,406	5.3 (0.8)
40-49	2,210	4.2 (0.6)	960	3.3 (1.0)	1,250	5.1 (0.9)
50-59	2,214	4.8 (0.7)	884	3.3 (0.8)	1,330	6.2 (1.0)
60-69	2,002	2.7 (0.5)	906	2.5 (0.7)	1,096	2.9 (0.7)
70+	1,790	3.4 (0.7)	778	1.8 (0.6)	1,012	4.4 (1.0)
1-2	486	1.3 (0.7)	230	0.7 (0.7)	256	1.9 (1.2)
3-5	702	1.6 (0.5)	344	1.2 (0.5)	358	2.0 (0.9)
6-11	1,558	1.9 (0.5)	814	1.7 (0.5)	744	2.0 (0.7)
12-18	1,406	5.8 (1.0)	764	3.9 (0.9)	642	8.2 (1.8)
19-29	1,386	5.7 (0.7)	540	3.8 (0.9)	846	7.7 (1.2)
30-49	4,506	4.1 (0.4)	1,850	3.0 (0.6)	2,656	5.2 (0.6)
50-64	3,226	4.3 (0.5)	1,346	3.2 (0.6)	1,880	5.4 (0.8)
65+	2,780	3.2 (0.5)	1,222	2.0 (0.5)	1,558	3.9 (0.7)
거주지역						
동	12,694	4.1 (0.3)	5,626	3.1 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)
읍면	3,356	4.4 (0.6)	1,484	2.6 (0.5)	1,872	6.2 (1.0)
소득수준[2]						
하	3,910	5.2 (0.5)	1,754	4.3 (0.7)	2,156	6.1 (0.7)
중하	3,974	4.3 (0.5)	1,750	3.3 (0.7)	2,224	5.3 (0.7)
중상	4,002	3.7 (0.5)	1,756	2.6 (0.6)	2,246	4.7 (0.7)
상	3,960	3.2 (0.4)	1,768	1.3 (0.4)	2,192	5.2 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	12,694	4.0 (0.3)	5,626	3.0 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)
읍면	3,356	4.6 (0.7)	1,484	2.7 (0.6)	1,872	6.7 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	3,910	5.2 (0.5)	1,754	4.4 (0.7)	2,156	6.1 (0.7)
중하	3,974	4.2 (0.5)	1,750	3.1 (0.7)	2,224	5.4 (0.7)
중상	4,002	3.6 (0.5)	1,756	2.5 (0.5)	2,246	4.6 (0.7)
상	3,960	3.2 (0.4)	1,768	1.2 (0.3)	2,192	5.2 (0.7)

1) 저녁식사 결식률 : {(1일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 저녁식사여부 응답자 수)+(2일전 저녁식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-7. 아침식사 가족동반식사율[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	8,440	62.9 (1.0)	4,088	56.4 (1.4)	8,639	58.7 (1.0)	9,394	57.7 (1.0)	8,025	55.1 (1.2)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,440	62.9 (0.9)	4,088	56.3 (1.4)	8,639	58.6 (0.9)	9,394	57.5 (0.9)	8,025	54.7 (1.1)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	219	80.4 (3.4)	118	85.7 (3.5)	245	87.8 (2.5)	273	80.9 (3.0)	243	80.6 (3.1)
3-5	-	- -	-	- -	401	85.5 (2.0)	189	84.3 (2.8)	401	83.5 (2.2)	382	84.8 (1.9)	351	79.6 (3.0)
6-11	-	- -	-	- -	898	83.2 (1.6)	475	84.0 (2.0)	954	86.6 (1.3)	881	86.3 (1.4)	779	80.9 (2.0)
12-18	-	- -	-	- -	900	59.3 (2.0)	369	51.5 (3.6)	760	55.5 (2.2)	882	53.8 (2.2)	703	52.3 (2.8)
19-29	-	- -	-	- -	971	39.3 (2.1)	331	36.2 (3.3)	764	35.8 (2.5)	944	33.1 (2.2)	693	30.6 (2.0)
30-49	-	- -	-	- -	2,923	58.9 (1.3)	1,202	53.0 (1.6)	2,513	54.9 (1.4)	2,671	54.5 (1.2)	2,253	50.0 (1.4)
50-64	-	- -	-	- -	1,324	69.2 (1.9)	692	59.8 (3.2)	1,543	65.1 (1.7)	1,736	63.1 (1.6)	1,613	61.7 (2.1)
65+	-	- -	-	- -	804	84.1 (1.7)	712	63.8 (2.3)	1,459	67.2 (1.8)	1,625	69.2 (1.6)	1,390	70.6 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,810	60.4 (1.1)	2,945	53.9 (1.6)	6,544	56.9 (1.0)	7,139	55.4 (1.1)	6,347	51.6 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	74.8 (1.9)	1,143	65.1 (2.7)	2,095	67.7 (2.4)	2,255	68.1 (2.0)	1,678	68.0 (3.4)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,126	63.0 (1.7)	977	57.1 (2.4)	2,070	58.0 (2.0)	2,339	54.1 (1.7)	1,955	53.7 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	2,117	60.8 (1.7)	977	56.1 (2.7)	2,086	58.9 (1.5)	2,302	58.4 (1.7)	1,987	54.7 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	2,080	63.5 (1.5)	971	57.1 (2.5)	2,116	58.4 (1.9)	2,303	58.0 (1.6)	2,001	56.1 (1.9)
상	-	- -	-	- -	2,042	64.6 (1.6)	956	57.6 (2.2)	2,119	61.1 (1.7)	2,349	60.7 (1.5)	1,980	56.9 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,810	61.0 (1.1)	2,945	54.5 (1.5)	6,544	57.2 (0.9)	7,139	55.8 (1.0)	6,347	52.1 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	71.5 (2.0)	1,143	63.2 (2.8)	2,095	65.8 (2.5)	2,255	65.1 (2.1)	1,678	65.1 (3.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,126	63.9 (1.6)	977	57.2 (2.2)	2,070	58.0 (1.7)	2,339	54.2 (1.4)	1,955	53.5 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	2,117	61.0 (1.6)	977	55.2 (2.3)	2,086	58.6 (1.4)	2,302	58.3 (1.6)	1,987	54.5 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,080	63.1 (1.4)	971	57.1 (2.5)	2,116	58.3 (1.8)	2,303	57.7 (1.5)	2,001	55.5 (1.8)
상	-	- -	-	- -	2,042	63.9 (1.6)	956	57.3 (2.2)	2,119	60.8 (1.6)	2,349	59.9 (1.5)	1,980	56.2 (1.8)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	3,989	61.3 (1.2)	1,820	54.5 (1.8)	3,697	57.3 (1.2)	4,184	56.2 (1.2)	3,555	52.2 (1.4)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,989	61.4 (1.1)	1,820	54.6 (1.7)	3,697	57.3 (1.1)	4,184	56.2 (1.0)	3,555	51.9 (1.2)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	114	79.3 (4.4)	73	86.1 (4.5)	105	80.7 (4.4)	158	81.9 (3.5)	115	80.2 (4.7)
3-5	-	- -	-	- -	210	84.8 (2.6)	100	82.7 (3.9)	221	82.8 (2.9)	204	86.5 (2.4)	172	82.0 (3.7)
6-11	-	- -	-	- -	453	83.2 (2.1)	246	84.0 (2.5)	495	88.3 (1.6)	452	86.3 (1.8)	407	79.2 (2.5)
12-18	-	- -	-	- -	480	60.1 (2.6)	203	55.5 (4.3)	392	56.5 (3.0)	454	53.8 (2.4)	382	49.2 (3.2)
19-29	-	- -	-	- -	407	35.6 (2.9)	134	33.8 (5.0)	282	32.6 (3.2)	416	30.7 (2.9)	270	27.1 (3.0)
30-49	-	- -	-	- -	1,322	54.6 (1.7)	489	44.3 (2.6)	979	47.9 (1.8)	1,065	47.7 (1.7)	925	42.3 (1.8)
50-64	-	- -	-	- -	628	70.2 (2.4)	284	62.6 (4.2)	657	67.8 (2.3)	759	64.4 (2.1)	673	62.1 (2.4)
65+	-	- -	-	- -	375	89.4 (2.0)	291	75.6 (3.1)	566	81.6 (2.3)	676	83.7 (1.6)	611	81.6 (2.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,194	58.8 (1.4)	1,297	51.9 (2.0)	2,780	54.7 (1.3)	3,170	53.5 (1.3)	2,813	48.3 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	795	73.1 (2.4)	523	63.4 (3.4)	917	69.5 (3.1)	1,014	68.5 (2.6)	742	66.5 (3.6)

1) 아침식사 가족동반식사율 : 아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 아침식사 가족동반식사율 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,032	59.8 (2.2)	437	53.5 (3.1)	903	60.1 (2.5)	1,050	54.2 (2.2)	877	50.8 (2.5)
중하	-	- -	-	- -	999	58.6 (2.0)	445	55.2 (3.2)	887	55.1 (2.2)	1,017	55.1 (2.1)	875	52.1 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	973	64.1 (2.1)	432	56.7 (2.6)	901	54.7 (2.6)	1,035	57.2 (2.1)	878	53.6 (2.4)
상	-	- -	-	- -	951	63.1 (2.2)	428	54.1 (3.1)	911	60.0 (2.3)	1,039	59.1 (1.9)	884	52.8 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,194	59.6 (1.2)	1,297	52.6 (1.9)	2,780	55.5 (1.1)	3,170	54.5 (1.1)	2,813	49.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	795	70.0 (2.3)	523	61.5 (3.4)	917	65.8 (3.0)	1,014	63.9 (2.5)	742	61.0 (3.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,032	60.9 (1.9)	437	54.3 (2.7)	903	60.6 (2.1)	1,050	54.7 (1.8)	877	50.3 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	999	58.8 (2.0)	445	53.3 (3.0)	887	54.6 (2.0)	1,017	55.5 (2.0)	875	51.9 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	973	63.9 (1.9)	432	57.0 (2.6)	901	55.0 (2.3)	1,035	56.9 (1.9)	878	53.5 (2.2)
상	-	- -	-	- -	951	62.3 (2.1)	428	54.2 (3.0)	911	60.2 (2.1)	1,039	58.0 (1.8)	884	52.7 (2.0)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,451	64.6 (1.1)	2,268	58.3 (1.6)	4,942	60.2 (1.0)	5,210	59.2 (1.0)	4,470	58.1 (1.4)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,451	64.4 (1.0)	2,268	58.6 (1.4)	4,942	60.6 (1.0)	5,210	59.3 (1.0)	4,470	58.0 (1.3)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	105	81.7 (4.6)	45	85.2 (5.1)	140	93.5 (2.2)	115	79.7 (4.5)	128	81.1 (4.3)
3-5	-	- -	-	- -	191	86.2 (3.1)	89	85.8 (4.1)	180	84.5 (3.4)	178	83.0 (3.0)	179	77.2 (3.9)
6-11	-	- -	-	- -	445	83.1 (2.0)	229	83.9 (3.1)	459	84.8 (1.8)	429	86.2 (2.0)	372	82.6 (2.7)
12-18	-	- -	-	- -	420	58.2 (2.6)	166	46.5 (4.7)	368	54.4 (2.9)	428	53.7 (3.2)	321	56.1 (4.1)
19-29	-	- -	-	- -	564	43.1 (2.5)	197	38.6 (3.6)	482	39.2 (3.2)	528	35.5 (2.7)	423	34.3 (2.8)
30-49	-	- -	-	- -	1,601	63.1 (1.5)	713	62.2 (2.2)	1,534	62.3 (1.6)	1,606	61.5 (1.3)	1,328	58.1 (1.8)
50-64	-	- -	-	- -	696	68.2 (2.2)	408	57.0 (3.6)	886	62.5 (1.8)	977	61.9 (1.9)	940	61.3 (2.7)
65+	-	- -	-	- -	429	79.4 (2.4)	421	55.9 (2.9)	893	57.3 (2.1)	949	59.3 (2.1)	779	63.0 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,616	62.1 (1.2)	1,648	55.9 (1.8)	3,764	59.0 (1.1)	3,969	57.3 (1.2)	3,534	54.9 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	835	76.5 (1.8)	620	67.0 (3.2)	1,178	65.8 (2.3)	1,241	67.7 (2.1)	936	69.5 (3.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,094	66.5 (1.9)	540	60.8 (2.7)	1,167	55.7 (2.4)	1,289	54.0 (1.8)	1,078	56.7 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,118	63.0 (1.9)	532	57.1 (3.2)	1,199	62.7 (1.8)	1,285	61.6 (1.8)	1,112	57.4 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	1,107	62.9 (1.7)	539	57.5 (3.5)	1,215	62.0 (1.9)	1,268	58.9 (1.8)	1,123	58.6 (2.3)
상	-	- -	-	- -	1,091	66.2 (1.8)	528	61.2 (2.8)	1,208	62.3 (1.9)	1,310	62.4 (1.7)	1,096	61.1 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,616	62.3 (1.2)	1,648	56.9 (1.6)	3,764	59.4 (1.1)	3,969	57.7 (1.1)	3,534	55.4 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	835	73.6 (2.0)	620	65.6 (3.2)	1,178	66.5 (2.5)	1,241	67.2 (2.4)	936	70.0 (3.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,094	67.2 (1.8)	540	61.1 (2.6)	1,167	55.8 (2.0)	1,289	54.5 (1.7)	1,078	57.4 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,118	63.2 (1.8)	532	57.4 (2.6)	1,199	63.1 (1.7)	1,285	62.1 (1.7)	1,112	57.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,107	62.7 (1.7)	539	57.2 (3.3)	1,215	62.5 (1.9)	1,268	58.8 (1.7)	1,123	57.8 (2.2)
상	-	- -	-	- -	1,091	65.6 (1.8)	528	60.8 (2.7)	1,208	61.9 (1.9)	1,310	62.0 (1.8)	1,096	60.3 (2.2)

표 2-III-8. 점심식사 가족동반식사율[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	8,440	21.0 (0.8)	4,085	21.3 (1.0)	8,639	20.0 (0.9)	9,394	20.6 (0.7)	8,025	21.1 (1.1)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,440	21.6 (0.8)	4,085	21.1 (0.8)	8,639	19.4 (0.8)	9,394	19.5 (0.6)	8,025	19.9 (0.9)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	219	71.3 (3.6)	118	73.5 (4.2)	245	69.6 (3.6)	273	59.0 (3.5)	243	50.7 (4.1)
3-5	-	- -	-	- -	401	23.8 (2.6)	189	19.2 (4.0)	401	9.6 (1.7)	382	10.5 (1.8)	351	7.2 (1.6)
6-11	-	- -	-	- -	898	6.8 (1.0)	475	5.5 (1.5)	954	1.1 (0.3)	881	2.1 (0.7)	779	2.2 (1.0)
12-18	-	- -	-	- -	900	3.2 (0.8)	369	4.2 (1.2)	760	1.2 (0.4)	882	2.1 (0.6)	703	2.0 (0.8)
19-29	-	- -	-	- -	971	14.4 (1.4)	331	17.0 (2.4)	764	13.9 (1.5)	944	13.2 (1.3)	693	15.1 (1.6)
30-49	-	- -	-	- -	2,923	15.9 (0.9)	1,199	17.7 (1.4)	2,513	15.9 (1.2)	2,671	15.0 (0.8)	2,253	17.7 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	1,324	34.5 (2.1)	692	31.4 (2.6)	1,543	33.2 (1.7)	1,736	35.6 (1.6)	1,613	31.4 (2.4)
65+	-	- -	-	- -	804	56.9 (2.3)	712	46.4 (2.6)	1,459	48.5 (1.9)	1,625	49.6 (1.8)	1,390	49.2 (2.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,810	17.8 (0.8)	2,942	18.4 (1.1)	6,544	16.6 (0.9)	7,139	17.3 (0.6)	6,347	16.6 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	36.1 (3.0)	1,143	31.9 (3.1)	2,095	36.4 (3.4)	2,255	35.1 (2.8)	1,678	37.5 (3.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,126	26.4 (1.6)	977	25.3 (2.1)	2,070	22.2 (1.6)	2,339	20.9 (1.3)	1,955	21.6 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	2,117	20.5 (1.3)	976	21.4 (1.6)	2,086	21.9 (1.5)	2,302	22.8 (1.3)	1,987	20.9 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,080	20.2 (1.3)	970	21.8 (1.8)	2,116	18.4 (1.2)	2,303	19.7 (1.1)	2,001	20.3 (1.5)
상	-	- -	-	- -	2,042	17.2 (1.3)	955	18.7 (1.8)	2,119	18.0 (1.4)	2,349	18.8 (1.3)	1,980	21.8 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,810	19.1 (0.8)	2,942	18.5 (1.0)	6,544	16.8 (0.8)	7,139	17.4 (0.6)	6,347	16.6 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	30.5 (2.6)	1,143	30.4 (2.0)	2,095	30.9 (2.6)	2,255	26.9 (1.8)	1,678	31.4 (2.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,126	28.4 (1.6)	977	25.2 (1.9)	2,070	22.0 (1.4)	2,339	20.1 (1.1)	1,955	21.2 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	2,117	21.3 (1.2)	976	21.7 (1.4)	2,086	21.6 (1.4)	2,302	21.7 (1.2)	1,987	20.3 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	2,080	20.8 (1.2)	970	21.7 (1.6)	2,116	17.8 (1.1)	2,303	18.9 (1.0)	2,001	18.4 (1.2)
상	-	- -	-	- -	2,042	16.7 (1.2)	955	18.1 (1.6)	2,119	17.2 (1.2)	2,349	17.2 (1.1)	1,980	20.0 (1.7)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	3,989	18.6 (0.8)	1,818	19.1 (1.1)	3,697	18.2 (1.0)	4,184	18.7 (0.8)	3,555	19.4 (1.2)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,989	19.8 (0.8)	1,818	19.8 (0.9)	3,697	18.5 (0.8)	4,184	18.6 (0.7)	3,555	19.0 (1.0)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	114	71.9 (4.8)	73	76.0 (5.1)	105	65.9 (5.8)	158	60.4 (4.9)	115	48.7 (5.6)
3-5	-	- -	-	- -	210	23.7 (3.2)	100	17.8 (4.6)	221	12.3 (2.4)	204	9.5 (2.3)	172	7.8 (2.5)
6-11	-	- -	-	- -	453	7.2 (1.4)	246	4.4 (1.6)	495	0.8 (0.4)	452	2.6 (1.1)	407	2.7 (1.6)
12-18	-	- -	-	- -	480	3.2 (0.9)	203	5.7 (2.0)	392	0.8 (0.4)	454	1.3 (0.5)	382	1.7 (1.0)
19-29	-	- -	-	- -	407	12.0 (1.9)	134	10.3 (2.6)	282	11.4 (2.1)	416	10.8 (1.8)	270	12.1 (2.3)
30-49	-	- -	-	- -	1,322	11.2 (1.1)	487	14.6 (1.6)	979	11.6 (1.3)	1,065	11.0 (1.0)	925	14.4 (1.6)
50-64	-	- -	-	- -	628	30.6 (2.3)	284	26.6 (3.3)	657	32.0 (2.2)	759	34.8 (2.0)	673	30.4 (2.6)
65+	-	- -	-	- -	375	64.5 (2.7)	291	61.6 (3.5)	566	63.8 (2.6)	676	60.7 (2.1)	611	59.5 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,194	15.5 (0.8)	1,295	15.8 (1.2)	2,780	14.0 (0.9)	3,170	15.1 (0.7)	2,813	14.8 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	795	32.9 (3.2)	523	30.2 (3.4)	917	38.0 (4.1)	1,014	34.7 (3.1)	742	36.1 (3.6)

1) 점심식사 가족동반식사율 : 점심식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 점심식사 가족동반식사율 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,032	23.8 (1.7)	437	25.3 (2.5)	903	21.8 (1.9)	1,050	20.6 (1.6)	877	20.0 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	999	16.8 (1.3)	444	19.4 (2.0)	887	19.4 (1.7)	1,017	19.9 (1.7)	875	19.6 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	973	18.3 (1.5)	431	17.2 (2.1)	901	15.5 (1.5)	1,035	16.9 (1.3)	878	16.4 (1.6)
상	-	- -	-	- -	951	15.8 (1.4)	428	15.1 (1.9)	911	15.7 (1.7)	1,039	17.5 (1.5)	884	21.0 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,194	17.4 (0.8)	1,295	17.0 (1.1)	2,780	15.3 (0.8)	3,170	16.1 (0.7)	2,813	15.6 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	795	27.9 (2.7)	523	28.9 (2.3)	917	31.9 (3.2)	1,014	27.2 (2.1)	742	29.4 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,032	26.0 (1.8)	437	26.2 (2.3)	903	22.8 (1.6)	1,050	20.2 (1.2)	877	20.3 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	999	17.6 (1.2)	444	19.8 (1.9)	887	19.3 (1.5)	1,017	19.6 (1.6)	875	19.6 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	973	19.8 (1.5)	431	18.7 (1.8)	901	16.3 (1.3)	1,035	17.5 (1.3)	878	15.7 (1.4)
상	-	- -	-	- -	951	16.1 (1.3)	428	15.3 (1.7)	911	16.0 (1.5)	1,039	16.7 (1.3)	884	20.0 (1.9)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,451	23.4 (1.0)	2,267	23.6 (1.3)	4,942	21.9 (1.0)	5,210	22.4 (0.8)	4,470	22.8 (1.3)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,451	23.6 (0.9)	2,267	22.9 (1.2)	4,942	20.9 (0.9)	5,210	21.0 (0.7)	4,470	21.2 (1.1)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	105	70.6 (4.8)	45	69.8 (7.1)	140	72.5 (3.9)	115	57.5 (4.9)	128	52.9 (5.3)
3-5	-	- -	-	- -	191	24.0 (3.9)	89	20.6 (5.5)	180	5.8 (1.8)	178	11.6 (2.6)	179	6.6 (1.7)
6-11	-	- -	-	- -	445	6.5 (1.4)	229	6.7 (2.4)	459	1.4 (0.5)	429	1.6 (0.6)	372	1.7 (0.9)
12-18	-	- -	-	- -	420	3.1 (1.2)	166	2.4 (1.2)	368	1.7 (0.7)	428	3.1 (1.1)	321	2.4 (1.3)
19-29	-	- -	-	- -	564	16.9 (1.8)	197	24.0 (3.5)	482	16.5 (2.0)	528	15.7 (1.7)	423	18.2 (2.6)
30-49	-	- -	-	- -	1,601	20.7 (1.1)	712	20.9 (1.8)	1,534	20.3 (1.4)	1,606	19.2 (1.1)	1,328	21.1 (1.4)
50-64	-	- -	-	- -	696	38.4 (2.2)	408	36.1 (3.0)	886	34.3 (2.0)	977	36.5 (1.9)	940	32.5 (2.6)
65+	-	- -	-	- -	429	50.2 (2.7)	421	36.1 (2.8)	893	38.2 (2.1)	949	42.0 (2.1)	779	42.0 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,616	20.1 (1.0)	1,647	20.8 (1.4)	3,764	19.2 (1.1)	3,969	19.6 (0.8)	3,534	18.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	835	39.5 (3.1)	620	33.8 (3.5)	1,178	34.8 (3.2)	1,241	35.4 (3.1)	936	38.9 (3.8)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,094	29.2 (1.9)	540	25.2 (2.5)	1,167	22.5 (1.9)	1,289	21.2 (1.4)	1,078	23.3 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	1,118	24.3 (1.6)	532	23.5 (2.1)	1,199	24.5 (1.9)	1,285	25.5 (1.6)	1,112	22.1 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	1,107	22.0 (1.5)	539	26.4 (2.4)	1,215	21.2 (1.6)	1,268	22.5 (1.4)	1,123	24.2 (1.8)
상	-	- -	-	- -	1,091	18.6 (1.6)	527	22.5 (2.3)	1,208	20.5 (1.6)	1,310	20.1 (1.4)	1,096	22.5 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,616	20.8 (1.0)	1,647	20.5 (1.3)	3,764	18.8 (1.0)	3,969	19.2 (0.8)	3,534	17.8 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	835	33.9 (2.9)	620	32.3 (2.7)	1,178	30.0 (2.7)	1,241	27.3 (2.3)	936	34.2 (3.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,094	31.1 (1.8)	540	25.3 (2.3)	1,167	21.9 (1.7)	1,289	20.7 (1.4)	1,078	22.3 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	1,118	24.7 (1.5)	532	23.1 (1.9)	1,199	24.2 (1.8)	1,285	24.6 (1.5)	1,112	21.4 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,107	21.9 (1.5)	539	25.2 (2.5)	1,215	20.1 (1.6)	1,268	20.6 (1.3)	1,123	21.5 (1.6)
상	-	- -	-	- -	1,091	17.6 (1.5)	527	21.4 (2.2)	1,208	18.9 (1.4)	1,310	18.0 (1.3)	1,096	20.2 (1.8)

표 2-III-9. 저녁식사 가족동반식사율[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	8,440	76.1 (0.8)	4,086	68.1 (1.4)	8,639	68.6 (1.0)	9,394	67.8 (0.9)	8,025	67.7 (1.0)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,440	76.0 (0.7)	4,086	68.3 (1.3)	8,639	68.8 (0.9)	9,394	68.1 (0.8)	8,025	68.0 (0.9)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	219	96.8 (1.4)	118	94.5 (2.3)	245	96.5 (1.2)	273	91.9 (2.2)	243	95.9 (1.2)
3-5	-	- -	-	- -	401	96.8 (1.3)	189	96.7 (1.4)	401	96.4 (1.3)	382	97.3 (0.9)	351	98.6 (0.6)
6-11	-	- -	-	- -	898	93.7 (1.0)	475	95.7 (1.1)	954	96.2 (0.8)	881	96.2 (0.7)	779	95.0 (1.0)
12-18	-	- -	-	- -	900	66.9 (1.8)	369	63.1 (2.7)	760	62.3 (2.0)	882	59.0 (2.0)	703	54.9 (2.5)
19-29	-	- -	-	- -	971	62.0 (1.8)	330	53.8 (3.5)	764	47.6 (2.4)	944	48.7 (2.3)	693	47.8 (2.4)
30-49	-	- -	-	- -	2,923	74.8 (1.1)	1,200	68.3 (1.9)	2,513	69.8 (1.3)	2,671	68.4 (1.1)	2,253	69.2 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	1,324	75.6 (1.7)	693	63.1 (3.0)	1,543	68.6 (1.7)	1,736	68.8 (1.5)	1,613	68.3 (1.9)
65+	-	- -	-	- -	804	87.4 (1.4)	712	67.4 (2.2)	1,459	70.0 (1.7)	1,625	70.8 (1.5)	1,390	72.6 (1.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,810	74.9 (0.9)	2,944	65.1 (1.6)	6,544	67.6 (1.1)	7,139	66.3 (1.1)	6,347	65.6 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	81.8 (1.5)	1,142	78.8 (2.5)	2,095	73.5 (2.0)	2,255	74.6 (1.2)	1,678	75.5 (2.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,126	78.0 (1.5)	977	71.2 (2.3)	2,070	68.8 (2.0)	2,339	66.0 (1.7)	1,955	66.5 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	2,117	78.5 (1.3)	976	71.0 (2.4)	2,086	69.5 (1.5)	2,302	69.5 (1.3)	1,987	66.0 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	2,080	73.9 (1.4)	970	65.3 (2.8)	2,116	69.7 (1.6)	2,303	68.7 (1.4)	2,001	69.1 (1.7)
상	-	- -	-	- -	2,042	74.1 (1.4)	956	65.3 (2.5)	2,119	68.3 (1.6)	2,349	67.2 (1.6)	1,980	69.4 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,810	75.0 (0.8)	2,944	65.8 (1.4)	6,544	67.8 (0.9)	7,139	66.8 (0.9)	6,347	66.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,630	80.2 (1.5)	1,142	78.4 (2.6)	2,095	73.6 (2.2)	2,255	73.6 (1.4)	1,678	75.5 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,126	78.3 (1.4)	977	71.4 (2.1)	2,070	69.1 (1.8)	2,339	66.3 (1.5)	1,955	66.8 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	2,117	78.6 (1.2)	976	70.8 (2.2)	2,086	69.5 (1.4)	2,302	70.1 (1.2)	1,987	66.6 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,080	73.9 (1.3)	970	65.7 (2.6)	2,116	69.7 (1.5)	2,303	69.0 (1.3)	2,001	69.2 (1.6)
상	-	- -	-	- -	2,042	73.5 (1.4)	956	65.2 (2.3)	2,119	68.3 (1.5)	2,349	66.8 (1.5)	1,980	69.3 (1.7)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	3,989	75.3 (1.0)	1,819	65.4 (1.7)	3,697	66.3 (1.2)	4,184	66.2 (1.1)	3,555	65.3 (1.3)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,989	75.3 (0.9)	1,819	65.5 (1.5)	3,697	66.5 (1.1)	4,184	66.4 (1.0)	3,555	65.4 (1.1)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	114	96.7 (1.7)	73	94.1 (2.9)	105	94.1 (2.4)	158	93.7 (2.8)	115	96.7 (1.4)
3-5	-	- -	-	- -	210	96.0 (1.7)	100	97.1 (1.7)	221	95.0 (2.1)	204	97.5 (1.3)	172	99.1 (0.9)
6-11	-	- -	-	- -	453	93.4 (1.3)	246	96.7 (1.1)	495	96.3 (0.9)	452	96.5 (0.9)	407	93.8 (1.7)
12-18	-	- -	-	- -	480	67.2 (2.2)	203	68.7 (3.0)	392	61.5 (3.0)	454	57.6 (2.5)	382	53.7 (3.2)
19-29	-	- -	-	- -	407	60.6 (2.6)	134	47.3 (4.9)	282	42.0 (3.2)	416	45.3 (2.8)	270	45.4 (3.4)
30-49	-	- -	-	- -	1,322	73.1 (1.4)	487	57.9 (2.4)	979	63.5 (1.8)	1,065	62.2 (1.6)	925	60.4 (1.8)
50-64	-	- -	-	- -	628	74.4 (2.2)	285	63.3 (3.6)	657	67.8 (2.4)	759	69.3 (2.1)	673	70.9 (2.3)
65+	-	- -	-	- -	375	91.6 (1.5)	291	83.1 (2.2)	566	83.5 (1.8)	676	84.2 (1.6)	611	82.3 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,194	74.3 (1.1)	1,296	62.4 (1.9)	2,780	64.6 (1.3)	3,170	64.2 (1.3)	2,813	62.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	795	79.8 (2.0)	523	75.6 (3.2)	917	74.3 (3.1)	1,014	75.1 (1.8)	742	76.4 (2.5)

1) 저녁식사 가족동반식사율 : 저녁식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저녁식사 가족동반식사율 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,032	78.3 (1.8)	437	68.5 (2.8)	903	69.1 (2.5)	1,050	66.5 (2.2)	877	65.7 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	999	76.6 (1.7)	445	67.9 (2.7)	887	67.7 (1.9)	1,017	67.5 (2.0)	875	64.5 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	973	73.3 (1.8)	431	62.7 (3.7)	901	66.3 (2.4)	1,035	67.4 (1.8)	878	64.2 (2.4)
상	-	- -	-	- -	951	73.2 (1.9)	428	61.6 (3.2)	911	63.7 (2.2)	1,039	63.7 (2.1)	884	66.2 (2.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,194	74.6 (1.0)	1,296	63.2 (1.7)	2,780	65.2 (1.1)	3,170	64.9 (1.1)	2,813	63.2 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	795	78.1 (1.8)	523	74.1 (3.5)	917	71.9 (3.3)	1,014	72.5 (2.0)	742	74.5 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,032	78.7 (1.7)	437	69.3 (2.5)	903	69.7 (2.1)	1,050	67.0 (1.9)	877	65.3 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	999	76.7 (1.6)	445	66.9 (2.8)	887	67.4 (1.8)	1,017	68.1 (1.9)	875	65.3 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	973	73.3 (1.8)	431	63.8 (3.5)	901	66.4 (2.2)	1,035	68.0 (1.7)	878	64.6 (2.3)
상	-	- -	-	- -	951	72.6 (1.8)	428	61.6 (3.0)	911	64.0 (2.1)	1,039	62.9 (1.9)	884	66.1 (2.3)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,451	76.9 (0.9)	2,267	70.8 (1.8)	4,942	70.9 (1.1)	5,210	69.5 (1.0)	4,470	70.2 (1.1)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,451	76.7 (0.8)	2,267	71.7 (1.5)	4,942	71.7 (1.0)	5,210	70.3 (0.9)	4,470	71.0 (1.0)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	105	96.9 (2.2)	45	95.1 (3.5)	140	98.3 (0.9)	115	89.8 (3.3)	128	95.0 (2.1)
3-5	-	- -	-	- -	191	97.7 (1.2)	89	96.4 (2.0)	180	98.5 (0.9)	178	97.1 (1.3)	179	98.1 (1.1)
6-11	-	- -	-	- -	445	94.0 (1.2)	229	94.7 (1.9)	459	96.1 (1.2)	429	95.9 (1.1)	372	96.3 (1.2)
12-18	-	- -	-	- -	420	66.5 (2.6)	166	56.1 (4.2)	368	63.1 (3.0)	428	60.6 (3.0)	321	56.4 (4.3)
19-29	-	- -	-	- -	564	63.5 (2.3)	196	60.6 (4.2)	482	53.5 (3.1)	528	52.2 (2.7)	423	50.2 (2.8)
30-49	-	- -	-	- -	1,601	76.5 (1.3)	713	79.2 (2.1)	1,534	76.4 (1.4)	1,606	74.9 (1.4)	1,328	78.4 (1.5)
50-64	-	- -	-	- -	696	76.7 (1.9)	408	62.9 (3.8)	886	69.4 (1.9)	977	68.3 (1.8)	940	65.8 (2.4)
65+	-	- -	-	- -	429	83.7 (2.2)	421	56.9 (3.0)	893	60.8 (2.2)	949	61.7 (2.0)	779	65.9 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,616	75.4 (1.0)	1,648	67.8 (2.0)	3,764	70.5 (1.2)	3,969	68.5 (1.1)	3,534	69.0 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	835	83.8 (1.4)	619	82.4 (2.4)	1,178	72.6 (2.0)	1,241	74.0 (1.8)	936	74.6 (3.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,094	77.7 (1.8)	540	73.8 (2.6)	1,167	68.6 (2.6)	1,289	65.5 (1.8)	1,078	67.4 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	1,118	80.4 (1.5)	531	74.4 (3.2)	1,199	71.3 (1.9)	1,285	71.5 (1.4)	1,112	67.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,107	74.6 (1.6)	539	67.9 (3.0)	1,215	73.0 (1.9)	1,268	70.1 (1.8)	1,123	74.1 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,091	74.9 (1.8)	528	69.2 (3.2)	1,208	73.1 (1.7)	1,310	70.8 (1.9)	1,096	72.8 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,616	75.4 (0.9)	1,648	69.0 (1.7)	3,764	70.9 (1.1)	3,969	69.1 (1.0)	3,534	69.8 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	835	82.8 (1.6)	619	83.7 (2.3)	1,178	76.8 (1.6)	1,241	75.5 (1.7)	936	77.0 (2.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,094	78.0 (1.6)	540	74.5 (2.4)	1,167	69.2 (2.5)	1,289	66.3 (1.7)	1,078	69.0 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	1,118	80.4 (1.4)	531	75.0 (2.8)	1,199	72.0 (1.7)	1,285	73.0 (1.4)	1,112	68.4 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	1,107	74.6 (1.5)	539	68.0 (2.7)	1,215	73.7 (1.8)	1,268	70.4 (1.7)	1,123	74.3 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,091	74.5 (1.7)	528	69.8 (3.1)	1,208	73.2 (1.6)	1,310	70.9 (1.8)	1,096	73.0 (2.0)

표 2-III-10. 아침식사 가족동반식사율[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	8,025	55.1 (1.2)	3,555	52.2 (1.4)	4,470	58.1 (1.4)
19세이상	5,949	51.9 (1.3)	2,479	48.5 (1.6)	3,470	55.2 (1.4)
연령(세)						
1-9	1,104	80.9 (1.7)	552	80.5 (2.3)	552	81.3 (2.2)
10-18	972	57.6 (2.4)	524	54.5 (2.6)	448	61.4 (3.6)
19-29	693	30.6 (2.0)	270	27.1 (3.0)	423	34.3 (2.8)
30-39	1,148	44.7 (1.8)	445	30.0 (2.4)	703	60.3 (2.4)
40-49	1,105	55.2 (2.0)	480	54.3 (2.2)	625	56.1 (2.6)
50-59	1,107	59.6 (2.5)	442	60.0 (3.1)	665	59.1 (3.1)
60-69	1,001	70.5 (2.0)	453	75.1 (2.7)	548	66.3 (2.6)
70+	895	69.3 (2.4)	389	80.8 (2.6)	506	62.3 (3.0)
1-2	243	80.6 (3.1)	115	80.2 (4.7)	128	81.1 (4.3)
3-5	351	79.6 (3.0)	172	82.0 (3.7)	179	77.2 (3.9)
6-11	779	80.9 (2.0)	407	79.2 (2.5)	372	82.6 (2.7)
12-18	703	52.3 (2.8)	382	49.2 (3.2)	321	56.1 (4.1)
19-29	693	30.6 (2.0)	270	27.1 (3.0)	423	34.3 (2.8)
30-49	2,253	50.0 (1.4)	925	42.3 (1.8)	1,328	58.1 (1.8)
50-64	1,613	61.7 (2.1)	673	62.1 (2.4)	940	61.3 (2.7)
65+	1,390	70.6 (2.0)	611	81.6 (2.1)	779	63.0 (2.5)
거주지역						
동	6,347	51.6 (1.1)	2,813	48.3 (1.4)	3,534	54.9 (1.3)
읍면	1,678	68.0 (3.4)	742	66.5 (3.6)	936	69.5 (3.7)
소득수준[2]						
하	1,955	53.7 (1.8)	877	50.8 (2.5)	1,078	56.7 (2.0)
중하	1,987	54.7 (1.8)	875	52.1 (2.3)	1,112	57.4 (2.2)
중상	2,001	56.1 (1.9)	878	53.6 (2.4)	1,123	58.6 (2.3)
상	1,980	56.9 (1.9)	884	52.8 (2.4)	1,096	61.1 (2.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,347	52.1 (1.0)	2,813	49.3 (1.3)	3,534	55.4 (1.2)
읍면	1,678	65.1 (3.3)	742	61.0 (3.4)	936	70.0 (3.7)
소득수준(표준화)						
하	1,955	53.5 (1.6)	877	50.3 (2.1)	1,078	57.4 (2.0)
중하	1,987	54.5 (1.6)	875	51.9 (2.1)	1,112	57.5 (2.0)
중상	2,001	55.5 (1.8)	878	53.5 (2.2)	1,123	57.8 (2.2)
상	1,980	56.2 (1.8)	884	52.7 (2.0)	1,096	60.3 (2.2)

1) 아침식사 가족동반식사율 : 아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-11. 점심식사 가족동반식사율[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	8,025	21.1 (1.1)	3,555	19.4 (1.2)	4,470	22.8 (1.3)
19세이상	5,949	24.8 (1.3)	2,479	23.0 (1.4)	3,470	26.6 (1.4)
연령(세)						
1-9	1,104	14.3 (1.4)	552	13.9 (1.9)	552	14.8 (1.7)
10-18	972	2.1 (0.7)	524	2.1 (0.9)	448	2.0 (1.0)
19-29	693	15.1 (1.6)	270	12.1 (2.3)	423	18.2 (2.6)
30-39	1,148	19.2 (1.8)	445	13.0 (2.2)	703	25.9 (2.2)
40-49	1,105	16.1 (1.6)	480	15.8 (2.1)	625	16.5 (1.8)
50-59	1,107	27.4 (2.6)	442	26.7 (3.0)	665	28.1 (2.8)
60-69	1,001	46.3 (2.4)	453	47.7 (3.3)	548	45.0 (2.9)
70+	895	49.1 (2.7)	389	62.1 (2.9)	506	41.0 (3.1)
1-2	243	50.7 (4.1)	115	48.7 (5.6)	128	52.9 (5.3)
3-5	351	7.2 (1.6)	172	7.8 (2.5)	179	6.6 (1.7)
6-11	779	2.2 (1.0)	407	2.7 (1.6)	372	1.7 (0.9)
12-18	703	2.0 (0.8)	382	1.7 (1.0)	321	2.4 (1.3)
19-29	693	15.1 (1.6)	270	12.1 (2.3)	423	18.2 (2.6)
30-49	2,253	17.7 (1.3)	925	14.4 (1.6)	1,328	21.1 (1.4)
50-64	1,613	31.4 (2.4)	673	30.4 (2.6)	940	32.5 (2.6)
65+	1,390	49.2 (2.4)	611	59.5 (2.5)	779	42.0 (2.7)
거주지역						
동	6,347	16.6 (0.8)	2,813	14.8 (0.9)	3,534	18.3 (1.0)
읍면	1,678	37.5 (3.5)	742	36.1 (3.6)	936	38.9 (3.8)
소득수준[2]						
하	1,955	21.6 (1.5)	877	20.0 (1.7)	1,078	23.3 (1.8)
중하	1,987	20.9 (1.6)	875	19.6 (1.8)	1,112	22.1 (1.8)
중상	2,001	20.3 (1.5)	878	16.4 (1.6)	1,123	24.2 (1.8)
상	1,980	21.8 (1.9)	884	21.0 (2.1)	1,096	22.5 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,347	16.6 (0.8)	2,813	15.6 (0.9)	3,534	17.8 (0.9)
읍면	1,678	31.4 (2.8)	742	29.4 (2.9)	936	34.2 (3.2)
소득수준(표준화)						
하	1,955	21.2 (1.3)	877	20.3 (1.5)	1,078	22.3 (1.6)
중하	1,987	20.3 (1.4)	875	19.6 (1.6)	1,112	21.4 (1.7)
중상	2,001	18.4 (1.2)	878	15.7 (1.4)	1,123	21.5 (1.6)
상	1,980	20.0 (1.7)	884	20.0 (1.9)	1,096	20.2 (1.8)

1) 점심식사 가족동반식사율 : 점심식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-12. 저녁식사 가족동반식사율[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	8,025	67.7 (1.0)	3,555	65.3 (1.3)	4,470	70.2 (1.1)
19세이상	5,949	65.3 (1.1)	2,479	62.4 (1.4)	3,470	68.1 (1.2)
연령(세)						
1-9	1,104	97.9 (0.5)	552	97.8 (0.8)	552	98.0 (0.6)
10-18	972	61.7 (2.2)	524	59.8 (2.7)	448	64.0 (3.8)
19-29	693	47.8 (2.4)	270	45.4 (3.4)	423	50.2 (2.8)
30-39	1,148	69.0 (1.7)	445	56.2 (2.4)	703	82.6 (1.8)
40-49	1,105	69.4 (1.9)	480	64.5 (2.7)	625	74.4 (2.3)
50-59	1,107	66.1 (2.2)	442	68.6 (2.7)	665	63.5 (2.8)
60-69	1,001	75.2 (1.8)	453	80.2 (2.2)	548	70.5 (2.4)
70+	895	71.2 (2.4)	389	81.7 (2.5)	506	64.8 (3.0)
1-2	243	95.9 (1.2)	115	96.7 (1.4)	128	95.0 (2.1)
3-5	351	98.6 (0.6)	172	99.1 (0.9)	179	98.1 (1.1)
6-11	779	95.0 (1.0)	407	93.8 (1.7)	372	96.3 (1.2)
12-18	703	54.9 (2.5)	382	53.7 (3.2)	321	56.4 (4.3)
19-29	693	47.8 (2.4)	270	45.4 (3.4)	423	50.2 (2.8)
30-49	2,253	69.2 (1.3)	925	60.4 (1.8)	1,328	78.4 (1.5)
50-64	1,613	68.3 (1.9)	673	70.9 (2.3)	940	65.8 (2.4)
65+	1,390	72.6 (1.9)	611	82.3 (2.0)	779	65.9 (2.5)
거주지역						
동	6,347	65.6 (1.1)	2,813	62.3 (1.3)	3,534	69.0 (1.2)
읍면	1,678	75.5 (2.3)	742	76.4 (2.5)	936	74.6 (3.0)
소득수준[2]						
하	1,955	66.5 (1.6)	877	65.7 (2.3)	1,078	67.4 (1.8)
중하	1,987	66.0 (1.7)	875	64.5 (2.3)	1,112	67.5 (2.0)
중상	2,001	69.1 (1.7)	878	64.2 (2.4)	1,123	74.1 (1.9)
상	1,980	69.4 (1.8)	884	66.2 (2.3)	1,096	72.8 (2.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,347	66.3 (1.0)	2,813	63.2 (1.2)	3,534	69.8 (1.1)
읍면	1,678	75.5 (2.1)	742	74.5 (2.5)	936	77.0 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	1,955	66.8 (1.5)	877	65.3 (2.1)	1,078	69.0 (1.8)
중하	1,987	66.6 (1.6)	875	65.3 (2.2)	1,112	68.4 (1.9)
중상	2,001	69.2 (1.6)	878	64.6 (2.3)	1,123	74.3 (1.9)
상	1,980	69.3 (1.7)	884	66.1 (2.3)	1,096	73.0 (2.0)

1) 저녁식사 가족동반식사율 : 저녁식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-13. 하루 1회 이상 외식률[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08			'09			'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)		N	분율(표준오차)		N	분율(표준오차)
전체																
1세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	8,635	23.7	(1.0)	9,386	23.9	(0.9)	8,019	25.3 (0.9)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	8,635	24.2	(0.9)	9,386	24.5	(0.9)	8,019	26.1 (0.8)
연령(세)																
1-2	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	243	6.5	(2.0)	270	5.4	(1.6)	243	8.1 (2.0)
3-5	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	401	15.0	(2.6)	381	10.7	(1.9)	349	16.4 (2.6)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	954	16.4	(1.9)	881	15.1	(2.4)	778	13.1 (1.5)
12-18	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	760	33.4	(2.1)	882	33.2	(2.3)	702	38.4 (2.5)
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	764	40.3	(2.7)	944	40.4	(2.0)	693	42.0 (2.3)
30-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,512	27.0	(1.3)	2,670	29.1	(1.3)	2,253	29.2 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,542	14.3	(1.3)	1,734	14.1	(1.2)	1,612	17.6 (1.5)
65+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,459	3.5	(0.6)	1,624	2.5	(0.5)	1,389	3.4 (0.5)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	6,541	25.0	(1.1)	7,131	24.8	(1.0)	6,342	27.5 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,094	17.2	(2.3)	2,255	19.8	(2.1)	1,677	17.0 (1.7)
소득수준[3]																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,068	21.4	(1.8)	2,335	20.8	(1.5)	1,953	21.6 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,086	22.5	(1.4)	2,300	22.2	(1.2)	1,986	24.0 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,115	24.7	(1.5)	2,302	25.5	(1.3)	1,998	26.4 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,118	26.6	(1.4)	2,348	26.9	(1.4)	1,980	30.6 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	6,541	24.8	(1.1)	7,131	24.5	(1.0)	6,342	27.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,094	20.5	(2.3)	2,255	24.9	(2.0)	1,677	20.1 (1.6)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,068	21.6	(1.5)	2,335	21.0	(1.3)	1,953	21.8 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,086	22.9	(1.3)	2,300	23.0	(1.2)	1,986	24.3 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,115	25.1	(1.4)	2,302	26.0	(1.3)	1,998	27.6 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,118	27.2	(1.5)	2,348	28.0	(1.5)	1,980	32.3 (1.8)
남자																
1세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,696	32.2	(1.4)	4,180	33.2	(1.2)	3,551	35.5 (1.4)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,696	32.0	(1.3)	4,180	33.2	(1.2)	3,551	35.6 (1.3)
연령(세)																
1-2	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	104	5.9	(3.7)	156	4.0	(1.7)	115	10.1 (3.2)
3-5	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	221	14.8	(2.8)	204	12.0	(2.7)	171	18.9 (3.7)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	495	16.3	(2.2)	452	16.5	(2.8)	406	12.7 (2.1)
12-18	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	392	34.4	(2.8)	454	34.9	(2.9)	381	40.0 (3.4)
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	282	47.0	(3.5)	416	48.2	(2.9)	270	49.0 (3.7)
30-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	979	42.5	(2.1)	1,064	45.5	(2.0)	925	47.0 (2.1)
50-64	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	657	21.9	(2.2)	758	21.7	(2.2)	672	27.5 (2.4)
65+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	566	3.9	(0.9)	676	4.0	(0.8)	611	6.6 (1.1)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,780	34.3	(1.6)	3,166	34.6	(1.4)	2,809	38.6 (1.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	916	22.0	(3.1)	1,014	26.8	(3.1)	742	24.1 (2.4)

1) 하루 1회 이상 외식률 : 외식빈도 설문에 '하루 2회 이상' 또는 '하루 1회'로 응답한 대상자 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 하루 1회 이상 외식률 추이, 성별, 만1세이상, 2008-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	903	26.8 (2.3)	1,048	26.9 (2.0)	876	30.4 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	887	31.0 (2.0)	1,015	32.6 (1.9)	874	32.9 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	901	34.3 (2.4)	1,035	35.2 (2.1)	876	38.1 (2.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	910	37.1 (2.1)	1,039	38.1 (2.4)	884	42.4 (2.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,780	33.4 (1.5)	3,166	33.6 (1.3)	2,809	37.7 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	916	25.1 (3.1)	1,014	32.1 (3.2)	742	26.8 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	903	26.5 (2.1)	1,048	26.4 (1.8)	876	30.4 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	887	31.1 (2.0)	1,015	32.8 (1.9)	874	32.7 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	901	33.8 (2.2)	1,035	35.0 (1.9)	876	37.9 (2.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	910	36.8 (2.1)	1,039	38.8 (2.2)	884	43.1 (2.4)
여자														
1세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	4,939	15.1 (0.9)	5,206	14.5 (0.8)	4,468	14.9 (0.8)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	4,939	16.0 (0.9)	5,206	15.5 (0.9)	4,468	16.2 (0.8)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	139	7.0 (2.2)	114	7.0 (2.6)	128	5.8 (2.2)
3-5	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	180	15.2 (3.6)	177	9.5 (2.2)	178	13.9 (2.9)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	459	16.5 (2.3)	429	13.7 (2.6)	372	13.6 (2.2)
12-18	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	368	32.3 (3.0)	428	31.2 (3.1)	321	36.5 (3.1)
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	482	33.1 (3.1)	528	32.0 (2.4)	423	34.7 (2.6)
30-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,533	10.7 (1.0)	1,606	11.9 (1.1)	1,328	10.4 (1.0)
50-64	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	885	6.8 (1.0)	976	6.6 (1.0)	940	7.9 (1.3)
65+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	893	3.2 (0.7)	948	1.5 (0.5)	778	1.2 (0.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,761	15.7 (1.0)	3,965	14.9 (0.9)	3,533	16.3 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,178	12.2 (1.9)	1,241	12.5 (1.9)	935	10.0 (1.7)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,165	15.8 (1.9)	1,287	14.5 (1.4)	1,077	12.5 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,199	13.8 (1.5)	1,285	12.0 (1.2)	1,112	15.2 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,214	15.4 (1.5)	1,267	15.5 (1.4)	1,122	14.8 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,208	15.7 (1.4)	1,309	15.8 (1.4)	1,096	18.5 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,761	16.0 (1.0)	3,965	15.3 (0.9)	3,533	16.8 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,178	15.2 (2.0)	1,241	16.6 (2.2)	935	12.6 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,165	16.6 (1.6)	1,287	15.2 (1.4)	1,077	12.7 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,199	14.3 (1.5)	1,285	12.7 (1.2)	1,112	15.9 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,214	16.0 (1.3)	1,267	16.6 (1.4)	1,122	16.9 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,208	16.8 (1.4)	1,309	17.2 (1.5)	1,096	20.9 (1.8)

표 2-III-14. 외식 섭취빈도 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	하루 2회 이상	하루 1회	주 5~6회	주 3~4회	주 1~2회	월 1~3회	거의 안 함
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1세이상	8,019	9.2 (0.6)	16.0 (0.7)	26.6 (1.0)	6.5 (0.4)	16.6 (0.6)	16.3 (0.6)	8.7 (0.6)
19세이상	5,947	9.1 (0.6)	16.3 (0.7)	16.1 (0.8)	8.0 (0.5)	19.8 (0.8)	20.0 (0.8)	10.6 (0.7)
성별								
남자	3,551	13.2 (0.9)	22.3 (1.1)	29.7 (1.3)	6.7 (0.6)	12.0 (0.8)	10.7 (0.7)	5.4 (0.5)
여자	4,468	5.2 (0.5)	9.7 (0.6)	23.4 (1.1)	6.4 (0.5)	21.2 (0.9)	22.0 (0.8)	12.1 (0.8)
연령(세)								
1-9	1,101	1.3 (0.5)	12.6 (1.4)	69.3 (2.1)	0.6 (0.2)	8.3 (1.0)	4.3 (0.6)	3.6 (0.8)
10-18	971	15.9 (1.7)	16.8 (1.8)	62.9 (2.1)	1.3 (0.5)	1.7 (0.7)	1.3 (0.5)	0.0 (-)[2]
19-29	693	15.8 (1.8)	26.2 (1.9)	21.4 (2.1)	11.2 (1.3)	16.2 (1.7)	8.0 (1.2)	1.2 (0.4)
30-39	1,148	11.4 (1.3)	19.9 (1.4)	20.0 (1.5)	8.1 (0.9)	23.0 (1.6)	14.6 (1.2)	3.1 (0.6)
40-49	1,105	8.6 (1.1)	18.5 (1.4)	19.8 (1.6)	8.1 (1.1)	21.1 (1.5)	18.4 (1.4)	5.5 (0.9)
50-59	1,106	7.9 (1.2)	12.8 (1.3)	13.8 (1.3)	8.5 (1.0)	19.1 (1.6)	26.3 (1.6)	11.5 (1.4)
60-69	1,001	2.9 (0.7)	4.1 (0.7)	6.3 (1.0)	4.9 (0.9)	20.2 (1.7)	37.3 (2.0)	24.4 (1.8)
70+	894	0.1 (0.1)	2.2 (0.6)	3.2 (0.6)	3.5 (0.7)	18.1 (1.9)	30.0 (1.7)	42.9 (2.3)
1-2	243	1.3 (0.7)	6.7 (1.9)	31.1 (3.9)	1.9 (0.9)	30.6 (3.3)	13.9 (2.1)	14.5 (2.8)
3-5	349	1.5 (0.7)	15.0 (2.5)	74.5 (3.1)	0.6 (0.3)	4.0 (1.3)	3.8 (0.9)	0.7 (0.7)
6-11	778	1.1 (0.5)	12.0 (1.5)	85.8 (1.7)	0.0 (-)	0.4 (0.2)	0.3 (0.2)	0.4 (0.2)
12-18	702	19.6 (2.0)	18.8 (2.1)	56.3 (2.5)	1.6 (0.6)	2.1 (0.8)	1.5 (0.6)	0.0 (-)
19-29	693	15.8 (1.8)	26.2 (1.9)	21.4 (2.1)	11.2 (1.3)	16.2 (1.7)	8.0 (1.2)	1.2 (0.4)
30-49	2,253	10.0 (0.9)	19.2 (1.0)	19.9 (1.2)	8.1 (0.7)	22.0 (1.2)	16.5 (1.0)	4.3 (0.6)
50-64	1,612	6.8 (1.0)	10.8 (1.1)	12.5 (1.1)	7.7 (0.9)	20.0 (1.3)	29.3 (1.6)	13.0 (1.3)
65+	1,389	0.7 (0.3)	2.7 (0.4)	3.4 (0.6)	3.9 (0.6)	17.9 (1.4)	32.0 (1.4)	39.3 (1.9)
거주지역								
동	6,342	9.9 (0.7)	17.6 (0.8)	27.9 (1.1)	6.8 (0.5)	16.9 (0.8)	14.6 (0.6)	6.3 (0.4)
읍면	1,677	6.8 (1.0)	10.2 (1.4)	21.7 (1.8)	5.5 (0.9)	15.5 (1.3)	22.5 (1.4)	17.7 (2.0)
소득수준[1]								
하	1,953	7.1 (0.7)	14.4 (1.1)	27.1 (1.6)	6.1 (0.8)	14.7 (1.3)	17.3 (1.1)	13.2 (1.1)
중하	1,986	9.8 (1.0)	14.2 (1.1)	28.8 (1.5)	5.7 (0.7)	17.3 (1.1)	16.6 (1.0)	7.6 (0.9)
중상	1,998	9.5 (1.0)	16.9 (1.2)	25.4 (1.5)	6.2 (0.7)	17.9 (1.1)	17.0 (1.1)	7.1 (0.7)
상	1,980	11.1 (1.3)	19.5 (1.4)	24.8 (1.3)	8.1 (0.8)	16.4 (1.2)	13.8 (1.0)	6.2 (0.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율이 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

표 2-III-15. 영양표시 이용률[1] 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
초등학생이상	-	- -	-	- -	8,321	21.4 (0.6)	3,726	24.4 (1.0)	7,902	22.3 (0.7)	8,625	23.8 (0.6)	7,342	24.9 (0.8)
초등학생이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,321	21.4 (0.6)	3,726	24.5 (1.0)	7,902	22.7 (0.7)	8,625	24.5 (0.6)	7,342	26.0 (0.8)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	836	10.2 (1.2)	420	14.0 (2.4)	870	9.2 (1.1)	773	13.6 (1.5)	704	13.2 (1.7)
12-18	-	- -	-	- -	902	17.7 (1.4)	369	28.4 (3.0)	757	22.7 (1.6)	882	25.1 (1.6)	702	31.4 (2.4)
19-29	-	- -	-	- -	1,058	23.7 (1.5)	331	31.7 (2.6)	763	33.7 (2.0)	943	35.8 (1.8)	693	40.7 (2.2)
30-49	-	- -	-	- -	3,054	29.6 (1.1)	1,201	32.0 (1.6)	2,512	29.4 (1.1)	2,669	31.7 (1.1)	2,246	32.3 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	1,458	17.3 (1.2)	693	15.4 (1.7)	1,543	13.8 (1.2)	1,734	13.5 (0.9)	1,608	11.8 (0.9)
65+	-	- -	-	- -	1,013	6.4 (0.9)	712	3.6 (0.8)	1,457	3.0 (0.6)	1,624	2.5 (0.6)	1,389	2.0 (0.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,666	22.4 (0.7)	2,689	25.4 (1.1)	5,902	23.5 (0.7)	6,508	25.3 (0.7)	5,777	26.8 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	16.6 (1.3)	1,037	20.7 (2.3)	2,000	16.9 (2.0)	2,117	17.1 (1.4)	1,565	17.7 (1.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,160	19.5 (1.0)	892	22.4 (2.2)	1,887	20.3 (1.2)	2,151	23.4 (1.2)	1,789	23.2 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	2,123	21.9 (1.1)	882	24.7 (2.1)	1,890	22.3 (1.2)	2,113	21.1 (1.1)	1,812	24.8 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	1,990	20.9 (1.1)	879	28.3 (1.9)	1,931	21.3 (1.3)	2,103	23.0 (1.1)	1,825	25.6 (1.3)
상	-	- -	-	- -	1,965	23.8 (1.4)	874	23.1 (1.9)	1,953	25.6 (1.1)	2,164	27.8 (1.3)	1,821	26.1 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,666	21.9 (0.6)	2,689	25.1 (1.1)	5,902	23.1 (0.7)	6,508	25.1 (0.7)	5,777	26.7 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	19.6 (1.4)	1,037	22.5 (2.3)	2,000	21.8 (2.0)	2,117	22.4 (1.4)	1,565	23.5 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,160	19.3 (0.9)	892	22.4 (2.1)	1,887	20.5 (1.1)	2,151	23.7 (1.1)	1,789	24.0 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	2,123	22.0 (1.1)	882	25.0 (2.0)	1,890	22.7 (1.2)	2,113	21.8 (1.1)	1,812	25.7 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	1,990	20.8 (1.1)	879	28.2 (1.8)	1,931	21.5 (1.3)	2,103	23.5 (1.1)	1,825	27.1 (1.5)
상	-	- -	-	- -	1,965	23.7 (1.4)	874	23.5 (2.0)	1,953	26.2 (1.2)	2,164	28.9 (1.3)	1,821	27.2 (1.6)
남자														
초등학생이상	-	- -	-	- -	3,846	13.3 (0.7)	1,620	17.2 (1.4)	3,327	14.1 (0.8)	3,763	16.0 (0.8)	3,223	16.4 (0.9)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,846	13.2 (0.7)	1,620	17.0 (1.4)	3,327	14.1 (0.8)	3,763	16.2 (0.8)	3,223	16.8 (0.9)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	424	7.0 (1.5)	219	15.4 (3.5)	454	9.4 (1.4)	397	13.4 (2.0)	370	12.0 (2.5)
12-18	-	- -	-	- -	481	13.2 (1.7)	203	19.5 (2.9)	389	16.1 (1.9)	454	19.1 (1.8)	382	22.7 (2.6)
19-29	-	- -	-	- -	454	13.3 (1.7)	134	27.3 (4.1)	282	21.9 (2.8)	416	25.3 (2.7)	270	28.9 (3.2)
30-49	-	- -	-	- -	1,405	16.2 (1.1)	488	18.4 (2.1)	979	16.3 (1.2)	1,063	18.5 (1.3)	921	18.7 (1.4)
50-64	-	- -	-	- -	677	11.7 (1.6)	285	10.2 (2.5)	657	7.9 (1.3)	757	7.7 (1.2)	670	5.8 (1.0)
65+	-	- -	-	- -	405	10.2 (1.6)	291	3.4 (1.2)	566	3.4 (1.0)	676	2.8 (1.1)	610	2.1 (0.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,070	13.6 (0.7)	1,150	18.3 (1.7)	2,461	14.6 (0.9)	2,826	17.1 (0.9)	2,537	17.1 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	776	12.2 (1.5)	470	13.5 (2.1)	866	11.6 (2.2)	937	10.9 (1.6)	686	13.7 (1.7)

1) 영양표시이용률 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 영양표시 이용률 추이, 성별, 초등학생이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,017	13.2 (1.3)	387	17.1 (2.8)	811	13.9 (1.6)	945	15.9 (1.5)	797	15.2 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	957	13.4 (1.2)	395	13.1 (2.3)	791	13.6 (1.5)	918	15.5 (1.5)	788	16.3 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	910	12.6 (1.2)	380	23.2 (2.8)	803	12.7 (1.5)	921	13.8 (1.2)	792	17.6 (1.8)
상	-	- -	-	- -	924	14.4 (1.6)	384	16.0 (2.5)	831	16.2 (1.6)	939	18.8 (1.8)	808	16.2 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,070	13.4 (0.7)	1,150	17.7 (1.6)	2,461	14.2 (0.9)	2,826	16.8 (0.9)	2,537	16.8 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	776	13.1 (1.6)	470	14.0 (2.1)	866	14.3 (2.6)	937	13.8 (1.9)	686	17.7 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,017	12.9 (1.3)	387	16.5 (2.6)	811	13.9 (1.5)	945	15.8 (1.4)	797	15.5 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	957	13.3 (1.2)	395	13.6 (2.2)	791	13.5 (1.5)	918	15.6 (1.5)	788	16.8 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	910	12.4 (1.2)	380	22.1 (2.4)	803	12.7 (1.5)	921	13.4 (1.2)	792	18.1 (1.9)
상	-	- -	-	- -	924	14.3 (1.6)	384	15.9 (2.5)	831	16.3 (1.6)	939	19.5 (1.9)	808	16.6 (1.8)
여자														
초등학생이상	-	- -	-	- -	4,475	29.5 (0.9)	2,106	31.6 (1.2)	4,575	30.5 (0.9)	4,862	31.7 (0.9)	4,119	33.4 (1.1)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,475	30.0 (0.8)	2,106	32.5 (1.2)	4,575	31.8 (0.9)	4,862	33.3 (0.8)	4,119	35.7 (1.1)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	412	13.6 (1.7)	201	12.7 (2.9)	416	8.9 (1.7)	376	13.9 (2.1)	334	14.5 (2.4)
12-18	-	- -	-	- -	421	23.2 (2.2)	166	39.8 (5.3)	368	30.2 (2.5)	428	32.0 (2.2)	320	42.3 (3.4)
19-29	-	- -	-	- -	604	34.6 (2.4)	197	36.3 (3.6)	481	46.3 (2.7)	527	47.0 (2.6)	423	53.1 (2.7)
30-49	-	- -	-	- -	1,649	43.6 (1.6)	713	46.1 (1.8)	1,533	43.2 (1.5)	1,606	45.5 (1.5)	1,325	46.5 (1.7)
50-64	-	- -	-	- -	781	22.7 (1.8)	408	20.5 (2.5)	886	19.6 (1.7)	977	19.3 (1.5)	938	17.8 (1.5)
65+	-	- -	-	- -	608	3.7 (0.9)	421	3.7 (1.0)	891	2.6 (0.7)	948	2.2 (0.6)	779	2.0 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,596	31.3 (1.0)	1,539	32.3 (1.4)	3,441	32.2 (1.0)	3,682	33.5 (1.0)	3,240	36.7 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	879	21.1 (1.9)	567	28.8 (3.3)	1,134	22.3 (2.5)	1,180	23.3 (1.8)	879	21.8 (2.0)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,143	26.1 (1.4)	505	27.9 (2.9)	1,076	27.0 (1.8)	1,206	31.2 (1.7)	992	31.3 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	1,166	30.1 (1.6)	487	37.1 (3.1)	1,099	31.3 (1.8)	1,195	26.6 (1.5)	1,024	33.2 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	1,080	29.0 (1.7)	499	33.5 (2.5)	1,128	29.5 (1.7)	1,182	32.5 (1.7)	1,033	33.6 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,041	33.3 (1.8)	490	30.3 (2.5)	1,122	35.3 (1.5)	1,225	36.6 (1.7)	1,013	36.3 (2.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,596	30.7 (0.9)	1,539	32.5 (1.2)	3,441	32.3 (1.0)	3,682	33.7 (0.9)	3,240	37.1 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	879	27.7 (2.2)	567	32.3 (3.2)	1,134	30.3 (2.5)	1,180	32.4 (1.4)	879	30.0 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,143	26.5 (1.4)	505	28.4 (2.9)	1,076	27.6 (1.6)	1,206	32.1 (1.6)	992	32.5 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	1,166	30.8 (1.6)	487	37.4 (2.8)	1,099	32.4 (1.7)	1,195	28.3 (1.6)	1,024	34.8 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,080	29.5 (1.6)	499	33.9 (2.4)	1,128	30.8 (1.7)	1,182	33.9 (1.7)	1,033	36.8 (2.3)
상	-	- -	-	- -	1,041	33.8 (1.7)	490	31.5 (2.6)	1,122	37.0 (1.6)	1,225	38.4 (1.6)	1,013	38.8 (2.3)

표 2-III-16. 가공식품 선택 시 영양표시 이용 여부 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체							남자							여자						
	N	읽음		읽지않음		모름		N	읽음		읽지않음		모름		N	읽음		읽지않음		모름	
		분율(표준오차)		분율(표준오차)		분율(표준오차)			분율(표준오차)		분율(표준오차)		분율(표준오차)			분율(표준오차)		분율(표준오차)		분율(표준오차)	
초등학생이상	7,342	24.9	(0.8)	43.5	(0.9)	31.7	(1.1)	3,223	16.4	(0.9)	50.5	(1.2)	33.2	(1.3)	4,119	33.4	(1.1)	36.4	(1.1)	30.2	(1.2)
19세이상	5,936	24.9	(0.8)	43.0	(1.0)	32.1	(1.2)	2,471	15.8	(1.0)	51.0	(1.3)	33.2	(1.4)	3,465	33.8	(1.1)	35.2	(1.2)	31.0	(1.4)
연령(세)																					
6-9	437	8.3	(1.7)	24.6	(2.7)	67.1	(3.3)	230	8.6	(2.3)	24.1	(4.3)	67.3	(4.6)	207	7.9	(2.3)	25.3	(3.4)	66.8	(3.7)
10-18	969	29.3	(2.0)	52.1	(2.2)	18.7	(1.9)	522	21.7	(2.2)	55.0	(2.9)	23.3	(2.3)	447	38.3	(3.0)	48.6	(3.2)	13.2	(2.8)
19-29	693	40.7	(2.2)	49.9	(2.2)	9.3	(1.6)	270	28.9	(3.2)	62.7	(3.2)	8.5	(2.3)	423	53.1	(2.7)	36.7	(2.8)	10.2	(1.8)
30-39	1,145	39.4	(1.8)	49.8	(1.8)	10.8	(1.1)	443	24.0	(2.2)	60.8	(2.2)	15.3	(1.8)	702	55.7	(2.3)	38.1	(2.3)	6.1	(1.2)
40-49	1,101	25.5	(1.5)	53.6	(1.8)	20.9	(1.6)	478	13.6	(1.7)	58.1	(2.7)	28.3	(2.8)	623	37.7	(2.2)	49.1	(2.2)	13.2	(1.8)
50-59	1,104	12.7	(1.1)	43.2	(2.1)	44.1	(2.2)	441	5.9	(1.2)	45.6	(2.7)	48.5	(2.8)	663	19.6	(1.8)	40.8	(2.7)	39.7	(2.6)
60-69	999	6.8	(1.0)	23.8	(2.1)	69.4	(2.3)	451	4.7	(1.2)	25.4	(3.0)	69.8	(3.0)	548	8.6	(1.5)	22.3	(2.3)	69.0	(2.6)
70+	894	1.0	(0.4)	8.8	(1.2)	90.1	(1.2)	388	1.0	(0.5)	14.9	(2.2)	84.1	(2.2)	506	1.0	(0.5)	5.1	(1.1)	93.9	(1.2)
6-11	704	13.2	(1.7)	35.5	(2.4)	51.3	(2.7)	370	12.0	(2.5)	37.0	(3.6)	51.0	(4.1)	334	14.5	(2.4)	33.9	(3.2)	51.5	(3.2)
12-18	702	31.4	(2.4)	52.2	(2.4)	16.3	(2.2)	382	22.7	(2.6)	54.6	(3.1)	22.8	(2.8)	320	42.3	(3.4)	49.3	(3.5)	8.4	(2.5)
19-29	693	40.7	(2.2)	49.9	(2.2)	9.3	(1.6)	270	28.9	(3.2)	62.7	(3.2)	8.5	(2.3)	423	53.1	(2.7)	36.7	(2.8)	10.2	(1.8)
30-49	2,246	32.3	(1.3)	51.7	(1.3)	15.9	(1.1)	921	18.7	(1.4)	59.4	(1.7)	21.9	(1.8)	1,325	46.5	(1.7)	43.7	(1.7)	9.7	(1.1)
50-64	1,608	11.8	(0.9)	39.5	(1.8)	48.6	(2.0)	670	5.8	(1.0)	42.4	(2.2)	51.8	(2.3)	938	17.8	(1.5)	36.6	(2.3)	45.6	(2.4)
65+	1,389	2.0	(0.5)	12.1	(1.2)	85.9	(1.4)	610	2.1	(0.8)	15.5	(2.0)	82.4	(2.1)	779	2.0	(0.7)	9.7	(1.3)	88.3	(1.4)
거주지역																					
동	5,777	26.8	(0.9)	45.4	(1.0)	27.8	(1.1)	2,537	17.1	(1.0)	52.6	(1.3)	30.3	(1.4)	3,240	36.7	(1.3)	38.1	(1.2)	25.2	(1.2)
읍면	1,565	17.7	(1.5)	36.5	(2.2)	45.8	(2.9)	686	13.7	(1.7)	42.7	(2.4)	43.6	(3.1)	879	21.8	(2.0)	30.4	(2.4)	47.9	(3.2)
소득수준[1)]																					
하	1,789	23.2	(1.4)	39.8	(1.5)	37.0	(1.8)	797	15.2	(1.7)	47.2	(2.0)	37.6	(2.2)	992	31.3	(1.9)	32.2	(2.1)	36.5	(2.3)
중하	1,812	24.8	(1.5)	43.8	(1.7)	31.4	(1.6)	788	16.3	(2.0)	50.1	(2.1)	33.6	(2.1)	1,024	33.2	(2.2)	37.6	(2.2)	29.2	(2.0)
중상	1,825	25.6	(1.3)	44.0	(1.6)	30.4	(1.6)	792	17.6	(1.8)	51.1	(2.3)	31.3	(2.1)	1,033	33.6	(2.0)	37.0	(2.1)	29.4	(1.9)
상	1,821	26.1	(1.6)	47.3	(1.5)	26.7	(1.5)	808	16.2	(1.7)	54.8	(2.2)	29.0	(2.1)	1,013	36.3	(2.3)	39.5	(2.0)	24.2	(1.8)
거주지역(표준화)[2)]																					
동	5,777	26.7	(0.9)	44.9	(0.9)	28.4	(0.9)	2,537	16.8	(1.0)	51.4	(1.2)	31.8	(1.1)	3,240	37.1	(1.3)	38.2	(1.2)	24.8	(1.0)
읍면	1,565	23.5	(1.6)	42.4	(2.2)	34.1	(1.9)	686	17.7	(2.1)	48.1	(2.1)	34.2	(2.2)	879	30.0	(2.1)	36.2	(2.8)	33.8	(2.5)
소득수준(표준화)																					
하	1,789	24.0	(1.2)	39.7	(1.4)	36.4	(1.3)	797	15.5	(1.6)	46.6	(1.8)	38.0	(1.5)	992	32.5	(1.7)	33.3	(2.0)	34.2	(1.8)
중하	1,812	25.7	(1.4)	44.3	(1.6)	30.0	(1.2)	788	16.8	(2.0)	50.4	(2.0)	32.8	(1.7)	1,024	34.8	(2.0)	38.2	(2.2)	27.0	(1.3)
중상	1,825	27.1	(1.5)	44.9	(1.5)	28.0	(1.3)	792	18.1	(1.9)	50.7	(2.2)	31.2	(1.9)	1,033	36.8	(2.3)	38.8	(2.1)	24.3	(1.4)
상	1,821	27.2	(1.6)	48.5	(1.5)	24.2	(1.1)	808	16.6	(1.8)	55.7	(2.0)	27.7	(1.6)	1,013	38.8	(2.3)	40.8	(2.0)	20.4	(1.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-17. 영양표시 중 관심항목[1] : 전체, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	열량	탄수화물	당류	단백질	지방	포화지방	트랜스지방	콜레스테롤	나트륨	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
초등학생이상	1,686	46.8 (1.6)	2.5 (0.5)	2.9 (0.5)	6.3 (0.8)	6.7 (0.7)	1.6 (0.4)	18.4 (1.2)	7.8 (0.8)	5.4 (0.7)	1.6 (0.3)
19세이상	1,362	43.7 (1.7)	2.0 (0.5)	3.3 (0.6)	6.8 (0.9)	6.6 (0.8)	1.5 (0.4)	20.3 (1.3)	8.6 (0.9)	5.8 (0.8)	1.5 (0.4)
성별											
남자	449	42.5 (2.9)	4.3 (1.2)	3.3 (0.9)	11.3 (2.0)	6.9 (1.4)	1.3 (0.6)	14.7 (1.9)	10.9 (1.9)	3.4 (1.0)	1.5 (0.6)
여자	1,237	49.0 (1.9)	1.7 (0.4)	2.7 (0.5)	3.9 (0.6)	6.6 (0.9)	1.8 (0.4)	20.2 (1.5)	6.3 (0.8)	6.3 (0.9)	1.6 (0.4)
연령(세)											
6-9	38	36.3 (9.2)	0.0 (-)[3]	2.0 (2.0)	18.9 (9.0)	7.2 (3.3)	0.0 (-)	2.2 (1.6)	17.6 (7.4)	3.5 (2.5)	12.2 (8.4)
10-18	286	65.1 (3.2)	5.5 (1.8)	1.2 (0.5)	2.7 (1.0)	6.7 (1.9)	2.5 (1.1)	9.1 (2.4)	2.7 (1.2)	3.3 (1.4)	1.2 (0.7)
19-29	298	59.4 (3.5)	3.3 (1.3)	3.0 (1.0)	8.3 (2.2)	5.6 (1.5)	1.1 (0.7)	11.2 (2.1)	3.9 (1.4)	3.1 (1.1)	1.1 (0.6)
30-39	498	35.2 (2.6)	0.7 (0.4)	2.8 (0.9)	6.0 (1.5)	6.1 (1.3)	1.9 (0.8)	29.2 (2.2)	7.2 (1.4)	8.8 (1.7)	2.0 (0.8)
40-49	308	43.4 (3.2)	1.4 (0.8)	2.9 (1.2)	3.9 (1.3)	7.7 (1.7)	0.6 (0.4)	22.4 (2.8)	10.4 (1.9)	6.1 (1.5)	1.2 (0.7)
50-59	177	26.8 (3.8)	3.1 (1.5)	5.1 (2.4)	6.6 (2.7)	10.1 (2.7)	3.0 (2.2)	16.8 (3.0)	22.0 (3.3)	4.7 (1.7)	1.7 (1.0)
60-69	69	24.9 (5.6)	2.4 (2.3)	8.4 (3.9)	15.1 (5.0)	6.6 (3.3)	1.8 (1.8)	17.8 (4.4)	18.4 (6.1)	1.9 (1.2)	2.8 (2.7)
70+	12	- -[4]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6-11	97	38.3 (6.0)	2.2 (1.6)	3.2 (1.5)	11.0 (4.1)	12.7 (3.7)	0.0 (-)	11.7 (3.8)	10.8 (3.5)	3.9 (1.9)	6.3 (3.5)
12-18	227	69.2 (3.4)	5.9 (2.0)	0.8 (0.5)	2.1 (1.0)	5.2 (2.0)	2.9 (1.2)	7.8 (2.6)	2.1 (1.2)	3.2 (1.6)	1.0 (0.6)
19-29	298	59.4 (3.5)	3.3 (1.3)	3.0 (1.0)	8.3 (2.2)	5.6 (1.5)	1.1 (0.7)	11.2 (2.1)	3.9 (1.4)	3.1 (1.1)	1.1 (0.6)
30-49	806	38.5 (2.0)	1.0 (0.4)	2.8 (0.7)	5.2 (1.0)	6.7 (1.1)	1.4 (0.5)	26.4 (1.9)	8.5 (1.1)	7.7 (1.1)	1.7 (0.5)
50-64	229	26.6 (3.3)	3.1 (1.3)	4.6 (2.0)	9.1 (2.5)	9.2 (2.2)	2.9 (1.8)	17.5 (2.7)	20.5 (3.1)	4.3 (1.4)	2.1 (1.1)
65+	29	15.2 (8.5)	3.4 (3.4)	18.9 (8.9)	23.6 (9.6)	7.6 (5.4)	0.0 (-)	6.8 (4.9)	24.5 (11.9)	0.0 (-)	0.0 (-)
거주지역											
동	1,457	47.1 (1.8)	2.1 (0.5)	3.2 (0.6)	6.3 (0.9)	6.1 (0.7)	1.6 (0.4)	19.3 (1.4)	7.2 (0.9)	5.4 (0.7)	1.6 (0.4)
읍면	229	45.5 (2.6)	4.5 (1.7)	1.7 (1.1)	6.5 (1.6)	9.6 (2.1)	1.5 (1.1)	13.2 (2.7)	11.0 (2.8)	5.0 (1.9)	1.5 (0.8)
소득수준[2]											
하	371	43.1 (3.3)	3.1 (1.1)	3.1 (1.2)	8.9 (2.1)	8.0 (1.7)	1.0 (0.4)	17.5 (2.6)	7.1 (1.4)	5.9 (1.6)	2.3 (0.8)
중하	389	47.3 (2.8)	3.5 (1.1)	3.3 (1.0)	5.4 (1.4)	5.4 (1.5)	1.3 (0.8)	18.2 (2.3)	8.5 (1.7)	4.9 (1.3)	2.2 (0.9)
중상	424	53.3 (3.5)	1.6 (0.8)	1.7 (0.7)	6.3 (1.7)	8.1 (1.7)	1.8 (0.8)	15.0 (2.1)	6.8 (2.2)	4.6 (1.1)	0.7 (0.4)
상	481	44.9 (3.0)	1.9 (0.7)	3.7 (1.1)	4.2 (1.1)	5.4 (1.1)	2.5 (1.0)	23.5 (2.4)	7.6 (1.4)	5.2 (1.2)	1.2 (0.6)

1) 영양표시 중 관심항목별 분율 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상의 가장 관심 있게 보는 영양표시 항목별 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 2-III-18. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률[1] : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
초등학생이상	1,697	76.0 (1.3)	451	69.3 (2.8)	1,246	79.3 (1.4)
19세이상	1,371	78.3 (1.6)	313	70.8 (3.3)	1,058	81.6 (1.6)
연령(세)						
6-9	38	35.7 (8.9)	20	25.4 (14.2)	18	- -[3]
10-18	288	66.7 (3.0)	118	67.5 (5.5)	170	66.2 (4.1)
19-29	298	74.2 (3.3)	76	62.9 (7.2)	222	80.6 (3.2)
30-39	504	85.3 (1.9)	105	80.1 (4.7)	399	87.6 (2.0)
40-49	309	76.3 (3.0)	70	70.0 (6.8)	239	78.6 (2.8)
50-59	179	72.8 (4.1)	31	70.5 (8.6)	148	73.5 (4.6)
60-69	69	79.1 (5.7)	24	74.9 (11.9)	45	81.2 (6.2)
70+	12	- -	7	- -	5	- -
6-11	97	52.0 (5.6)	44	53.0 (9.9)	53	51.2 (7.7)
12-18	229	67.5 (3.4)	94	66.4 (6.1)	135	68.3 (4.4)
19-29	298	74.2 (3.3)	76	62.9 (7.2)	222	80.6 (3.2)
30-49	813	81.6 (1.7)	175	76.4 (3.9)	638	83.8 (1.7)
50-64	231	74.0 (3.5)	47	71.9 (7.2)	184	74.6 (4.0)
65+	29	70.0 (11.5)	15	- -	14	- -
거주지역						
동	1,466	76.3 (1.4)	383	71.4 (2.8)	1083	78.6 (1.5)
읍면	231	74.2 (4.0)	68	59.5 (7.5)	163	83.3 (3.8)
소득수준[2]						
하	372	75.6 (2.8)	112	72.8 (5.6)	260	77.0 (3.3)
중하	391	78.6 (2.5)	103	70.0 (5.3)	288	82.8 (2.8)
중상	425	71.4 (3.2)	109	62.8 (5.7)	316	75.9 (3.3)
상	487	78.0 (2.7)	121	71.5 (5.9)	366	81.0 (2.3)

1) 가공식품 선택 시 영양표시 영향률 : 가공식품 구매/선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상 중 영양표시 내용에 영향을 받는다고 답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 2-III-19. 영양교육 및 상담 수혜율[1] 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
초등학생이상	-	- -	-	- -	8,322	9.1 (0.5)	3,719	7.8 (0.7)	7,910	8.1 (0.4)	8,610	8.6 (0.4)	7,351	5.9 (0.4)
초등학생이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	8,322	9.2 (0.5)	3,719	7.9 (0.7)	7,910	8.2 (0.4)	8,610	8.9 (0.4)	7,351	6.3 (0.4)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	836	32.1 (2.3)	416	21.5 (3.1)	879	21.0 (1.8)	778	31.4 (2.1)	705	28.9 (2.1)
12-18	-	- -	-	- -	902	23.4 (1.8)	369	17.8 (2.8)	759	23.5 (1.9)	881	21.2 (1.6)	702	12.2 (1.5)
19-29	-	- -	-	- -	1,058	4.3 (0.7)	330	6.7 (1.5)	764	3.6 (0.7)	943	4.5 (0.7)	691	2.4 (0.7)
30-49	-	- -	-	- -	3,054	4.3 (0.4)	1,199	4.8 (0.8)	2,512	5.4 (0.5)	2,666	4.5 (0.5)	2,251	3.0 (0.4)
50-64	-	- -	-	- -	1,459	5.0 (0.7)	693	4.7 (0.8)	1,541	5.2 (0.6)	1,730	7.0 (0.8)	1,613	4.3 (0.8)
65+	-	- -	-	- -	1,013	7.7 (1.3)	712	5.4 (0.9)	1,455	5.1 (0.9)	1,612	5.4 (0.8)	1,389	4.1 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	6,667	9.2 (0.5)	2,687	7.8 (0.8)	5,911	8.2 (0.5)	6,498	8.6 (0.4)	5,785	5.9 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	8.9 (1.0)	1,032	7.7 (1.5)	1,999	7.6 (1.0)	2,112	8.7 (0.9)	1,566	5.6 (0.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,161	8.4 (0.8)	890	6.0 (1.0)	1,891	7.1 (0.7)	2,151	6.9 (0.6)	1,790	6.2 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,123	8.4 (0.7)	882	7.6 (1.2)	1,890	8.6 (0.8)	2,110	8.5 (0.7)	1,813	6.1 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	1,990	10.9 (1.0)	878	7.7 (1.1)	1,934	8.0 (0.7)	2,096	8.9 (0.7)	1,828	4.9 (0.6)
상	-	- -	-	- -	1,965	8.9 (0.9)	870	8.5 (1.2)	1,955	9.1 (0.8)	2,159	10.1 (0.8)	1,825	6.4 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	6,667	9.1 (0.5)	2,687	8.0 (0.8)	5,911	8.3 (0.5)	6,498	8.8 (0.4)	5,785	6.4 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	8.9 (1.0)	1,032	7.6 (1.4)	1,999	7.9 (1.0)	2,112	9.7 (0.9)	1,566	6.3 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,161	8.4 (0.8)	890	6.1 (1.1)	1,891	7.2 (0.7)	2,151	7.1 (0.6)	1,790	6.5 (0.6)
중하	-	- -	-	- -	2,123	8.5 (0.7)	882	7.8 (1.2)	1,890	8.6 (0.8)	2,110	8.8 (0.7)	1,813	6.5 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	1,990	10.8 (1.0)	878	8.1 (1.0)	1,934	8.0 (0.7)	2,096	9.1 (0.7)	1,828	5.5 (0.6)
상	-	- -	-	- -	1,965	9.0 (0.8)	870	8.7 (1.2)	1,955	9.1 (0.8)	2,159	10.4 (0.8)	1,825	6.9 (0.6)
남자														
초등학생이상	-	- -	-	- -	3,847	8.3 (0.6)	1,617	6.6 (0.8)	3,331	8.1 (0.6)	3,760	8.6 (0.5)	3,228	5.0 (0.5)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,847	8.1 (0.5)	1,617	6.7 (0.8)	3,331	8.0 (0.5)	3,760	8.7 (0.5)	3,228	5.3 (0.4)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	424	32.6 (3.1)	217	22.7 (4.0)	458	21.8 (2.3)	400	33.8 (2.7)	371	27.6 (3.1)
12-18	-	- -	-	- -	481	22.9 (2.4)	203	13.8 (2.9)	391	22.8 (2.5)	454	22.2 (2.3)	381	11.9 (1.9)
19-29	-	- -	-	- -	454	3.5 (1.0)	134	5.3 (2.1)	282	3.1 (1.1)	416	4.7 (1.1)	269	0.1 (0.1)
30-49	-	- -	-	- -	1,405	3.0 (0.5)	487	3.6 (0.9)	979	5.0 (0.7)	1,062	4.1 (0.7)	923	2.0 (0.5)
50-64	-	- -	-	- -	678	3.0 (0.7)	285	3.5 (1.1)	656	5.4 (1.0)	754	5.4 (1.1)	673	4.4 (1.2)
65+	-	- -	-	- -	405	7.4 (1.5)	291	4.9 (1.4)	565	5.7 (1.3)	674	4.4 (0.9)	611	2.8 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,071	8.4 (0.6)	1,149	6.5 (0.9)	2,466	8.2 (0.6)	2,823	8.6 (0.6)	2,540	5.2 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	776	8.0 (1.0)	468	7.3 (1.6)	865	7.6 (1.2)	937	8.5 (1.1)	688	4.5 (0.9)

1) 영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 영양교육 및 상담 수혜율 추이, 성별, 초등학생이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,018	8.3 (1.1)	387	5.6 (1.3)	811	6.4 (0.9)	947	6.0 (0.8)	798	5.0 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	957	7.9 (0.9)	395	4.9 (1.2)	792	8.6 (1.1)	917	7.6 (0.9)	789	5.4 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	910	9.5 (1.1)	380	8.6 (1.5)	806	8.3 (1.0)	919	10.0 (1.2)	793	3.7 (0.6)
상	-	- -	-	- -	924	7.5 (1.1)	381	7.0 (1.5)	832	9.4 (1.2)	937	10.9 (1.3)	810	6.2 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,071	8.0 (0.6)	1,149	6.6 (0.9)	2,466	8.2 (0.6)	2,823	8.7 (0.6)	2,540	5.3 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	776	8.4 (1.0)	468	6.6 (1.4)	865	7.9 (1.2)	937	9.1 (0.8)	688	5.0 (0.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,018	8.2 (1.0)	387	5.5 (1.4)	811	6.3 (0.9)	947	6.4 (0.8)	798	4.9 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	957	7.9 (0.9)	395	4.8 (1.2)	792	8.4 (1.1)	917	7.7 (0.9)	789	5.7 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	910	9.3 (1.1)	380	9.0 (1.4)	806	8.2 (1.0)	919	9.6 (1.1)	793	4.2 (0.6)
상	-	- -	-	- -	924	7.3 (0.9)	381	7.2 (1.5)	832	9.2 (1.1)	937	11.0 (1.2)	810	6.6 (0.9)
여자														
초등학생이상	-	- -	-	- -	4,475	10.0 (0.6)	2,102	9.0 (0.9)	4,579	8.1 (0.5)	4,850	8.7 (0.5)	4,123	6.7 (0.5)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,475	10.2 (0.6)	2,102	9.3 (1.0)	4,579	8.4 (0.6)	4,850	9.0 (0.5)	4,123	7.4 (0.5)
연령(세)														
6-11	-	- -	-	- -	412	31.6 (2.7)	199	20.2 (3.7)	421	20.1 (2.4)	378	29.0 (2.9)	334	30.2 (2.8)
12-18	-	- -	-	- -	421	24.0 (2.6)	166	23.0 (4.4)	368	24.4 (2.8)	427	20.1 (2.2)	321	12.7 (2.1)
19-29	-	- -	-	- -	604	5.2 (1.0)	196	8.1 (2.2)	482	4.0 (0.9)	527	4.3 (0.9)	422	4.7 (1.3)
30-49	-	- -	-	- -	1,649	5.7 (0.6)	712	6.0 (1.0)	1,533	5.9 (0.8)	1,604	4.9 (0.6)	1,328	3.9 (0.6)
50-64	-	- -	-	- -	781	6.8 (1.1)	408	5.9 (1.2)	885	4.9 (0.7)	976	8.7 (1.0)	940	4.2 (0.7)
65+	-	- -	-	- -	608	7.9 (1.6)	421	5.7 (1.1)	890	4.7 (0.9)	938	6.1 (1.0)	778	5.1 (1.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,596	10.0 (0.7)	1,538	9.2 (1.1)	3,445	8.2 (0.6)	3,675	8.7 (0.6)	3,245	6.7 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	879	9.8 (1.5)	564	8.3 (2.0)	1,134	7.5 (1.2)	1,175	8.9 (1.1)	878	6.6 (1.2)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	1,143	8.4 (1.1)	503	6.5 (1.4)	1,080	7.9 (1.0)	1,204	7.8 (0.9)	992	7.5 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,166	8.9 (1.0)	487	10.4 (2.0)	1,098	8.7 (1.1)	1,193	9.5 (1.0)	1,024	6.7 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	1,080	12.3 (1.2)	498	6.8 (1.4)	1,128	7.6 (0.9)	1,177	7.8 (0.8)	1,035	6.1 (1.0)
상	-	- -	-	- -	1,041	10.2 (1.1)	489	10.2 (1.6)	1,123	8.8 (1.0)	1,222	9.4 (1.0)	1,015	6.6 (0.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	3,596	10.2 (0.7)	1,538	9.4 (1.1)	3,445	8.5 (0.6)	3,675	8.9 (0.6)	3,245	7.4 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	879	9.3 (1.4)	564	8.7 (2.0)	1,134	7.9 (1.2)	1,175	10.2 (1.4)	878	7.6 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	1,143	8.5 (1.0)	503	6.5 (1.5)	1,080	8.3 (1.0)	1,204	7.9 (0.9)	992	8.1 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,166	9.1 (1.0)	487	11.0 (2.0)	1,098	8.9 (1.1)	1,193	10.0 (1.0)	1,024	7.3 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	1,080	12.3 (1.3)	498	7.3 (1.4)	1,128	7.9 (0.9)	1,177	8.2 (0.9)	1,035	7.0 (1.0)
상	-	- -	-	- -	1,041	10.8 (1.1)	489	10.6 (1.6)	1,123	8.7 (1.0)	1,222	9.7 (1.0)	1,015	7.0 (0.9)

표 2-III-20. 영양교육 및 상담 수혜율[1] : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
초등학생이상	7,351	5.9 (0.4)	3,228	5.0 (0.5)	4,123	6.7 (0.5)
19세이상	5,944	3.3 (0.3)	2,476	2.3 (0.4)	3,468	4.3 (0.5)
연령(세)						
6-9	438	27.8 (2.5)	230	26.8 (3.4)	208	28.9 (3.7)
10-18	969	15.8 (1.4)	522	14.9 (2.0)	447	16.9 (2.1)
19-29	691	2.4 (0.7)	269	0.1 (0.1)	422	4.7 (1.3)
30-39	1,146	3.5 (0.6)	443	2.2 (0.7)	703	4.9 (1.1)
40-49	1,105	2.5 (0.5)	480	1.9 (0.6)	625	3.0 (0.8)
50-59	1,107	4.4 (0.8)	442	4.8 (1.3)	665	4.1 (0.9)
60-69	1,000	4.1 (0.8)	453	2.7 (0.9)	547	5.4 (1.1)
70+	895	4.0 (0.9)	389	3.2 (1.0)	506	4.5 (1.4)
6-11	705	28.9 (2.1)	371	27.6 (3.1)	334	30.2 (2.8)
12-18	702	12.2 (1.5)	381	11.9 (1.9)	321	12.7 (2.1)
19-29	691	2.4 (0.7)	269	0.1 (0.1)	422	4.7 (1.3)
30-49	2,251	3.0 (0.4)	923	2.0 (0.5)	1,328	3.9 (0.6)
50-64	1,613	4.3 (0.8)	673	4.4 (1.2)	940	4.2 (0.7)
65+	1,389	4.1 (0.7)	611	2.8 (0.7)	778	5.1 (1.1)
거주지역						
동	5,785	5.9 (0.4)	2,540	5.2 (0.6)	3,245	6.7 (0.5)
읍면	1,566	5.6 (0.8)	688	4.5 (0.9)	878	6.6 (1.2)
소득수준[2]						
하	1,790	6.2 (0.7)	798	5.0 (0.8)	992	7.5 (1.0)
중하	1,813	6.1 (0.8)	789	5.4 (1.2)	1,024	6.7 (0.9)
중상	1,828	4.9 (0.6)	793	3.7 (0.6)	1,035	6.1 (1.0)
상	1,825	6.4 (0.7)	810	6.2 (1.0)	1,015	6.6 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,785	6.4 (0.4)	2,540	5.3 (0.5)	3,245	7.4 (0.5)
읍면	1,566	6.3 (0.9)	688	5.0 (0.8)	878	7.6 (1.6)
소득수준(표준화)						
하	1,790	6.5 (0.6)	798	4.9 (0.7)	992	8.1 (1.0)
중하	1,813	6.5 (0.8)	789	5.7 (1.1)	1,024	7.3 (0.9)
중상	1,828	5.5 (0.6)	793	4.2 (0.6)	1,035	7.0 (1.0)
상	1,825	6.9 (0.6)	810	6.6 (0.9)	1,015	7.0 (0.9)

1) 영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-21. 식이보충제 복용경험률[1] 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1세이상	-	- -	-	- -	9,004	25.9 (0.9)	4,071	33.3 (1.5)	8,587	34.1 (0.9)	9,364	33.9 (0.8)	8,025	40.1 (0.9)
1세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	9,004	25.8 (0.9)	4,071	33.3 (1.5)	8,587	34.1 (1.0)	9,364	33.8 (0.8)	8,025	40.0 (0.9)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	219	27.3 (3.0)	117	26.7 (5.3)	242	35.3 (4.0)	268	39.1 (3.6)	243	42.9 (4.1)
3-5	-	- -	-	- -	401	33.5 (2.5)	184	43.0 (4.8)	398	47.1 (2.8)	381	48.6 (3.3)	351	52.0 (3.5)
6-11	-	- -	-	- -	898	27.1 (2.0)	471	34.1 (3.8)	940	36.9 (1.8)	878	38.4 (2.3)	779	43.6 (2.6)
12-18	-	- -	-	- -	902	22.6 (1.7)	367	25.2 (3.2)	759	28.2 (2.1)	880	25.5 (1.8)	703	24.6 (2.0)
19-29	-	- -	-	- -	1,058	18.8 (1.5)	331	30.9 (3.7)	756	25.7 (1.8)	939	25.8 (1.7)	693	31.5 (2.1)
30-49	-	- -	-	- -	3,054	27.9 (1.2)	1,200	34.5 (1.8)	2,501	35.5 (1.4)	2,661	35.5 (1.3)	2,253	42.8 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	1,459	29.7 (1.7)	691	39.3 (2.4)	1,536	40.5 (1.6)	1,734	38.5 (1.5)	1,613	47.4 (1.6)
65+	-	- -	-	- -	1,013	23.9 (1.6)	710	29.5 (2.7)	1,455	32.0 (1.8)	1,623	33.6 (1.7)	1,390	40.3 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	7,244	26.7 (1.0)	2,931	34.6 (1.8)	6,497	35.6 (1.1)	7,113	35.5 (0.9)	6,347	42.0 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	1,760	22.1 (1.8)	1,140	28.7 (3.0)	2,090	27.1 (1.4)	2,251	26.8 (1.9)	1,678	33.3 (1.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	2,356	18.3 (1.1)	974	22.8 (2.0)	2,060	26.7 (1.4)	2,333	26.9 (1.3)	1,955	34.9 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	2,277	24.0 (1.2)	969	30.9 (2.2)	2,079	32.0 (1.6)	2,299	29.8 (1.2)	1,987	38.7 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	2,164	27.8 (1.4)	968	39.3 (2.1)	2,108	35.6 (1.5)	2,292	37.0 (1.4)	2,001	41.6 (1.6)
상	-	- -	-	- -	2,122	34.2 (1.6)	952	41.5 (2.9)	2,095	42.0 (1.9)	2,340	42.1 (1.7)	1,980	46.7 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	7,244	26.8 (1.0)	2,931	34.6 (1.8)	6,497	35.6 (1.1)	7,113	35.5 (0.9)	6,347	42.0 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	1,760	21.8 (1.8)	1,140	28.8 (2.7)	2,090	27.0 (1.7)	2,251	27.2 (2.1)	1,678	32.9 (2.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,356	18.3 (1.1)	974	23.1 (2.0)	2,060	26.7 (1.4)	2,333	27.0 (1.3)	1,955	35.0 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	2,277	24.1 (1.2)	969	30.3 (2.2)	2,079	32.1 (1.6)	2,299	29.8 (1.2)	1,987	39.0 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	2,164	27.6 (1.3)	968	39.1 (2.2)	2,108	35.5 (1.4)	2,292	36.9 (1.4)	2,001	41.2 (1.6)
상	-	- -	-	- -	2,122	34.1 (1.6)	952	41.3 (2.8)	2,095	41.4 (1.9)	2,340	41.9 (1.8)	1,980	45.9 (2.0)
남자														
1세이상	-	- -	-	- -	4,200	22.4 (0.9)	1,815	28.3 (1.8)	3,671	29.0 (1.1)	4,173	28.8 (1.0)	3,555	34.8 (1.0)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,200	22.3 (0.9)	1,815	28.4 (1.8)	3,671	29.0 (1.1)	4,173	28.9 (1.0)	3,555	35.1 (1.1)
연령(세)														
1-2	-	- -	-	- -	114	30.7 (4.4)	72	26.8 (6.9)	103	38.0 (6.6)	156	43.1 (4.2)	115	41.2 (5.2)
3-5	-	- -	-	- -	210	34.6 (3.5)	99	48.1 (6.6)	219	42.5 (3.3)	203	48.8 (4.3)	172	57.2 (4.4)
6-11	-	- -	-	- -	453	31.8 (2.7)	246	33.1 (4.5)	488	37.6 (2.3)	451	37.5 (2.9)	407	45.4 (3.5)
12-18	-	- -	-	- -	481	22.2 (2.1)	202	24.8 (3.7)	392	29.8 (3.3)	453	25.0 (2.3)	382	22.2 (2.4)
19-29	-	- -	-	- -	454	13.5 (1.9)	134	26.9 (5.3)	279	18.8 (2.3)	414	24.0 (2.3)	270	27.7 (3.0)
30-49	-	- -	-	- -	1,405	22.4 (1.3)	489	26.7 (2.4)	972	28.2 (1.7)	1,062	28.0 (1.6)	925	35.7 (1.7)
50-64	-	- -	-	- -	678	24.1 (2.0)	283	29.5 (3.0)	653	32.3 (2.3)	759	28.9 (2.0)	673	37.5 (2.0)
65+	-	- -	-	- -	405	20.2 (2.1)	290	28.9 (3.7)	565	29.0 (2.8)	675	27.9 (2.0)	611	37.4 (2.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	3,367	23.2 (1.1)	1,293	29.4 (2.2)	2,757	30.2 (1.3)	3,160	30.0 (1.1)	2,813	36.2 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	833	18.9 (1.8)	522	24.8 (2.7)	914	22.9 (1.7)	1,013	23.2 (2.2)	742	29.6 (2.1)

1) 식이보충제 복용경험률 : 최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 비타민/무기질제 혹은 건강기능식품을 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 식이보충제 복용경험률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	--	-	--	1,112	15.5 (1.2)	437	16.0 (2.1)	897	21.1 (1.6)	1,049	22.6 (1.6)	877	30.6 (2.3)
중하	-	--	-	--	1,040	21.7 (1.6)	441	27.9 (2.9)	883	26.9 (1.8)	1,017	24.2 (1.5)	875	33.8 (1.9)
중상	-	--	-	--	1,010	23.8 (1.5)	432	34.6 (2.9)	898	29.9 (2.0)	1,028	29.6 (1.9)	878	35.3 (2.1)
상	-	--	-	--	1,000	28.8 (1.7)	426	36.5 (3.5)	899	37.2 (2.4)	1,036	38.9 (2.0)	884	41.1 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	3,367	23.1 (1.1)	1,293	29.5 (2.2)	2,757	30.3 (1.3)	3,160	30.1 (1.1)	2,813	36.6 (1.2)
읍면	-	--	-	--	833	18.5 (1.7)	522	24.5 (2.9)	914	23.2 (2.0)	1,013	23.4 (2.2)	742	29.7 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	1,112	15.5 (1.2)	437	16.4 (2.1)	897	21.3 (1.6)	1,049	22.9 (1.7)	877	31.0 (2.3)
중하	-	--	-	--	1,040	21.8 (1.5)	441	27.2 (2.9)	883	27.2 (1.8)	1,017	24.5 (1.5)	875	34.5 (1.9)
중상	-	--	-	--	1,010	23.2 (1.4)	432	34.3 (2.8)	898	29.8 (2.0)	1,028	29.4 (1.8)	878	35.5 (2.1)
상	-	--	-	--	1,000	28.7 (1.7)	426	36.3 (3.4)	899	36.6 (2.2)	1,036	39.1 (2.1)	884	40.7 (2.5)
여자														
1세이상	-	--	-	--	4,804	29.3 (1.1)	2,256	38.4 (1.7)	4,916	39.4 (1.1)	5,191	39.1 (1.0)	4,470	45.5 (1.2)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	4,804	29.3 (1.0)	2,256	38.4 (1.7)	4,916	39.3 (1.2)	5,191	38.7 (1.0)	4,470	44.9 (1.1)
연령(세)														
1-2	-	--	-	--	105	23.7 (4.0)	45	26.4 (7.7)	139	33.2 (4.5)	112	34.5 (5.5)	128	44.9 (5.8)
3-5	-	--	-	--	191	32.3 (3.5)	85	37.8 (7.0)	179	53.3 (4.5)	178	48.3 (4.0)	179	46.7 (4.6)
6-11	-	--	-	--	445	22.1 (2.4)	225	35.1 (4.5)	452	36.2 (2.7)	427	39.3 (3.0)	372	41.6 (3.5)
12-18	-	--	-	--	421	23.2 (2.5)	165	25.7 (4.8)	367	26.4 (2.4)	427	26.0 (2.7)	321	27.5 (3.3)
19-29	-	--	-	--	604	24.4 (1.8)	197	35.0 (3.8)	477	33.0 (2.9)	525	27.8 (2.3)	423	35.5 (3.0)
30-49	-	--	-	--	1,649	33.5 (1.5)	711	42.6 (2.3)	1,529	43.2 (1.6)	1,599	43.3 (1.6)	1,328	50.3 (1.8)
50-64	-	--	-	--	781	35.0 (2.4)	408	48.9 (3.0)	883	48.6 (1.9)	975	48.1 (1.9)	940	57.1 (2.0)
65+	-	--	-	--	608	26.4 (2.1)	420	29.8 (3.1)	890	34.1 (1.9)	948	37.5 (2.1)	779	42.3 (2.5)
거주지역														
동	-	--	-	--	3,877	30.2 (1.2)	1,638	39.8 (2.0)	3,740	41.0 (1.3)	3,953	41.0 (1.2)	3,534	47.8 (1.4)
읍면	-	--	-	--	927	25.2 (2.3)	618	33.0 (4.1)	1,176	31.5 (2.1)	1,238	30.5 (2.3)	936	37.0 (2.3)
소득수준														
하	-	--	-	--	1,244	21.1 (1.6)	537	29.8 (3.0)	1,163	32.6 (1.9)	1,284	31.3 (1.6)	1,078	39.3 (1.8)
중하	-	--	-	--	1,237	26.3 (1.6)	528	34.1 (2.9)	1,196	37.2 (2.0)	1,282	35.4 (1.6)	1,112	43.7 (2.1)
중상	-	--	-	--	1,154	31.7 (1.8)	536	44.1 (2.6)	1,210	41.1 (1.7)	1,264	44.8 (1.8)	1,123	48.0 (2.0)
상	-	--	-	--	1,122	39.7 (2.0)	526	46.6 (3.2)	1,196	46.9 (2.2)	1,304	45.2 (2.3)	1,096	52.5 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	3,877	30.2 (1.2)	1,638	39.5 (1.9)	3,740	40.9 (1.3)	3,953	40.6 (1.1)	3,534	47.3 (1.3)
읍면	-	--	-	--	927	25.7 (2.3)	618	34.0 (3.8)	1,176	31.9 (2.2)	1,238	31.2 (2.6)	936	36.4 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	1,244	21.2 (1.5)	537	30.3 (3.0)	1,163	32.5 (1.9)	1,284	31.4 (1.6)	1,078	39.0 (1.8)
중하	-	--	-	--	1,237	26.4 (1.5)	528	34.0 (2.9)	1,196	37.1 (2.0)	1,282	35.0 (1.6)	1,112	43.7 (2.1)
중상	-	--	-	--	1,154	31.8 (1.8)	536	43.4 (2.8)	1,210	41.1 (1.6)	1,264	44.6 (1.9)	1,123	46.8 (2.0)
상	-	--	-	--	1,122	39.5 (2.0)	526	46.5 (3.2)	1,196	46.5 (2.2)	1,304	44.5 (2.3)	1,096	51.2 (2.1)

표 2-III-22. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	8,025	40.1 (0.9)	3,555	34.8 (1.0)	4,470	45.5 (1.2)
19세이상	5,949	41.3 (1.0)	2,479	34.7 (1.2)	3,470	47.8 (1.3)
연령(세)						
1-9	1,104	48.0 (2.2)	552	51.5 (2.7)	552	44.2 (2.9)
10-18	972	26.9 (1.8)	524	24.0 (2.2)	448	30.4 (2.7)
19-29	693	31.5 (2.1)	270	27.7 (3.0)	423	35.5 (3.0)
30-39	1,148	44.2 (2.0)	445	39.0 (2.6)	703	49.8 (2.4)
40-49	1,105	41.4 (1.9)	480	32.4 (2.5)	625	50.8 (2.6)
50-59	1,107	47.6 (1.9)	442	37.6 (2.4)	665	57.5 (2.2)
60-69	1,001	46.2 (2.1)	453	41.1 (2.6)	548	50.9 (2.6)
70+	895	37.6 (2.3)	389	32.2 (3.1)	506	41.0 (2.7)
1-2	243	42.9 (4.1)	115	41.2 (5.2)	128	44.9 (5.8)
3-5	351	52.0 (3.5)	172	57.2 (4.4)	179	46.7 (4.6)
6-11	779	43.6 (2.6)	407	45.4 (3.5)	372	41.6 (3.5)
12-18	703	24.6 (2.0)	382	22.2 (2.4)	321	27.5 (3.3)
19-29	693	31.5 (2.1)	270	27.7 (3.0)	423	35.5 (3.0)
30-49	2,253	42.8 (1.3)	925	35.7 (1.7)	1,328	50.3 (1.8)
50-64	1,613	47.4 (1.6)	673	37.5 (2.0)	940	57.1 (2.0)
65+	1,390	40.3 (2.0)	611	37.4 (2.8)	779	42.3 (2.5)
거주지역						
동	6,347	42.0 (1.1)	2,813	36.2 (1.2)	3,534	47.8 (1.4)
읍면	1,678	33.3 (1.8)	742	29.6 (2.1)	936	37.0 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,955	34.9 (1.5)	877	30.6 (2.3)	1,078	39.3 (1.8)
중하	1,987	38.7 (1.6)	875	33.8 (1.9)	1,112	43.7 (2.1)
중상	2,001	41.6 (1.6)	878	35.3 (2.1)	1,123	48.0 (2.0)
상	1,980	46.7 (1.9)	884	41.1 (2.5)	1,096	52.5 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,347	42.0 (1.0)	2,813	36.6 (1.2)	3,534	47.3 (1.3)
읍면	1,678	32.9 (2.1)	742	29.7 (2.4)	936	36.4 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	1,955	35.0 (1.5)	877	31.0 (2.3)	1,078	39.0 (1.8)
중하	1,987	39.0 (1.5)	875	34.5 (1.9)	1,112	43.7 (2.1)
중상	2,001	41.2 (1.6)	878	35.5 (2.1)	1,123	46.8 (2.0)
상	1,980	45.9 (2.0)	884	40.7 (2.5)	1,096	51.2 (2.1)

1) 식이보충제 복용경험률-최근 1년간 : 최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-23. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험률[1] : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	8,025	32.9 (0.9)	3,555	29.1 (1.0)	4,470	36.8 (1.3)
19세이상	5,949	34.3 (0.9)	2,479	29.0 (1.2)	3,470	39.3 (1.3)
연령(세)						
1-9	1,104	39.1 (2.1)	552	42.7 (2.6)	552	35.2 (2.6)
10-18	972	20.1 (1.9)	524	20.1 (2.6)	448	20.2 (2.7)
19-29	693	25.7 (2.2)	270	23.8 (2.9)	423	27.6 (2.8)
30-39	1,148	34.3 (1.7)	445	30.0 (2.3)	703	38.8 (2.2)
40-49	1,105	34.6 (1.9)	480	28.1 (2.4)	625	41.2 (2.6)
50-59	1,107	42.0 (2.0)	442	32.2 (2.8)	665	51.8 (2.2)
60-69	1,001	38.7 (2.2)	453	34.2 (2.6)	548	42.8 (2.7)
70+	895	31.8 (2.0)	389	28.7 (2.8)	506	33.7 (2.4)
1-2	243	34.9 (3.9)	115	32.4 (4.6)	128	37.7 (5.9)
3-5	351	42.3 (3.5)	172	49.2 (4.6)	179	35.1 (4.3)
6-11	779	34.4 (2.8)	407	36.2 (3.5)	372	32.4 (3.4)
12-18	703	18.6 (2.1)	382	19.3 (2.8)	321	17.6 (3.1)
19-29	693	25.7 (2.2)	270	23.8 (2.9)	423	27.6 (2.8)
30-49	2,253	34.4 (1.3)	925	29.0 (1.7)	1,328	40.1 (1.9)
50-64	1,613	41.5 (1.6)	673	32.1 (2.3)	940	50.9 (1.9)
65+	1,390	33.6 (1.7)	611	32.0 (2.6)	779	34.6 (2.2)
거주지역						
동	6,347	34.7 (1.1)	2,813	30.6 (1.1)	3,534	38.9 (1.6)
읍면	1,678	26.4 (2.0)	742	23.5 (2.2)	936	29.2 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,955	27.9 (1.5)	877	25.0 (2.1)	1,078	30.8 (1.8)
중하	1,987	30.8 (1.6)	875	27.2 (1.8)	1,112	34.4 (2.2)
중상	2,001	34.6 (1.5)	878	30.8 (2.0)	1,123	38.4 (2.1)
상	1,980	40.1 (1.8)	884	35.2 (2.3)	1,096	45.1 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,347	34.7 (1.1)	2,813	30.9 (1.1)	3,534	38.3 (1.5)
읍면	1,678	25.8 (2.3)	742	23.2 (2.4)	936	28.6 (2.9)
소득수준(표준화)						
하	1,955	28.1 (1.4)	877	25.6 (2.0)	1,078	30.4 (1.7)
중하	1,987	30.8 (1.6)	875	27.6 (1.8)	1,112	34.2 (2.1)
중상	2,001	34.0 (1.6)	878	31.0 (2.0)	1,123	36.6 (2.0)
상	1,980	39.3 (1.8)	884	34.9 (2.2)	1,096	43.9 (2.1)

1) 식이보충제 복용경험률-최근 1개월간 : 최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-24. 식품안정성 확보가구분율[1] 추이, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체	-	- -	-	- -	3,320	87.9 (0.8)	1,614	89.0 (1.5)	3,526	88.2 (1.0)	3,762	92.0 (0.7)	3,094	95.4 (0.6)

1) 식품안정성 확보가구분율 : 가구원 중 식품구매를 주로 담당하는 1명에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다' 또는 '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'로 응답한 분율

표 2-III-25. 식품안정성 확보가구분율[1], 2010

(단위 : %)

구 분	N	우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었음(A)	우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했음(B)	경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했음	경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했음	식품안정성 확보가구분율
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체	3,094	40.7 (1.2)	54.6 (1.2)	3.9 (0.5)	0.8 (0.2)	95.4 (0.6)
거주지역						
동	2,395	41.8 (1.3)	53.1 (1.3)	4.2 (0.6)	0.8 (0.2)	95.0 (0.7)
읍면	699	37.0 (2.4)	59.6 (2.8)	2.6 (0.8)	0.8 (0.7)	96.6 (1.3)
소득수준[2]						
하	764	23.5 (2.2)	64.1 (2.5)	10.7 (1.6)	1.7 (0.5)	87.6 (1.7)
중하	766	40.0 (1.8)	57.2 (2.0)	2.0 (0.6)	0.8 (0.5)	97.2 (0.8)
중상	778	49.3 (2.1)	49.6 (2.0)	0.8 (0.3)	0.3 (0.2)	98.9 (0.4)
상	748	54.2 (2.3)	45.1 (2.3)	0.7 (0.4)	0.0 (-)[3]	99.3 (0.4)

1) 식품안정성 확보가구분율 : 가구원 중 식품구매를 주로 담당하는 1명에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 (A) 또는 (B)로 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 2-IV-1. 출생 시 체중 분포 : 전체, 만1-3세, 2008-2010[1]

(단위 : %)

구 분	N	평균체중 (kg)	2.5kg 미만[2]	2.5kg 이상 3.0kg 미만	3.0kg 이상 3.5kg 미만	3.5kg 이상 4.0kg 미만	4.0kg 이상
		평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1-3세	1,109	3.25 (0.02)	3.9 (0.7)	19.4 (1.4)	47.1 (1.7)	26.0 (1.5)	3.5 (0.7)
성별							
남자	568	3.32 (0.02)	2.3 (0.6)	17.3 (2.0)	44.5 (2.3)	31.9 (2.3)	4.0 (1.0)
여자	541	3.17 (0.02)	5.6 (1.2)	21.7 (1.9)	49.8 (2.4)	19.8 (2.0)	3.0 (0.8)
거주지역							
동	926	3.26 (0.02)	3.6 (0.6)	19.2 (1.5)	47.3 (1.8)	26.3 (1.6)	3.7 (0.7)
읍면	183	3.19 (0.05)	5.5 (2.6)	20.7 (3.9)	46.2 (4.7)	24.7 (4.0)	2.8 (1.4)

1) 해당 대상수가 적어 2008-2010년도 자료를 합하여 결과산출

2) 저체중아(출생체중 2.5kg 미만) 출생률 : 3.9%

표 2-IV-2. 수유현황 : 전체, 만1-3세, 2008-2010[1]

(단위 : %)

구 분	수유경험률[2]				완전모유수유율[3]		모유수유기간(개월)[4]	
	모유		조제분유					
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N[5]	평균(표준오차)
1-3세	1,113	88.6 (1.2)	1,107	67.1 (1.6)	1,107	32.8 (1.6)	985	10.0 (0.3)
성별								
남자	571	88.5 (1.6)	568	70.9 (2.3)	568	29.0 (2.3)	504	9.3 (0.3)
여자	542	88.6 (1.7)	539	63.1 (2.4)	539	36.9 (2.4)	481	10.7 (0.4)
거주지역								
동	930	89.0 (1.2)	926	66.1 (1.7)	926	33.8 (1.7)	827	10.2 (0.3)
읍면	183	86.2 (3.2)	181	72.5 (4.3)	181	27.5 (4.3)	158	8.9 (0.8)

1) 해당 대상수가 적어 2008-2010년도 자료를 합하여 결과산출

2) 모유수유경험률 : 모유수유 여부에 '예'로 응답한 분율
조제분유수유경험률 : 조제분유수유 여부에 '예'로 응답한 분율

3) 완전모유수유율 : 모유수유 여부에 '예'로 응답하고 조제분유 수유 여부에 '아니오'로 응답한 분율

4) 모유수유기간 : 모유수유를 경험한 대상자의 총 모유수유기간의 평균

5) N : 모유수유여부에 '예'로 응답한 대상자 수

표 2-IV-3. 월령별 수유형태 : 전체, 만1-3세, 2008-2010[1]

(단위 : %)

구 분	N	완전모유수유[2]	혼합수유[3]	조제분유수유[4]
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
생후 1개월				
1-3세	1,105	56.4 (1.9)	30.8 (1.7)	12.8 (1.2)
성별				
남자	565	53.7 (2.7)	33.9 (2.5)	12.4 (1.6)
여자	540	59.3 (2.5)	27.6 (2.3)	13.1 (1.8)
거주지역				
동	925	57.0 (2.0)	30.8 (1.9)	12.1 (1.3)
읍면	180	53.1 (5.5)	30.8 (4.4)	16.1 (3.2)
생후 6개월				
1-3세	1,102	49.5 (1.8)	11.3 (1.0)	39.2 (1.8)
성별				
남자	564	46.2 (2.5)	10.6 (1.4)	43.2 (2.5)
여자	538	53.0 (2.5)	11.9 (1.5)	35.0 (2.4)
거주지역				
동	923	50.8 (2.0)	11.2 (1.1)	38.0 (1.9)
읍면	179	42.8 (5.0)	11.5 (2.6)	45.7 (4.8)
생후 12개월				
1-3세	1,025	41.1 (1.7)	6.7 (0.8)	52.1 (1.8)
성별				
남자	531	37.9 (2.5)	5.0 (1.1)	57.1 (2.5)
여자	494	44.6 (2.6)	8.6 (1.3)	46.8 (2.7)
거주지역				
동	856	42.4 (1.9)	6.9 (0.9)	50.7 (2.0)
읍면	169	34.4 (4.6)	5.9 (1.9)	59.8 (4.6)

1) 해당 대상수가 적어 2008-2010년도 자료를 합하여 결과산출
2) 완전모유수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유 수유 없이 모유만 수유한 대상자 분율
3) 혼합수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유와 모유를 모두 수유한 대상자 분율
4) 조제분유수유율 : 조제분유수유 여부에 '예'로 응답한 대상 중 모유수유 여부에 '아니오'로 응답한 분율

표 2-IV-4. 조제분유[1], 시판우유[2], 이유보충식[3] 시작 시기 : 전체, 만1-3세, 2008-2010[4]

구 분	시작 시기					
	조제분유수유(주) (혼합수유아의 경우)		시판우유(개월)		이유보충식(개월)	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
1-3세	618	9.0 (0.7)	1,043	14.6 (0.2)	1,093	6.6 (0.1)
성별						
남자	338	8.9 (1.0)	536	15.0 (0.2)	561	6.6 (0.1)
여자	280	9.2 (1.0)	507	14.2 (0.2)	532	6.5 (0.1)
거주지역						
동	515	8.8 (0.8)	880	14.6 (0.2)	917	6.6 (0.1)
읍면	103	10.1 (2.1)	163	14.9 (0.5)	176	6.6 (0.4)

1) 조제분유수유 시작시기 : 혼합수유아의 경우 조제분유를 수유하기 시작한 시기
2) 시판우유 시작시기 : 시판우유 섭취를 시작한 시기
3) 이유보충식 시작 시기 : 이유보충식을 꾸준히 섭취하기 시작한 시기
4) 해당 대상수가 적어 2008-2010년도 자료를 합하여 결과산출

제 3 장 만 성 질 환

Ⅰ. 비만
Ⅱ. 고혈압
Ⅲ. 당뇨병
Ⅳ. 이상지혈증
Ⅴ. 폐쇄성폐질환
Ⅵ. 구강질환
Ⅶ. B형간염
Ⅷ. 빈혈
Ⅸ. 안질환
Ⅹ. 이비인후질환
Ⅺ. 골다공증
Ⅻ. 골관절염
ⅩⅢ. 중금속
ⅩⅣ. 알레르기
ⅩⅤ. 기타질환

표 3-I-1. 비만 유병률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
19세이상	8,048	25.8 (0.6)	6,631	30.3 (0.8)	5,485	31.4 (0.9)	2,997	32.1 (1.1)	6,727	31.0 (0.8)	7,469	31.9 (0.7)	6,265	31.4 (0.7)
30세이상	6,442	29.0 (0.7)	5,452	32.9 (0.8)	4,761	34.8 (0.9)	2,662	34.8 (1.2)	5,858	33.1 (0.8)	6,439	34.3 (0.7)	5,508	34.0 (0.8)
19세이상(표준화)[2]	8,048	26.0 (0.6)	6,631	29.2 (0.7)	5,485	31.3 (0.8)	2,997	31.7 (1.1)	6,727	30.7 (0.8)	7,469	31.3 (0.7)	6,265	30.8 (0.7)
30세이상(표준화)	6,442	29.1 (0.7)	5,452	32.7 (0.8)	4,761	34.8 (0.9)	2,662	34.6 (1.2)	5,858	32.9 (0.8)	6,439	34.0 (0.7)	5,508	33.9 (0.8)
연령(세)														
19-29	1,606	15.2 (1.1)	1,179	17.3 (1.2)	724	19.3 (1.8)	335	22.0 (2.5)	869	23.0 (1.8)	1,030	22.1 (1.4)	757	20.5 (1.5)
30-39	1,949	24.6 (1.1)	1,637	25.6 (1.3)	1,196	29.0 (1.5)	627	27.8 (2.2)	1,384	28.0 (1.2)	1,407	29.5 (1.1)	1,217	31.0 (1.8)
40-49	1,628	31.6 (1.3)	1,518	35.8 (1.4)	1,337	35.2 (1.6)	579	32.5 (2.1)	1,321	34.4 (1.6)	1,501	34.7 (1.5)	1,176	34.1 (1.5)
50-59	1,258	35.6 (1.6)	946	37.2 (1.8)	913	42.1 (1.7)	512	42.4 (2.6)	1,133	37.4 (1.6)	1,251	40.0 (1.5)	1,180	35.3 (1.6)
60-69	1,004	30.2 (1.7)	800	38.3 (2.1)	808	39.6 (2.2)	490	46.2 (2.6)	1,076	37.2 (2.0)	1,212	37.0 (1.6)	1,037	40.7 (2.1)
70+	603	22.2 (1.9)	551	29.5 (2.2)	507	31.5 (2.2)	454	31.7 (2.9)	944	29.3 (1.9)	1,068	31.1 (1.8)	898	30.6 (1.9)
거주지역														
동	5,169	25.7 (0.7)	5,103	29.8 (0.9)	4,224	30.2 (1.0)	2,121	33.1 (1.3)	4,930	30.7 (0.9)	5,549	31.4 (0.7)	4,889	30.8 (0.9)
읍면	2,879	26.1 (1.1)	1,528	32.3 (1.2)	1,261	36.5 (1.5)	876	28.7 (1.6)	1,797	32.3 (1.6)	1,920	34.0 (1.6)	1,376	33.4 (1.6)
소득수준[3]														
하	1,889	24.7 (1.1)	1,469	32.7 (1.5)	1,399	31.7 (1.6)	706	31.4 (2.7)	1,612	32.8 (1.4)	1,864	33.6 (1.5)	1,549	30.3 (1.4)
중하	2,082	26.6 (1.1)	1,522	29.8 (1.5)	1,390	30.3 (1.7)	699	31.5 (2.4)	1,616	31.7 (1.6)	1,855	35.0 (1.4)	1,536	32.5 (1.6)
중상	2,024	25.0 (1.0)	1,635	31.2 (1.4)	1,322	32.9 (1.8)	727	34.4 (1.9)	1,643	30.5 (1.5)	1,819	29.4 (1.2)	1,554	30.6 (1.6)
상	2,053	26.6 (1.3)	1,616	28.1 (1.3)	1,325	30.7 (1.7)	698	32.3 (2.2)	1,640	29.7 (1.2)	1,840	30.2 (1.4)	1,537	32.3 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	5,169	26.4 (0.7)	5,103	29.1 (0.8)	4,224	30.7 (0.9)	2,121	32.8 (1.3)	4,930	30.7 (0.9)	5,549	31.2 (0.7)	4,889	30.7 (0.9)
읍면	2,879	26.8 (1.2)	1,528	31.7 (1.2)	1,261	36.3 (1.8)	876	28.2 (1.7)	1,797	31.6 (2.0)	1,920	33.3 (1.8)	1,376	31.8 (1.9)
소득수준(표준화)														
하	1,889	24.8 (1.1)	1,469	31.8 (1.5)	1,399	31.6 (1.6)	706	31.2 (2.7)	1,612	32.5 (1.4)	1,864	33.2 (1.5)	1,549	30.1 (1.4)
중하	2,082	26.7 (1.1)	1,522	29.1 (1.4)	1,390	30.5 (1.5)	699	31.1 (2.3)	1,616	31.4 (1.6)	1,855	34.5 (1.4)	1,536	31.8 (1.5)
중상	2,024	25.6 (1.0)	1,635	30.0 (1.3)	1,322	32.5 (1.8)	727	34.2 (1.8)	1,643	30.1 (1.5)	1,819	28.7 (1.2)	1,554	30.1 (1.6)
상	2,053	26.6 (1.2)	1,616	27.1 (1.2)	1,325	30.6 (1.7)	698	31.3 (2.1)	1,640	29.4 (1.3)	1,840	29.4 (1.4)	1,537	31.7 (1.7)
남자														
19세이상	3,661	25.7 (1.0)	2,920	32.0 (1.1)	2,355	34.9 (1.3)	1,262	36.6 (1.7)	2,827	35.6 (1.0)	3,251	36.2 (0.9)	2,713	36.5 (1.2)
30세이상	2,938	27.6 (1.1)	2,400	33.4 (1.2)	2,053	37.9 (1.3)	1,119	38.1 (1.9)	2,463	36.9 (1.1)	2,765	38.1 (1.0)	2,406	38.6 (1.2)
19세이상(표준화)	3,661	25.1 (0.9)	2,920	31.8 (1.0)	2,355	34.7 (1.2)	1,262	36.2 (1.7)	2,827	35.3 (1.0)	3,251	35.8 (0.9)	2,713	36.3 (1.2)
30세이상(표준화)	2,938	26.8 (1.0)	2,400	33.6 (1.2)	2,053	37.6 (1.3)	1,119	37.8 (1.8)	2,463	36.6 (1.1)	2,765	37.8 (1.0)	2,406	38.7 (1.3)
연령(세)														
19-29	723	19.3 (1.6)	520	25.5 (2.2)	302	24.8 (2.8)	143	31.0 (4.0)	364	31.0 (2.6)	486	29.0 (2.1)	307	28.3 (2.8)
30-39	923	28.4 (1.7)	728	35.0 (2.3)	496	38.1 (2.3)	251	41.7 (3.6)	597	38.2 (2.1)	599	38.5 (1.8)	517	42.3 (2.5)
40-49	775	33.3 (2.1)	689	39.0 (2.1)	596	41.1 (2.4)	258	37.9 (3.3)	576	41.1 (2.3)	643	41.9 (2.1)	538	41.2 (2.3)
50-59	575	28.3 (2.0)	436	32.4 (2.5)	407	41.0 (2.7)	208	41.7 (4.1)	492	39.6 (2.3)	543	43.4 (2.2)	483	36.8 (2.4)
60-69	445	20.0 (2.2)	351	28.0 (3.0)	376	31.0 (3.0)	218	34.6 (4.1)	439	29.8 (2.8)	543	32.2 (2.1)	476	37.8 (2.9)
70+	220	8.0 (2.2)	196	23.0 (3.6)	178	27.4 (4.1)	184	21.4 (3.7)	359	21.0 (2.5)	437	19.9 (2.2)	392	24.5 (2.4)
거주지역														
동	2,374	26.9 (1.2)	2,242	32.8 (1.2)	1,804	34.3 (1.5)	880	37.8 (2.0)	2,068	35.8 (1.1)	2,402	36.3 (1.1)	2,111	37.3 (1.3)
읍면	1,287	21.3 (1.5)	678	28.6 (2.0)	551	37.6 (2.1)	382	32.3 (2.6)	759	34.8 (2.5)	849	35.7 (2.2)	602	33.4 (2.6)

1) 비만 유병률 : 체질량지수(kg/m^2) 25 이상인 분율, 만19세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 비만 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	848	23.5 (1.7)	637	31.6 (2.1)	611	33.6 (2.5)	300	35.2 (4.3)	675	34.5 (2.3)	823	35.3 (2.0)	673	31.8 (2.3)
중하	951	25.0 (1.8)	688	29.8 (2.0)	588	32.5 (2.4)	291	33.0 (3.0)	670	34.2 (2.1)	800	39.7 (2.1)	668	38.7 (2.4)
중상	963	24.8 (1.6)	731	34.5 (2.2)	553	35.8 (2.6)	309	43.7 (3.1)	705	36.7 (2.1)	777	33.7 (2.0)	675	34.3 (2.3)
상	899	29.0 (1.7)	701	32.1 (1.9)	580	37.6 (2.6)	302	36.9 (2.8)	689	37.7 (1.9)	807	36.2 (2.1)	665	41.0 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	2,374	26.0 (1.1)	2,242	32.5 (1.2)	1,804	34.2 (1.4)	880	37.3 (2.0)	2,068	35.3 (1.1)	2,402	35.9 (1.0)	2,111	37.2 (1.3)
읍면	1,287	22.8 (1.6)	678	29.6 (2.2)	551	38.6 (2.7)	382	32.5 (2.5)	759	36.1 (3.0)	849	36.9 (2.5)	602	32.8 (3.2)
소득수준(표준화)														
하	848	23.1 (1.6)	637	30.9 (2.0)	611	33.1 (2.4)	300	34.4 (4.2)	675	34.0 (2.2)	823	34.7 (2.0)	673	31.7 (2.3)
중하	951	24.3 (1.6)	688	29.8 (2.0)	588	32.4 (2.3)	291	32.9 (3.0)	670	34.2 (2.1)	800	39.6 (2.2)	668	38.4 (2.4)
중상	963	24.4 (1.6)	731	34.2 (2.1)	553	35.3 (2.6)	309	43.0 (2.9)	705	36.4 (2.1)	777	33.1 (1.9)	675	35.0 (2.3)
상	899	28.3 (1.7)	701	31.9 (1.9)	580	37.5 (2.5)	302	36.5 (2.8)	689	37.4 (1.9)	807	36.0 (2.1)	665	40.9 (2.5)
여자														
19세이상	4,387	25.9 (0.8)	3,711	29.1 (0.9)	3,130	27.9 (1.0)	1,735	27.8 (1.2)	3,900	26.5 (1.0)	4,218	27.6 (0.9)	3,552	26.4 (0.9)
30세이상	3,504	30.3 (0.9)	3,052	32.6 (1.0)	2,708	31.8 (1.1)	1,543	31.6 (1.5)	3,395	29.4 (1.0)	3,674	30.6 (1.0)	3,102	29.7 (1.1)
19세이상(표준화)	4,387	26.2 (0.7)	3,711	27.4 (0.8)	3,130	27.3 (1.0)	1,735	26.3 (1.1)	3,900	25.2 (0.9)	4,218	26.0 (0.9)	3,552	24.8 (0.9)
30세이상(표준화)	3,504	30.5 (0.9)	3,052	32.2 (1.0)	2,708	31.4 (1.1)	1,543	30.3 (1.4)	3,395	28.5 (1.0)	3,674	29.5 (1.0)	3,102	28.5 (1.0)
연령(세)														
19-29	883	11.6 (1.2)	659	11.0 (1.3)	422	13.4 (2.0)	192	12.6 (2.6)	505	14.1 (2.1)	544	14.3 (1.7)	450	12.1 (1.5)
30-39	1,026	20.9 (1.3)	909	19.1 (1.4)	700	19.0 (1.7)	376	12.8 (1.9)	787	17.0 (1.3)	808	19.6 (1.5)	700	19.0 (1.9)
40-49	853	29.8 (1.8)	829	33.6 (2.1)	741	29.0 (2.0)	321	26.6 (2.5)	745	27.5 (2.0)	858	27.2 (1.9)	638	26.7 (2.1)
50-59	683	42.7 (2.4)	510	40.8 (2.4)	506	43.1 (2.5)	304	43.1 (3.3)	641	35.3 (2.2)	708	36.7 (2.2)	697	33.8 (2.0)
60-69	559	38.6 (2.4)	449	46.6 (2.8)	432	47.1 (3.0)	272	56.4 (4.2)	637	43.8 (2.4)	669	41.4 (2.1)	561	43.3 (2.7)
70+	383	29.4 (2.5)	355	33.4 (2.9)	329	34.0 (2.8)	270	37.9 (4.0)	585	34.3 (2.4)	631	38.1 (2.4)	506	34.4 (2.5)
거주지역														
동	2,795	24.6 (0.9)	2,861	27.7 (1.1)	2,420	26.2 (1.1)	1,241	28.5 (1.4)	2,862	25.7 (1.1)	3,147	26.5 (1.0)	2,778	24.4 (1.1)
읍면	1,592	30.3 (1.4)	850	35.2 (1.8)	710	35.5 (2.7)	494	24.9 (2.2)	1,038	29.9 (1.9)	1,071	32.4 (2.2)	774	33.4 (2.0)
소득수준														
하	1,041	25.7 (1.5)	832	33.4 (1.9)	788	29.7 (1.9)	406	27.6 (2.5)	937	31.2 (1.9)	1,041	31.8 (1.9)	876	28.9 (2.0)
중하	1,131	28.1 (1.4)	834	29.8 (2.1)	802	28.2 (2.1)	408	30.0 (2.7)	946	29.3 (2.1)	1,055	30.3 (1.6)	868	26.5 (1.8)
중상	1,061	25.2 (1.6)	904	28.7 (1.7)	769	30.1 (2.1)	418	25.0 (2.3)	938	24.1 (1.8)	1,042	25.1 (1.7)	879	26.9 (1.8)
상	1,154	24.6 (1.6)	915	25.5 (1.6)	745	23.7 (1.9)	396	27.3 (2.6)	951	21.7 (1.6)	1,033	24.2 (1.6)	872	23.2 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	2,795	26.1 (0.9)	2,861	26.8 (1.0)	2,420	26.6 (1.0)	1,241	27.2 (1.3)	2,862	25.3 (1.1)	3,147	25.8 (1.0)	2,778	23.8 (1.0)
읍면	1,592	30.1 (1.5)	850	33.1 (1.8)	710	32.8 (2.7)	494	23.0 (1.8)	1,038	25.4 (2.2)	1,071	28.3 (2.2)	774	30.4 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	1,041	26.0 (1.4)	832	32.3 (1.9)	788	29.2 (1.8)	406	27.0 (2.5)	937	30.4 (1.7)	1,041	30.8 (1.9)	876	28.4 (1.9)
중하	1,131	28.8 (1.3)	834	28.0 (1.9)	802	28.4 (2.0)	408	29.3 (2.6)	946	28.3 (2.1)	1,055	28.6 (1.5)	868	24.8 (1.7)
중상	1,061	25.9 (1.5)	904	27.0 (1.5)	769	29.1 (2.0)	418	24.0 (2.1)	938	22.6 (1.7)	1,042	23.6 (1.6)	879	24.6 (1.7)
상	1,154	24.5 (1.5)	915	23.9 (1.4)	745	22.6 (1.9)	396	24.6 (2.3)	951	20.7 (1.6)	1,033	21.9 (1.5)	872	21.1 (1.8)

표 3-I-2. 신장 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : cm)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,722	170.8	0.20	159.6	162.4	166.3	170.9	175.4	179.2	181.3
30세이상	2,415	169.7	0.18	158.8	161.7	165.4	169.8	174.0	177.8	180.4
65세이상	626	164.6	0.27	155.6	157.2	160.7	164.5	168.6	172.1	173.9
연령(세)										
19-29	307	175.0	0.38	165.0	168.1	171.7	175.3	178.5	181.3	183.8
30-39	521	173.5	0.27	163.9	166.3	170.1	173.5	176.9	180.8	182.6
40-49	539	170.2	0.33	161.3	163.0	166.2	169.9	174.2	177.7	179.8
50-59	484	168.7	0.33	158.8	161.5	164.9	168.9	172.7	175.6	178.4
60-69	478	166.6	0.28	157.5	159.2	163.1	166.4	170.1	173.7	175.7
70+	393	163.7	0.33	154.6	156.7	159.8	163.7	168.0	170.7	172.5
여자										
19세이상	3,559	157.1	0.18	145.8	148.7	152.8	157.4	161.5	165.3	167.8
30세이상	3,109	156.1	0.17	145.3	147.9	152.0	156.4	160.5	164.0	166.4
65세이상	789	150.4	0.26	140.7	142.8	146.4	150.5	154.6	158.0	159.5
연령(세)										
19-29	450	161.3	0.34	151.4	153.8	157.7	161.4	165.2	168.5	170.7
30-39	702	159.9	0.28	150.6	152.7	156.2	160.1	163.6	167.3	169.0
40-49	640	158.3	0.21	149.7	152.1	154.8	158.3	161.5	164.9	167.1
50-59	697	155.4	0.23	146.6	148.7	151.8	155.5	158.7	162.0	163.8
60-69	563	153.4	0.26	145.2	147.2	149.7	153.4	157.0	160.2	162.0
70+	507	149.4	0.33	138.9	141.2	145.5	149.5	153.4	157.0	158.9

표 3-I-3. 체중 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : kg)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,719	70.2	0.30	53.5	56.7	62.7	69.6	76.7	83.9	89.5
30세이상	2,412	69.7	0.28	53.1	56.0	62.2	69.1	76.5	83.0	88.2
65세이상	625	62.4	0.46	47.9	51.3	55.4	62.1	68.8	73.8	77.0
연령(세)										
19-29	307	72.3	0.73	55.9	59.6	64.1	71.1	77.8	88.8	94.9
30-39	519	73.8	0.61	55.8	59.3	64.8	73.2	81.1	89.2	94.6
40-49	540	70.6	0.50	54.2	58.0	63.2	70.3	77.4	82.7	87.5
50-59	484	68.9	0.51	54.1	57.0	62.6	68.0	74.5	79.8	83.1
60-69	476	66.1	0.53	50.6	54.2	59.4	65.9	72.4	78.3	82.4
70+	393	61.3	0.55	47.4	51.0	54.6	61.1	67.4	72.9	76.0
여자										
19세이상	3,553	57.1	0.18	44.5	46.9	51.0	56.0	62.0	69.1	73.4
30세이상	3,103	57.5	0.20	44.7	47.1	51.5	56.5	62.4	69.4	73.3
65세이상	788	55.2	0.42	40.7	43.9	49.0	54.3	60.8	68.5	72.2
연령(세)										
19-29	450	55.5	0.56	43.3	45.7	49.6	53.6	59.0	67.2	74.8
30-39	700	57.2	0.40	45.2	46.9	50.9	55.5	61.5	69.8	74.5
40-49	639	58.8	0.43	46.5	48.3	52.7	58.0	64.0	70.6	74.2
50-59	697	58.2	0.37	46.4	48.7	52.8	57.3	62.9	68.9	71.9
60-69	561	58.1	0.42	45.5	47.8	52.1	58.0	63.0	69.1	73.1
70+	506	53.9	0.49	39.6	42.0	47.9	53.4	59.1	67.6	71.0

표 3-I-4. 허리둘레 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : cm)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,702	84.0	0.24	70.0	73.0	77.8	83.8	89.7	94.7	98.6
30세이상	2,397	84.8	0.23	70.6	73.6	79.0	85.1	90.3	95.0	99.0
65세이상	619	84.5	0.44	69.2	73.5	78.1	85.2	90.7	94.2	97.5
연령(세)										
19-29	305	81.0	0.58	67.4	70.5	74.8	79.9	85.3	93.5	97.6
30-39	518	84.1	0.51	69.2	72.3	76.8	84.2	90.0	95.6	101.4
40-49	535	84.6	0.40	71.0	73.6	79.0	85.1	89.6	94.2	97.1
50-59	482	85.5	0.39	73.1	75.2	80.7	85.4	90.5	94.4	98.1
60-69	474	85.7	0.49	71.4	73.7	80.2	86.0	91.7	96.4	100.3
70+	388	84.6	0.58	68.2	73.3	78.3	85.0	91.3	94.5	98.3
여자										
19세이상	3,529	77.6	0.30	62.6	65.3	70.1	76.6	84.2	91.0	95.2
30세이상	3,082	79.2	0.31	64.5	67.2	72.1	78.6	85.4	91.7	96.2
65세이상	780	84.0	0.42	67.5	71.3	78.0	84.2	90.2	95.8	99.6
연령(세)										
19-29	447	71.0	0.53	60.2	61.4	65.2	69.2	75.0	82.5	87.5
30-39	694	74.4	0.44	62.0	64.2	68.2	73.2	79.5	85.9	91.4
40-49	635	77.7	0.53	64.0	67.1	71.7	76.7	82.3	88.8	95.2
50-59	694	80.6	0.42	67.2	69.4	74.6	80.5	86.3	91.4	95.0
60-69	560	83.8	0.51	68.9	72.7	77.5	83.7	90.2	95.3	99.0
70+	499	83.6	0.47	67.0	70.1	77.7	83.6	90.0	94.9	99.3

표 3-I-5. 체질량지수[1] 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : kg/m^2)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,713	24.0	0.08	19.1	20.2	21.8	23.9	25.9	27.9	29.4
30세이상	2,406	24.1	0.08	19.2	20.2	21.9	24.0	26.1	27.9	29.3
65세이상	624	23.0	0.15	18.4	19.2	20.9	22.9	25.1	26.8	28.1
연령(세)										
19-29	307	23.6	0.22	18.7	19.9	21.2	23.0	25.3	28.1	30.2
30-39	517	24.5	0.19	19.2	20.2	21.8	24.3	26.8	28.9	30.2
40-49	538	24.3	0.15	19.6	20.5	22.3	24.2	26.3	28.0	29.4
50-59	483	24.1	0.14	19.7	20.5	22.6	24.0	25.7	27.3	28.5
60-69	476	23.8	0.18	19.0	19.7	21.5	23.8	25.7	27.6	28.5
70+	392	22.8	0.18	17.9	19.1	20.8	22.6	24.9	26.6	28.2
여자										
19세이상	3,552	23.2	0.09	18.2	19.0	20.6	22.7	25.2	27.9	29.9
30세이상	3,102	23.6	0.09	18.7	19.4	21.2	23.2	25.6	28.1	29.9
65세이상	788	24.3	0.16	19.1	20.0	21.9	24.2	26.2	28.9	30.4
연령(세)										
19-29	450	21.3	0.20	17.4	18.0	19.1	20.6	22.6	25.4	28.5
30-39	700	22.4	0.17	18.0	18.6	19.8	21.7	23.9	27.2	29.7
40-49	638	23.5	0.16	18.9	19.6	21.2	23.0	25.3	27.8	30.3
50-59	697	24.1	0.14	19.5	20.5	22.1	23.9	25.9	28.1	29.1
60-69	561	24.7	0.19	19.6	20.7	22.3	24.5	26.5	29.0	30.4
70+	506	24.1	0.19	18.5	19.6	21.6	23.9	26.1	28.4	30.4

1) 체질량지수 : 체중(kg) / {신장(m)}^{2}

표 3-I-6. 체지방률[1] 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : %)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,557	23.1	0.24	13.9	15.8	19.4	23.2	27.0	30.0	32.0
30세이상	2,266	23.4	0.23	14.5	16.1	19.7	23.5	27.0	30.0	32.1
65세이상	571	23.5	0.37	14.6	15.4	19.8	23.7	27.2	30.1	32.5
연령(세)										
19-29	291	22.3	0.42	12.4	14.3	18.1	22.2	26.7	29.6	31.8
30-39	495	23.4	0.35	13.9	15.6	19.5	23.6	27.3	30.5	32.7
40-49	501	23.4	0.32	14.1	16.0	19.7	23.7	26.9	30.1	31.5
50-59	462	23.0	0.33	15.5	16.9	19.9	23.2	26.1	28.7	30.5
60-69	454	23.3	0.41	13.9	16.0	19.5	23.5	27.1	30.2	32.5
70+	354	24.1	0.39	15.0	15.8	20.9	24.2	27.6	30.5	33.0
여자										
19세이상	3,367	34.0	0.21	24.6	26.8	30.4	34.2	37.7	40.7	42.9
30세이상	2,963	34.3	0.21	24.6	27.3	30.8	34.4	37.9	40.8	43.0
65세이상	734	35.2	0.38	23.2	27.5	31.8	36.0	38.9	42.4	44.2
연령(세)										
19-29	404	32.7	0.40	24.5	25.8	28.8	32.5	36.8	39.5	41.3
30-39	663	32.9	0.30	23.4	25.4	29.3	33.0	36.7	39.7	41.8
40-49	618	33.8	0.29	25.5	27.4	30.4	33.8	37.2	40.5	41.9
50-59	680	35.1	0.25	27.4	29.1	32.2	34.9	38.3	40.8	43.1
60-69	537	35.8	0.37	26.2	29.4	32.5	36.2	39.2	42.0	44.1
70+	465	34.8	0.43	22.3	26.9	31.0	35.6	38.8	42.3	44.0

1) 체지방률 : 체중에 대한 체지방량(머리, 왼팔, 오른팔, 몸통, 왼다리, 오른다리 체지방량의 평균)의 분율, 만19세이상

*체지방 측정장비 : Dual energy X-ray absorptiometry(DXA), (Hologic Discovery W, Hologlc, USA)

표 3-I-7. 비만 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	저체중	정상	비만	N	저체중	정상	비만	N	저체중	정상	비만
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율표준오차)
19세이상	6,265	4.8 (0.3)	63.8 (0.7)	31.4 (0.7)	2,713	2.9 (0.4)	60.6 (1.2)	36.5 (1.2)	3,552	6.7 (0.6)	67.0 (0.9)	26.4 (0.9)
30세이상	5,508	3.3 (0.3)	62.6 (0.8)	34.0 (0.8)	2,406	2.5 (0.3)	59.0 (1.2)	38.6 (1.2)	3,102	4.2 (0.4)	66.2 (1.0)	29.7 (1.1)
연령(세)												
19-29	757	10.8 (1.2)	68.8 (1.6)	20.5 (1.5)	307	4.5 (1.2)	67.2 (2.8)	28.3 (2.8)	450	17.5 (2.2)	70.4 (2.1)	12.1 (1.5)
30-39	1,217	5.4 (0.7)	63.6 (1.7)	31.0 (1.8)	517	2.5 (0.8)	55.2 (2.5)	42.3 (2.5)	700	8.4 (1.3)	72.6 (1.9)	19.0 (1.9)
40-49	1,176	2.5 (0.5)	63.4 (1.5)	34.1 (1.5)	538	1.6 (0.6)	57.2 (2.4)	41.2 (2.3)	638	3.4 (0.9)	69.9 (2.1)	26.7 (2.1)
50-59	1,180	1.7 (0.6)	63.0 (1.5)	35.3 (1.6)	483	1.8 (0.7)	61.5 (2.5)	36.8 (2.4)	697	1.7 (0.6)	64.5 (1.9)	33.8 (2.0)
60-69	1,037	2.0 (0.5)	57.4 (2.0)	40.7 (2.1)	476	2.8 (0.9)	59.5 (2.9)	37.8 (2.9)	561	1.2 (0.6)	55.5 (2.6)	43.3 (2.7)
70+	898	5.4 (0.9)	63.9 (1.9)	30.6 (1.9)	392	6.5 (1.5)	69.0 (2.8)	24.5 (2.4)	506	4.8 (1.1)	60.8 (2.5)	34.4 (2.5)
19-64	4,853	4.9 (0.4)	64.1 (0.8)	31.0 (0.8)	2,089	2.6 (0.4)	59.7 (1.3)	37.7 (1.3)	2,764	7.3 (0.7)	68.6 (1.0)	24.1 (0.9)
65+	1,412	4.3 (0.7)	62.3 (1.6)	33.4 (1.7)	624	5.2 (1.1)	67.8 (2.3)	27.0 (2.1)	788	3.6 (0.8)	58.6 (2.1)	37.8 (2.2)
거주지역												
동	4,889	4.9 (0.4)	64.3 (0.9)	30.8 (0.9)	2,111	2.8 (0.4)	59.9 (1.3)	37.3 (1.3)	2,778	6.9 (0.7)	68.7 (1.1)	24.4 (1.1)
읍면	1,376	4.4 (0.6)	62.1 (1.6)	33.4 (1.6)	602	3.1 (0.7)	63.5 (2.6)	33.4 (2.6)	774	5.7 (1.0)	60.9 (2.0)	33.4 (2.0)
소득수준[2]												
하	1,549	5.9 (0.7)	63.8 (1.4)	30.3 (1.4)	673	4.1 (0.9)	64.1 (2.2)	31.8 (2.3)	876	7.7 (1.2)	63.5 (1.9)	28.9 (2.0)
중하	1,536	3.4 (0.5)	64.1 (1.6)	32.5 (1.6)	668	1.4 (0.5)	59.8 (2.4)	38.7 (2.4)	868	5.3 (1.0)	68.2 (1.9)	26.5 (1.8)
중상	1,554	5.2 (0.7)	64.2 (1.5)	30.6 (1.6)	675	3.8 (0.9)	61.9 (2.1)	34.3 (2.3)	879	6.6 (1.1)	66.5 (2.0)	26.9 (1.8)
상	1,537	4.2 (0.6)	63.5 (1.6)	32.3 (1.7)	665	1.8 (0.6)	57.2 (2.5)	41.0 (2.5)	872	6.7 (1.1)	70.0 (1.8)	23.2 (1.9)
거주지역(표준화)[3]												
동	4,889	5.0 (0.4)	64.3 (0.8)	30.7 (0.9)	2,111	2.9 (0.5)	59.9 (1.3)	37.2 (1.3)	2,778	7.3 (0.7)	68.9 (1.1)	23.8 (1.0)
읍면	1,376	4.9 (1.0)	63.2 (1.8)	31.8 (1.9)	602	2.9 (0.9)	64.3 (3.0)	32.8 (3.2)	774	7.2 (1.7)	62.4 (2.4)	30.4 (2.2)
소득수준(표준화)												
하	1,549	6.1 (0.8)	63.8 (1.5)	30.1 (1.4)	673	4.1 (0.9)	64.2 (2.3)	31.7 (2.3)	876	8.1 (1.2)	63.6 (2.0)	28.4 (1.9)
중하	1,536	3.7 (0.6)	64.5 (1.5)	31.8 (1.5)	668	1.6 (0.5)	60.0 (2.4)	38.4 (2.4)	868	5.9 (1.1)	69.3 (1.9)	24.8 (1.7)
중상	1,554	5.6 (0.8)	64.3 (1.6)	30.1 (1.6)	675	3.9 (0.9)	61.1 (2.1)	35.0 (2.3)	879	7.7 (1.3)	67.7 (2.0)	24.6 (1.7)
상	1,537	4.4 (0.7)	63.9 (1.6)	31.7 (1.7)	665	1.8 (0.6)	57.3 (2.6)	40.9 (2.5)	872	7.7 (1.3)	71.1 (1.8)	21.1 (1.8)

1) 비만 유병률 : 체질량지수(kg/m^2) 기준으로 저체중 18.5 미만, 정상 18.5 이상 25 미만, 비만 25 이상인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-I-8. 비만 유병률(허리둘레기준)[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,231	23.6 (0.8)	2,702	24.3 (1.1)	3,529	22.9 (1.0)
30세이상	5,479	26.6 (0.9)	2,397	26.8 (1.2)	3,082	26.5 (1.2)
연령(세)						
19-29	752	11.2 (1.3)	305	14.5 (2.2)	447	7.6 (1.5)
30-39	1,212	19.2 (1.4)	518	25.7 (2.2)	694	12.2 (1.5)
40-49	1,170	21.1 (1.4)	535	23.9 (2.2)	635	18.1 (2.1)
50-59	1,176	29.2 (1.6)	482	28.0 (2.2)	694	30.3 (2.1)
60-69	1,034	37.2 (2.1)	474	30.4 (2.5)	560	43.3 (2.9)
70+	887	39.5 (2.0)	388	30.6 (2.9)	499	44.9 (2.6)
19-64	4,832	21.1 (0.8)	2,083	23.7 (1.3)	2,749	18.3 (0.9)
65+	1,399	38.9 (1.7)	619	28.3 (2.5)	780	46.1 (2.1)
거주지역						
동	4,863	22.1 (0.9)	2,106	23.8 (1.3)	2,757	20.4 (1.0)
읍면	1,368	29.0 (1.9)	596	26.0 (2.2)	772	31.9 (2.5)
소득수준[2]						
하	1,542	23.1 (1.3)	669	20.6 (1.9)	873	25.5 (1.9)
중하	1,527	25.2 (1.4)	668	26.1 (2.1)	859	24.4 (2.0)
중상	1,548	22.1 (1.5)	674	22.3 (2.2)	874	21.8 (1.7)
상	1,524	23.7 (1.7)	659	27.4 (2.6)	865	19.8 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,863	22.0 (0.9)	2,106	23.9 (1.3)	2,757	19.6 (0.9)
읍면	1,368	24.8 (1.6)	596	24.0 (2.5)	772	25.0 (2.0)
소득수준(표준화)						
하	1,542	22.4 (1.2)	669	20.3 (1.8)	873	23.9 (1.7)
중하	1,527	24.2 (1.3)	668	25.7 (1.9)	859	22.4 (1.7)
중상	1,548	20.9 (1.4)	674	22.3 (2.2)	874	19.1 (1.5)
상	1,524	22.3 (1.7)	659	27.0 (2.6)	865	16.5 (1.5)

1) 비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-I-9. 소아청소년 비만 유병률 : 성별, 만2-18세, 2010

(단위 : %)

구 분	N	정상[1]	과체중[2]	비만[3]
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체				
2-18세	1,984	81.2 (1.0)	8.0 (0.7)	10.8 (0.9)
연령(세)				
2-5	476	81.3 (2.4)	9.1 (1.8)	9.6 (1.9)
6-11	777	79.5 (1.8)	11.7 (1.3)	8.8 (1.3)
12-18	731	82.4 (1.6)	4.9 (0.9)	12.7 (1.5)
남자				
2-18세	1,044	79.8 (1.5)	7.4 (1.0)	12.7 (1.3)
연령(세)				
2-5	239	78.2 (3.4)	9.8 (2.4)	12.0 (2.7)
6-11	409	75.9 (2.6)	11.8 (2.0)	12.2 (2.3)
12-18	396	83.1 (2.3)	3.6 (1.0)	13.3 (2.2)
여자				
2-18세	940	82.8 (1.6)	8.6 (1.1)	8.6 (1.6)
연령(세)				
2-5	237	84.7 (3.0)	8.4 (2.2)	6.9 (2.2)
6-11	368	83.5 (2.2)	11.5 (1.9)	5.0 (1.3)
12-18	335	81.5 (2.7)	6.5 (1.7)	12.0 (2.7)

1) 정상 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수(BMI, kg/m^2) 기준 85백분위수 미만

2) 과체중 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 이상 95백분위수 미만이면서 체질량지수 25미만

3) 비만 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상 또는 체질량지수 25이상

표 3-II-1. 고혈압 유병률[1] 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
30세이상	6,435	28.9 (0.8)	5,029	29.8 (0.9)	4,795	28.1 (0.9)	2,595	25.1 (1.2)	5,900	27.2 (0.8)	6,440	28.0 (0.8)	5,464	28.9 (0.9)
65세이상	1,004	56.1 (2.0)	845	58.9 (2.0)	904	55.9 (2.0)	703	56.6 (2.2)	1,509	55.3 (1.6)	1,658	59.4 (1.7)	1,376	60.7 (1.7)
30세이상(표준화)[2]	6,435	29.9 (0.7)	5,029	28.6 (0.8)	4,795	28.0 (0.8)	2,595	24.6 (1.1)	5,900	26.3 (0.6)	6,440	26.4 (0.6)	5,464	26.9 (0.7)
연령(세)														
30-39	1,961	12.3 (0.8)	1,527	10.3 (0.9)	1,218	8.8 (1.1)	631	7.5 (1.4)	1,413	9.9 (0.9)	1,429	7.3 (0.9)	1,243	7.2 (0.9)
40-49	1,624	25.2 (1.2)	1,381	20.7 (1.3)	1,343	19.7 (1.5)	558	15.7 (1.9)	1,326	19.3 (1.2)	1,495	18.2 (1.1)	1,161	17.0 (1.3)
50-59	1,258	39.5 (1.5)	881	36.1 (2.0)	911	41.3 (2.1)	494	33.6 (2.8)	1,133	34.2 (1.5)	1,250	35.3 (1.5)	1,165	37.3 (1.9)
60-69	997	47.5 (1.7)	728	57.2 (2.3)	808	53.7 (2.0)	478	45.9 (3.2)	1,075	46.8 (1.8)	1,204	50.5 (1.8)	1,023	55.6 (2.3)
70+	595	58.5 (2.6)	512	58.1 (2.6)	515	55.0 (2.9)	434	60.2 (3.1)	953	56.6 (2.0)	1,062	63.1 (1.9)	872	61.2 (2.1)
거주지역														
동	3,955	27.5 (0.9)	3,761	28.3 (1.0)	3,610	26.6 (1.1)	1,806	24.7 (1.4)	4,206	25.7 (0.9)	4,666	26.7 (0.9)	4,200	27.6 (1.0)
읍면	2,480	33.7 (1.5)	1,268	35.6 (2.2)	1,185	33.8 (1.4)	789	26.6 (3.2)	1,694	33.4 (1.7)	1,774	33.0 (2.1)	1,264	33.1 (2.2)
소득수준[3]														
하	1,518	30.5 (1.5)	1,133	31.8 (1.7)	1,227	30.4 (1.8)	619	28.9 (2.8)	1,408	28.1 (1.5)	1,625	26.2 (1.3)	1,349	29.5 (1.6)
중하	1,650	28.8 (1.5)	1,147	27.5 (1.8)	1,207	27.4 (1.5)	604	24.3 (2.0)	1,414	27.2 (1.4)	1,594	30.3 (1.5)	1,335	28.3 (1.7)
중상	1,612	27.7 (1.4)	1,229	31.5 (1.7)	1,154	27.9 (1.8)	636	21.1 (1.8)	1,439	27.0 (1.3)	1,568	27.0 (1.6)	1,374	29.0 (1.8)
상	1,655	29.0 (1.3)	1,207	27.3 (1.5)	1,168	26.8 (1.6)	613	26.0 (2.1)	1,451	25.5 (1.3)	1,586	28.1 (1.4)	1,335	28.8 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	3,955	30.4 (0.9)	3,761	28.7 (0.9)	3,610	28.4 (1.0)	1,806	25.0 (1.3)	4,206	26.2 (0.8)	4,666	27.0 (0.7)	4,200	27.5 (0.8)
읍면	2,480	29.1 (1.3)	1,268	29.9 (1.8)	1,185	28.3 (1.4)	789	24.7 (2.2)	1,694	26.5 (1.4)	1,774	24.3 (1.0)	1,264	25.4 (1.2)
소득수준(표준화)														
하	1,518	30.3 (1.4)	1,133	30.7 (1.6)	1,227	30.8 (1.7)	619	29.1 (2.3)	1,408	27.8 (1.4)	1,625	25.5 (1.1)	1,349	28.4 (1.3)
중하	1,650	30.9 (1.4)	1,147	27.7 (1.5)	1,207	27.7 (1.3)	604	24.2 (1.6)	1,414	26.3 (1.3)	1,594	28.4 (1.3)	1,335	26.5 (1.3)
중상	1,612	29.7 (1.2)	1,229	30.1 (1.4)	1,154	27.0 (1.6)	636	21.3 (1.6)	1,439	26.5 (1.2)	1,568	25.8 (1.3)	1,374	26.8 (1.4)
상	1,655	29.3 (1.2)	1,207	25.5 (1.2)	1,168	26.8 (1.3)	613	25.3 (1.8)	1,451	24.5 (1.2)	1,586	25.7 (1.1)	1,335	26.2 (1.4)
남자														
30세이상	2,923	31.1 (1.1)	2,184	34.4 (1.4)	2,058	30.9 (1.2)	1,089	26.5 (1.7)	2,469	28.1 (1.1)	2,754	30.7 (1.1)	2,375	30.1 (1.2)
65세이상	392	47.3 (3.2)	326	55.0 (3.2)	365	48.3 (3.6)	297	49.3 (3.3)	578	48.4 (2.5)	690	55.8 (2.5)	613	50.5 (2.7)
30세이상(표준화)	2,923	32.5 (1.1)	2,184	33.2 (1.3)	2,058	31.5 (1.1)	1,089	26.9 (1.6)	2,469	28.1 (1.0)	2,754	30.4 (1.0)	2,375	29.3 (1.1)
연령(세)														
30-39	918	18.6 (1.4)	666	17.6 (1.6)	494	14.1 (1.8)	246	13.3 (2.6)	598	15.2 (1.6)	597	11.5 (1.5)	517	12.6 (1.6)
40-49	772	30.5 (2.0)	619	28.6 (2.2)	599	27.8 (2.2)	247	19.8 (2.8)	578	23.5 (2.1)	643	25.2 (1.8)	530	22.4 (2.0)
50-59	573	42.0 (2.4)	402	40.0 (2.9)	409	44.1 (2.7)	202	36.0 (3.8)	490	35.9 (2.3)	544	40.2 (2.4)	474	41.0 (3.0)
60-69	443	43.8 (2.5)	317	56.8 (3.7)	375	53.9 (2.9)	214	43.4 (3.9)	440	43.0 (2.8)	536	52.1 (2.4)	469	52.5 (2.8)
70+	217	48.8 (4.2)	180	52.5 (4.5)	181	43.9 (5.1)	180	51.9 (3.7)	363	48.4 (3.3)	434	58.5 (2.9)	385	50.1 (3.5)
거주지역														
동	1,819	30.4 (1.3)	1,640	34.0 (1.5)	1,538	30.6 (1.4)	743	26.2 (1.9)	1,762	27.1 (1.3)	1,976	30.7 (1.3)	1,819	30.1 (1.3)
읍면	1,104	33.5 (1.9)	544	36.3 (3.3)	520	31.8 (2.1)	346	27.4 (4.2)	707	32.3 (2.1)	778	30.9 (2.3)	556	30.2 (2.9)

1) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분율, 만30세이상
※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 고혈압 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	685	32.3 (2.1)	489	37.8 (2.5)	533	34.0 (2.5)	265	31.6 (4.3)	587	29.2 (2.1)	707	29.0 (2.0)	592	30.2 (2.4)
중하	755	32.2 (2.1)	500	31.1 (2.5)	513	30.0 (2.0)	247	26.8 (2.9)	588	28.7 (2.1)	675	32.6 (2.1)	582	30.4 (2.3)
중상	758	27.5 (1.9)	548	35.8 (2.8)	486	28.8 (2.7)	267	22.1 (2.6)	612	28.4 (1.9)	663	31.1 (2.3)	591	31.0 (2.5)
상	725	32.7 (1.9)	512	31.8 (2.3)	508	30.6 (2.4)	265	26.2 (2.9)	609	25.6 (2.0)	679	30.0 (1.9)	585	28.4 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	1,819	32.7 (1.4)	1,640	33.5 (1.4)	1,538	32.6 (1.4)	743	27.3 (1.8)	1,762	28.1 (1.1)	1,976	31.8 (1.2)	1,819	30.4 (1.2)
읍면	1,104	31.3 (1.8)	544	32.9 (2.9)	520	29.9 (2.2)	346	26.7 (3.6)	707	28.0 (2.3)	778	25.0 (1.6)	556	26.2 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	685	33.0 (2.1)	489	37.5 (2.5)	533	34.7 (2.3)	265	32.3 (3.8)	587	29.3 (1.9)	707	28.8 (1.8)	592	30.5 (2.2)
중하	755	34.2 (2.1)	500	30.8 (2.1)	513	30.6 (1.9)	247	27.5 (2.7)	588	28.4 (2.0)	675	31.9 (2.0)	582	29.6 (2.1)
중상	758	29.9 (1.9)	548	33.5 (2.3)	486	28.7 (2.5)	267	22.9 (2.5)	612	29.2 (1.8)	663	31.2 (2.0)	591	30.1 (2.3)
상	725	33.2 (1.9)	512	30.2 (2.2)	508	31.8 (2.2)	265	26.8 (2.6)	609	25.8 (1.9)	679	29.6 (1.8)	585	27.2 (2.0)
여자														
30세이상	3,512	27.0 (1.0)	2,845	26.5 (1.2)	2,737	25.4 (1.1)	1,506	23.8 (1.5)	3,431	26.4 (0.9)	3,686	25.4 (1.0)	3,089	27.7 (1.1)
65세이상	612	61.3 (2.2)	519	61.5 (2.6)	539	61.2 (2.3)	406	61.8 (2.9)	931	60.0 (1.9)	968	61.9 (2.0)	763	67.8 (2.2)
30세이상(표준화)	3,512	26.9 (0.8)	2,845	25.4 (1.0)	2,737	23.9 (0.9)	1,506	21.8 (1.2)	3,431	23.9 (0.7)	3,686	22.2 (0.8)	3,089	23.9 (0.7)
연령(세)														
30-39	1,043	6.2 (0.8)	861	5.4 (1.0)	724	3.1 (0.7)	385	1.5 (0.7)	815	4.3 (0.9)	832	2.9 (0.6)	726	1.6 (0.5)
40-49	852	19.6 (1.5)	762	15.2 (1.6)	744	11.2 (1.5)	311	11.4 (2.6)	748	15.0 (1.4)	852	11.0 (1.4)	631	11.6 (1.4)
50-59	685	37.2 (1.9)	479	33.2 (2.6)	502	38.4 (2.9)	292	31.1 (3.5)	643	32.6 (2.1)	706	30.5 (2.0)	691	33.7 (2.2)
60-69	554	50.5 (2.5)	411	57.5 (3.0)	433	53.6 (3.0)	264	48.2 (4.6)	635	50.2 (2.1)	668	49.1 (2.4)	554	58.3 (3.1)
70+	378	63.4 (2.8)	332	61.5 (2.9)	334	61.3 (3.2)	254	65.4 (3.8)	590	61.5 (2.6)	628	65.9 (2.3)	487	68.2 (2.7)
거주지역														
동	2,136	24.8 (1.2)	2,121	24.3 (1.3)	2,072	22.8 (1.2)	1,063	23.3 (1.7)	2,444	24.4 (1.0)	2,690	22.9 (1.2)	2,381	25.2 (1.2)
읍면	1,376	33.8 (1.7)	724	35.2 (2.4)	665	35.7 (2.2)	443	25.8 (4.0)	987	34.3 (2.1)	996	35.1 (2.5)	708	35.8 (2.7)
소득수준														
하	833	28.8 (1.7)	644	27.4 (2.2)	694	26.8 (2.0)	354	26.1 (2.9)	821	27.0 (1.7)	918	23.5 (1.6)	757	28.8 (2.0)
중하	895	25.6 (1.8)	647	24.9 (2.2)	694	25.0 (1.9)	357	22.1 (2.7)	826	25.8 (1.8)	919	28.1 (1.9)	753	26.4 (2.1)
중상	854	27.9 (1.8)	681	28.3 (2.0)	668	27.1 (2.1)	369	20.1 (2.1)	827	25.5 (1.8)	905	23.1 (1.9)	783	27.3 (2.2)
상	930	26.0 (1.7)	695	24.5 (1.9)	660	23.1 (1.9)	348	25.8 (3.1)	842	25.4 (1.7)	907	26.2 (1.7)	750	29.2 (2.4)
거주지역(표준화)														
동	2,136	27.3 (1.1)	2,121	25.4 (1.1)	2,072	23.8 (1.1)	1,063	22.2 (1.4)	2,444	23.7 (0.9)	2,690	22.0 (0.9)	2,381	24.2 (0.8)
읍면	1,376	26.6 (1.3)	724	27.2 (2.1)	665	25.1 (1.7)	443	21.3 (2.5)	987	24.9 (1.3)	996	23.1 (1.3)	708	23.5 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	833	27.2 (1.5)	644	25.4 (1.9)	694	25.7 (1.8)	354	25.5 (2.7)	821	25.8 (1.6)	918	21.9 (1.3)	757	25.7 (1.4)
중하	895	27.2 (1.5)	647	25.4 (1.8)	694	24.4 (1.6)	357	20.9 (2.0)	826	23.8 (1.5)	919	24.9 (1.5)	753	22.9 (1.3)
중상	854	28.6 (1.5)	681	27.4 (1.9)	668	24.5 (1.8)	369	19.5 (1.7)	827	23.1 (1.4)	905	20.2 (1.6)	783	23.5 (1.6)
상	930	25.3 (1.5)	695	22.7 (1.6)	660	21.3 (1.6)	348	22.6 (2.0)	842	22.8 (1.4)	907	21.3 (1.1)	750	24.3 (1.8)

표 3-II-2. 수축기 혈압[1] 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : mmHg)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,723	118.7	0.46	97.5	101.5	107.5	116.5	127.5	137.5	146.5
30세이상	2,416	120.3	0.47	98.5	101.5	108.5	118.5	129.5	140.5	148.5
65세이상	628	128.2	1.06	100.5	104.5	115.5	127.5	139.5	152.5	159.5
연령(세)										
19-29	307	112.2	0.73	96.5	99.5	105.5	111.5	118.5	126.5	130.5
30-39	522	114.7	0.72	96.5	100.5	105.5	112.5	122.5	130.5	135.5
40-49	539	117.7	0.73	96.5	101.5	106.5	116.5	126.5	135.5	140.5
50-59	482	123.2	0.93	98.5	103.5	111.5	122.5	132.5	142.5	151.5
60-69	478	127.6	1.11	101.5	105.5	115.5	126.5	138.5	150.5	155.5
70+	395	128.6	1.33	102.5	106.5	115.5	127.5	139.5	155.5	165.5
여자										
19세이상	3,603	115.0	0.47	90.9	94.9	101.9	110.9	125.9	139.9	149.9
30세이상	3,137	117.9	0.48	91.9	96.9	103.9	114.9	128.9	143.9	152.9
65세이상	789	133.1	0.77	105.9	111.9	120.9	132.9	143.9	154.9	163.9
연령(세)										
19-29	466	102.5	0.53	87.9	89.9	96.9	101.9	107.9	114.9	118.9
30-39	729	104.8	0.49	89.9	91.9	97.9	103.9	109.9	117.9	123.9
40-49	641	113.0	0.70	91.9	95.9	102.9	110.9	119.9	132.9	139.9
50-59	697	121.7	0.92	96.9	101.9	107.9	118.9	132.9	145.9	153.9
60-69	563	129.2	0.95	99.9	107.9	116.9	127.9	140.9	151.9	157.9
70+	507	134.2	0.82	105.9	112.9	122.9	133.9	143.9	155.9	165.9

1) 2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 보정한 값

표 3-II-3. 이완기 혈압[1] 분포 : 성별, 만19세이상, 2010

(단위 : mmHg)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,723	76.8	0.35	61.5	65.5	68.5	76.5	84.5	90.5	95.5
30세이상	2,416	77.8	0.35	61.5	65.5	70.5	76.5	85.5	91.5	96.5
65세이상	628	72.9	0.55	56.5	60.5	66.5	73.5	78.5	86.5	88.5
연령(세)										
19-29	307	73.0	0.71	58.5	61.5	66.5	71.5	78.5	86.5	89.5
30-39	522	76.8	0.58	62.5	66.5	69.5	76.5	83.5	90.5	95.5
40-49	539	79.4	0.60	64.5	66.5	71.5	78.5	86.5	93.5	96.5
50-59	482	80.2	0.67	64.5	67.5	72.5	78.5	86.5	93.5	97.5
60-69	478	76.9	0.71	61.5	65.5	69.5	76.5	83.5	90.5	94.5
70+	395	71.6	0.67	56.5	59.5	66.5	71.5	77.5	85.5	87.5
여자										
19세이상	3,603	72.1	0.29	57.9	59.9	66.9	70.9	77.9	85.9	89.9
30세이상	3,137	73.4	0.27	57.9	60.9	67.9	71.9	78.9	87.9	90.9
65세이상	789	74.2	0.41	57.9	61.9	67.9	72.9	79.9	87.9	90.9
연령(세)										
19-29	466	66.9	0.52	53.9	56.9	61.9	67.9	71.9	77.9	80.9
30-39	729	68.7	0.44	55.9	57.9	62.9	67.9	72.9	78.9	82.9
40-49	641	73.2	0.44	57.9	61.9	67.9	71.9	78.9	87.9	91.9
50-59	697	76.9	0.52	61.9	65.9	68.9	76.9	83.9	89.9	95.9
60-69	563	76.3	0.50	59.9	64.9	68.9	76.9	82.9	88.9	92.9
70+	507	73.6	0.46	57.9	60.9	67.9	72.9	78.9	86.9	90.9

1) 2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 보정한 값

표 3-II-4. 고혈압 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	정상	고혈압전단계	고혈압	N	정상	고혈압전단계	고혈압	N	정상	고혈압전단계	고혈압
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
30세이상	5,464	49.3 (1.1)	21.8 (0.7)	28.9 (0.9)	2,375	42.9 (1.4)	27.0 (1.1)	30.1 (1.2)	3,089	55.3 (1.3)	17.0 (0.8)	27.7 (1.1)
65세이상	1,376	18.8 (1.3)	20.5 (1.3)	60.7 (1.7)	613	26.4 (2.4)	23.1 (2.2)	50.5 (2.7)	763	13.5 (1.6)	18.7 (1.9)	67.8 (2.2)
연령(세)												
30-39	1,243	75.2 (1.4)	17.6 (1.2)	7.2 (0.9)	517	61.0 (2.5)	26.4 (2.2)	12.6 (1.6)	726	90.0 (1.3)	8.5 (1.2)	1.6 (0.5)
40-49	1,161	58.5 (1.8)	24.5 (1.6)	17.0 (1.3)	530	46.7 (2.8)	30.9 (2.7)	22.4 (2.0)	631	70.6 (2.1)	17.9 (1.8)	11.6 (1.4)
50-59	1,165	38.4 (2.0)	24.3 (1.5)	37.3 (1.9)	474	32.1 (2.7)	26.9 (2.6)	41.0 (3.0)	691	44.5 (2.4)	21.8 (1.8)	33.7 (2.2)
60-69	1,023	22.6 (1.7)	21.8 (1.7)	55.6 (2.3)	469	23.9 (2.2)	23.6 (2.4)	52.5 (2.8)	554	21.5 (2.4)	20.2 (2.0)	58.3 (3.1)
70+	872	18.0 (1.5)	20.8 (1.8)	61.2 (2.1)	385	28.4 (3.2)	21.5 (2.6)	50.1 (3.5)	487	11.5 (1.7)	20.3 (2.6)	68.2 (2.7)
거주지역												
동	4,200	51.1 (1.1)	21.3 (0.8)	27.6 (1.0)	1,819	43.1 (1.6)	26.8 (1.3)	30.1 (1.3)	2,381	58.8 (1.4)	16.0 (0.9)	25.2 (1.2)
읍면	1,264	43.2 (2.2)	23.6 (1.1)	33.1 (2.2)	556	42.2 (3.2)	27.5 (1.9)	30.2 (2.9)	708	44.2 (2.5)	20.0 (1.5)	35.8 (2.7)
소득수준[2]												
하	1,349	48.8 (1.8)	21.7 (1.4)	29.5 (1.6)	592	44.5 (2.6)	25.3 (2.1)	30.2 (2.4)	757	52.9 (2.5)	18.3 (1.8)	28.8 (2.0)
중하	1,335	49.6 (2.1)	22.0 (1.4)	28.3 (1.7)	582	42.9 (2.7)	26.7 (2.3)	30.4 (2.3)	753	56.1 (2.6)	17.6 (1.6)	26.4 (2.1)
중상	1,374	48.8 (1.9)	22.2 (1.4)	29.0 (1.8)	591	41.9 (2.6)	27.1 (2.3)	31.0 (2.5)	783	55.0 (2.4)	17.8 (1.5)	27.3 (2.2)
상	1,335	50.1 (1.7)	21.1 (1.3)	28.8 (1.8)	585	43.1 (2.6)	28.6 (2.2)	28.4 (2.2)	750	57.1 (2.4)	13.7 (1.4)	29.2 (2.4)
거주지역(표준화)[3]												
동	4,200	51.4 (1.0)	21.2 (0.8)	27.5 (0.8)	1,819	42.9 (1.5)	26.7 (1.3)	30.4 (1.2)	2,381	60.2 (1.1)	15.7 (0.9)	24.2 (0.8)
읍면	1,264	51.6 (1.8)	23.0 (1.4)	25.4 (1.2)	556	47.3 (3.1)	26.5 (2.2)	26.2 (2.2)	708	57.3 (2.1)	19.2 (1.8)	23.5 (1.6)
소득수준(표준화)												
하	1,349	49.8 (1.6)	21.8 (1.4)	28.4 (1.3)	592	43.9 (2.5)	25.6 (2.1)	30.5 (2.2)	757	56.4 (2.1)	17.9 (1.8)	25.7 (1.4)
중하	1,335	52.3 (1.6)	21.2 (1.4)	26.5 (1.3)	582	44.6 (2.3)	25.8 (2.2)	29.6 (2.1)	753	60.7 (1.8)	16.3 (1.5)	22.9 (1.3)
중상	1,374	51.0 (1.9)	22.2 (1.5)	26.8 (1.4)	591	42.5 (2.7)	27.4 (2.3)	30.1 (2.3)	783	59.3 (2.0)	17.1 (1.5)	23.5 (1.6)
상	1,335	52.7 (1.6)	21.1 (1.4)	26.2 (1.4)	585	44.1 (2.6)	28.8 (2.3)	27.2 (2.0)	750	62.6 (1.8)	13.1 (1.4)	24.3 (1.8)

1) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분율, 만30세이상
고혈압 전단계 : 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 분율
※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 보정한 값으로 산출(13p 참고)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-II-5. 고혈압[1] 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
인지율[2]						
30세이상	5,566	67.9 (0.9)	2,530	59.7 (1.3)	3,036	76.7 (1.0)
65세이상	2,636	81.5 (1.0)	981	77.4 (1.7)	1,655	83.7 (1.1)
연령(세)						
30-39	277	26.4 (2.8)	213	25.4 (3.3)	64	31.1 (6.5)
40-49	676	45.7 (2.1)	406	41.4 (2.7)	270	54.2 (3.4)
50-59	1,215	71.3 (1.7)	576	66.9 (2.4)	639	76.6 (1.9)
60-69	1,664	82.3 (1.1)	699	78.5 (1.9)	965	85.3 (1.3)
70+	1,734	80.4 (1.1)	636	76.7 (2.0)	1,098	82.3 (1.3)
치료율[3]						
30세이상	5,566	61.9 (0.9)	2,530	52.6 (1.3)	3,036	71.9 (1.0)
65세이상	2,636	77.7 (1.0)	981	72.9 (1.8)	1,655	80.4 (1.1)
연령(세)						
30-39	277	15.7 (2.3)	213	14.4 (2.6)	64	21.7 (5.5)
40-49	676	37.5 (2.1)	406	31.4 (2.6)	270	49.3 (3.4)
50-59	1,215	64.1 (1.7)	576	59.9 (2.5)	639	69.1 (2.0)
60-69	1,664	78.3 (1.3)	699	74.5 (2.1)	965	81.5 (1.5)
70+	1,734	77.2 (1.2)	636	72.8 (2.1)	1,098	79.4 (1.4)
조절률(유병자 기준)[4]						
30세이상	5,566	43.6 (0.9)	2,530	38.2 (1.3)	3,036	49.4 (1.2)
65세이상	2,636	52.4 (1.3)	981	50.4 (2.1)	1,655	53.6 (1.4)
연령(세)						
30-39	277	11.0 (2.0)	213	10.8 (2.3)	64	11.7 (4.5)
40-49	676	28.1 (2.0)	406	24.3 (2.4)	270	35.6 (3.3)
50-59	1,215	46.7 (1.7)	576	45.0 (2.5)	639	48.8 (2.3)
60-69	1,664	55.7 (1.5)	699	53.1 (2.3)	965	57.8 (1.9)
70+	1,734	50.9 (1.5)	636	49.1 (2.4)	1,098	51.8 (1.7)
조절률(치료자 기준)[5]						
30세이상	3,729	69.7 (1.0)	1,501	71.8 (1.5)	2,228	68.1 (1.2)
65세이상	2,038	66.8 (1.3)	724	68.4 (2.2)	1,314	65.9 (1.5)
연령(세)						
30-39	45	69.8 (7.5)	30	74.9 (8.8)	15	- -[6]
40-49	274	73.1 (3.1)	129	74.0 (4.2)	145	72.1 (4.5)
50-59	780	72.2 (1.9)	350	74.6 (2.5)	430	69.7 (2.6)
60-69	1,300	70.7 (1.5)	519	71.2 (2.4)	781	70.3 (1.9)
70+	1,330	65.2 (1.5)	473	66.4 (2.8)	857	64.6 (1.9)

1) 2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)
2) 고혈압 인지율 : 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율
3) 고혈압 치료율 : 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율
4) 고혈압 조절률(유병자 기준) : 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율
5) 고혈압 조절률(치료자 기준) : 고혈압 치료제 복용자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율
6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 3-III-1. 당뇨병 유병률[1] 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
30세이상	5,632	11.6 (0.6)	4,165	8.9 (0.5)	4,599	9.1 (0.5)	2,452	9.7 (0.8)	5,504	10.0 (0.5)	5,975	10.0 (0.5)	5,020	10.1 (0.5)
65세이상	912	18.1 (1.4)	693	16.6 (1.5)	836	18.2 (1.5)	656	18.3 (1.6)	1,377	19.7 (1.2)	1,463	22.7 (1.5)	1,158	22.7 (1.6)
30세이상(표준화)[2]	5,632	11.6 (0.5)	4,165	8.6 (0.5)	4,599	9.1 (0.5)	2,452	9.6 (0.7)	5,504	9.7 (0.4)	5,975	9.6 (0.5)	5,020	9.7 (0.5)
연령(세)														
30-39	1,666	5.8 (0.6)	1,259	4.9 (0.9)	1,186	1.4 (0.4)	595	4.2 (1.0)	1,314	2.1 (0.4)	1,337	2.5 (0.5)	1,170	2.8 (0.5)
40-49	1,403	8.1 (0.8)	1,137	5.9 (0.7)	1,300	7.4 (0.9)	527	5.7 (1.2)	1,253	7.6 (0.9)	1,423	5.8 (0.7)	1,093	6.6 (1.0)
50-59	1,123	18.4 (1.5)	738	10.2 (1.3)	875	14.0 (1.3)	472	13.4 (2.0)	1,076	12.6 (1.1)	1,183	12.3 (1.1)	1,109	13.1 (1.2)
60-69	897	18.9 (1.8)	624	16.1 (1.6)	768	18.1 (1.4)	452	19.7 (1.9)	1,015	21.1 (1.5)	1,126	22.0 (1.4)	949	17.6 (1.3)
70+	543	18.2 (1.9)	407	15.1 (1.9)	470	17.9 (2.2)	406	17.5 (1.9)	846	19.2 (1.7)	906	21.8 (1.7)	699	23.4 (2.0)
거주지역														
동	3,349	11.7 (0.7)	3,075	8.4 (0.6)	3,486	8.8 (0.6)	1,717	10.2 (1.0)	3,922	9.9 (0.5)	4,343	9.7 (0.6)	3,896	9.9 (0.6)
읍면	2,283	11.2 (0.8)	1,090	10.5 (0.9)	1,113	10.1 (1.1)	735	8.1 (1.1)	1,582	10.3 (0.8)	1,632	11.4 (1.0)	1,124	10.8 (1.2)
소득수준[3]														
하	1,354	12.9 (1.2)	957	11.0 (1.6)	1,168	8.2 (0.9)	573	10.7 (1.4)	1,294	12.7 (1.1)	1,483	10.6 (1.0)	1,217	10.9 (1.0)
중하	1,465	10.1 (0.9)	943	7.6 (0.9)	1,154	9.4 (1.0)	570	9.6 (1.5)	1,321	10.2 (0.9)	1,480	11.0 (0.9)	1,224	11.6 (1.1)
중상	1,400	11.4 (1.0)	1,017	8.9 (1.1)	1,112	9.3 (0.9)	607	8.9 (1.6)	1,348	7.9 (0.8)	1,471	8.7 (0.8)	1,266	8.3 (0.9)
상	1,413	12.0 (1.0)	1,004	8.6 (1.0)	1,128	9.5 (1.1)	590	9.2 (1.3)	1,371	8.7 (0.8)	1,489	9.4 (0.9)	1,251	9.6 (1.1)
거주지역(표준화)														
동	3,349	12.5 (0.7)	3,075	8.5 (0.6)	3,486	9.5 (0.6)	1,717	10.2 (0.9)	3,922	10.3 (0.5)	4,343	10.1 (0.5)	3,896	10.2 (0.5)
읍면	2,283	10.3 (0.8)	1,090	9.5 (1.0)	1,113	8.1 (0.8)	735	7.5 (1.0)	1,582	8.2 (0.8)	1,632	8.7 (0.7)	1,124	9.1 (1.0)
소득수준(표준화)														
하	1,354	12.5 (1.1)	957	10.5 (1.6)	1,168	8.4 (0.9)	573	10.7 (1.4)	1,294	12.5 (1.1)	1,483	10.3 (0.9)	1,217	10.8 (1.0)
중하	1,465	10.6 (0.9)	943	7.5 (0.8)	1,154	9.6 (1.0)	570	9.7 (1.4)	1,321	9.7 (0.8)	1,480	10.5 (0.8)	1,224	11.0 (1.0)
중상	1,400	11.7 (1.0)	1,017	8.6 (1.0)	1,112	9.1 (0.9)	607	8.7 (1.4)	1,348	7.8 (0.8)	1,471	8.6 (0.8)	1,266	7.8 (0.8)
상	1,413	11.9 (1.0)	1,004	8.3 (0.9)	1,128	9.6 (1.0)	590	9.2 (1.3)	1,371	8.4 (0.8)	1,489	8.8 (0.7)	1,251	8.9 (0.9)
남자														
30세이상	2,518	13.3 (0.8)	1,806	9.8 (0.8)	1,968	10.2 (0.7)	1,022	11.7 (1.2)	2,313	10.8 (0.7)	2,578	10.9 (0.7)	2,194	11.3 (0.8)
65세이상	349	18.8 (2.8)	270	15.1 (2.4)	333	16.6 (2.2)	274	17.3 (2.5)	542	17.4 (1.8)	620	22.7 (1.8)	528	21.8 (2.0)
30세이상(표준화)	2,518	13.5 (0.8)	1,806	9.5 (0.8)	1,968	10.5 (0.7)	1,022	11.8 (1.1)	2,313	10.6 (0.6)	2,578	10.7 (0.6)	2,194	11.0 (0.8)
연령(세)														
30-39	759	7.9 (1.0)	558	5.8 (1.4)	481	1.7 (0.7)	233	6.7 (2.0)	551	2.5 (0.7)	564	2.8 (0.8)	484	3.3 (0.9)
40-49	661	9.8 (1.2)	496	9.9 (1.4)	582	9.3 (1.4)	234	6.9 (1.8)	550	10.2 (1.6)	608	6.9 (1.1)	501	8.4 (1.6)
50-59	506	21.9 (2.2)	333	9.6 (1.7)	391	18.9 (1.9)	192	16.8 (3.2)	461	15.2 (1.8)	522	15.7 (1.6)	452	17.7 (1.7)
60-69	396	19.4 (2.5)	276	15.3 (2.5)	353	17.9 (2.1)	196	26.1 (3.7)	416	21.2 (2.3)	504	25.2 (2.2)	438	16.0 (1.9)
70+	196	18.4 (3.4)	143	12.0 (2.6)	161	16.7 (3.2)	167	14.4 (2.5)	335	15.1 (2.3)	380	18.9 (2.2)	319	24.5 (2.8)
거주지역														
동	1,507	13.5 (1.0)	1,334	9.1 (0.9)	1,487	9.7 (0.8)	704	12.4 (1.5)	1,649	10.7 (0.8)	1,857	10.6 (0.8)	1,687	11.3 (0.9)
읍면	1,011	12.8 (1.3)	472	12.0 (1.5)	481	12.2 (1.4)	318	9.2 (1.5)	664	11.1 (1.1)	721	12.1 (1.3)	507	11.5 (1.8)

1) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당 강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 당뇨병 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	611	14.7 (1.8)	408	11.9 (2.4)	503	10.0 (1.4)	242	9.8 (2.1)	536	14.9 (1.9)	652	13.1 (1.6)	535	13.5 (1.6)
중하	654	13.3 (1.6)	410	10.1 (1.7)	488	10.3 (1.5)	233	10.6 (2.6)	549	9.7 (1.4)	633	11.8 (1.4)	539	12.0 (1.7)
중상	644	12.4 (1.4)	449	8.2 (1.4)	469	8.9 (1.4)	254	13.4 (2.4)	575	8.4 (1.4)	623	9.3 (1.2)	545	8.4 (1.3)
상	609	13.1 (1.6)	434	9.8 (1.5)	490	11.5 (1.5)	253	12.4 (2.3)	585	10.5 (1.4)	646	8.8 (1.2)	551	10.7 (1.6)
거주지역(표준화)														
동	1,507	14.4 (1.1)	1,334	9.0 (0.9)	1,487	10.2 (0.9)	704	12.5 (1.3)	1,649	11.1 (0.8)	1,857	11.2 (0.7)	1,687	11.7 (0.9)
읍면	1,011	12.6 (1.4)	472	11.6 (1.5)	481	10.4 (1.1)	318	8.9 (1.4)	664	8.9 (0.9)	721	9.8 (1.1)	507	10.0 (1.7)
소득수준(표준화)														
하	611	14.6 (1.8)	408	11.7 (2.4)	503	10.3 (1.3)	242	9.8 (1.9)	536	14.5 (1.7)	652	12.7 (1.5)	535	13.3 (1.5)
중하	654	14.1 (1.6)	410	10.0 (1.6)	488	10.3 (1.5)	233	11.4 (2.5)	549	9.5 (1.3)	633	11.7 (1.2)	539	11.3 (1.5)
중상	644	12.8 (1.5)	449	8.2 (1.3)	469	9.2 (1.4)	254	13.1 (2.2)	575	8.8 (1.3)	623	9.5 (1.2)	545	8.2 (1.3)
상	609	13.1 (1.6)	434	9.4 (1.5)	490	12.3 (1.6)	253	12.7 (2.2)	585	10.3 (1.3)	646	8.5 (1.0)	551	10.4 (1.5)
여자														
30세이상	3,114	10.0 (0.7)	2,359	8.2 (0.6)	2,631	8.0 (0.6)	1,430	7.8 (0.8)	3,191	9.3 (0.6)	3,397	9.2 (0.6)	2,826	9.0 (0.7)
65세이상	563	17.7 (1.7)	423	17.7 (2.0)	503	19.2 (2.1)	382	18.9 (2.7)	835	21.3 (1.8)	843	22.7 (1.9)	630	23.3 (2.1)
30세이상(표준화)	3,114	9.8 (0.6)	2,359	7.9 (0.6)	2,631	7.7 (0.6)	1,430	7.3 (0.8)	3,191	8.5 (0.6)	3,397	8.4 (0.5)	2,826	8.3 (0.6)
연령(세)														
30-39	907	3.8 (0.7)	701	4.3 (1.0)	705	1.2 (0.5)	362	1.5 (0.6)	763	1.7 (0.5)	773	2.3 (0.6)	686	2.3 (0.7)
40-49	742	6.2 (1.1)	641	3.3 (0.7)	718	5.3 (1.1)	293	4.4 (1.5)	703	4.9 (0.9)	815	4.7 (0.8)	592	4.8 (1.2)
50-59	617	15.1 (1.7)	405	10.6 (2.1)	484	9.1 (1.5)	280	9.9 (2.1)	615	9.9 (1.4)	661	8.9 (1.2)	657	8.6 (1.4)
60-69	501	18.4 (2.2)	348	16.7 (2.2)	415	18.3 (2.2)	256	14.5 (3.0)	599	21.1 (1.9)	622	19.2 (1.6)	511	19.1 (2.2)
70+	347	18.1 (2.2)	264	17.0 (2.5)	309	18.5 (2.8)	239	19.3 (2.9)	511	21.9 (2.3)	526	23.8 (2.4)	380	22.7 (2.4)
거주지역														
동	1,842	10.1 (0.8)	1,741	7.9 (0.7)	1,999	8.0 (0.7)	1,013	8.1 (1.0)	2,273	9.2 (0.7)	2,486	8.8 (0.7)	2,209	8.6 (0.8)
읍면	1,272	9.9 (0.9)	618	9.4 (1.3)	632	8.1 (1.4)	417	6.9 (1.3)	918	9.7 (1.3)	911	10.8 (1.3)	617	10.1 (1.7)
소득수준														
하	743	11.3 (1.3)	549	10.3 (1.6)	665	6.4 (1.1)	331	11.6 (2.0)	758	10.6 (1.3)	831	8.1 (1.0)	682	8.5 (1.3)
중하	811	7.3 (1.0)	533	5.8 (0.9)	666	8.5 (1.3)	337	8.6 (1.7)	772	10.6 (1.2)	847	10.3 (1.2)	685	11.2 (1.5)
중상	756	10.5 (1.4)	568	9.4 (1.6)	643	9.8 (1.4)	353	4.4 (1.5)	773	7.3 (1.1)	848	8.2 (1.0)	721	8.2 (1.2)
상	804	11.2 (1.3)	570	7.8 (1.2)	638	7.6 (1.2)	337	5.9 (1.4)	786	6.9 (0.9)	843	10.0 (1.3)	700	8.6 (1.3)
거주지역(표준화)														
동	1,842	10.7 (0.8)	1,741	8.2 (0.7)	1,999	8.5 (0.7)	1,013	7.8 (0.9)	2,273	9.1 (0.6)	2,486	8.8 (0.6)	2,209	8.7 (0.7)
읍면	1,272	7.9 (0.8)	618	7.7 (1.2)	632	6.2 (1.2)	417	5.7 (1.1)	918	7.5 (1.1)	911	7.4 (0.9)	617	8.1 (1.7)
소득수준(표준화)														
하	743	10.6 (1.3)	549	9.4 (1.5)	665	6.3 (1.1)	331	11.3 (2.0)	758	10.5 (1.2)	831	7.9 (1.0)	682	8.3 (1.3)
중하	811	7.5 (1.0)	533	5.7 (0.9)	666	8.5 (1.3)	337	8.4 (1.7)	772	9.7 (1.1)	847	9.3 (1.0)	685	10.5 (1.3)
중상	756	10.5 (1.3)	568	9.0 (1.4)	643	8.8 (1.2)	353	4.2 (1.4)	773	6.6 (0.9)	848	7.6 (0.9)	721	7.4 (1.0)
상	804	10.8 (1.2)	570	7.6 (1.2)	638	7.2 (1.1)	337	5.4 (1.2)	786	6.3 (0.8)	843	8.8 (1.0)	700	7.1 (1.0)

표 3-III-2. 혈당 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : ㎎/dL)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,965	97.2	0.55	80.0	82.0	87.0	92.0	100.0	112.0	129.0
19세이상	2,502	98.5	0.62	80.0	83.0	87.0	93.0	101.0	115.0	134.0
30세이상	2,224	101.0	0.70	82.0	84.0	89.0	95.0	103.0	118.0	139.0
65세이상	535	104.2	1.21	82.0	85.0	90.0	97.0	110.0	130.0	145.0
연령(세)										
10-18	463	89.1	0.41	78.0	81.0	85.0	89.0	93.0	98.0	100.0
19-29	278	88.5	0.69	78.0	80.0	83.0	87.0	92.0	97.0	100.0
30-39	487	94.5	0.95	80.0	83.0	86.0	91.0	97.0	105.0	110.0
40-49	511	102.0	1.92	81.0	84.0	90.0	95.0	103.0	117.0	136.0
50-59	459	105.2	1.29	84.0	86.0	91.0	97.0	110.0	133.0	156.0
60-69	444	103.9	1.18	83.0	87.0	92.0	98.0	108.0	122.0	142.0
70+	323	103.5	1.63	82.0	85.0	90.0	96.0	109.0	134.0	147.0
여자										
10세이상	3,672	93.5	0.35	79.0	81.0	85.0	90.0	96.0	106.0	121.0
19세이상	3,285	94.1	0.39	79.0	81.0	85.0	90.0	97.0	108.0	123.0
30세이상	2,847	96.0	0.45	80.0	82.0	86.0	91.0	99.0	111.0	126.0
65세이상	640	104.0	1.35	82.0	85.0	90.0	98.0	108.0	129.0	144.0
연령(세)										
10-18	387	88.5	0.37	78.0	80.0	84.0	88.0	92.0	96.0	99.0
19-29	438	86.6	0.44	76.0	78.0	82.0	86.0	90.0	95.0	98.0
30-39	687	89.8	0.77	78.0	80.0	84.0	88.0	93.0	98.0	102.0
40-49	596	93.5	0.78	80.0	82.0	86.0	90.0	96.0	104.0	121.0
50-59	662	98.5	1.05	82.0	84.0	88.0	93.0	102.0	117.0	129.0
60-69	516	101.5	1.01	82.0	84.0	88.0	96.0	106.0	124.0	142.0
70+	386	104.2	1.95	80.0	85.0	90.0	97.0	108.0	126.0	145.0

표 3-III-3. 인슐린 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : μIU/mL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,976	10.8	0.14	5.5	6.3	7.7	9.7	12.5	15.6	19.3
19세이상	2,508	10.4	0.14	5.4	6.1	7.6	9.4	11.9	15.2	18.2
30세이상	2,230	10.3	0.13	5.4	6.1	7.5	9.3	11.9	15.2	18.4
65세이상	537	9.9	0.24	5.4	5.9	7.2	8.9	11.2	14.3	16.2
연령(세)										
10-18	468	13.3	0.37	6.8	7.5	9.4	12.4	14.8	20.1	25.5
19-29	278	10.8	0.45	6.0	6.5	8.0	9.9	12.0	15.4	18.0
30-39	488	10.9	0.28	5.6	6.5	7.7	9.9	12.6	15.5	20.6
40-49	511	10.0	0.22	5.2	5.7	7.3	9.3	11.6	15.0	17.2
50-59	460	10.4	0.27	5.4	6.2	7.5	9.3	12.2	15.2	18.8
60-69	448	9.7	0.24	5.3	5.9	7.2	8.9	11.2	14.1	15.9
70+	323	9.9	0.27	5.5	6.1	7.2	9.0	11.4	14.4	18.2
여자										
10세이상	3,685	10.8	0.11	5.6	6.4	7.9	9.7	12.5	15.5	19.4
19세이상	3,292	10.4	0.12	5.6	6.3	7.7	9.4	11.9	14.9	17.3
30세이상	2,854	10.3	0.12	5.5	6.3	7.7	9.4	11.9	14.9	16.8
65세이상	641	11.3	0.27	5.9	6.7	8.1	10.1	13.0	16.0	20.5
연령(세)										
10-18	393	13.8	0.41	7.1	8.0	9.9	12.7	15.6	21.6	25.5
19-29	438	10.7	0.28	5.9	6.5	7.9	9.6	12.0	15.0	19.5
30-39	687	9.8	0.17	5.8	6.4	7.7	9.2	11.5	14.0	15.0
40-49	598	10.2	0.25	5.4	6.2	7.7	9.4	11.8	15.3	16.5
50-59	665	10.1	0.24	5.4	6.0	7.4	9.2	12.1	14.6	16.4
60-69	517	11.0	0.29	5.6	6.5	8.0	9.7	12.9	16.0	20.8
70+	387	11.2	0.33	5.9	6.7	8.1	9.9	12.7	15.7	19.8

표 3-III-4. 당뇨병 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	정상	공복혈당장애	당뇨병	N	정상	공복혈당장애	당뇨병	N	정상	공복혈당장애	당뇨병
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
30세이상	5,020	70.0 (0.9)	19.9 (0.7)	10.1 (0.5)	2,194	64.5 (1.3)	24.2 (1.2)	11.3 (0.8)	2,826	75.3 (1.0)	15.8 (0.8)	9.0 (0.7)
65세이상	1,158	52.6 (2.1)	24.7 (1.5)	22.7 (1.6)	528	53.5 (2.5)	24.7 (2.1)	21.8 (2.0)	630	52.0 (2.9)	24.6 (2.1)	23.3 (2.1)
연령(세)												
30-39	1,170	86.2 (1.2)	11.0 (1.0)	2.8 (0.5)	484	81.2 (2.1)	15.5 (1.9)	3.3 (0.9)	686	91.4 (1.1)	6.3 (1.0)	2.3 (0.7)
40-49	1,093	72.9 (1.8)	20.5 (1.7)	6.6 (1.0)	501	63.7 (2.9)	27.9 (2.7)	8.4 (1.6)	592	82.5 (1.8)	12.7 (1.5)	4.8 (1.2)
50-59	1,109	62.1 (1.8)	24.8 (1.5)	13.1 (1.2)	452	55.4 (2.6)	26.9 (2.5)	17.7 (1.7)	657	68.7 (2.2)	22.7 (1.9)	8.6 (1.4)
60-69	949	56.8 (1.9)	25.5 (1.7)	17.6 (1.3)	438	53.0 (2.9)	31.0 (2.6)	16.0 (1.9)	511	60.3 (2.7)	20.6 (2.5)	19.1 (2.2)
70+	699	52.6 (2.7)	24.0 (1.9)	23.4 (2.0)	319	53.0 (3.6)	22.4 (2.9)	24.5 (2.8)	380	52.2 (3.6)	25.0 (2.6)	22.7 (2.4)
거주지역												
동	3,896	70.4 (1.1)	19.7 (0.9)	9.9 (0.6)	1,687	64.6 (1.5)	24.2 (1.5)	11.3 (0.9)	2,209	75.9 (1.2)	15.4 (0.9)	8.6 (0.8)
읍면	1,124	68.7 (1.6)	20.6 (1.4)	10.8 (1.2)	507	64.2 (2.5)	24.3 (1.9)	11.5 (1.8)	617	73.1 (2.4)	16.8 (1.8)	10.1 (1.7)
소득수준[2]												
하	1,217	69.5 (1.7)	19.5 (1.6)	10.9 (1.0)	535	66.5 (2.4)	20.0 (2.3)	13.5 (1.6)	682	72.5 (2.1)	19.1 (1.9)	8.5 (1.3)
중하	1,224	68.9 (1.9)	19.5 (1.5)	11.6 (1.1)	539	64.0 (2.6)	24.0 (2.3)	12.0 (1.7)	685	73.8 (2.1)	15.1 (1.6)	11.2 (1.5)
중상	1,266	72.1 (1.5)	19.5 (1.3)	8.3 (0.9)	545	67.7 (2.4)	23.8 (2.2)	8.4 (1.3)	721	76.1 (1.9)	15.6 (1.6)	8.2 (1.2)
상	1,251	69.5 (1.9)	20.9 (1.6)	9.6 (1.1)	551	60.1 (2.8)	29.2 (2.6)	10.7 (1.6)	700	79.0 (1.9)	12.4 (1.5)	8.6 (1.3)
거주지역(표준화)[3]												
동	3,896	70.1 (1.0)	19.7 (0.9)	10.2 (0.5)	1,687	64.0 (1.4)	24.3 (1.5)	11.7 (0.9)	2,209	76.2 (1.0)	15.1 (0.8)	8.7 (0.7)
읍면	1,124	72.2 (2.0)	18.7 (1.7)	9.1 (1.0)	507	67.6 (2.9)	22.3 (2.1)	10.0 (1.7)	617	77.3 (2.4)	14.6 (2.0)	8.1 (1.7)
소득수준(표준화)												
하	1,217	70.0 (1.7)	19.2 (1.6)	10.8 (1.0)	535	66.5 (2.3)	20.2 (2.2)	13.3 (1.5)	682	73.6 (2.0)	18.1 (1.8)	8.3 (1.3)
중하	1,224	70.3 (1.6)	18.7 (1.4)	11.0 (1.0)	539	65.2 (2.4)	23.5 (2.2)	11.3 (1.5)	685	75.6 (1.7)	13.9 (1.4)	10.5 (1.3)
중상	1,266	72.9 (1.5)	19.3 (1.3)	7.8 (0.8)	545	67.7 (2.3)	24.2 (2.1)	8.2 (1.3)	721	77.6 (1.8)	15.1 (1.6)	7.4 (1.0)
상	1,251	70.7 (1.8)	20.4 (1.6)	8.9 (0.9)	551	60.6 (2.9)	28.9 (2.7)	10.4 (1.5)	700	81.6 (1.5)	11.3 (1.3)	7.1 (1.0)

1) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당 강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상
공복혈당장애 : 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-III-5. 당뇨병 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
인지율[1]						
30세이상	1,838	73.0 (1.3)	906	69.0 (2.0)	932	77.6 (1.7)
65세이상	836	80.5 (1.7)	355	76.1 (2.9)	481	83.4 (2.2)
연령(세)						
30-39	90	48.1 (5.9)	43	30.5 (7.5)	47	73.4 (6.5)
40-49	228	56.1 (3.8)	134	52.7 (5.0)	94	62.5 (5.6)
50-59	406	74.7 (2.6)	236	75.8 (3.1)	170	72.7 (4.4)
60-69	616	85.7 (1.7)	294	85.5 (2.4)	322	85.9 (2.4)
70+	498	77.7 (2.3)	199	72.3 (4.0)	299	80.8 (2.9)
치료율[2]						
30세이상	1,838	59.1 (1.4)	906	54.9 (2.0)	932	64.0 (1.9)
65세이상	836	70.3 (1.9)	355	65.6 (3.0)	481	73.4 (2.6)
연령(세)						
30-39	90	26.5 (5.2)	43	20.8 (6.7)	47	34.7 (8.4)
40-49	228	39.9 (3.4)	134	37.0 (4.3)	94	45.4 (5.7)
50-59	406	59.5 (2.8)	236	59.5 (3.3)	170	59.5 (4.6)
60-69	616	74.3 (2.0)	294	72.3 (3.1)	322	76.1 (2.9)
70+	498	67.0 (2.4)	199	61.7 (4.1)	299	70.0 (3.2)
조절률(유병자 기준)[3]						
30세이상	1,735	28.1 (1.4)	872	30.1 (2.0)	863	25.8 (1.9)
65세이상	791	34.5 (2.0)	339	37.2 (3.2)	452	32.7 (2.7)
연령(세)						
30-39	75	26.1 (5.2)	41	24.7 (6.8)	34	28.9 (8.8)
40-49	217	22.4 (3.1)	132	25.9 (4.0)	85	15.0 (4.0)
50-59	390	25.7 (2.6)	230	29.0 (3.4)	160	19.6 (3.5)
60-69	579	29.5 (2.4)	279	31.2 (3.3)	300	27.8 (3.3)
70+	474	35.4 (2.5)	190	40.4 (4.4)	284	32.5 (3.1)
조절률(치료자 기준)[4]						
30세이상	1,135	24.8 (1.6)	535	27.5 (2.3)	600	22.0 (2.1)
65세이상	584	30.8 (2.4)	238	33.7 (3.5)	346	29.1 (3.1)
연령(세)						
30-39	23	16.9 (8.5)	9	- -[5]	14	- -
40-49	97	17.2 (4.3)	55	24.0 (6.4)	42	6.8 (3.4)
50-59	231	21.0 (3.1)	135	24.1 (4.2)	96	15.2 (4.1)
60-69	439	27.0 (2.7)	205	30.4 (3.9)	234	23.9 (3.8)
70+	345	31.1 (3.0)	131	33.9 (4.8)	214	29.8 (3.7)

1) 당뇨병 인지율 : 당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율
2) 당뇨병 치료율 : 당뇨병 유병자 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사 투여 분율
3) 당뇨병 조절률(유병자 기준) : 당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율
4) 당뇨병 조절률(치료자 기준) : 당뇨병 치료자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율
5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 3-IV-1. 고콜레스테롤혈증 유병률[1] 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
30세이상	5,643	9.9(0.5)	4,234	9.5(0.5)	4,627	8.0(0.5)	2,388	10.8(0.8)	5,498	11.1(0.5)	5,984	11.8(0.5)	5,032	14.1(0.6)
65세이상	913	13.5(1.3)	711	11.6(1.4)	847	11.0(1.2)	639	16.0(1.7)	1,376	17.3(1.3)	1,469	15.4(1.1)	1,161	20.5(1.6)
30세이상(표준화)[2]	5,643	10.0(0.5)	4,234	9.1(0.5)	4,627	8.0(0.4)	2,388	10.7(0.7)	5,498	10.9(0.5)	5,984	11.5(0.5)	5,032	13.5(0.6)
연령(세)														
30-39	1,670	4.7(0.5)	1,260	5.4(0.7)	1,186	3.9(0.7)	584	5.5(1.1)	1,316	5.9(0.7)	1,336	6.3(0.7)	1,171	6.1(0.8)
40-49	1,407	8.5(0.9)	1,150	7.5(0.9)	1,307	7.1(0.9)	510	8.4(1.3)	1,255	8.5(0.9)	1,424	9.4(0.9)	1,096	10.4(1.1)
50-59	1,123	15.9(1.2)	758	11.8(1.1)	881	11.5(1.2)	458	15.0(2.2)	1,068	15.2(1.2)	1,186	17.4(1.3)	1,112	21.0(1.5)
60-69	900	14.7(1.4)	648	16.8(1.8)	775	13.5(1.4)	440	18.7(2.4)	1,013	18.2(1.4)	1,128	18.0(1.3)	952	21.7(1.5)
70+	543	13.4(1.6)	418	10.3(1.7)	478	9.7(1.6)	396	15.2(2.1)	846	15.6(1.6)	910	14.0(1.4)	701	20.8(2.1)
거주지역														
동	3,357	9.4(0.6)	3,118	9.8(0.6)	3,504	7.9(0.5)	1,670	11.7(1.0)	3,916	11.3(0.6)	4,347	12.0(0.6)	3,901	14.4(0.7)
읍면	2,286	11.4(1.0)	1,116	8.4(0.8)	1,123	8.6(1.1)	718	7.7(0.9)	1,582	10.3(1.1)	1,637	11.1(0.8)	1,131	13.2(1.0)
소득수준[3]														
하	1,355	10.7(1.0)	982	9.6(1.0)	1,180	8.9(0.9)	554	10.0(1.7)	1,292	10.7(1.0)	1,486	11.9(1.0)	1,219	15.4(1.3)
중하	1,467	9.0(0.9)	953	9.6(1.2)	1,158	7.4(0.9)	556	11.1(1.5)	1,318	10.6(0.9)	1,484	11.7(0.9)	1,225	12.5(1.3)
중상	1,402	9.9(0.9)	1,029	9.3(0.9)	1,117	7.3(0.9)	593	9.6(1.5)	1,348	10.3(0.9)	1,472	11.6(0.9)	1,270	12.7(1.1)
상	1,419	10.0(0.9)	1,020	9.8(1.0)	1,135	8.4(1.1)	574	12.0(1.5)	1,370	11.2(0.9)	1,490	12.2(1.1)	1,256	15.5(1.2)
거주지역(표준화)														
동	3,357	9.9(0.7)	3,118	9.7(0.5)	3,504	8.2(0.5)	1,670	11.7(0.9)	3,916	11.5(0.6)	4,347	12.0(0.6)	3,901	14.4(0.7)
읍면	2,286	10.7(0.9)	1,116	7.3(0.7)	1,123	7.8(1.1)	718	7.4(0.8)	1,582	8.7(1.1)	1,637	9.4(0.8)	1,131	11.7(1.0)
소득수준(표준화)														
하	1,355	10.3(1.0)	982	9.0(0.9)	1,180	9.0(0.9)	554	10.0(1.7)	1,292	10.6(1.0)	1,486	11.6(0.9)	1,219	15.0(1.2)
중하	1,467	9.5(0.9)	953	9.5(1.1)	1,158	7.4(0.8)	556	11.1(1.4)	1,318	10.4(0.9)	1,484	11.2(0.8)	1,225	11.9(1.2)
중상	1,402	10.4(0.9)	1,029	9.1(0.9)	1,117	7.2(0.9)	593	9.8(1.4)	1,348	10.3(0.9)	1,472	11.5(0.9)	1,270	11.9(1.0)
상	1,419	10.0(0.9)	1,020	9.5(1.0)	1,135	8.4(1.1)	574	11.7(1.4)	1,370	10.8(0.8)	1,490	11.6(1.0)	1,256	14.5(1.1)
남자														
30세이상	2,523	8.9(0.7)	1,857	8.6(0.7)	1,976	7.3(0.6)	989	9.4(1.2)	2,309	9.5(0.7)	2,580	10.9(0.7)	2,199	13.4(0.9)
65세이상	349	6.6(1.6)	282	6.5(1.5)	336	4.4(1.0)	267	8.8(1.9)	541	9.3(1.6)	622	10.9(1.4)	530	10.3(1.9)
30세이상(표준화)	2,523	8.7(0.7)	1,857	8.5(0.7)	1,976	7.2(0.6)	989	9.3(1.1)	2,309	9.5(0.7)	2,580	10.8(0.7)	2,199	13.0(0.9)
연령(세)														
30-39	762	6.5(1.0)	563	6.0(1.1)	481	5.9(1.1)	227	7.5(2.0)	551	7.5(1.2)	564	8.4(1.2)	485	8.9(1.3)
40-49	663	10.0(1.4)	509	10.4(1.5)	583	8.7(1.3)	223	11.0(2.1)	550	10.5(1.4)	608	11.0(1.4)	502	14.3(1.8)
50-59	506	12.5(1.5)	345	9.2(1.7)	393	7.9(1.5)	184	10.9(2.8)	459	10.9(1.6)	522	14.0(1.7)	451	18.7(2.2)
60-69	396	9.7(1.7)	289	10.0(2.6)	355	8.8(1.7)	193	9.6(3.3)	414	10.5(1.8)	504	12.8(1.8)	442	13.3(2.1)
70+	196	3.5(1.3)	151	7.5(2.2)	164	3.6(1.3)	162	6.6(2.5)	335	8.4(1.6)	382	8.5(1.7)	319	10.6(2.6)
거주지역														
동	1,511	8.9(0.8)	1,372	9.5(0.9)	1,490	7.4(0.7)	680	10.6(1.5)	1,645	10.1(0.8)	1,857	11.6(0.8)	1,689	14.5(1.1)
읍면	1,012	8.7(1.1)	485	5.6(1.0)	486	7.2(1.4)	309	5.4(1.1)	664	7.2(1.4)	723	8.4(1.3)	510	9.7(1.6)

1) 고콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 총콜레스테롤이 240㎎/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율, 만30세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 고콜레스테롤혈증 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	612	10.3(1.5)	428	7.2(1.3)	508	8.8(1.4)	233	7.8(1.7)	536	10.6(1.5)	653	10.8(1.5)	537	14.3(1.8)
중하	655	8.1(1.2)	415	9.5(1.8)	489	7.8(1.4)	226	8.1(2.0)	548	10.2(1.4)	634	9.2(1.2)	540	13.7(2.0)
중상	644	9.1(1.3)	459	9.3(1.6)	470	4.7(1.0)	246	10.4(2.5)	573	7.4(1.1)	623	11.6(1.4)	547	10.2(1.4)
상	612	8.3(1.2)	448	8.6(1.4)	491	7.5(1.4)	245	10.7(2.1)	584	9.6(1.3)	646	12.1(1.5)	551	14.4(1.8)
거주지역(표준화)														
동	1,511	8.8(0.8)	1,372	9.4(0.9)	1,490	7.2(0.7)	680	10.5(1.4)	1,645	10.0(0.8)	1,857	11.6(0.8)	1,689	14.3(1.0)
읍면	1,012	9.2(1.2)	485	5.3(1.0)	486	7.3(1.4)	309	5.3(1.0)	664	7.3(1.7)	723	7.5(1.2)	510	8.8(1.4)
소득수준(표준화)														
하	612	10.1(1.5)	428	7.0(1.3)	508	8.7(1.4)	233	7.6(1.7)	536	10.4(1.4)	653	10.5(1.4)	537	13.7(1.7)
중하	655	8.3(1.2)	415	9.8(1.7)	489	7.7(1.4)	226	7.9(2.0)	548	10.1(1.4)	634	8.9(1.2)	540	13.3(1.9)
중상	644	9.1(1.3)	459	9.2(1.5)	470	4.8(1.0)	246	10.6(2.3)	573	7.5(1.1)	623	11.4(1.3)	547	9.9(1.4)
상	612	8.0(1.2)	448	8.5(1.4)	491	7.4(1.3)	245	10.6(2.1)	584	9.4(1.2)	646	12.1(1.5)	551	14.0(1.8)
여자														
30세이상	3,120	10.8(0.7)	2,377	10.1(0.7)	2,651	8.7(0.7)	1,399	12.2(1.1)	3,189	12.6(0.6)	3,404	12.7(0.7)	2,833	14.9(0.8)
65세이상	564	17.7(1.9)	429	15.3(2.1)	511	15.6(1.8)	372	21.0(2.4)	835	23.2(1.9)	847	18.6(1.5)	631	27.9(2.3)
30세이상(표준화)	3,120	10.6(0.7)	2,377	9.6(0.6)	2,651	8.4(0.6)	1,399	11.6(1.1)	3,189	11.9(0.6)	3,404	11.9(0.7)	2,833	13.4(0.7)
연령(세)														
30-39	908	3.1(0.6)	697	5.0(1.0)	705	1.8(0.5)	357	3.5(1.3)	765	4.3(0.8)	772	4.1(0.8)	686	3.1(0.9)
40-49	744	7.0(1.1)	641	5.5(0.9)	724	5.5(1.0)	287	5.7(1.6)	705	6.5(1.0)	816	7.7(1.0)	594	6.3(1.2)
50-59	617	19.0(1.9)	413	13.7(1.7)	488	15.2(2.0)	274	19.1(3.4)	609	19.5(1.7)	664	21.0(1.9)	661	23.3(2.0)
60-69	504	18.6(2.1)	359	22.3(2.6)	420	17.4(2.1)	247	26.5(3.4)	599	24.9(2.0)	624	22.5(1.8)	510	29.5(2.5)
70+	347	18.5(2.4)	267	12.0(2.3)	314	13.2(2.4)	234	20.5(3.5)	511	20.2(2.4)	528	17.6(2.0)	382	27.5(2.9)
거주지역														
동	1,846	9.7(0.9)	1,746	10.0(0.8)	2,014	8.4(0.7)	990	12.8(1.4)	2,271	12.6(0.8)	2,490	12.4(0.9)	2,212	14.3(0.9)
읍면	1,274	13.8(1.3)	631	10.6(1.3)	637	9.8(1.6)	409	10.1(1.6)	918	13.0(1.3)	914	13.9(1.1)	621	16.6(1.7)
소득수준														
하	743	11.0(1.3)	554	11.4(1.4)	672	9.1(1.2)	321	12.2(2.6)	756	10.8(1.3)	833	12.9(1.3)	682	16.6(1.7)
중하	812	9.9(1.2)	538	9.7(1.5)	669	6.9(1.1)	330	13.8(2.3)	770	11.0(1.1)	850	14.1(1.3)	685	11.2(1.5)
중상	758	10.7(1.3)	570	9.3(1.3)	647	9.7(1.5)	347	8.9(1.5)	775	13.2(1.5)	849	11.6(1.2)	723	14.9(1.6)
상	807	11.5(1.3)	572	10.6(1.5)	644	9.2(1.5)	329	13.3(2.4)	786	12.7(1.2)	844	12.3(1.5)	705	16.5(1.7)
거주지역(표준화)														
동	1,846	10.4(0.9)	1,746	10.0(0.8)	2,014	8.7(0.7)	990	12.3(1.2)	2,271	12.4(0.7)	2,490	12.2(0.8)	2,212	14.0(0.8)
읍면	1,274	11.4(1.2)	631	8.7(1.2)	637	7.9(1.5)	409	9.5(1.6)	918	10.1(0.9)	914	11.0(0.9)	621	14.4(2.0)
소득수준(표준화)														
하	743	10.0(1.2)	554	10.5(1.3)	672	9.0(1.2)	321	12.3(2.6)	756	10.7(1.2)	833	12.4(1.1)	682	15.5(1.6)
중하	812	10.2(1.3)	538	9.5(1.4)	669	7.0(1.0)	330	13.2(2.1)	770	10.2(1.0)	850	13.4(1.2)	685	10.2(1.3)
중상	758	10.8(1.2)	570	9.0(1.2)	647	9.1(1.3)	347	8.9(1.5)	775	12.5(1.4)	849	11.1(1.2)	723	13.3(1.4)
상	807	11.3(1.2)	572	10.4(1.3)	644	8.8(1.4)	329	12.1(2.1)	786	11.9(1.0)	844	10.8(1.2)	705	14.7(1.4)

표 3-IV-2. 혈중 총콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : mg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,976	182.4	0.96	127	137	155	179	206	229	247
19세이상	2,508	187.2	0.97	133	143	162	184	210	233	251
30세이상	2,230	191.5	0.99	137	148	167	190	213	238	255
65세이상	537	179.7	1.67	129	139	155	177	201	222	235
연령(세)										
10-18	468	152.0	1.71	113	123	133	149	168	185	198
19-29	278	170.0	2.04	122	134	148	168	191	210	222
30-39	488	191.4	1.86	140	149	167	190	212	236	253
40-49	511	196.9	1.97	139	155	170	196	217	245	258
50-59	460	193.0	1.88	134	144	168	191	215	239	264
60-69	448	184.1	1.87	135	144	162	180	206	222	242
70+	323	178.9	2.24	126	137	154	177	201	224	236
여자										
10세이상	3,685	183.8	0.82	134	142	158	180	205	230	246
19세이상	3,292	186.5	0.88	136	144	160	183	208	233	250
30세이상	2,854	191.0	0.89	139	147	166	189	213	236	253
65세이상	641	199.3	1.77	145	154	171	197	222	244	263
연령(세)										
10-18	393	163.0	1.49	127	135	146	161	178	195	207
19-29	438	168.2	1.49	126	135	147	165	185	204	217
30-39	687	177.7	1.46	134	140	156	174	198	216	232
40-49	598	186.1	1.55	138	145	164	184	207	225	242
50-59	665	203.5	2.04	152	159	178	202	225	249	268
60-69	517	196.9	1.67	143	151	171	197	220	243	256
70+	387	200.5	2.23	142	154	172	197	223	248	271

표 3-IV-3. 고콜레스테롤혈증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,032	14.1 (0.6)	2,199	13.4 (0.9)	2,833	14.9 (0.8)
65세이상	1,161	20.5 (1.6)	530	10.3 (1.9)	631	27.9 (2.3)
연령(세)						
30-39	1,171	6.1 (0.8)	485	8.9 (1.3)	686	3.1 (0.9)
40-49	1,096	10.4 (1.1)	502	14.3 (1.8)	594	6.3 (1.2)
50-59	1,112	21.0 (1.5)	451	18.7 (2.2)	661	23.3 (2.0)
60-69	952	21.7 (1.5)	442	13.3 (2.1)	510	29.5 (2.5)
70+	701	20.8 (2.1)	319	10.6 (2.6)	382	27.5 (2.9)
거주지역						
동	3,901	14.4 (0.7)	1,689	14.5 (1.1)	2,212	14.3 (0.9)
읍면	1,131	13.2 (1.0)	510	9.7 (1.6)	621	16.6 (1.7)
소득수준[2]						
하	1,219	15.4 (1.3)	537	14.3 (1.8)	682	16.6 (1.7)
중하	1,225	12.5 (1.3)	540	13.7 (2.0)	685	11.2 (1.5)
중상	1,270	12.7 (1.1)	547	10.2 (1.4)	723	14.9 (1.6)
상	1,256	15.5 (1.2)	551	14.4 (1.8)	705	16.5 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,901	14.4 (0.7)	1,689	14.3 (1.0)	2,212	14.0 (0.8)
읍면	1,131	11.7 (1.0)	510	8.8 (1.4)	621	14.4 (2.0)
소득수준(표준화)						
하	1,219	15.0 (1.2)	537	13.7 (1.7)	682	15.5 (1.6)
중하	1,225	11.9 (1.2)	540	13.3 (1.9)	685	10.2 (1.3)
중상	1,270	11.9 (1.0)	547	9.9 (1.4)	723	13.3 (1.4)
상	1,256	14.5 (1.1)	551	14.0 (1.8)	705	14.7 (1.4)

1) 고콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 총콜레스테롤이 240㎎/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IV-4. 고콜레스테롤혈증 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
인지율[1]						
30세이상	2,184	42.2 (1.3)	795	38.3 (2.1)	1,389	45.4 (1.7)
65세이상	688	51.4 (2.6)	169	55.3 (4.7)	519	50.2 (3.0)
연령(세)						
30-39	212	17.0 (3.0)	130	18.9 (3.8)	82	12.7 (4.9)
40-49	359	28.2 (2.7)	204	25.0 (3.2)	155	34.1 (4.6)
50-59	624	51.1 (2.4)	206	54.2 (4.0)	418	49.0 (2.9)
60-69	607	59.6 (2.3)	162	59.5 (4.8)	445	59.6 (2.6)
70+	382	42.9 (3.4)	93	50.0 (6.3)	289	40.9 (3.8)
치료율[2]						
30세이상	2,184	31.6 (1.3)	795	27.8 (1.8)	1,389	34.7 (1.7)
65세이상	688	45.4 (2.7)	169	51.2 (4.7)	519	43.5 (3.1)
연령(세)						
30-39	212	5.5 (1.8)	130	4.6 (1.9)	82	7.4 (4.0)
40-49	359	16.4 (2.1)	204	14.4 (2.6)	155	19.9 (3.5)
50-59	624	38.3 (2.4)	206	44.6 (4.0)	418	34.0 (2.7)
60-69	607	51.3 (2.4)	162	49.8 (4.7)	445	51.9 (2.8)
70+	382	36.8 (3.4)	93	46.8 (6.3)	289	34.0 (3.7)
조절률(유병자 기준)[3]						
30세이상	2,184	24.3 (1.2)	795	22.3 (1.6)	1,389	25.9 (1.6)
65세이상	688	36.0 (2.6)	169	44.1 (4.7)	519	33.4 (2.9)
연령(세)						
30-39	212	2.6 (1.1)	130	2.7 (1.4)	82	2.3 (1.7)
40-49	359	12.5 (2.0)	204	10.5 (2.4)	155	16.1 (3.3)
50-59	624	29.2 (2.2)	206	36.5 (3.7)	418	24.2 (2.5)
60-69	607	40.4 (2.5)	162	41.2 (4.8)	445	40.0 (2.9)
70+	382	29.2 (3.2)	93	40.4 (5.9)	289	26.1 (3.3)
조절률(치료자 기준)[4]						
30세이상	743	75.4 (1.9)	245	80.0 (2.8)	498	72.4 (2.5)
65세이상	309	78.3 (2.6)	83	85.5 (4.0)	226	75.6 (3.4)
연령(세)						
30-39	11	- -[5]	6	- -	5	- -
40-49	65	74.5 (5.9)	31	72.6 (8.4)	34	77.1 (7.6)
50-59	221	74.6 (3.4)	85	81.8 (4.5)	136	68.1 (4.7)
60-69	300	77.8 (2.9)	80	82.0 (5.8)	220	76.0 (3.4)
70+	146	77.6 (4.1)	43	86.3 (5.2)	103	74.2 (5.2)

1) 고콜레스테롤혈증 인지율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증 진단을 받은 분율
2) 고콜레스테롤혈증 치료율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 현재 콜레스테롤강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율
3) 고콜레스테롤혈증 조절률(유병자 기준) : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤수치가 200㎎/dL미만인 분율
4) 고콜레스테롤혈증 조절률(치료자 기준) : 고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤수치가 200㎎/dL미만인 분율
5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 3-IV-5. 저HDL콜레스테롤혈증 유병률[1] 추이 : 성별, 만30세이상, 2008-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	5,530	27.7(0.9)	6,001	28.2(0.7)	5,084	26.5(0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,386	37.6(1.6)	1,474	33.2(1.4)	1,178	33.9(1.8)
30세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	5,530	27.6(0.8)	6,001	28.0(0.7)	5,084	26.2(0.9)
연령(세)														
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,319	23.7(1.3)	1,337	25.1(1.4)	1,175	22.3(1.4)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,260	25.9(1.3)	1,431	25.2(1.3)	1,109	24.1(1.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,079	26.0(1.7)	1,190	29.6(1.5)	1,125	27.2(1.6)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,019	34.3(2.0)	1,131	34.5(1.9)	965	33.0(1.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	853	39.2(2.1)	912	34.2(1.7)	710	34.2(2.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,940	27.1(1.0)	4,357	27.9(0.8)	3,942	26.7(0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,590	30.3(1.6)	1,644	29.6(1.4)	1,142	25.7(1.9)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,297	30.9(1.5)	1,493	29.6(1.4)	1,235	27.6(1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,323	29.0(1.5)	1,485	28.5(1.5)	1,237	26.9(1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,356	25.2(1.6)	1,473	27.2(1.4)	1,280	26.2(1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,377	26.4(1.5)	1,493	28.0(1.5)	1,265	25.1(1.6)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,940	27.4(1.0)	4,357	28.1(0.8)	3,942	26.8(0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,590	28.3(1.6)	1,644	28.1(1.6)	1,142	24.0(2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,297	30.9(1.5)	1,493	29.3(1.4)	1,235	27.6(1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,323	29.0(1.5)	1,485	28.2(1.5)	1,237	27.0(1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,356	25.2(1.5)	1,473	27.1(1.4)	1,280	25.8(1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,377	26.2(1.5)	1,493	27.6(1.6)	1,265	24.6(1.6)
남자														
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,320	36.4(1.2)	2,584	36.1(1.1)	2,230	35.8(1.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	544	42.6(2.3)	623	36.2(2.4)	537	41.1(2.4)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,320	36.6(1.2)	2,584	35.9(1.1)	2,230	35.7(1.4)
연령(세)														
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	552	34.5(2.2)	564	34.3(2.2)	488	32.5(2.4)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	551	36.4(2.3)	609	33.2(2.1)	511	33.5(2.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	463	34.2(2.6)	524	39.5(2.4)	460	38.2(2.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	417	38.5(2.7)	505	40.8(2.8)	448	41.8(2.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	337	45.4(3.1)	382	36.2(2.8)	323	39.5(3.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,654	35.9(1.4)	1,859	36.1(1.3)	1,715	37.5(1.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	666	38.5(2.3)	725	36.0(2.2)	515	30.5(2.9)

1) 저HDL콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 HDL콜레스테롤이 40㎎/dL 미만인 분율, 만30세이상

* '98-'07년 : 측정소급성 미실시 기간으로 결과 비제시

* '08-'10년 : 미국 CDC 지질 표준화 프로그램(LSP, Lipid Standardization Program)에 참여하여 도출된 HDL전환식으로 보정한 값

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저HDL콜레스테롤혈증 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 2008-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	536	39.0(2.5)	655	37.4(2.1)	545	36.4(2.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	549	37.2(2.3)	634	37.1(2.3)	547	34.4(2.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	579	33.8(2.1)	623	33.4(2.3)	554	37.1(2.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	585	36.5(2.3)	646	36.4(2.4)	557	35.1(2.4)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,654	36.5(1.4)	1,859	36.1(1.3)	1,715	37.6(1.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	666	38.3(2.4)	725	35.2(2.4)	515	29.1(3.4)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	536	39.2(2.4)	655	36.9(2.1)	545	36.4(2.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	549	37.8(2.3)	634	37.0(2.4)	547	34.7(2.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	579	34.1(2.1)	623	33.7(2.3)	554	37.2(2.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	585	36.6(2.3)	646	35.9(2.5)	557	34.8(2.4)
여자														
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,210	19.4(0.9)	3,417	20.6(0.9)	2,854	17.4(0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	842	34.1(1.9)	851	31.1(1.8)	641	28.7(2.3)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,210	18.6(0.8)	3,417	20.0(0.9)	2,854	16.8(0.9)
연령(세)														
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	767	12.4(1.4)	773	15.2(1.6)	687	11.8(1.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	709	14.9(1.4)	822	17.1(1.4)	598	14.0(2.2)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	616	17.7(1.8)	666	19.4(1.8)	665	16.3(1.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	602	30.5(2.4)	626	29.0(2.3)	517	24.9(2.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	516	35.2(2.5)	530	32.8(2.3)	387	30.7(3.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,286	18.4(1.0)	2,498	19.9(1.1)	2,227	16.3(0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	924	23.0(2.0)	919	23.0(1.7)	627	21.0(2.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	761	23.3(1.6)	838	21.8(1.6)	690	18.8(1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	774	21.3(1.6)	851	20.2(1.8)	690	19.5(1.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	777	16.5(1.6)	850	21.2(1.7)	726	16.1(1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	792	16.3(1.5)	847	19.8(1.6)	708	14.9(1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,286	18.4(1.0)	2,498	20.1(1.1)	2,227	16.3(0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	924	18.8(1.7)	919	19.8(1.7)	627	18.7(3.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	761	23.0(1.6)	838	21.5(1.6)	690	18.6(1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	774	20.7(1.5)	851	19.4(1.7)	690	19.1(1.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	777	15.8(1.5)	850	20.6(1.7)	726	15.4(1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	792	15.5(1.4)	847	18.9(1.5)	708	13.6(1.5)

표 3-IV-6. 혈중 HDL콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : mg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,976	46.0	0.25	32.2	34.8	39.1	45.1	52.0	59.7	64.0
19세이상	2,508	45.7	0.28	31.4	33.9	38.2	44.3	51.1	59.7	64.0
30세이상	2,230	45.3	0.31	31.4	33.9	38.2	44.3	50.3	58.9	64.0
65세이상	537	44.2	0.55	29.6	32.2	36.5	42.5	50.3	58.9	64.9
연령(세)										
10-18	468	47.8	0.50	35.7	37.4	41.7	46.8	53.7	60.6	63.2
19-29	278	47.2	0.58	33.1	35.7	40.0	46.0	52.9	59.7	64.0
30-39	488	45.6	0.56	31.4	33.9	39.1	44.3	51.1	58.9	64.0
40-49	511	45.9	0.59	32.2	34.8	38.2	44.3	51.1	58.9	63.2
50-59	460	44.7	0.65	31.4	33.9	37.4	43.4	50.3	58.9	62.3
60-69	448	45.2	0.66	31.4	33.9	36.5	43.4	51.1	60.6	66.6
70+	323	44.4	0.69	28.8	31.4	36.5	42.5	49.4	58.9	65.8
여자										
10세이상	3,685	51.0	0.23	34.8	38.2	43.4	50.3	57.2	64.9	70.1
19세이상	3,292	51.1	0.23	34.8	38.2	43.4	50.3	57.2	65.8	70.1
30세이상	2,854	50.4	0.23	34.8	37.4	42.5	49.4	57.2	64.0	69.2
65세이상	641	46.3	0.54	31.4	34.8	39.1	45.1	52.9	58.9	64.0
연령(세)										
10-18	393	50.6	0.57	35.7	39.1	44.3	49.4	55.4	61.5	68.3
19-29	438	53.8	0.64	38.2	40.8	46.8	52.9	59.7	67.5	71.8
30-39	687	52.8	0.52	35.7	39.1	45.1	52.9	58.9	67.5	70.1
40-49	598	51.3	0.51	36.5	39.1	44.3	50.3	57.2	64.0	70.9
50-59	665	50.6	0.54	34.8	37.4	42.5	49.4	57.2	64.0	70.1
60-69	517	48.1	0.57	33.1	34.8	40.8	46.8	53.7	61.5	67.5
70+	387	45.6	0.63	32.2	34.8	39.1	44.3	52.0	57.2	62.3

* 미국 CDC 지질 표준화 프로그램(LSP, Lipid Standardization Program)에 참여하여 도출된 HDL전환식으로 보정한 값

표 3-IV-7. 저HLD콜레스테롤혈증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,084	26.5 (0.8)	2,230	35.8 (1.4)	2,854	17.4 (0.9)
65세이상	1,178	33.9 (1.8)	537	41.1 (2.4)	641	28.7 (2.3)
연령(세)						
30-39	1,175	22.3 (1.4)	488	32.5 (2.4)	687	11.8 (1.6)
40-49	1,109	24.1 (1.6)	511	33.5 (2.6)	598	14.0 (2.2)
50-59	1,125	27.2 (1.6)	460	38.2 (2.9)	665	16.3 (1.9)
60-69	965	33.0 (1.7)	448	41.8 (2.7)	517	24.9 (2.1)
70+	710	34.2 (2.4)	323	39.5 (3.3)	387	30.7 (3.1)
거주지역						
동	3,942	26.7 (0.9)	1,715	37.5 (1.6)	2,227	16.3 (0.9)
읍면	1,142	25.7 (1.9)	515	30.5 (2.9)	627	21.0 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,235	27.6 (1.7)	545	36.4 (2.7)	690	18.8 (1.7)
중하	1,237	26.9 (1.4)	547	34.4 (2.5)	690	19.5 (1.8)
중상	1,280	26.2 (1.6)	554	37.1 (2.5)	726	16.1 (1.7)
상	1,265	25.1 (1.6)	557	35.1 (2.4)	708	14.9 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,942	26.8 (0.9)	1,715	37.6 (1.6)	2,227	16.3 (0.9)
읍면	1,142	24.0 (2.2)	515	29.1 (3.4)	627	18.7 (3.0)
소득수준(표준화)						
하	1,235	27.6 (1.7)	545	36.4 (2.7)	690	18.6 (1.7)
중하	1,237	27.0 (1.4)	547	34.7 (2.4)	690	19.1 (1.8)
중상	1,280	25.8 (1.6)	554	37.2 (2.6)	726	15.4 (1.7)
상	1,265	24.6 (1.6)	557	34.8 (2.4)	708	13.6 (1.5)

1) 저HDL콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 HDL콜레스테롤이 40㎎/dL 미만인 분율, 만30세이상
* 미국 CDC 지질 표준화 프로그램(LSP, Lipid Standardization Program)에 참여하여 도출된 HDL전환식으로 보정한 값

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IV-8. 고중성지방혈증 유병률[1] 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
30세이상	3,482	10.2(0.6)	1,911	20.3(1.1)	4,644	16.7(0.7)	1,833	16.9(1.3)	4,242	17.4(0.8)	4,821	16.9(0.7)	4,202	16.9(0.7)
65세이상	613	8.4(1.3)	411	26.8(2.4)	849	14.9(1.4)	574	16.5(2.2)	1,201	17.8(1.5)	1,298	18.5(1.4)	1,065	19.3(1.6)
30세이상(표준화)[2]	3,482	10.2(0.6)	1,911	19.6(1.1)	4,644	16.7(0.7)	1,833	16.9(1.2)	4,242	17.3(0.7)	4,821	16.5(0.7)	4,202	16.6(0.7)
연령(세)														
30-39	1,006	7.3(0.8)	530	14.4(1.6)	1,193	12.6(1.2)	441	11.7(1.7)	982	14.7(1.2)	1,030	12.4(1.3)	959	12.3(1.3)
40-49	839	10.8(1.0)	438	19.2(2.2)	1,309	18.5(1.3)	353	17.1(2.2)	903	18.3(1.4)	1,083	15.5(1.3)	841	17.0(1.5)
50-59	673	14.5(1.6)	348	23.1(2.5)	887	21.1(1.6)	315	24.5(3.0)	780	18.7(1.4)	919	21.8(1.6)	914	20.5(1.8)
60-69	610	12.8(1.7)	346	24.8(2.7)	777	17.5(1.5)	362	19.9(3.3)	824	17.7(1.7)	971	21.7(1.5)	837	18.5(1.7)
70+	354	5.8(1.3)	249	23.4(2.7)	478	14.4(2.0)	362	14.5(2.0)	753	19.3(1.9)	818	15.9(1.5)	651	19.0(2.3)
거주지역														
동	2,034	8.6(0.7)	1,340	19.5(1.3)	3,519	16.5(0.8)	1,258	18.2(1.5)	3,005	16.9(0.9)	3,460	16.7(0.8)	3,241	17.1(0.9)
읍면	1,448	14.8(1.5)	571	22.9(1.8)	1,125	17.3(1.8)	575	12.6(1.8)	1,237	19.3(1.7)	1,361	17.8(1.5)	961	16.6(1.4)
소득수준[3]														
하	843	12.1(1.3)	470	18.4(2.1)	1,183	17.9(1.3)	433	15.9(2.5)	1,023	20.3(1.5)	1,185	18.1(1.4)	1,034	17.4(1.6)
중하	894	12.4(1.1)	421	21.7(2.0)	1,161	16.3(1.2)	430	18.0(2.3)	999	17.6(1.4)	1,210	17.8(1.4)	1,037	18.3(1.4)
중상	858	9.2(1.1)	473	18.9(2.0)	1,124	16.9(1.5)	440	16.4(2.3)	1,030	16.3(1.3)	1,183	16.5(1.3)	1,053	16.2(1.4)
상	887	7.6(1.0)	447	19.5(2.2)	1,137	15.8(1.3)	431	17.6(2.4)	1,040	15.5(1.3)	1,200	15.7(1.2)	1,032	15.6(1.6)
거주지역(표준화)														
동	2,034	8.6(0.7)	1,340	19.0(1.3)	3,519	16.6(0.8)	1,258	18.1(1.4)	3,005	17.0(0.9)	3,460	16.5(0.8)	3,241	17.0(0.9)
읍면	1,448	15.2(1.6)	571	21.6(1.8)	1,125	18.2(2.1)	575	12.5(2.0)	1,237	18.9(2.0)	1,361	17.1(1.6)	961	14.9(1.5)
소득수준(표준화)														
하	843	12.0(1.3)	470	17.9(2.2)	1,183	17.8(1.3)	433	16.0(2.5)	1,023	20.2(1.5)	1,185	17.5(1.4)	1,034	17.1(1.6)
중하	894	12.5(1.1)	421	20.7(1.8)	1,161	16.3(1.2)	430	17.7(2.2)	999	17.5(1.4)	1,210	17.3(1.4)	1,037	17.9(1.4)
중상	858	9.4(1.2)	473	17.9(1.9)	1,124	16.8(1.5)	440	16.8(2.3)	1,030	16.0(1.2)	1,183	16.2(1.3)	1,053	15.5(1.5)
상	887	7.6(0.9)	447	19.0(2.4)	1,137	15.9(1.3)	431	17.5(2.3)	1,040	15.5(1.4)	1,200	15.2(1.2)	1,032	15.1(1.6)
남자														
30세이상	1,493	14.9(1.1)	767	27.1(1.8)	1,982	23.2(1.2)	716	21.9(1.7)	1,684	23.8(1.1)	2,000	23.9(1.2)	1,755	24.0(1.3)
65세이상	237	7.6(1.8)	161	26.1(3.5)	337	15.6(2.2)	242	15.3(2.5)	478	15.4(1.9)	541	18.7(2.2)	482	18.4(2.3)
30세이상(표준화)	1,493	14.9(1.0)	767	28.2(1.9)	1,982	22.9(1.2)	716	22.1(1.7)	1,684	24.0(1.1)	2,000	23.5(1.2)	1,755	23.9(1.3)
연령(세)														
30-39	423	12.9(1.7)	215	28.7(3.4)	484	20.5(2.2)	152	19.8(3.1)	371	25.5(2.2)	402	19.5(2.1)	373	20.9(2.6)
40-49	378	17.4(1.9)	176	31.8(4.1)	583	27.8(2.2)	141	26.9(3.6)	366	27.8(2.4)	435	24.0(2.3)	359	28.7(2.7)
50-59	291	21.4(2.6)	138	29.3(4.1)	395	26.9(2.5)	119	27.5(4.9)	312	24.8(2.4)	393	31.2(2.7)	345	27.6(2.8)
60-69	268	11.0(2.0)	146	19.7(3.7)	356	19.0(2.3)	159	17.4(3.9)	334	16.1(2.3)	430	26.9(2.6)	380	20.0(2.6)
70+	133	6.1(1.7)	92	25.4(4.5)	164	13.0(2.9)	145	10.9(2.4)	301	16.8(2.4)	340	15.0(2.3)	298	17.5(3.0)
거주지역														
동	863	13.5(1.3)	532	27.4(2.2)	1,495	23.5(1.3)	481	24.4(2.1)	1,181	23.8(1.2)	1,406	24.2(1.3)	1,336	25.0(1.5)
읍면	630	19.0(1.9)	235	26.4(2.5)	487	21.9(2.6)	235	13.9(2.5)	503	23.8(2.3)	594	23.0(2.4)	419	20.8(2.3)

1) 고중성지방혈증 유병률 : 12시간이상 공복자 중 중성지방이 200㎎/dL 이상인 분율, 만30세이상
   * 2005년도 8시간 이상 공복자

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 고중성지방혈증 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	372	16.4(2.0)	184	21.7(3.0)	509	25.1(2.4)	176	18.0(4.0)	408	27.3(2.7)	495	24.7(2.3)	441	24.5(2.5)
중하	394	19.1(2.0)	159	27.6(3.6)	491	24.5(2.1)	156	25.6(3.6)	387	24.0(2.3)	499	25.0(2.5)	450	25.1(2.4)
중상	363	14.0(2.1)	199	23.8(3.4)	473	22.2(2.6)	174	22.5(3.4)	413	22.2(2.3)	485	23.1(2.3)	424	23.4(2.7)
상	364	10.5(1.7)	185	31.7(4.5)	491	21.1(2.0)	177	21.7(3.4)	416	22.9(2.5)	501	23.4(2.0)	423	22.4(2.8)
거주지역(표준화)														
동	863	13.2(1.3)	532	28.7(2.4)	1,495	22.9(1.3)	481	24.5(2.0)	1,181	23.7(1.3)	1,406	23.7(1.3)	1,336	25.1(1.5)
읍면	630	20.4(2.1)	235	26.6(2.3)	487	22.9(2.9)	235	13.9(2.6)	503	26.1(3.2)	594	23.2(2.7)	419	19.8(2.5)
소득수준(표준화)														
하	372	16.8(2.1)	184	21.6(3.0)	509	24.6(2.3)	176	18.1(3.7)	408	26.9(2.7)	495	23.6(2.3)	441	24.3(2.5)
중하	394	19.0(2.0)	159	--[4)]	491	24.0(2.0)	156	26.0(3.6)	387	24.8(2.2)	499	24.8(2.5)	450	24.7(2.3)
중상	363	14.7(2.2)	199	26.0(3.4)	473	21.8(2.5)	174	22.9(3.6)	413	22.2(2.2)	485	22.8(2.2)	424	23.3(2.8)
상	364	11.0(1.7)	185	34.4(5.0)	491	21.0(2.0)	177	21.6(3.0)	416	22.8(2.5)	501	23.0(2.0)	423	22.6(2.9)
여자														
30세이상	1,989	6.3(0.7)	1,144	16.1(1.2)	2,662	10.4(0.7)	1,117	12.7(1.5)	2,558	12.0(0.8)	2,821	10.8(0.8)	2,447	10.7(0.7)
65세이상	376	8.8(1.6)	250	27.2(3.3)	512	14.3(1.9)	332	17.3(3.0)	723	19.7(1.8)	757	18.4(1.8)	583	20.0(2.2)
30세이상(표준화)	1,989	6.1(0.7)	1,144	14.5(1.2)	2,662	10.2(0.7)	1,117	12.2(1.4)	2,558	11.2(0.8)	2,821	10.1(0.7)	2,447	9.7(0.7)
연령(세)														
30-39	583	2.8(0.6)	315	5.4(1.4)	709	4.4(0.7)	289	4.7(1.2)	611	5.3(1.1)	628	5.8(1.2)	586	4.2(1.0)
40-49	461	4.6(1.0)	262	12.2(2.6)	726	8.8(1.3)	212	8.3(2.1)	537	9.6(1.4)	648	7.7(1.1)	482	6.0(1.3)
50-59	382	8.6(1.4)	210	19.5(3.1)	492	15.3(2.0)	196	21.8(3.8)	468	13.3(1.8)	526	12.8(1.8)	569	14.2(1.9)
60-69	342	14.2(2.3)	200	28.7(3.4)	421	16.1(1.9)	203	21.9(4.3)	490	19.0(2.2)	541	17.1(1.9)	457	17.2(1.9)
70+	221	5.6(1.5)	157	22.1(3.9)	314	15.2(2.4)	217	16.7(3.2)	452	20.9(2.4)	478	16.5(1.9)	353	20.1(2.7)
거주지역														
동	1,171	4.6(0.7)	808	14.7(1.5)	2,024	9.8(0.8)	777	13.1(1.8)	1,824	11.0(1.0)	2,054	10.2(0.9)	1,905	10.1(0.9)
읍면	818	11.3(1.6)	336	20.5(2.3)	638	12.9(1.8)	340	11.3(2.1)	734	15.6(2.0)	767	12.7(1.5)	542	12.7(1.6)
소득수준														
하	471	8.5(1.5)	286	16.2(2.3)	674	10.7(1.5)	257	13.9(2.5)	615	14.2(1.7)	690	12.0(1.5)	593	10.9(1.5)
중하	500	6.5(1.1)	262	18.3(2.5)	670	8.5(1.2)	274	12.7(2.8)	612	12.4(1.5)	711	11.5(1.6)	587	11.7(1.6)
중상	495	5.3(1.0)	274	15.5(2.4)	651	12.0(1.5)	266	11.4(2.2)	617	11.2(1.5)	698	10.8(1.2)	629	10.5(1.4)
상	523	5.6(1.2)	262	12.2(2.6)	646	10.8(1.4)	254	13.8(2.8)	624	8.9(1.2)	699	8.8(1.4)	609	9.7(1.5)
거주지역(표준화)														
동	1,171	4.7(0.8)	808	14.0(1.4)	2,024	10.1(0.8)	777	12.5(1.6)	1,824	10.8(0.9)	2,054	10.1(0.8)	1,905	9.7(0.8)
읍면	818	10.1(1.4)	336	17.8(2.7)	638	13.0(2.0)	340	11.3(2.5)	734	13.1(1.7)	767	10.4(1.4)	542	9.6(1.5)
소득수준(표준화)														
하	471	7.9(1.3)	286	15.7(2.5)	674	10.7(1.5)	257	14.4(2.4)	615	14.0(1.7)	690	11.7(1.4)	593	10.3(1.4)
중하	500	6.4(1.0)	262	17.1(2.4)	670	8.5(1.2)	274	11.8(2.4)	612	11.7(1.3)	711	10.7(1.4)	587	10.9(1.5)
중상	495	5.3(1.0)	274	13.1(1.9)	651	11.6(1.4)	266	11.7(2.4)	617	10.3(1.3)	698	10.2(1.2)	629	9.2(1.3)
상	523	5.2(1.1)	262	10.6(2.4)	646	10.4(1.3)	254	13.1(2.4)	624	8.2(1.2)	699	7.9(1.3)	609	8.0(1.2)

표 3-IV-9. 혈중 중성지방 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : mg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,311	147.7	3.73	42	52	76	117	179	261	337
19세이상	1,950	158.4	4.10	48	57	83	126	187	278	358
30세이상	1,755	168.4	4.76	51	63	90	132	196	294	368
65세이상	482	146.1	5.81	44	55	82	122	178	251	311
연령(세)										
10-18	361	83.7	3.75	33	37	47	70	101	153	179
19-29	195	114.2	6.42	43	49	64	92	131	217	269
30-39	373	156.2	6.57	51	60	87	128	184	293	363
40-49	359	184.8	12.07	55	69	96	145	209	327	402
50-59	345	186.4	12.62	56	72	98	138	216	305	432
60-69	380	150.9	5.73	44	56	89	131	188	251	316
70+	298	140.3	6.58	48	60	81	122	166	243	299
여자										
10세이상	3,078	106.8	1.60	39	46	62	87	127	191	241
19세이상	2,780	109.7	1.70	39	47	63	91	132	194	247
30세이상	2,447	115.5	1.91	41	49	66	96	141	204	260
65세이상	583	146.7	4.73	57	66	90	125	179	263	333
연령(세)										
10-18	298	83.3	3.13	38	42	56	73	97	129	163
19-29	333	83.4	2.79	32	41	54	68	101	141	182
30-39	586	92.7	3.16	38	42	55	75	111	158	194
40-49	482	100.6	3.72	38	45	61	84	118	178	212
50-59	569	127.2	4.12	50	58	77	108	160	224	275
60-69	457	134.8	4.27	53	62	79	110	161	244	320
70+	353	149.9	5.42	58	71	93	132	187	254	328

표 3-IV-10. 고중성지방혈증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	4,202	16.9 (0.7)	1,755	24.0 (1.3)	2,447	10.7 (0.7)
65세이상	1,065	19.3 (1.6)	482	18.4 (2.3)	583	20.0 (2.2)
연령(세)						
30-39	959	12.3 (1.3)	373	20.9 (2.6)	586	4.2 (1.0)
40-49	841	17.0 (1.5)	359	28.7 (2.7)	482	6.0 (1.3)
50-59	914	20.5 (1.8)	345	27.6 (2.8)	569	14.2 (1.9)
60-69	837	18.5 (1.7)	380	20.0 (2.6)	457	17.2 (1.9)
70+	651	19.0 (2.3)	298	17.5 (3.0)	353	20.1 (2.7)
거주지역						
동	3,241	17.1 (0.9)	1,336	25.0 (1.5)	1,905	10.1 (0.9)
읍면	961	16.6 (1.4)	419	20.8 (2.3)	542	12.7 (1.6)
소득수준[2]						
하	1,034	17.4 (1.6)	441	24.5 (2.5)	593	10.9 (1.5)
중하	1,037	18.3 (1.4)	450	25.1 (2.4)	587	11.7 (1.6)
중상	1,053	16.2 (1.4)	424	23.4 (2.7)	629	10.5 (1.4)
상	1,032	15.6 (1.6)	423	22.4 (2.8)	609	9.7 (1.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,241	17.0 (0.9)	1,336	25.1 (1.5)	1,905	9.7 (0.8)
읍면	961	14.9 (1.5)	419	19.8 (2.5)	542	9.6 (1.5)
소득수준(표준화)						
하	1,034	17.1 (1.6)	441	24.3 (2.5)	593	10.3 (1.4)
중하	1,037	17.9 (1.4)	450	24.7 (2.3)	587	10.9 (1.5)
중상	1,053	15.5 (1.5)	424	23.3 (2.8)	629	9.2 (1.3)
상	1,032	15.1 (1.6)	423	22.6 (2.9)	609	8.0 (1.2)

1) 고중성지방혈증 유병률 : 12시간이상 공복자 중 중성지방이 200㎎/dL 이상인 분율, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-V-1. 폐쇄성폐질환 유병률[1] 추이 : 성별, 만40세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
40세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,142	15.6 (1.5)	2,501	13.4 (0.9)	3,291	11.0 (0.6)	2,855	13.1 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	323	34.0 (3.5)	689	31.1 (2.3)	908	23.6 (1.9)	660	31.9 (2.7)
40세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	1,142	15.3 (1.4)	2,501	13.1 (0.7)	3,291	10.5 (0.6)	2,855	12.3 (0.8)
연령(세)														
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	371	5.4 (1.5)	818	4.8 (0.9)	1,049	3.2 (0.6)	901	2.8 (0.7)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	319	14.3 (2.6)	706	9.0 (1.3)	918	9.1 (1.3)	929	9.6 (1.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	277	21.5 (3.1)	594	21.4 (2.0)	806	17.7 (1.7)	689	20.3 (1.8)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	175	38.8 (4.3)	383	34.8 (3.0)	518	26.2 (2.6)	336	35.8 (3.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	812	13.6 (1.5)	1,741	12.2 (0.9)	2,283	10.0 (0.7)	2,192	11.6 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	330	22.2 (3.4)	760	17.8 (2.3)	1,008	14.5 (1.5)	663	16.8 (2.3)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	264	17.9 (2.8)	561	14.6 (1.8)	787	12.6 (1.5)	652	14.5 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	265	18.3 (2.7)	596	13.2 (1.8)	821	10.3 (1.4)	686	14.4 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	280	14.9 (2.6)	629	11.8 (1.6)	809	10.2 (1.3)	737	11.0 (1.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	279	10.2 (2.4)	642	10.7 (1.6)	844	10.5 (1.2)	739	12.5 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	812	14.1 (1.4)	1,741	12.4 (0.8)	2,283	10.3 (0.7)	2,192	11.4 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	330	19.4 (3.2)	760	15.0 (1.6)	1,008	11.6 (1.2)	663	14.3 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	264	17.9 (2.7)	561	14.7 (1.6)	787	12.8 (1.4)	652	15.1 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	265	17.7 (2.6)	596	13.2 (1.4)	821	10.2 (1.2)	686	13.1 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	280	14.2 (2.2)	629	11.7 (1.5)	809	10.1 (1.2)	737	10.1 (1.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	279	10.8 (2.3)	642	10.2 (1.4)	844	9.2 (1.0)	739	11.0 (1.3)
남자														
40세이상	-	- -	-	- -	-	- -	477	21.5 (2.2)	1,056	19.4 (1.5)	1,446	16.6 (1.1)	1,281	19.6 (1.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	139	53.2 (5.7)	271	51.6 (3.8)	379	38.7 (3.5)	300	51.4 (3.5)
40세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	477	22.5 (2.0)	1,056	20.4 (1.3)	1,446	17.1 (1.0)	1,281	20.0 (1.2)
연령(세)														
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	168	5.6 (2.1)	355	5.6 (1.3)	466	5.5 (1.1)	446	4.1 (1.1)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	115	21.9 (4.1)	310	15.0 (2.3)	401	13.2 (2.0)	371	15.1 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	117	36.8 (5.5)	235	34.9 (3.5)	365	29.4 (2.9)	308	34.0 (3.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	77	56.2 (7.7)	156	56.1 (4.9)	214	43.9 (4.6)	156	58.9 (4.6)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	325	18.4 (2.3)	730	17.4 (1.6)	995	15.1 (1.2)	971	18.9 (1.7)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	152	30.6 (5.0)	326	25.9 (3.8)	451	21.8 (2.3)	310	21.3 (2.8)

1) 폐쇄성폐질환유병률 : 폐기능검사결과 기류제한(FEV1/FVC < 0.7)이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 폐쇄성폐질환유병률 추이, 성별, 만40세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	100	28.5 (4.7)	221	20.6 (3.1)	353	18.9 (2.3)	291	18.3 (2.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	110	27.1 (4.1)	257	19.7 (2.9)	349	15.6 (2.5)	316	21.0 (2.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	123	18.8 (4.0)	281	17.7 (2.7)	351	16.1 (2.1)	332	18.6 (2.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	125	12.2 (3.3)	267	15.6 (2.8)	376	15.3 (2.0)	327	21.0 (2.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	325	19.8 (2.1)	730	19.3 (1.5)	995	16.8 (1.3)	971	19.8 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	152	29.7 (4.5)	326	23.9 (2.6)	451	18.7 (1.9)	310	20.3 (2.3)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	100	- -[4)]	221	21.2 (2.7)	353	20.7 (2.3)	291	21.5 (2.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	110	- -	257	19.9 (2.3)	349	17.2 (2.3)	316	21.7 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	123	- -	281	19.2 (2.6)	351	16.5 (1.9)	332	16.8 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	125	- -	267	17.3 (2.5)	376	14.0 (1.8)	327	19.1 (1.9)
여자														
40세이상	-	- -	-	- -	-	- -	665	10.2 (1.8)	1,445	7.9 (1.0)	1,845	5.8 (0.7)	1,574	7.0 (1.2)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	184	21.0 (4.5)	418	17.2 (2.5)	529	13.3 (2.0)	360	18.4 (3.2)
40세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	665	9.3 (1.6)	1,445	7.2 (0.8)	1,845	5.1 (0.6)	1,574	6.0 (0.9)
연령(세)														
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	203	5.2 (2.4)	463	3.9 (1.1)	583	0.8 (0.4)	455	1.4 (0.7)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	204	6.6 (2.2)	396	3.1 (0.8)	517	5.0 (1.2)	558	4.0 (1.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	160	8.1 (2.9)	359	9.4 (2.2)	441	7.2 (1.4)	381	7.9 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	98	28.5 (6.1)	227	21.9 (3.3)	304	15.4 (2.8)	180	21.4 (4.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	487	9.2 (2.1)	1,011	7.5 (1.1)	1,288	5.3 (0.8)	1,221	5.1 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	178	13.8 (3.9)	434	9.5 (1.8)	557	7.7 (1.4)	353	12.2 (3.4)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	164	10.8 (3.7)	340	9.2 (1.8)	434	6.6 (1.7)	361	10.8 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	155	9.3 (2.6)	339	7.0 (1.6)	472	5.3 (1.2)	370	8.1 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	157	11.0 (3.4)	348	5.8 (1.9)	458	5.1 (1.5)	405	4.2 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	154	7.9 (3.5)	375	6.6 (1.8)	468	5.9 (1.5)	412	4.7 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	487	9.2 (2.0)	1,011	7.1 (1.0)	1,288	5.1 (0.8)	1,221	4.7 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	178	10.8 (3.6)	434	6.8 (1.1)	557	5.3 (1.0)	353	9.4 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	164	9.0 (2.7)	340	9.0 (1.6)	434	6.0 (1.5)	361	9.8 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	155	9.3 (2.7)	339	6.9 (1.5)	472	4.9 (1.0)	370	6.5 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	157	9.8 (2.8)	348	5.4 (1.8)	458	4.7 (1.2)	405	3.8 (1.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	154	- -	375	6.0 (1.6)	468	5.1 (1.3)	412	3.8 (1.1)

표 3-V-2. 폐쇄성폐질환 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	2,855	13.1 (0.9)	1,281	19.6 (1.4)	1,574	7.0 (1.2)
65세이상	660	31.9 (2.7)	300	51.4 (3.5)	360	18.4 (3.2)
연령(세)						
40-49	901	2.8 (0.7)	446	4.1 (1.1)	455	1.4 (0.7)
50-59	929	9.6 (1.1)	371	15.1 (2.1)	558	4.0 (1.1)
60-69	689	20.3 (1.8)	308	34.0 (3.1)	381	7.9 (1.7)
70+	336	35.8 (3.6)	156	58.9 (4.6)	180	21.4 (4.2)
거주지역						
동	2,192	11.6 (1.0)	971	18.9 (1.7)	1,221	5.1 (0.9)
읍면	663	16.8 (2.3)	310	21.3 (2.8)	353	12.2 (3.4)
소득수준[2]						
하	652	14.5 (1.5)	291	18.3 (2.7)	361	10.8 (2.3)
중하	686	14.4 (1.9)	316	21.0 (2.9)	370	8.1 (2.3)
중상	737	11.0 (1.5)	332	18.6 (2.4)	405	4.2 (1.4)
상	739	12.5 (1.7)	327	21.0 (2.9)	412	4.7 (1.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,192	11.4 (0.8)	971	19.8 (1.3)	1,221	4.7 (0.7)
읍면	663	14.3 (1.8)	310	20.3 (2.3)	353	9.4 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	652	15.1 (1.5)	291	21.5 (2.7)	361	9.8 (1.8)
중하	686	13.1 (1.4)	316	21.7 (2.1)	370	6.5 (1.5)
중상	737	10.1 (1.2)	332	16.8 (1.9)	405	3.8 (1.2)
상	739	11.0 (1.3)	327	19.1 (1.9)	412	3.8 (1.1)

1) 폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능검사결과 기류제한(FEV1/FVC < 0.7)이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-Ⅵ-1. 영구치우식 경험률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	경험률(표준오차)	N	경험률(표준오차)	N	경험률(표준오차)
19세이상	6,206	89.1 (0.6)	2,678	85.6 (1.0)	3,528	92.5 (0.6)
30세이상	5,448	88.9 (0.6)	2,374	85.4 (1.0)	3,074	92.2 (0.6)
연령(세)						
19-29	758	89.9 (1.4)	304	86.3 (2.3)	454	93.7 (1.5)
30-39	1,230	89.3 (1.0)	508	87.0 (1.7)	722	91.6 (1.1)
40-49	1,150	89.1 (1.1)	526	84.0 (1.8)	624	94.4 (1.1)
50-59	1,164	87.9 (1.3)	480	83.7 (1.9)	684	92.2 (1.5)
60-69	1,011	91.6 (1.0)	468	90.0 (1.5)	543	93.1 (1.0)
70+	893	86.5 (1.7)	392	83.2 (2.6)	501	88.6 (2.0)
19-64	4,810	89.3 (0.6)	2,057	85.8 (1.0)	2,753	92.8 (0.6)
65+	1,396	88.0 (1.3)	621	84.2 (2.0)	775	90.7 (1.4)
거주지역						
동	4,850	89.5 (0.7)	2,090	85.9 (1.1)	2,760	93.0 (0.7)
읍면	1,356	87.8 (1.7)	588	84.7 (2.2)	768	90.7 (1.5)
소득수준[2]						
하	1,525	87.6 (1.0)	661	83.1 (1.7)	864	91.8 (1.3)
중하	1,538	88.6 (1.3)	666	85.7 (2.2)	872	91.4 (1.3)
중상	1,543	90.3 (1.1)	665	87.1 (1.8)	878	93.4 (1.0)
상	1,516	90.3 (1.1)	655	87.1 (1.8)	861	93.7 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	89.5 (0.7)	2,090	85.9 (1.1)	2,760	93.0 (0.6)
읍면	1,356	88.0 (1.8)	588	85.0 (2.5)	768	91.3 (1.7)
소득수준(표준화)						
하	1,525	87.7 (1.0)	661	83.5 (1.7)	864	92.0 (1.3)
중하	1,538	88.7 (1.4)	666	85.9 (2.2)	872	91.5 (1.2)
중상	1,543	90.4 (1.2)	665	87.2 (1.9)	878	93.7 (0.9)
상	1,516	90.3 (1.1)	655	87.1 (1.8)	861	93.8 (0.9)

1) 영구치우식 경험률 : 1개 이상의 영구치에서 치아우식증(충치)을 경험한 자의 분율 즉, 현재 충치가 있거나, 충치치료를 받은 경험이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-2. 우식경험영구치지수[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 개)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	6,206	6.6 (0.1)	2,678	5.7 (0.1)	3,528	7.5 (0.1)
30세이상	5,448	6.6 (0.1)	2,374	5.6 (0.1)	3,074	7.5 (0.1)
연령(세)						
19-29	758	6.5 (0.2)	304	5.9 (0.4)	454	7.2 (0.2)
30-39	1,230	5.7 (0.1)	508	5.0 (0.2)	722	6.3 (0.2)
40-49	1,150	5.8 (0.1)	526	4.8 (0.2)	624	6.8 (0.2)
50-59	1,164	6.0 (0.2)	480	4.9 (0.3)	684	7.2 (0.3)
60-69	1,011	7.9 (0.3)	468	7.0 (0.4)	543	8.7 (0.3)
70+	893	10.2 (0.3)	392	9.4 (0.5)	501	10.7 (0.4)
19-64	4,810	6.1 (0.1)	2,057	5.3 (0.1)	2,753	7.0 (0.1)
65+	1,396	9.6 (0.3)	621	8.8 (0.4)	775	10.1 (0.4)
거주지역						
동	4,850	6.5 (0.1)	2,090	5.7 (0.2)	2,760	7.3 (0.1)
읍면	1,356	6.9 (0.2)	588	5.8 (0.2)	768	8.1 (0.3)
소득수준[2]						
하	1,525	6.6 (0.2)	661	5.6 (0.2)	864	7.5 (0.2)
중하	1,538	6.5 (0.2)	666	5.7 (0.3)	872	7.4 (0.2)
중상	1,543	6.7 (0.2)	665	5.7 (0.2)	878	7.7 (0.2)
상	1,516	6.5 (0.2)	655	5.7 (0.3)	861	7.4 (0.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	6.5 (0.1)	2,090	5.7 (0.2)	2,760	7.3 (0.1)
읍면	1,356	6.2 (0.2)	588	5.4 (0.2)	768	7.1 (0.3)
소득수준(표준화)						
하	1,525	6.6 (0.2)	661	5.7 (0.2)	864	7.4 (0.2)
중하	1,538	6.5 (0.2)	666	5.7 (0.3)	872	7.2 (0.2)
중상	1,543	6.6 (0.2)	665	5.6 (0.2)	878	7.5 (0.2)
상	1,516	6.4 (0.2)	655	5.7 (0.3)	861	7.1 (0.2)

1) 우식경험영구치지수 : 한 사람당 보유하고 있는 우식경험영구치 수(평균)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-3. 영구치우식 유병률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,925	38.6 (1.4)	6,681	35.2 (0.9)	7,403	33.8 (0.8)	6,206	33.5 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	727	33.7 (2.2)	1,497	29.3 (1.5)	1,658	28.4 (1.4)	1,396	27.5 (1.6)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	589	38.3 (2.6)	1,476	35.7 (1.4)	1,492	35.7 (1.5)	1,325	34.3 (1.7)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,925	39.1 (1.3)	6,681	35.7 (0.9)	7,403	34.3 (0.8)	6,206	34.1 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	329	53.1 (3.1)	872	44.6 (2.1)	1,031	40.5 (1.7)	758	38.6 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	616	41.7 (2.4)	1,384	38.4 (1.6)	1,400	38.6 (1.5)	1,230	38.2 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	549	33.7 (3.0)	1,297	33.1 (1.5)	1,477	31.7 (1.6)	1,150	33.9 (1.8)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	494	29.5 (2.1)	1,116	27.4 (1.7)	1,235	29.1 (1.6)	1,164	28.5 (1.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	479	31.9 (2.4)	1,063	31.3 (1.9)	1,196	27.2 (1.5)	1,011	27.6 (2.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	458	32.7 (2.9)	949	29.0 (1.7)	1,064	28.8 (1.9)	893	27.4 (1.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,061	38.0 (1.7)	4,907	34.4 (1.0)	5,482	33.5 (1.0)	4,850	32.6 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	864	40.5 (2.8)	1,774	38.5 (2.2)	1,921	34.8 (1.7)	1,356	36.7 (2.1)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	691	44.2 (2.2)	1,594	42.3 (1.6)	1,842	40.7 (1.4)	1,525	37.6 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	676	40.9 (2.5)	1,608	36.7 (1.5)	1,847	36.0 (1.4)	1,538	34.5 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	717	38.0 (2.2)	1,639	34.8 (1.6)	1,797	31.5 (1.2)	1,543	30.5 (1.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	689	32.4 (2.1)	1,630	27.5 (1.5)	1,829	26.6 (1.3)	1,516	30.8 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,061	38.3 (1.6)	4,907	34.5 (1.0)	5,482	33.6 (1.0)	4,850	32.8 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	864	42.8 (3.0)	1,774	39.8 (2.5)	1,921	36.7 (2.1)	1,356	39.5 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	691	44.5 (2.0)	1,594	42.5 (1.6)	1,842	41.1 (1.4)	1,525	38.1 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	676	41.3 (2.5)	1,608	37.3 (1.5)	1,847	36.7 (1.5)	1,538	35.3 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	717	38.3 (2.1)	1,639	35.3 (1.6)	1,797	31.8 (1.3)	1,543	30.9 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	689	33.5 (2.1)	1,630	27.9 (1.5)	1,829	27.4 (1.3)	1,516	31.6 (1.7)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,215	41.1 (2.0)	2,787	37.3 (1.3)	3,207	36.9 (1.0)	2,678	37.1 (1.3)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	302	37.6 (3.5)	574	31.9 (2.6)	694	30.2 (1.9)	621	31.6 (2.3)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	253	39.3 (3.4)	634	37.0 (2.1)	644	39.0 (2.0)	602	37.5 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,215	41.6 (2.0)	2,787	37.6 (1.2)	3,207	37.4 (1.0)	2,678	37.5 (1.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	132	57.8 (4.8)	356	46.8 (3.0)	478	44.9 (2.2)	304	41.6 (3.2)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	243	45.6 (3.5)	586	40.3 (2.3)	586	44.6 (2.2)	508	42.2 (2.7)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	241	33.2 (3.7)	565	33.8 (2.3)	634	34.1 (2.3)	526	37.0 (2.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	201	32.8 (3.2)	482	29.8 (2.5)	536	28.3 (2.2)	480	30.7 (2.4)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	214	27.2 (3.3)	438	33.2 (2.8)	538	29.4 (2.2)	468	32.5 (2.9)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	184	41.5 (5.2)	360	33.0 (2.8)	435	29.5 (2.6)	392	31.3 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	843	40.4 (2.4)	2,044	36.2 (1.4)	2,364	36.9 (1.2)	2,090	36.9 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	372	43.8 (3.8)	743	42.1 (2.7)	843	37.2 (2.0)	588	37.8 (2.6)

1) 영구치우식 유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 자의 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 영구치우식 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	289	41.0 (3.2)	664	44.7 (2.4)	811	46.3 (1.9)	661	42.9 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	275	44.6 (3.9)	666	38.7 (2.2)	789	39.2 (2.0)	666	37.6 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	300	40.7 (3.3)	696	36.6 (2.1)	764	33.8 (1.7)	665	31.6 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	296	40.2 (3.4)	677	29.8 (2.2)	800	27.9 (1.9)	655	35.8 (2.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	843	40.7 (2.3)	2,044	36.0 (1.4)	2,364	36.7 (1.2)	2,090	37.0 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	372	46.9 (4.0)	743	42.4 (2.8)	843	39.3 (2.4)	588	38.8 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	289	40.8 (3.0)	664	44.8 (2.4)	811	46.4 (1.9)	661	43.1 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	275	45.1 (3.8)	666	39.0 (2.1)	789	39.9 (2.0)	666	38.3 (2.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	300	41.1 (3.1)	696	36.6 (2.0)	764	34.1 (1.8)	665	32.2 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	296	41.1 (3.4)	677	29.9 (2.2)	800	28.5 (1.8)	655	36.2 (2.4)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,710	36.1 (1.5)	3,894	33.1 (1.0)	4,196	30.6 (1.0)	3,528	30.0 (1.0)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	425	31.0 (2.5)	923	27.4 (1.8)	964	27.1 (1.8)	775	24.6 (2.0)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	336	37.3 (3.4)	842	34.4 (1.9)	848	32.3 (1.8)	723	30.9 (2.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,710	36.7 (1.5)	3,894	33.8 (1.0)	4,196	31.0 (1.0)	3,528	30.7 (1.1)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	48.4 (4.2)	516	42.3 (2.3)	553	35.7 (2.4)	454	35.3 (3.0)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	373	37.5 (3.0)	798	36.4 (2.3)	814	32.1 (1.9)	722	34.1 (2.2)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	308	34.1 (3.8)	732	32.4 (1.9)	843	29.3 (1.8)	624	30.7 (2.1)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	293	26.2 (2.8)	634	25.1 (2.1)	699	29.8 (2.1)	684	26.3 (2.0)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	265	36.0 (3.6)	625	29.5 (2.4)	658	25.3 (1.8)	543	23.1 (2.4)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	274	27.5 (2.9)	589	26.6 (2.2)	629	28.4 (2.2)	501	25.0 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,218	35.9 (1.7)	2,863	32.7 (1.1)	3,118	30.2 (1.1)	2,760	28.4 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	492	37.0 (3.1)	1,031	35.0 (2.2)	1,078	32.3 (2.1)	768	35.6 (2.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	402	47.4 (2.9)	930	39.9 (1.9)	1,031	34.8 (1.9)	864	32.5 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	401	37.7 (2.7)	942	34.8 (1.8)	1,058	33.0 (1.9)	872	31.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	417	35.3 (2.5)	943	33.0 (2.0)	1,033	29.2 (1.7)	878	29.4 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	393	24.1 (2.7)	953	25.2 (1.8)	1,029	25.4 (1.8)	861	25.5 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,218	36.3 (1.7)	2,863	32.9 (1.1)	3,118	30.4 (1.1)	2,760	28.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	492	38.7 (3.3)	1,031	36.2 (2.6)	1,078	33.7 (2.7)	768	40.1 (3.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	402	47.8 (2.7)	930	40.4 (1.9)	1,031	35.2 (2.0)	864	33.4 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	401	37.8 (2.7)	942	35.8 (1.8)	1,058	33.5 (2.0)	872	32.4 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	417	35.8 (2.6)	943	34.1 (2.0)	1,033	29.4 (1.8)	878	30.1 (2.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	393	25.1 (2.8)	953	25.7 (1.8)	1,029	25.9 (1.9)	861	26.1 (2.1)

표 3-VI-4. 영구치우식 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,206	33.5 (0.9)	2,678	37.1 (1.3)	3,528	30.0 (1.0)
30세이상	5,448	32.3 (1.0)	2,374	35.9 (1.3)	3,074	28.8 (1.0)
연령(세)						
19-29	758	38.6 (2.4)	304	41.6 (3.2)	454	35.3 (3.0)
30-39	1,230	38.2 (1.9)	508	42.2 (2.7)	722	34.1 (2.2)
40-49	1,150	33.9 (1.8)	526	37.0 (2.6)	624	30.7 (2.1)
50-59	1,164	28.5 (1.7)	480	30.7 (2.4)	684	26.3 (2.0)
60-69	1,011	27.6 (2.1)	468	32.5 (2.9)	543	23.1 (2.4)
70+	893	27.4 (1.8)	392	31.3 (2.9)	501	25.0 (2.5)
19-64	4,810	34.5 (1.1)	2,057	37.8 (1.4)	2,753	31.1 (1.2)
65+	1,396	27.5 (1.6)	621	31.6 (2.4)	775	24.6 (2.0)
거주지역						
동	4,850	32.6 (1.1)	2,090	36.9 (1.5)	2,760	28.4 (1.2)
읍면	1,356	36.7 (2.1)	588	37.8 (2.6)	768	35.6 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,525	37.6 (1.5)	661	42.9 (2.3)	864	32.5 (1.9)
중하	1,538	34.5 (1.9)	666	37.6 (2.6)	872	31.5 (2.0)
중상	1,543	30.5 (1.8)	665	31.6 (2.3)	878	29.4 (2.3)
상	1,516	30.8 (1.7)	655	35.8 (2.5)	861	25.5 (2.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	32.8 (1.1)	2,090	37.0 (1.5)	2,760	28.6 (1.2)
읍면	1,356	39.5 (2.5)	588	38.8 (3.0)	768	40.1 (3.1)
소득수준(표준화)						
하	1,525	38.1 (1.5)	661	43.1 (2.3)	864	33.4 (2.0)
중하	1,538	35.3 (2.0)	666	38.3 (2.6)	872	32.4 (2.1)
중상	1,543	30.9 (1.9)	665	32.2 (2.3)	878	30.1 (2.5)
상	1,516	31.6 (1.7)	655	36.2 (2.4)	861	26.1 (2.1)

1) 영구치우식 유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 자의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-5. 치면세마필요자율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)
19세이상	5,975	66.3 (1.1)	2,570	71.7 (1.3)	3,405	61.0 (1.4)
30세이상	5,217	70.5 (1.0)	2,266	75.8 (1.2)	2,951	65.4 (1.4)
35-44세	1,324	66.6 (1.7)	601	75.3 (2.0)	723	57.5 (2.5)
연령(세)						
19-29	758	49.9 (2.7)	304	56.6 (3.7)	454	42.8 (3.1)
30-39	1,228	61.4 (1.8)	507	66.8 (2.4)	721	55.8 (2.6)
40-49	1,148	69.7 (1.9)	524	77.2 (2.4)	624	61.9 (2.5)
50-59	1,146	76.5 (1.6)	467	81.9 (2.1)	679	71.1 (2.4)
60-69	962	78.6 (1.8)	440	83.1 (2.2)	522	74.7 (2.3)
70+	733	73.5 (2.5)	328	73.7 (3.4)	405	73.4 (2.8)
19-64	4,772	65.1 (1.1)	2,033	71.1 (1.4)	2739	58.9 (1.5)
65+	1,203	75.0 (2.0)	537	77.3 (2.7)	666	73.4 (2.2)
거주지역						
동	4,725	63.7 (1.2)	2,027	69.6 (1.5)	2698	57.8 (1.5)
읍면	1,250	76.1 (2.5)	543	79.7 (2.6)	707	72.5 (3.1)
소득수준[2]						
하	1,461	66.3 (1.7)	637	72.3 (2.2)	824	60.5 (2.4)
중하	1,476	68.4 (1.8)	636	73.2 (2.4)	840	63.7 (2.1)
중상	1,489	66.4 (1.8)	640	71.8 (2.3)	849	61.2 (2.2)
상	1,468	63.8 (1.8)	628	69.1 (2.2)	840	58.3 (2.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,725	63.5 (1.2)	2,027	69.6 (1.5)	2698	57.4 (1.6)
읍면	1,250	70.5 (2.4)	543	74.2 (2.7)	707	66.4 (3.6)
소득수준(표준화)						
하	1,461	65.2 (1.7)	637	70.8 (2.3)	824	59.5 (2.3)
중하	1,476	67.6 (1.8)	636	72.5 (2.4)	840	62.4 (2.1)
중상	1,489	65.1 (1.9)	640	71.0 (2.3)	849	59.3 (2.3)
상	1,468	63.2 (1.9)	628	68.7 (2.3)	840	57.1 (2.6)

1) 치면세마필요자율 : 치면세마(치석제거)이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-6. 치주질환 유병률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,774	35.5 (1.9)	6,410	33.1 (1.2)	7,095	30.7 (1.0)	5,975	24.1 (1.2)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,445	42.5 (2.2)	5,539	40.5 (1.4)	6,065	37.0 (1.1)	5,217	28.9 (1.3)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	588	33.6 (2.7)	1,475	29.8 (1.9)	1,489	27.4 (1.7)	1,324	20.0 (1.6)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,774	35.0 (1.8)	6,410	32.1 (1.1)	7,095	29.4 (1.0)	5,975	22.9 (1.0)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	2,445	42.4 (2.2)	5,539	40.0 (1.3)	6,065	36.2 (1.2)	5,217	28.0 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	329	9.6 (2.2)	871	5.3 (0.8)	1,030	6.4 (1.0)	758	5.3 (1.1)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	614	24.6 (2.9)	1,381	21.4 (1.6)	1,398	19.0 (1.5)	1,228	12.8 (1.3)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	548	42.9 (3.4)	1,295	39.0 (1.9)	1,475	37.2 (1.7)	1,148	28.0 (1.8)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	485	51.7 (3.5)	1,103	53.2 (2.2)	1,221	49.2 (2.0)	1,146	36.9 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	448	57.6 (3.9)	997	57.2 (2.5)	1,132	47.8 (2.3)	962	41.4 (2.4)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	350	59.4 (3.9)	763	53.7 (2.6)	839	47.4 (2.6)	733	41.4 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,002	35.4 (2.2)	4,785	31.2 (1.3)	5,321	30.0 (1.1)	4,725	21.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	772	36.0 (3.8)	1,625	42.1 (2.7)	1,774	33.9 (2.4)	1,250	35.4 (3.0)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	649	37.8 (2.7)	1,514	37.3 (1.8)	1,748	32.4 (1.5)	1,461	24.8 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	650	37.4 (3.2)	1,540	35.1 (1.6)	1,765	35.0 (1.5)	1,476	25.4 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	682	33.7 (2.6)	1,585	30.0 (1.6)	1,731	29.2 (1.6)	1,489	24.2 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	660	34.1 (2.5)	1,579	30.4 (2.1)	1,773	26.7 (1.4)	1,468	21.5 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,002	35.3 (2.2)	4,785	31.7 (1.3)	5,321	29.9 (1.1)	4,725	21.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	772	34.2 (3.5)	1,625	34.7 (2.2)	1,774	28.2 (2.2)	1,250	28.1 (2.2)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	649	38.0 (2.7)	1,514	37.1 (1.5)	1,748	31.4 (1.4)	1,461	23.8 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	650	37.1 (2.9)	1,540	33.8 (1.5)	1,765	33.4 (1.5)	1,476	24.3 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	682	33.6 (2.4)	1,585	29.7 (1.4)	1,731	28.0 (1.5)	1,489	22.8 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	660	32.6 (2.4)	1,579	29.0 (1.9)	1,773	25.1 (1.4)	1,468	20.1 (1.4)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,153	40.8 (2.1)	2,705	38.8 (1.6)	3,078	36.2 (1.3)	2,570	29.4 (1.5)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,021	49.2 (2.3)	2,350	47.9 (1.8)	2,600	44.1 (1.5)	2,266	35.1 (1.7)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	253	41.2 (3.6)	633	38.0 (2.8)	644	36.3 (2.3)	601	29.1 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,153	40.7 (2.0)	2,705	38.4 (1.4)	3,078	35.4 (1.2)	2,570	28.4 (1.4)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,021	49.8 (2.4)	2,350	47.9 (1.7)	2,600	43.6 (1.5)	2,266	34.4 (1.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	132	9.7 (3.4)	355	5.9 (1.2)	478	7.3 (1.6)	304	8.0 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	243	30.5 (3.8)	584	27.7 (2.3)	586	24.7 (2.2)	507	18.5 (2.0)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	240	49.1 (3.8)	565	49.8 (2.8)	633	48.0 (2.3)	524	36.3 (2.7)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	196	63.6 (4.5)	475	59.9 (3.0)	530	57.2 (2.7)	467	46.8 (2.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	199	64.8 (4.2)	412	64.1 (3.4)	505	53.8 (2.9)	440	44.6 (3.1)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	143	66.9 (5.3)	314	61.9 (3.7)	346	50.9 (3.8)	328	41.3 (3.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	816	40.9 (2.4)	2,004	36.9 (1.8)	2,286	35.4 (1.4)	2,027	26.0 (1.6)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	337	40.5 (4.6)	701	48.1 (3.2)	792	39.4 (2.8)	543	42.2 (3.5)

1) 치주질환 유병률 : 치주조직병치료 이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 치주질환 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	271	45.1 (3.5)	636	43.2 (2.5)	768	37.6 (2.1)	637	30.7 (2.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	261	42.9 (4.0)	644	41.9 (2.4)	758	41.7 (2.1)	636	30.2 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	288	38.6 (3.1)	678	34.2 (2.2)	737	35.6 (2.4)	640	30.6 (2.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	284	38.7 (3.0)	668	36.6 (2.9)	777	30.5 (2.0)	628	25.3 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	816	41.5 (2.4)	2,004	37.8 (1.7)	2,286	35.9 (1.5)	2,027	26.1 (1.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	337	38.2 (4.2)	701	42.3 (2.7)	792	33.7 (2.5)	543	35.0 (2.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	271	45.2 (3.0)	636	43.5 (2.1)	768	37.1 (2.1)	637	29.2 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	261	43.2 (3.6)	644	40.8 (2.2)	758	40.3 (2.0)	636	29.2 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	288	38.2 (2.9)	678	34.9 (1.8)	737	35.0 (2.1)	640	29.7 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	284	38.6 (2.8)	668	35.6 (2.7)	777	29.5 (1.8)	628	24.8 (2.0)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,621	30.3 (2.2)	3,705	27.4 (1.1)	4,017	25.2 (1.0)	3,405	19.0 (1.1)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,424	36.0 (2.6)	3,189	33.2 (1.2)	3,465	30.0 (1.2)	2,951	23.0 (1.3)
35-44세	-	- -	-	- -	-	- -	335	25.5 (3.1)	842	21.3 (1.9)	845	18.0 (1.8)	723	10.6 (1.6)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,621	29.4 (2.1)	3,705	25.9 (1.0)	4,017	23.4 (1.0)	3,405	17.3 (0.9)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,424	35.3 (2.5)	3,189	32.1 (1.2)	3,465	28.7 (1.2)	2,951	21.6 (1.2)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	9.5 (2.2)	516	4.7 (0.9)	552	5.3 (1.0)	454	2.5 (0.8)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	371	18.2 (2.7)	797	14.7 (1.5)	812	12.9 (1.5)	721	7.0 (1.3)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	308	36.5 (4.3)	730	27.8 (2.0)	842	25.9 (1.8)	624	19.4 (1.9)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	289	40.0 (4.3)	628	46.5 (2.4)	691	41.2 (2.4)	679	27.0 (2.2)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	249	51.4 (4.8)	585	51.0 (3.0)	627	42.4 (2.7)	522	38.6 (2.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	207	54.9 (5.0)	449	48.3 (2.9)	493	45.3 (2.9)	405	41.5 (3.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,186	30.2 (2.6)	2,781	25.7 (1.2)	3,035	24.6 (1.1)	2,698	16.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	435	31.1 (3.4)	924	36.0 (2.9)	982	28.2 (2.5)	707	28.9 (3.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	378	30.5 (3.3)	878	31.4 (2.0)	980	26.9 (1.7)	824	19.1 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	389	32.6 (3.7)	896	28.4 (1.8)	1,007	28.6 (1.7)	840	20.7 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	394	28.8 (3.4)	907	25.7 (1.8)	994	22.8 (1.6)	849	18.0 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	376	29.1 (3.4)	911	24.3 (2.0)	996	22.9 (1.6)	840	17.5 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,186	29.5 (2.6)	2,781	25.6 (1.2)	3,035	24.0 (1.1)	2,698	16.0 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	435	29.6 (3.1)	924	27.1 (2.3)	982	22.1 (2.2)	707	20.4 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	378	30.7 (3.2)	878	30.8 (1.7)	980	25.5 (1.5)	824	18.3 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	389	31.8 (3.3)	896	26.9 (1.6)	1,007	26.8 (1.6)	840	19.1 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	394	28.8 (3.1)	907	24.3 (1.6)	994	21.1 (1.4)	849	16.0 (1.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	376	26.6 (3.0)	911	22.6 (1.8)	996	20.6 (1.5)	840	15.0 (1.4)

표 3-VI-7. 치주질환 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	5,975	24.1 (1.2)	2,570	29.4 (1.5)	3,405	19.0 (1.1)
30세이상	5,217	28.9 (1.3)	2,266	35.1 (1.7)	2,951	23.0 (1.3)
35-44세	1,324	20.0 (1.6)	601	29.1 (2.4)	723	10.6 (1.6)
연령(세)						
19-29	758	5.3 (1.1)	304	8.0 (2.0)	454	2.5 (0.8)
30-39	1,228	12.8 (1.3)	507	18.5 (2.0)	721	7.0 (1.3)
40-49	1,148	28.0 (1.8)	524	36.3 (2.7)	624	19.4 (1.9)
50-59	1,146	36.9 (2.1)	467	46.8 (2.9)	679	27.0 (2.2)
60-69	962	41.4 (2.4)	440	44.6 (3.1)	522	38.6 (2.7)
70+	733	41.4 (2.7)	328	41.3 (3.7)	405	41.5 (3.0)
19-64	4,772	21.7 (1.1)	2,033	27.8 (1.6)	2,739	15.4 (1.0)
65+	1,203	41.7 (2.3)	537	43.5 (3.3)	666	40.5 (2.6)
거주지역						
동	4,725	21.1 (1.1)	2,027	26.0 (1.6)	2,698	16.3 (1.0)
읍면	1,250	35.4 (3.0)	543	42.2 (3.5)	707	28.9 (3.3)
소득수준[2]						
하	1,461	24.8 (1.8)	637	30.7 (2.6)	824	19.1 (1.8)
중하	1,476	25.4 (1.9)	636	30.2 (2.3)	840	20.7 (1.9)
중상	1,489	24.2 (1.7)	640	30.6 (2.5)	849	18.0 (1.7)
상	1,468	21.5 (1.5)	628	25.3 (2.1)	840	17.5 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,725	21.1 (1.1)	2,027	26.1 (1.5)	2,698	16.0 (0.9)
읍면	1,250	28.1 (2.2)	543	35.0 (2.7)	707	20.4 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	1,461	23.8 (1.6)	637	29.2 (2.2)	824	18.3 (1.7)
중하	1,476	24.3 (1.7)	636	29.2 (2.1)	840	19.1 (1.7)
중상	1,489	22.8 (1.6)	640	29.7 (2.3)	849	16.0 (1.3)
상	1,468	20.1 (1.4)	628	24.8 (2.0)	840	15.0 (1.4)

1) 치주질환 유병률 : 치주조직병치료 이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-8. 현존 자연치아 수[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 개)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	6,206	25.7 (0.1)	2,678	26.0 (0.2)	3,528	25.3 (0.2)
30세이상	5,448	24.9 (0.2)	2,374	25.2 (0.2)	3,074	24.6 (0.2)
65-74세	958	18.5 (0.3)	436	17.9 (0.5)	522	19.0 (0.5)
연령(세)						
19-29	758	28.8 (0.1)	304	29.2 (0.1)	454	28.4 (0.1)
30-39	1,230	28.6 (0.1)	508	28.8 (0.1)	722	28.4 (0.1)
40-49	1,150	27.6 (0.1)	526	27.4 (0.1)	624	27.7 (0.1)
50-59	1,164	25.1 (0.2)	480	24.8 (0.3)	684	25.5 (0.2)
60-69	1,011	20.9 (0.3)	468	20.9 (0.5)	543	21.0 (0.4)
70+	893	14.2 (0.4)	392	14.4 (0.6)	501	14.1 (0.6)
19-64	4,810	27.2 (0.1)	2,057	27.3 (0.1)	2,753	27.2 (0.1)
65+	1,396	16.0 (0.4)	621	16.1 (0.4)	775	16.0 (0.5)
거주지역						
동	4,850	26.3 (0.1)	2,090	26.5 (0.2)	2,760	26.1 (0.1)
읍면	1,356	23.3 (0.4)	588	24.1 (0.5)	768	22.6 (0.4)
소득수준[2]						
하	1,525	25.5 (0.2)	661	25.9 (0.3)	864	25.2 (0.3)
중하	1,538	25.7 (0.2)	666	26.0 (0.3)	872	25.5 (0.3)
중상	1,543	25.7 (0.2)	665	26.1 (0.3)	878	25.3 (0.3)
상	1,516	25.7 (0.2)	655	26.2 (0.3)	861	25.3 (0.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	26.3 (0.1)	2,090	26.4 (0.1)	2,760	26.3 (0.1)
읍면	1,356	25.6 (0.1)	588	25.7 (0.2)	768	25.6 (0.2)
소득수준(표준화)						
하	1,525	25.9 (0.1)	661	26.0 (0.2)	864	25.8 (0.2)
중하	1,538	26.1 (0.1)	666	26.1 (0.2)	872	26.1 (0.2)
중상	1,543	26.2 (0.1)	665	26.4 (0.2)	878	26.0 (0.1)
상	1,516	26.3 (0.1)	655	26.3 (0.2)	861	26.2 (0.2)

1) 현존 자연치아 수 : 한사람이 현재 보유하고 있는 평균 자연치아 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-9. 20개이상 치아보유율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	보유율(표준오차)	N	보유율(표준오차)	N	보유율(표준오차)
19세이상	6,206	88.3 (0.6)	2,678	89.1 (0.8)	3,528	87.5 (0.8)
30세이상	5,448	85.4 (0.7)	2,374	86.3 (0.9)	3,074	84.6 (0.9)
65-74세	958	56.0 (1.8)	436	54.1 (2.6)	522	57.6 (2.8)
연령(세)						
19-29	758	100.0 (0.0)	304	100.0 (0.0)	454	100.0 (0.0)
30-39	1,230	99.7 (0.2)	508	99.5 (0.3)	722	100.0 (0.0)
40-49	1,150	98.1 (0.5)	526	97.3 (0.8)	624	99.0 (0.4)
50-59	1,164	87.9 (1.1)	480	85.8 (1.8)	684	90.0 (1.3)
60-69	1,011	67.4 (1.9)	468	67.4 (2.8)	543	67.5 (2.4)
70+	893	39.6 (1.9)	392	40.7 (2.9)	501	38.9 (2.8)
19-64	4,810	95.1 (0.4)	2,057	94.7 (0.6)	2,753	95.6 (0.4)
65+	1,396	46.9 (1.7)	621	47.3 (2.1)	775	46.6 (2.6)
거주지역						
동	4,850	91.0 (0.5)	2,090	91.1 (0.7)	2,760	90.9 (0.6)
읍면	1,356	78.6 (1.8)	588	81.7 (2.3)	768	75.6 (1.9)
소득수준[2]						
하	1,525	88.0 (1.1)	661	88.5 (1.4)	864	87.6 (1.3)
중하	1,538	87.8 (1.1)	666	88.0 (1.5)	872	87.6 (1.4)
중상	1,543	88.6 (0.9)	665	90.1 (1.2)	878	87.1 (1.3)
상	1,516	89.1 (1.0)	655	90.2 (1.1)	861	87.9 (1.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	91.1 (0.4)	2,090	90.4 (0.5)	2,760	91.7 (0.4)
읍면	1,356	88.1 (0.7)	588	87.8 (1.1)	768	88.6 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,525	89.3 (0.7)	661	88.5 (1.0)	864	90.0 (0.8)
중하	1,538	89.5 (0.6)	666	88.5 (1.1)	872	90.5 (0.8)
중상	1,543	90.5 (0.6)	665	91.1 (0.9)	878	90.2 (0.8)
상	1,516	91.3 (0.6)	655	90.9 (0.8)	861	91.7 (0.7)

1) 20개이상 치아보유율 : 20개 이상의 자연치아를 보유하고 있는 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-10. 의치필요자율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)
19세이상	6,206	15.4 (0.6)	2,678	17.1 (1.0)	3,528	13.8 (0.7)
60세이상	1,904	25.2 (1.3)	860	28.2 (2.1)	1,044	23.0 (1.5)
연령(세)						
19-29	758	7.0 (1.1)	304	6.2 (1.6)	454	7.9 (1.6)
30-39	1,230	7.4 (0.9)	508	8.7 (1.5)	722	6.2 (1.0)
40-49	1,150	16.0 (1.5)	526	19.0 (2.2)	624	12.9 (1.6)
50-59	1,164	22.7 (1.5)	480	26.7 (2.3)	684	18.7 (1.8)
60-69	1,011	24.2 (2.0)	468	27.0 (2.9)	543	21.7 (2.3)
70+	893	26.3 (1.7)	392	29.8 (2.6)	501	24.2 (1.9)
19-64	4,810	13.7 (0.7)	2,057	15.4 (1.0)	2,753	11.9 (0.8)
65+	1,396	26.1 (1.4)	621	29.5 (2.3)	775	23.7 (1.5)
거주지역						
동	4,850	13.7 (0.6)	2,090	15.7 (1.0)	2,760	11.8 (0.7)
읍면	1,356	21.7 (1.6)	588	22.3 (2.3)	768	21.1 (1.8)
소득수준[2]						
하	1,525	19.2 (1.3)	661	21.7 (1.9)	864	16.9 (1.5)
중하	1,538	15.5 (1.1)	666	16.0 (1.8)	872	15.1 (1.3)
중상	1,543	14.8 (1.1)	665	16.3 (1.9)	878	13.3 (1.3)
상	1,516	11.3 (1.2)	655	12.6 (1.6)	861	10.0 (1.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,850	13.5 (0.6)	2,090	15.7 (1.0)	2,760	11.4 (0.7)
읍면	1,356	18.0 (1.7)	588	18.9 (2.3)	768	17.1 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	1,525	18.1 (1.2)	661	20.2 (1.6)	864	16.0 (1.5)
중하	1,538	14.6 (1.1)	666	15.2 (1.7)	872	13.8 (1.3)
중상	1,543	13.8 (1.0)	665	15.8 (1.7)	878	12.1 (1.2)
상	1,516	10.6 (1.2)	655	12.1 (1.6)	861	8.7 (1.2)

1) 의치필요자율 : 상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-11. 저작불편호소율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,978	29.2 (1.1)	6,794	29.6 (0.9)	7,479	28.1 (0.7)	6,197	25.4 (0.9)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,640	32.2 (1.2)	5,902	33.6 (1.0)	6,430	31.9 (0.8)	5,443	28.5 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	721	56.1 (2.5)	1,510	60.0 (1.6)	1,655	56.5 (1.5)	1,395	44.3 (1.6)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	2,978	28.5 (1.0)	6,794	28.4 (0.7)	7,479	26.7 (0.6)	6,197	23.9 (0.8)
30세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,640	31.7 (1.1)	5,902	32.6 (0.8)	6,430	30.6 (0.7)	5,443	27.2 (0.9)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	338	17.7 (2.5)	892	14.2 (1.3)	1,049	13.1 (1.1)	754	12.6 (1.5)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	634	17.5 (1.6)	1,411	15.9 (1.2)	1,425	15.1 (1.1)	1,226	13.3 (1.2)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	565	25.1 (1.9)	1,327	25.1 (1.3)	1,495	24.2 (1.2)	1,151	25.0 (1.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	504	37.8 (2.7)	1,133	43.2 (1.6)	1,248	38.4 (1.7)	1,164	34.5 (1.9)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	489	53.8 (3.3)	1,076	50.9 (2.2)	1,206	48.9 (2.0)	1,011	39.6 (2.2)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	448	55.7 (2.4)	955	63.5 (1.9)	1,056	60.3 (1.7)	891	47.3 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,115	27.4 (1.1)	4,996	27.4 (0.9)	5,559	26.2 (0.8)	4,839	23.2 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	35.9 (3.0)	1,798	39.7 (2.5)	1,920	36.2 (2.0)	1,358	33.3 (2.0)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	712	34.9 (2.0)	1,629	34.3 (1.5)	1,865	30.3 (1.3)	1,525	28.1 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	696	36.7 (2.2)	1,632	31.4 (1.5)	1,859	32.2 (1.4)	1,533	26.0 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	25.7 (1.9)	1,665	28.7 (1.5)	1,819	27.6 (1.1)	1,540	24.6 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	701	19.9 (1.7)	1,657	23.4 (1.3)	1,855	22.6 (1.2)	1,516	22.1 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,115	27.2 (1.0)	4,996	27.7 (0.8)	5,559	26.2 (0.7)	4,839	22.9 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	33.1 (2.3)	1,798	30.7 (1.8)	1,920	27.4 (1.1)	1,358	26.9 (1.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	712	34.7 (1.9)	1,629	33.8 (1.3)	1,865	29.1 (1.1)	1,525	26.6 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	696	36.4 (2.0)	1,632	30.0 (1.3)	1,859	30.1 (1.1)	1,533	24.4 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	731	25.6 (1.7)	1,665	28.1 (1.3)	1,819	26.4 (1.0)	1,540	23.1 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	701	18.9 (1.6)	1,657	22.1 (1.2)	1,855	21.0 (1.1)	1,516	20.8 (1.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,240	28.2 (1.4)	2,834	28.5 (1.2)	3,235	27.4 (0.9)	2,673	25.8 (1.3)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,100	31.4 (1.6)	2,468	32.4 (1.3)	2,750	31.4 (1.0)	2,369	29.4 (1.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	301	60.7 (3.5)	580	55.2 (2.4)	690	52.4 (2.1)	620	42.1 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,240	28.5 (1.4)	2,834	28.3 (1.1)	3,235	26.8 (0.8)	2,673	24.8 (1.2)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,100	32.0 (1.5)	2,468	32.3 (1.2)	2,750	31.1 (0.9)	2,369	28.5 (1.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	140	16.5 (3.4)	366	14.3 (2.0)	485	12.4 (1.6)	304	11.9 (2.4)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	247	17.8 (2.0)	596	16.6 (1.8)	595	15.1 (1.7)	506	14.2 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	248	27.4 (2.9)	578	25.6 (2.1)	642	27.2 (1.7)	525	26.8 (2.4)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	205	35.3 (3.9)	489	43.8 (2.5)	543	39.5 (2.3)	480	39.9 (2.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	217	49.1 (4.7)	440	49.1 (3.1)	539	47.3 (2.5)	467	36.9 (3.2)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	183	61.6 (4.0)	365	58.3 (2.9)	431	55.7 (2.8)	391	46.2 (3.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	26.7 (1.6)	2,077	26.6 (1.2)	2,390	25.5 (1.0)	2,084	23.6 (1.4)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	33.9 (3.3)	757	37.0 (3.2)	845	35.1 (2.2)	589	33.7 (3.0)

1) 저작불편 호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저작불편호소율 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	34.3 (2.8)	679	33.5 (2.4)	818	29.2 (1.7)	660	27.7 (2.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	37.1 (3.2)	674	30.0 (2.0)	800	30.2 (1.8)	664	29.2 (2.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	26.0 (2.7)	707	28.1 (2.1)	772	27.9 (1.7)	664	23.9 (2.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	17.1 (2.3)	690	22.3 (1.8)	806	22.4 (1.6)	654	21.0 (2.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	867	27.4 (1.5)	2,077	27.7 (1.2)	2,390	26.1 (0.9)	2,084	23.6 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	32.1 (2.9)	757	30.4 (3.0)	845	28.5 (1.7)	589	28.4 (3.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	34.6 (2.6)	679	33.6 (2.2)	818	28.8 (1.5)	660	26.2 (1.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	37.4 (2.9)	674	29.2 (1.8)	800	29.1 (1.5)	664	27.6 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	27.0 (2.5)	707	28.7 (1.9)	772	27.7 (1.6)	664	23.0 (2.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	17.2 (2.2)	690	22.0 (1.6)	806	21.9 (1.5)	654	20.5 (1.9)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	30.1 (1.4)	3,960	30.7 (1.0)	4,244	28.9 (0.9)	3,524	25.0 (1.0)
30세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,540	33.0 (1.6)	3,434	34.8 (1.1)	3,680	32.4 (1.0)	3,074	27.7 (1.1)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	420	53.0 (3.3)	930	63.3 (1.8)	965	59.2 (1.9)	775	45.9 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	28.7 (1.3)	3,960	28.4 (0.8)	4,244	26.3 (0.8)	3,524	22.9 (0.9)
30세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,540	31.5 (1.5)	3,434	32.6 (0.9)	3,680	30.0 (0.8)	3,074	25.7 (1.0)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	198	18.9 (3.5)	526	14.0 (1.7)	564	13.8 (1.6)	450	13.3 (1.9)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	387	17.1 (2.4)	815	15.1 (1.4)	830	15.1 (1.4)	720	12.5 (1.5)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	317	22.7 (2.4)	749	24.5 (1.7)	853	21.0 (1.6)	626	23.1 (2.2)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	299	40.2 (3.8)	644	42.6 (2.1)	705	37.2 (2.1)	684	29.0 (2.0)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	272	57.9 (3.6)	636	52.5 (2.5)	667	50.5 (2.5)	544	42.0 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	265	52.2 (3.5)	590	66.7 (2.2)	625	63.1 (2.1)	500	48.1 (2.5)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,248	28.0 (1.4)	2,919	28.2 (1.1)	3,169	26.9 (1.0)	2,755	22.8 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	38.0 (4.0)	1,041	42.3 (2.6)	1,075	37.3 (2.5)	769	33.0 (2.3)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	412	35.5 (3.1)	950	35.2 (2.0)	1,047	31.3 (1.8)	865	28.5 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	36.3 (3.0)	958	32.7 (1.9)	1,059	34.0 (1.9)	869	22.9 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	25.4 (2.7)	958	29.3 (1.8)	1,047	27.3 (1.5)	876	25.2 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	23.0 (2.4)	967	24.4 (1.5)	1,049	22.7 (1.6)	862	23.3 (1.9)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,248	27.1 (1.3)	2,919	27.6 (0.9)	3,169	26.0 (0.9)	2,755	22.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	34.9 (3.4)	1,041	30.7 (1.4)	1,075	26.1 (1.4)	769	25.2 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	412	35.0 (2.9)	950	33.9 (1.9)	1,047	29.3 (1.5)	865	26.8 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	35.2 (2.7)	958	30.6 (1.5)	1,059	31.1 (1.6)	869	20.8 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	24.7 (2.4)	958	27.4 (1.6)	1,047	24.9 (1.2)	876	23.3 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	20.6 (2.0)	967	21.9 (1.3)	1,049	19.9 (1.4)	862	20.9 (1.7)

표 3-VI-12. 저작불편호소율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)
19세이상	6,197	25.4 (0.9)	2,673	25.8 (1.3)	3,524	25.0 (1.0)
30세이상	5,443	28.5 (1.0)	2,369	29.4 (1.4)	3,074	27.7 (1.1)
연령(세)						
19-29	754	12.6 (1.5)	304	11.9 (2.4)	450	13.3 (1.9)
30-39	1,226	13.3 (1.2)	506	14.2 (1.9)	720	12.5 (1.5)
40-49	1,151	25.0 (1.6)	525	26.8 (2.4)	626	23.1 (2.2)
50-59	1,164	34.5 (1.9)	480	39.9 (2.7)	684	29.0 (2.0)
60-69	1,011	39.6 (2.2)	467	36.9 (3.2)	544	42.0 (2.6)
70+	891	47.3 (2.0)	391	46.2 (3.3)	500	48.1 (2.5)
19-64	4,802	22.3 (0.9)	2,053	23.6 (1.3)	2,749	20.9 (1.0)
65+	1,395	44.3 (1.6)	620	42.1 (2.4)	775	45.9 (2.2)
거주지역						
동	4,839	23.2 (1.0)	2,084	23.6 (1.4)	2,755	22.8 (1.1)
읍면	1,358	33.3 (2.0)	589	33.7 (3.0)	769	33.0 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,525	28.1 (1.4)	660	27.7 (2.2)	865	28.5 (1.9)
중하	1,533	26.0 (1.5)	664	29.2 (2.4)	869	22.9 (1.9)
중상	1,540	24.6 (1.4)	664	23.9 (2.1)	876	25.2 (1.7)
상	1,516	22.1 (1.5)	654	21.0 (2.0)	862	23.3 (1.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,839	22.9 (0.9)	2,084	23.6 (1.3)	2,755	22.1 (1.1)
읍면	1,358	26.9 (1.8)	589	28.4 (3.0)	769	25.2 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	1,525	26.6 (1.2)	660	26.2 (1.7)	865	26.8 (1.8)
중하	1,533	24.4 (1.3)	664	27.6 (2.2)	869	20.8 (1.6)
중상	1,540	23.1 (1.4)	664	23.0 (2.1)	876	23.3 (1.7)
상	1,516	20.8 (1.5)	654	20.5 (1.9)	862	20.9 (1.7)

1) 저작불편 호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-13. 구강검진율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	검진율(표준오차)	N	검진율(표준오차)	N	검진율(표준오차)
19세이상	6,205	21.5 (1.1)	2,679	22.9 (1.2)	3,526	20.1 (1.2)
30세이상	5,451	22.1 (1.2)	2,375	24.4 (1.3)	3,076	19.8 (1.2)
35-44세	1,327	27.0 (1.5)	602	28.5 (2.1)	725	25.4 (1.9)
65-74세	961	15.1 (1.7)	437	17.2 (2.8)	524	13.3 (1.8)
연령(세)						
19-29	754	19.0 (1.9)	304	17.1 (2.2)	450	21.0 (2.8)
30-39	1,230	25.6 (1.6)	508	28.6 (2.2)	722	22.4 (2.0)
40-49	1,152	26.3 (1.7)	526	26.8 (2.3)	626	25.9 (2.1)
50-59	1,163	21.6 (2.0)	480	23.7 (2.6)	683	19.6 (2.0)
60-69	1,014	16.9 (2.1)	469	18.5 (2.6)	545	15.5 (2.3)
70+	892	10.9 (1.6)	392	14.5 (2.6)	500	8.7 (1.6)
19-64	4,807	23.0 (1.1)	2,057	23.9 (1.3)	2,750	22.0 (1.3)
65+	1,398	12.3 (1.4)	622	15.2 (2.3)	776	10.2 (1.4)
거주지역						
동	4,847	22.6 (1.0)	2,090	24.1 (1.3)	2,757	21.1 (1.2)
읍면	1,358	17.4 (3.2)	589	18.7 (3.2)	769	16.3 (3.5)
소득수준[2]						
하	1,528	16.5 (1.6)	662	16.0 (1.9)	866	17.0 (1.8)
중하	1,535	19.6 (1.5)	666	21.0 (2.1)	869	18.3 (1.7)
중상	1,541	24.0 (1.5)	665	27.5 (2.1)	876	20.5 (1.7)
상	1,518	27.1 (1.6)	655	28.5 (2.4)	863	25.6 (1.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,847	22.5 (1.0)	2,090	23.8 (1.2)	2,757	21.3 (1.2)
읍면	1,358	18.5 (3.1)	589	18.5 (2.9)	769	18.6 (4.0)
소득수준(표준화)						
하	1,528	16.7 (1.6)	662	16.3 (2.0)	866	17.2 (1.8)
중하	1,535	19.9 (1.5)	666	20.7 (2.0)	869	19.2 (1.8)
중상	1,541	24.6 (1.5)	665	27.6 (2.1)	876	21.8 (1.8)
상	1,518	27.6 (1.6)	655	28.7 (2.4)	863	26.3 (1.9)

1) 구강검진율 : 최근 1년 이내 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VI-14. 칫솔질 실천율[1] : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체(N)	아침식사		점심식사		저녁식사		간식 후		잠자기 전	
		전	후	전	후	전	후				
		실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)		실천율(표준오차)	
19세이상	6,080	19.6 (1.1)	74.7 (1.2)	0.9 (0.2)	39.6 (1.1)	1.9 (0.3)	67.9 (1.6)	1.2	(0.2)	29.1	(1.6)
30세이상	5,332	18.8 (1.1)	75.9 (1.2)	0.6 (0.2)	37.2 (1.2)	1.9 (0.3)	68.4 (1.7)	0.9	(0.1)	26.8	(1.6)
성별											
남자	2,618	21.3 (1.4)	71.1 (1.5)	0.8 (0.2)	34.4 (1.3)	1.9 (0.3)	65.8 (1.6)	0.5	(0.1)	27.8	(1.7)
여자	3,462	18.0 (1.1)	78.2 (1.3)	1.0 (0.3)	44.7 (1.4)	1.8 (0.5)	70.0 (1.8)	1.9	(0.4)	30.4	(1.7)
연령(세)											
19-29	748	22.9 (2.0)	69.9 (2.3)	2.1 (0.6)	49.4 (2.1)	1.9 (0.5)	66.1 (2.2)	2.5	(0.6)	38.4	(2.3)
30-39	1,227	21.4 (1.8)	72.4 (1.9)	0.8 (0.4)	45.0 (1.8)	1.7 (0.6)	69.4 (2.3)	1.2	(0.3)	33.2	(2.2)
40-49	1,148	18.0 (1.6)	77.8 (1.8)	0.7 (0.3)	43.1 (2.0)	2.1 (0.6)	73.3 (1.9)	0.8	(0.3)	25.6	(1.9)
50-59	1,145	17.2 (1.5)	78.1 (1.7)	0.3 (0.1)	31.7 (1.7)	2.3 (0.6)	68.8 (2.2)	0.8	(0.3)	25.7	(2.3)
60-69	997	18.5 (1.7)	76.7 (2.2)	0.6 (0.2)	27.6 (2.1)	1.4 (0.6)	63.9 (2.9)	0.8	(0.3)	23.2	(2.7)
70+	815	18.4 (2.1)	73.7 (2.2)	0.3 (0.2)	26.4 (2.5)	1.3 (0.6)	57.9 (2.9)	0.5	(0.2)	20.6	(2.4)
19-64	4,767	19.9 (1.1)	74.6 (1.3)	1.0 (0.3)	41.7 (1.1)	2.0 (0.4)	69.1 (1.5)	1.3	(0.2)	30.5	(1.6)
65+	1,313	18.0 (1.8)	75.4 (2.0)	0.3 (0.2)	26.3 (1.9)	1.2 (0.4)	60.3 (2.6)	0.5	(0.2)	20.2	(2.1)
거주지역											
동	4,804	20.6 (1.2)	75.2 (1.2)	0.9 (0.3)	42.7 (1.0)	1.8 (0.3)	68.5 (1.5)	1.4	(0.2)	30.6	(1.4)
읍면	1,276	16.2 (2.5)	72.8 (3.5)	0.7 (0.3)	28.3 (2.8)	2.2 (0.7)	65.9 (4.6)	0.4	(0.2)	23.6	(4.7)
소득수준[2]											
하	1,493	17.9 (1.5)	74.0 (1.8)	0.8 (0.3)	35.8 (2.0)	1.7 (0.6)	67.6 (1.9)	1.2	(0.4)	27.4	(2.1)
중하	1,501	18.2 (1.5)	74.6 (1.8)	1.2 (0.4)	39.0 (1.7)	1.7 (0.4)	67.7 (2.1)	1.3	(0.4)	29.2	(1.9)
중상	1,512	20.0 (2.0)	75.8 (1.9)	0.9 (0.3)	41.7 (1.5)	2.0 (0.5)	68.7 (2.1)	1.0	(0.3)	30.9	(2.2)
상	1,492	22.5 (1.8)	74.7 (1.7)	0.7 (0.3)	42.5 (1.8)	2.1 (0.5)	68.2 (2.1)	1.3	(0.3)	29.1	(2.0)
거주지역(표준화)[3]											
동	4,804	20.7 (1.2)	75.0 (1.2)	1.0 (0.3)	42.8 (1.0)	1.8 (0.3)	68.4 (1.5)	1.4	(0.2)	30.7	(1.4)
읍면	1,276	15.9 (2.8)	74.0 (3.7)	1.0 (0.5)	32.4 (3.1)	2.2 (0.7)	70.0 (4.2)	0.4	(0.2)	24.6	(4.4)
소득수준(표준화)											
하	1,493	18.0 (1.5)	73.6 (1.8)	0.8 (0.4)	36.5 (2.0)	1.7 (0.5)	67.4 (1.9)	1.2	(0.4)	28.1	(2.1)
중하	1,501	18.4 (1.6)	74.2 (1.8)	1.3 (0.4)	39.9 (1.7)	1.7 (0.4)	67.8 (2.1)	1.4	(0.4)	29.9	(1.9)
중상	1,512	20.3 (2.0)	75.5 (2.0)	0.9 (0.4)	43.1 (1.5)	2.1 (0.5)	69.0 (2.1)	1.1	(0.3)	31.3	(2.2)
상	1,492	22.7 (1.8)	74.6 (1.7)	0.7 (0.3)	43.5 (1.7)	2.2 (0.6)	68.6 (2.1)	1.4	(0.4)	29.5	(2.0)

1) 칫솔질 실천율 : 어제 하루 동안 시기별 칫솔질을 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VII-1. B형간염 표면항원 양성률[1] 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
10세이상	9,771	4.5(0.3)	7,918	4.4(0.3)	6,404	3.7(0.3)	3,480	3.7(0.4)	7,670	3.0(0.2)	8,304	3.2(0.3)	6,815	3.0(0.3)
30세이상	6,469	5.0(0.3)	5,406	4.9(0.4)	4,760	4.2(0.4)	2,645	4.5(0.5)	5,739	3.9(0.3)	6,171	4.0(0.3)	5,203	3.7(0.3)
10세이상(표준화)[2]	9,771	4.6(0.3)	7,918	4.5(0.3)	6,404	3.7(0.3)	3,480	3.7(0.4)	7,670	2.9(0.2)	8,304	3.2(0.3)	6,815	2.9(0.3)
30세이상(표준화)	6,469	4.9(0.3)	5,406	5.0(0.4)	4,760	4.2(0.4)	2,645	4.5(0.5)	5,739	3.9(0.3)	6,171	4.0(0.3)	5,203	3.7(0.3)
연령(세)														
10-18	1,654	2.2(0.4)	1,319	2.0(0.5)	904	0.4(0.2)	494	1.9(0.7)	1,056	0.6(0.3)	1,118	0.2(0.1)	873	0.1(0.1)
19-29	1,648	5.1(0.7)	1,193	4.5(0.7)	740	4.3(0.9)	341	2.1(0.8)	875	1.4(0.4)	1,015	2.4(0.7)	739	2.1(0.6)
30-39	1,968	6.1(0.5)	1,643	5.2(0.6)	1,220	4.5(0.7)	640	4.4(0.9)	1,383	3.1(0.5)	1,385	4.4(0.6)	1,205	3.9(0.6)
40-49	1,630	5.1(0.5)	1,505	6.5(0.8)	1,336	4.4(0.6)	575	4.3(1.1)	1,308	5.4(0.8)	1,475	4.7(0.6)	1,137	3.7(0.6)
50-59	1,260	5.3(0.7)	934	5.0(0.7)	909	5.7(1.0)	508	6.5(1.7)	1,116	4.4(0.7)	1,218	3.6(0.6)	1,144	4.2(0.7)
60-69	1,007	2.9(0.6)	793	2.7(0.6)	796	3.4(0.8)	481	3.1(0.8)	1,047	3.6(0.7)	1,159	3.2(0.6)	981	4.0(0.8)
70+	604	2.3(0.6)	531	3.2(0.9)	499	1.1(0.5)	441	3.3(0.9)	885	1.3(0.4)	934	2.6(0.6)	736	1.8(0.5)
거주지역														
동	6,353	4.4(0.3)	6,141	4.5(0.3)	5,003	3.8(0.4)	2,504	3.7(0.5)	5,716	3.0(0.2)	6,282	3.2(0.3)	5,419	3.1(0.3)
읍면	3,418	5.0(0.6)	1,777	4.1(0.5)	1,401	3.0(0.6)	976	3.9(0.7)	1,954	3.3(0.5)	2,022	3.3(0.6)	1,396	2.7(0.5)
소득수준[3]														
하	2,268	3.7(0.5)	1,763	4.4(0.5)	1,608	3.9(0.6)	829	3.0(0.7)	1,827	2.9(0.4)	2,041	3.1(0.4)	1,656	2.5(0.4)
중하	2,506	4.3(0.5)	1,816	4.0(0.6)	1,606	4.3(0.7)	817	3.6(0.8)	1,853	3.7(0.5)	2,050	3.5(0.6)	1,669	2.7(0.4)
중상	2,486	5.1(0.6)	1,948	4.0(0.6)	1,573	3.0(0.5)	835	4.7(0.9)	1,890	2.9(0.4)	2,045	2.5(0.4)	1,697	3.3(0.5)
상	2,511	4.8(0.5)	1,925	5.0(0.8)	1,554	3.6(0.5)	816	3.3(0.7)	1,865	2.6(0.4)	2,083	3.8(0.5)	1,694	3.7(0.6)
거주지역(표준화)														
동	6,353	4.3(0.3)	6,141	4.5(0.3)	5,003	3.8(0.3)	2,504	3.6(0.5)	5,716	2.9(0.2)	6,282	3.1(0.3)	5,419	3.0(0.3)
읍면	3,418	5.3(0.6)	1,777	4.2(0.6)	1,401	3.0(0.6)	976	3.9(0.8)	1,954	3.3(0.6)	2,022	3.5(0.7)	1,396	2.5(0.5)
소득수준(표준화)														
하	2,268	3.7(0.5)	1,763	4.5(0.5)	1,608	3.8(0.6)	829	3.0(0.7)	1,827	2.8(0.4)	2,041	3.0(0.4)	1,656	2.4(0.5)
중하	2,506	4.3(0.5)	1,816	3.9(0.6)	1,606	4.3(0.7)	817	3.6(0.8)	1,853	3.6(0.5)	2,050	3.5(0.6)	1,669	2.7(0.4)
중상	2,486	5.1(0.6)	1,948	4.1(0.6)	1,573	3.0(0.5)	835	4.5(0.9)	1,890	2.9(0.4)	2,045	2.5(0.4)	1,697	3.1(0.5)
상	2,511	4.9(0.5)	1,925	5.1(0.8)	1,554	3.5(0.5)	816	3.3(0.7)	1,865	2.6(0.4)	2,083	3.8(0.5)	1,694	3.6(0.6)
남자														
10세이상	4,514	5.1(0.4)	3,568	4.7(0.4)	2,826	4.4(0.5)	1,511	4.3(0.6)	3,357	3.3(0.3)	3,724	3.7(0.4)	3,064	2.7(0.4)
30세이상	2,938	5.6(0.5)	2,367	5.2(0.5)	2,039	4.9(0.6)	1,106	5.2(0.8)	2,422	4.3(0.5)	2,668	4.6(0.5)	2,294	3.6(0.5)
10세이상(표준화)	4,514	5.1(0.4)	3,568	4.9(0.4)	2,826	4.4(0.5)	1,511	4.2(0.6)	3,357	3.2(0.3)	3,724	3.6(0.4)	3,064	2.7(0.4)
30세이상(표준화)	2,938	5.4(0.5)	2,367	5.3(0.5)	2,039	4.8(0.6)	1,106	5.1(0.8)	2,422	4.3(0.5)	2,668	4.5(0.5)	2,294	3.6(0.5)
연령(세)														
10-18	853	1.7(0.4)	688	2.7(0.9)	482	0.5(0.3)	263	1.9(1.0)	572	0.8(0.4)	581	0.2(0.2)	476	0.1(0.1)
19-29	723	6.7(1.2)	513	5.0(1.2)	305	5.7(1.4)	142	2.9(1.4)	363	1.5(0.5)	475	2.9(1.0)	294	1.2(0.7)
30-39	923	6.2(0.8)	716	6.1(1.0)	497	5.5(1.1)	250	6.0(1.5)	588	3.0(0.7)	587	4.9(1.0)	508	4.3(1.0)
40-49	775	6.3(0.9)	679	6.1(1.0)	594	4.9(1.0)	256	3.5(1.3)	576	6.2(1.1)	631	5.8(1.0)	526	4.1(1.0)
50-59	575	6.4(1.0)	428	5.2(1.0)	407	6.4(1.4)	208	8.0(3.0)	482	5.3(1.1)	540	4.5(1.0)	467	3.7(1.0)
60-69	445	2.9(0.9)	353	3.4(1.0)	370	2.7(0.9)	213	3.1(1.5)	426	3.5(1.1)	520	3.1(0.8)	457	2.0(0.7)
70+	220	1.8(0.9)	191	3.1(1.3)	171	1.8(1.0)	179	4.6(1.5)	350	1.5(0.7)	390	1.8(0.7)	336	1.8(0.7)
거주지역														
동	2,969	5.0(0.5)	2,756	4.7(0.5)	2,206	4.5(0.5)	1,075	4.3(0.8)	2,505	3.2(0.4)	2,809	3.8(0.5)	2,432	2.8(0.4)
읍면	1,545	5.5(0.8)	812	4.6(0.8)	620	3.7(1.1)	436	4.1(1.0)	852	3.8(0.7)	915	3.4(0.7)	632	2.4(0.7)

1) B형간염 표면항원 양성률 : B형간염 표면항원 양성인 분율, 만10세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : B형간염 표면항원 양성률 추이, 성별, 만10세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	1,040	3.8(0.6)	784	5.5(0.8)	720	4.8(1.1)	360	3.0(0.9)	801	3.3(0.7)	923	3.2(0.6)	747	1.4(0.5)
중하	1,155	5.0(0.7)	831	3.8(0.8)	694	4.5(0.9)	354	3.5(1.0)	796	4.0(0.7)	909	3.9(0.9)	753	3.7(0.7)
중상	1,199	5.1(0.7)	902	3.9(0.7)	685	3.4(0.9)	365	6.4(1.6)	834	3.4(0.7)	907	2.9(0.7)	766	2.5(0.6)
상	1,120	6.1(0.8)	844	5.1(1.0)	698	4.5(0.9)	364	3.6(1.1)	824	2.7(0.5)	942	4.8(0.8)	756	3.7(0.9)
거주지역(표준화)														
동	2,969	4.9(0.5)	2,756	4.8(0.5)	2,206	4.5(0.5)	1,075	4.3(0.7)	2,505	3.1(0.3)	2,809	3.7(0.5)	2,432	2.8(0.4)
읍면	1,545	6.1(0.9)	812	4.8(0.9)	620	3.5(1.0)	436	4.1(1.1)	852	3.6(0.7)	915	3.4(0.8)	632	2.2(0.7)
소득수준(표준화)														
하	1,040	3.9(0.7)	784	5.8(0.8)	720	4.8(1.1)	360	3.0(1.0)	801	3.2(0.7)	923	3.1(0.6)	747	1.4(0.5)
중하	1,155	4.9(0.7)	831	3.8(0.8)	694	4.4(0.9)	354	3.5(0.9)	796	3.9(0.7)	909	3.8(0.9)	753	3.5(0.7)
중상	1,199	5.1(0.7)	902	4.1(0.8)	685	3.5(0.9)	365	6.3(1.6)	834	3.2(0.7)	907	2.9(0.7)	766	2.4(0.6)
상	1,120	6.3(0.8)	844	5.4(1.0)	698	4.4(0.9)	364	3.6(1.1)	824	2.6(0.5)	942	4.7(0.8)	756	3.6(0.9)
여자														
10세이상	5,257	4.0(0.3)	4,350	4.1(0.4)	3,578	3.0(0.4)	1,969	3.2(0.5)	4,313	2.7(0.3)	4,580	2.7(0.3)	3,751	3.2(0.4)
30세이상	3,531	4.4(0.4)	3,039	4.7(0.5)	2,721	3.6(0.4)	1,539	3.8(0.5)	3,317	3.4(0.4)	3,503	3.4(0.3)	2,909	3.8(0.5)
10세이상(표준화)	5,257	4.0(0.3)	4,350	4.2(0.4)	3,578	3.0(0.4)	1,969	3.1(0.4)	4,313	2.7(0.3)	4,580	2.7(0.3)	3,751	3.1(0.4)
30세이상(표준화)	3,531	4.4(0.4)	3,039	4.8(0.5)	2,721	3.6(0.4)	1,539	3.9(0.5)	3,317	3.5(0.4)	3,503	3.4(0.4)	2,909	3.7(0.4)
연령(세)														
10-18	801	2.7(0.7)	631	1.1(0.4)	422	0.4(0.3)	231	2.0(1.0)	484	0.5(0.3)	537	0.2(0.2)	397	0.2(0.2)
19-29	925	3.8(0.8)	680	4.2(0.9)	435	2.7(1.0)	199	1.2(0.7)	512	1.4(0.5)	540	1.9(0.6)	445	3.1(0.9)
30-39	1,045	6.0(0.8)	927	4.6(0.7)	723	3.4(0.9)	390	2.8(0.7)	795	3.2(0.7)	798	3.8(0.8)	697	3.4(0.7)
40-49	855	3.9(0.6)	826	6.8(1.2)	742	3.8(0.7)	319	5.1(1.3)	732	4.4(0.9)	844	3.7(0.6)	611	3.2(0.9)
50-59	685	4.2(0.8)	506	4.7(1.0)	502	5.0(1.5)	300	5.1(1.6)	634	3.5(0.9)	678	2.8(0.6)	677	4.7(1.1)
60-69	562	2.9(0.7)	440	2.0(0.9)	426	4.1(1.0)	268	3.0(0.9)	621	3.8(1.0)	639	3.2(0.8)	524	5.8(1.3)
70+	384	2.6(0.8)	340	3.2(1.3)	328	0.7(0.5)	262	2.4(1.2)	535	1.2(0.6)	544	3.1(0.9)	400	1.8(0.7)
거주지역														
동	3,384	3.9(0.4)	3,385	4.3(0.5)	2,797	3.1(0.4)	1,429	3.0(0.5)	3,211	2.7(0.3)	3,473	2.6(0.3)	2,987	3.3(0.4)
읍면	1,873	4.5(0.6)	965	3.7(0.7)	781	2.4(0.6)	540	3.7(1.0)	1,102	2.7(0.6)	1,107	3.3(0.7)	764	3.1(0.7)
소득수준														
하	1,228	3.5(0.6)	979	3.6(0.6)	888	2.8(0.6)	469	3.1(0.9)	1,026	2.5(0.5)	1,118	3.0(0.5)	909	3.5(0.7)
중하	1,351	3.7(0.6)	985	4.2(0.8)	912	4.0(1.1)	463	3.6(1.2)	1,057	3.4(0.7)	1,141	3.1(0.6)	916	1.8(0.5)
중상	1,287	5.2(0.8)	1,046	4.1(0.8)	888	2.5(0.5)	470	2.8(0.9)	1,056	2.5(0.6)	1,138	2.2(0.4)	931	4.1(0.8)
상	1,391	3.7(0.6)	1,081	4.9(1.0)	856	2.6(0.6)	452	3.1(0.7)	1,041	2.6(0.5)	1,141	2.8(0.6)	938	3.8(0.9)
거주지역(표준화)														
동	3,384	3.8(0.3)	3,385	4.2(0.5)	2,797	3.1(0.4)	1,429	2.9(0.5)	3,211	2.7(0.3)	3,473	2.6(0.3)	2,987	3.2(0.4)
읍면	1,873	4.6(0.7)	965	3.8(0.8)	781	2.3(0.7)	540	3.7(1.1)	1,102	3.2(1.1)	1,107	3.5(0.9)	764	2.7(0.7)
소득수준(표준화)														
하	1,228	3.5(0.6)	979	3.6(0.6)	888	2.8(0.6)	469	3.1(0.9)	1,026	2.4(0.5)	1,118	3.0(0.6)	909	3.4(0.7)
중하	1,351	3.6(0.6)	985	4.1(0.8)	912	4.1(1.1)	463	3.8(1.2)	1,057	3.3(0.7)	1,141	2.9(0.6)	916	1.8(0.5)
중상	1,287	5.2(0.8)	1,046	4.1(0.9)	888	2.5(0.5)	470	2.6(0.8)	1,056	2.5(0.6)	1,138	2.1(0.4)	931	3.7(0.8)
상	1,391	3.7(0.6)	1,081	4.8(1.0)	856	2.5(0.6)	452	3.0(0.6)	1,041	2.5(0.5)	1,141	2.8(0.6)	938	3.6(0.8)

표 3-VII-2. B형간염 표면항원 양성률[1] : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위:%)

구 분	전체		남자		여자	
	N	양성률(표준오차)	N	양성률(표준오차)	N	양성률(표준오차)
10세이상	6,815	3.0 (0.3)	3,064	2.7 (0.4)	3,751	3.2 (0.4)
19세이상	5,942	3.4 (0.3)	2,588	3.1 (0.4)	3,354	3.6 (0.4)
30세이상	5,203	3.7 (0.3)	2,294	3.6 (0.5)	2,909	3.8 (0.5)
연령(세)						
10-18	873	0.1 (0.1)	476	0.1 (0.1)	397	0.2 (0.2)
19-29	739	2.1 (0.6)	294	1.2 (0.7)	445	3.1 (0.9)
30-39	1,205	3.9 (0.6)	508	4.3 (1.0)	697	3.4 (0.7)
40-49	1,137	3.7 (0.6)	526	4.1 (1.0)	611	3.2 (0.9)
50-59	1,144	4.2 (0.7)	467	3.7 (1.0)	677	4.7 (1.1)
60-69	981	4.0 (0.8)	457	2.0 (0.7)	524	5.8 (1.3)
70+	736	1.8 (0.5)	336	1.8 (0.7)	400	1.8 (0.7)
12-18	651	0.2 (0.1)	355	0.2 (0.2)	296	0.2 (0.2)
19-64	4,729	3.5 (0.3)	2,034	3.4 (0.5)	2,695	3.6 (0.5)
65+	1,213	2.8 (0.6)	554	1.4 (0.5)	659	3.8 (1.0)
거주지역						
동	5,419	3.1 (0.3)	2,432	2.8 (0.4)	2,987	3.3 (0.4)
읍면	1,396	2.7 (0.5)	632	2.4 (0.7)	764	3.1 (0.7)
소득수준[2]						
하	1,656	2.5 (0.4)	747	1.4 (0.5)	909	3.5 (0.7)
중하	1,669	2.7 (0.4)	753	3.7 (0.7)	916	1.8 (0.5)
중상	1,697	3.3 (0.5)	766	2.5 (0.6)	931	4.1 (0.8)
상	1,694	3.7 (0.6)	756	3.7 (0.9)	938	3.8 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,419	3.0 (0.3)	2,432	2.8 (0.4)	2,987	3.2 (0.4)
읍면	1,396	2.5 (0.5)	632	2.2 (0.7)	764	2.7 (0.7)
소득수준(표준화)						
하	1,656	2.4 (0.5)	747	1.4 (0.5)	909	3.4 (0.7)
중하	1,669	2.7 (0.4)	753	3.5 (0.7)	916	1.8 (0.5)
중상	1,697	3.1 (0.5)	766	2.4 (0.6)	931	3.7 (0.8)
상	1,694	3.6 (0.6)	756	3.6 (0.9)	938	3.6 (0.8)

1) B형간염 표면항원 양성률 : B형간염 표면항원 양성인 분율, 만10세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-VIII-1. 빈혈 유병률[1] 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
10세이상	9,771	8.1(0.3)	7,873	8.2(0.4)	6,388	8.5(0.5)	3,466	9.6(0.5)	7,607	7.5(0.4)	8,249	8.4(0.4)	6,758	7.4(0.4)
30세이상	6,469	8.9(0.4)	5,371	9.2(0.5)	4,746	9.8(0.6)	2,637	11.2(0.7)	5,703	9.1(0.5)	6,137	9.7(0.5)	5,172	8.5(0.4)
10세이상(표준화)[2]	9,771	8.4(0.3)	7,873	8.3(0.3)	6,388	8.5(0.5)	3,466	9.5(0.5)	7,607	7.4(0.4)	8,249	8.2(0.4)	6,758	7.4(0.4)
30세이상(표준화)	6,469	9.1(0.4)	5,371	9.3(0.5)	4,746	9.8(0.6)	2,637	11.2(0.7)	5,703	9.1(0.5)	6,137	9.7(0.5)	5,172	8.6(0.4)
연령(세)														
10-18	1,654	4.8(0.6)	1,312	4.2(0.6)	905	4.2(0.7)	491	3.6(0.8)	1,035	2.6(0.6)	1,102	3.5(0.6)	852	3.3(0.7)
19-29	1,648	8.5(0.7)	1,190	8.0(0.8)	737	7.2(1.0)	338	7.9(1.2)	869	5.1(0.8)	1,010	6.6(0.8)	734	6.2(0.9)
30-39	1,968	8.4(0.7)	1,634	10.0(0.8)	1,217	8.8(0.8)	640	10.4(1.3)	1,378	8.2(0.8)	1,382	7.9(0.8)	1,203	8.2(0.8)
40-49	1,630	9.3(0.8)	1,486	9.6(1.0)	1,336	9.3(1.0)	575	11.7(1.2)	1,302	9.8(0.9)	1,473	11.4(0.9)	1,133	8.7(0.9)
50-59	1,260	6.5(0.7)	934	6.2(0.9)	909	6.6(0.9)	505	7.3(1.3)	1,113	6.0(0.8)	1,211	6.0(0.7)	1,137	5.5(0.7)
60-69	1,007	7.5(0.9)	787	7.0(1.0)	792	10.2(1.2)	479	8.2(1.5)	1,034	9.3(1.1)	1,150	9.3(1.0)	970	6.8(0.9)
70+	604	17.7(1.8)	530	14.7(1.9)	492	20.2(2.5)	438	23.5(2.8)	876	15.2(1.4)	921	18.3(1.5)	729	17.6(1.6)
거주지역														
동	6,353	8.0(0.4)	6,106	8.0(0.4)	4,995	8.1(0.5)	2,491	8.8(0.6)	5,670	7.3(0.4)	6,254	8.1(0.4)	5,377	7.4(0.4)
읍면	3,418	8.6(0.5)	1,767	9.3(0.7)	1,393	10.4(1.0)	975	12.3(1.4)	1,937	8.6(1.2)	1,995	9.4(0.8)	1,381	7.6(0.7)
소득수준[3]														
하	2,268	8.1(0.6)	1,753	8.9(0.6)	1,599	8.3(0.8)	825	10.7(1.3)	1,805	8.1(0.7)	2,024	9.9(0.8)	1,637	8.8(0.8)
중하	2,506	7.9(0.5)	1,806	8.7(0.9)	1,606	8.8(0.9)	813	8.4(1.0)	1,841	8.3(0.7)	2,038	8.4(0.6)	1,660	7.5(0.7)
중상	2,486	8.7(0.6)	1,937	8.5(0.7)	1,567	8.6(0.8)	833	9.2(1.2)	1,874	6.9(0.6)	2,030	7.8(0.6)	1,682	7.4(0.7)
상	2,511	7.8(0.6)	1,916	6.8(0.7)	1,553	8.2(0.8)	812	9.1(1.3)	1,853	6.5(0.6)	2,072	7.3(0.6)	1,682	5.7(0.6)
거주지역(표준화)														
동	6,353	8.3(0.4)	6,106	8.1(0.4)	4,995	8.4(0.6)	2,491	8.9(0.6)	5,670	7.3(0.4)	6,254	8.2(0.4)	5,377	7.5(0.4)
읍면	3,418	8.4(0.5)	1,767	8.3(0.5)	1,393	9.6(1.0)	975	11.3(1.5)	1,937	7.9(1.3)	1,995	8.0(0.9)	1,381	6.7(0.8)
소득수준(표준화)														
하	2,268	8.4(0.6)	1,753	9.0(0.6)	1,599	8.4(0.8)	825	10.7(1.3)	1,805	8.0(0.6)	2,024	9.7(0.8)	1,637	8.8(0.8)
중하	2,506	8.1(0.5)	1,806	8.9(0.9)	1,606	8.8(0.8)	813	8.8(1.1)	1,841	8.2(0.7)	2,038	8.2(0.6)	1,660	7.5(0.7)
중상	2,486	9.2(0.7)	1,937	8.7(0.7)	1,567	8.6(0.8)	833	9.1(1.1)	1,874	6.8(0.6)	2,030	7.8(0.6)	1,682	7.4(0.7)
상	2,511	8.0(0.6)	1,916	7.0(0.7)	1,553	8.2(0.7)	812	8.7(1.2)	1,853	6.3(0.6)	2,072	7.2(0.6)	1,682	5.4(0.6)
남자														
10세이상	4,514	4.2(0.4)	3,558	3.1(0.4)	2,820	2.9(0.4)	1,506	2.5(0.4)	3,337	2.1(0.3)	3,706	2.7(0.3)	3,041	2.4(0.4)
30세이상	2,938	5.0(0.5)	2,361	4.0(0.5)	2,036	4.1(0.6)	1,103	3.5(0.5)	2,415	3.1(0.4)	2,658	3.6(0.4)	2,283	2.9(0.4)
10세이상(표준화)	4,514	4.8(0.5)	3,558	3.1(0.3)	2,820	3.3(0.5)	1,506	2.6(0.4)	3,337	2.2(0.3)	3,706	2.7(0.3)	3,041	2.4(0.4)
30세이상(표준화)	2,938	5.6(0.6)	2,361	3.9(0.5)	2,036	4.7(0.7)	1,103	3.8(0.5)	2,415	3.2(0.4)	2,658	3.8(0.4)	2,283	3.0(0.4)
연령(세)														
10-18	853	2.3(0.6)	685	1.8(0.5)	480	0.7(0.4)	262	0.7(0.6)	559	0.0(-)[4]	574	0.6(0.5)	465	0.5(0.5)
19-29	723	3.8(0.8)	512	1.2(0.5)	304	0.5(0.3)	141	0.0(-)	363	0.0(-)	474	0.5(0.4)	293	1.6(1.4)
30-39	923	2.9(0.7)	714	0.7(0.3)	495	0.9(0.4)	250	0.5(0.4)	588	1.4(0.6)	587	0.4(0.2)	507	0.4(0.3)
40-49	775	4.0(0.9)	677	2.1(0.6)	595	2.6(1.1)	256	1.4(0.8)	576	0.7(0.3)	631	1.8(0.6)	526	1.3(0.7)
50-59	575	4.5(0.9)	429	2.9(0.8)	407	3.4(0.9)	208	3.8(1.2)	481	2.7(0.9)	540	3.8(1.0)	466	3.0(0.9)
60-69	445	7.5(1.3)	350	5.9(1.3)	369	7.9(1.6)	212	6.5(1.9)	421	7.3(1.6)	518	7.5(1.3)	452	5.7(1.2)
70+	220	18.8(3.1)	191	18.7(3.2)	170	20.7(5.0)	177	18.3(3.7)	349	12.3(2.0)	382	15.9(2.2)	332	12.8(2.4)
거주지역														
동	2,969	4.0(0.5)	2,750	2.7(0.4)	2,203	2.8(0.5)	1,071	1.8(0.3)	2,489	1.8(0.3)	2,803	2.2(0.3)	2,415	2.0(0.4)
읍면	1,545	5.0(0.6)	808	5.1(0.8)	617	3.1(0.7)	435	5.0(1.1)	848	3.2(0.8)	903	4.7(0.8)	626	3.6(0.9)

1) 빈혈 유병률 : 헤모글로빈이 다음 경우에 해당되는 분율, 만10세이상
헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 빈혈 유병률 추이, 성별, 만10세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	1,040	3.8(0.6)	781	3.9(0.8)	715	2.7(0.6)	357	3.3(0.8)	794	2.0(0.5)	917	4.0(0.6)	740	3.9(1.1)
중하	1,155	4.3(0.6)	829	2.6(0.6)	693	3.7(1.1)	352	1.2(0.4)	793	2.9(0.6)	906	2.1(0.5)	747	1.5(0.4)
중상	1,199	4.6(0.8)	900	3.0(0.7)	685	2.7(0.6)	365	1.5(0.6)	829	1.3(0.4)	902	2.1(0.4)	762	2.1(0.6)
상	1,120	4.2(0.7)	841	3.0(0.7)	698	2.5(0.7)	364	3.3(1.0)	819	1.8(0.5)	938	2.3(0.5)	751	1.5(0.3)
거주지역(표준화)														
동	2,969	4.9(0.6)	2,750	2.8(0.4)	2,203	3.8(0.7)	1,071	2.1(0.4)	2,489	2.1(0.3)	2,803	2.6(0.3)	2,415	2.2(0.4)
읍면	1,545	4.2(0.6)	808	4.0(0.6)	617	2.1(0.4)	435	4.1(0.9)	848	2.2(0.4)	903	3.4(0.6)	626	2.7(0.7)
소득수준(표준화)														
하	1,040	3.9(0.7)	781	3.7(0.8)	715	3.3(0.7)	357	3.4(0.8)	794	2.2(0.4)	917	4.0(0.6)	740	4.2(1.3)
중하	1,155	4.8(0.6)	829	2.8(0.6)	693	4.1(1.1)	352	1.6(0.5)	793	2.8(0.6)	906	2.1(0.4)	747	1.6(0.4)
중상	1,199	5.5(0.9)	900	3.1(0.6)	685	3.0(0.7)	365	1.8(0.6)	829	1.4(0.4)	902	2.3(0.4)	762	2.0(0.5)
상	1,120	4.8(0.8)	841	2.8(0.7)	698	2.9(0.7)	364	3.3(1.0)	819	1.8(0.5)	938	2.4(0.5)	751	1.4(0.3)
여자														
10세이상	5,257	11.7(0.5)	4,315	12.1(0.5)	3,568	14.1(0.8)	1,960	16.8(0.9)	4,270	13.1(0.6)	4,543	14.2(0.7)	3,717	12.6(0.6)
30세이상	3,531	12.6(0.7)	3,010	12.9(0.7)	2,710	15.2(0.9)	1,534	18.6(1.2)	3,288	14.9(0.8)	3,479	15.7(0.8)	2,889	13.9(0.8)
10세이상(표준화)	5,257	11.9(0.5)	4,315	12.2(0.5)	3,568	14.0(0.7)	1,960	16.5(0.9)	4,270	12.9(0.6)	4,543	14.1(0.7)	3,717	12.5(0.7)
30세이상(표준화)	3,531	12.6(0.7)	3,010	13.1(0.7)	2,710	15.2(0.9)	1,534	18.7(1.2)	3,288	15.1(0.8)	3,479	15.9(0.9)	2,889	14.2(0.8)
연령(세)														
10-18	801	7.5(1.0)	627	6.9(1.0)	425	8.1(1.4)	229	7.0(1.7)	476	5.6(1.2)	528	6.8(1.1)	387	6.7(1.4)
19-29	925	12.4(1.1)	678	13.2(1.3)	433	14.3(2.0)	197	16.1(2.3)	506	10.8(1.6)	536	13.4(1.5)	441	10.9(1.6)
30-39	1,045	13.8(1.3)	920	16.4(1.3)	722	17.2(1.6)	390	20.7(2.6)	790	15.5(1.4)	795	16.0(1.6)	696	16.5(1.6)
40-49	855	14.8(1.4)	809	15.0(1.6)	741	16.2(1.6)	319	22.7(2.0)	726	19.6(1.7)	842	21.3(1.7)	607	16.6(1.8)
50-59	685	8.4(1.1)	505	8.7(1.4)	502	9.8(1.6)	297	10.9(1.9)	632	9.3(1.3)	671	8.4(1.2)	671	7.9(1.2)
60-69	562	7.6(1.2)	437	7.9(1.5)	423	12.1(1.8)	267	9.8(2.4)	613	11.1(1.4)	632	10.9(1.3)	518	7.7(1.3)
70+	384	17.1(2.1)	339	12.2(1.9)	322	19.9(2.7)	261	26.8(3.6)	527	17.0(1.8)	539	19.8(2.0)	397	20.7(2.6)
거주지역														
동	3,384	11.7(0.6)	3,356	12.0(0.6)	2,792	13.4(0.8)	1,420	15.9(1.1)	3,181	12.8(0.6)	3,451	14.2(0.8)	2,962	12.9(0.7)
읍면	1,873	11.9(0.8)	959	12.8(1.1)	776	17.4(1.5)	540	20.1(2.1)	1,089	14.1(1.9)	1,092	14.3(1.3)	755	11.6(1.2)
소득수준														
하	1,228	12.0(1.1)	972	12.8(1.0)	884	14.2(1.5)	468	18.3(2.4)	1,011	14.3(1.2)	1,107	15.9(1.5)	897	13.7(1.1)
중하	1,351	11.3(0.9)	977	13.8(1.5)	913	13.5(1.2)	461	15.3(1.9)	1,048	13.7(1.2)	1,132	14.7(1.2)	913	13.7(1.4)
중상	1,287	12.9(1.1)	1,037	13.0(1.2)	882	14.3(1.4)	468	17.5(2.4)	1,045	12.8(1.1)	1,128	13.7(1.2)	920	12.9(1.3)
상	1,391	10.8(1.0)	1,075	9.5(1.1)	855	14.3(1.3)	448	15.5(2.0)	1,034	11.4(1.1)	1,134	12.5(1.1)	931	10.1(1.2)
거주지역(표준화)														
동	3,384	11.7(0.6)	3,356	12.0(0.6)	2,792	13.3(0.8)	1,420	15.9(1.1)	3,181	12.8(0.6)	3,451	14.1(0.7)	2,962	12.8(0.7)
읍면	1,873	12.5(0.9)	959	12.2(1.0)	776	17.5(1.9)	540	19.5(2.3)	1,089	14.2(2.6)	1,092	13.5(1.7)	755	11.0(1.4)
소득수준(표준화)														
하	1,228	12.7(1.1)	972	12.9(1.0)	884	14.2(1.5)	468	18.1(2.4)	1,011	14.1(1.2)	1,107	15.8(1.5)	897	13.6(1.2)
중하	1,351	11.2(0.9)	977	14.1(1.5)	913	13.4(1.2)	461	15.6(1.9)	1,048	13.7(1.3)	1,132	14.6(1.2)	913	13.7(1.4)
중상	1,287	13.0(1.1)	1,037	13.0(1.2)	882	14.2(1.4)	468	16.8(2.3)	1,045	12.7(1.1)	1,128	13.7(1.2)	920	13.0(1.3)
상	1,391	11.0(1.0)	1,075	9.7(1.1)	855	14.1(1.3)	448	14.8(2.0)	1,034	11.1(1.1)	1,134	12.2(1.1)	931	9.7(1.1)

표 3-VIII-2. 헤모글로빈 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : g/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	3,041	15.2	0.03	13.3	13.9	14.5	15.3	16.0	16.5	16.9
19세이상	2,576	15.3	0.03	13.5	14.0	14.7	15.3	16.0	16.6	16.9
30세이상	2,283	15.2	0.03	13.4	13.9	14.6	15.3	16.0	16.6	16.9
65세이상	548	14.5	0.08	12.2	13.0	13.8	14.7	15.4	16.0	16.4
연령(세)										
10-18	465	14.6	0.07	13.0	13.3	13.9	14.6	15.4	16.0	16.5
19-29	293	15.5	0.08	13.9	14.4	15.0	15.5	16.1	16.6	17.0
30-39	507	15.5	0.05	14.0	14.3	15.0	15.5	16.1	16.6	17.0
40-49	526	15.4	0.06	13.9	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.0
50-59	466	15.2	0.06	13.5	13.9	14.6	15.2	16.0	16.5	17.0
60-69	452	14.9	0.06	12.8	13.4	14.1	14.9	15.7	16.3	16.9
70+	332	14.3	0.11	11.6	12.6	13.6	14.4	15.2	16.0	16.4
여자										
10세이상	3,717	13.0	0.03	11.0	11.7	12.5	13.1	13.7	14.2	14.5
19세이상	3,330	13.0	0.03	10.8	11.7	12.4	13.1	13.7	14.2	14.5
30세이상	2,889	13.0	0.03	10.8	11.6	12.4	13.1	13.7	14.2	14.5
65세이상	654	13.0	0.05	11.0	11.5	12.2	13.0	13.7	14.4	14.7
연령(세)										
10-18	387	13.2	0.06	11.8	12.3	12.7	13.2	13.9	14.4	14.6
19-29	441	13.0	0.06	11.2	11.9	12.5	13.0	13.6	14.1	14.4
30-39	696	12.8	0.05	10.3	11.4	12.2	12.9	13.5	14.0	14.4
40-49	607	12.8	0.06	10.4	11.3	12.4	13.0	13.6	14.2	14.5
50-59	671	13.2	0.05	11.7	12.2	12.7	13.3	13.9	14.4	14.8
60-69	518	13.2	0.05	11.7	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.7
70+	397	12.9	0.07	10.8	11.3	12.1	12.9	13.6	14.4	14.5

표 3-VIII-3. 빈혈 유병률[1] : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
10세이상	6,758	7.4 (0.4)	3,041	2.4 (0.4)	3,717	12.6 (0.6)
19세이상	5,906	8.0 (0.4)	2,576	2.6 (0.4)	3,330	13.4 (0.7)
30세이상	5,172	8.5 (0.4)	2,283	2.9 (0.4)	2,889	13.9 (0.8)
연령(세)						
10-18	852	3.3 (0.7)	465	0.5 (0.5)	387	6.7 (1.4)
19-29	734	6.2 (0.9)	293	1.6 (1.4)	441	10.9 (1.6)
30-39	1,203	8.2 (0.8)	507	0.4 (0.3)	696	16.5 (1.6)
40-49	1,133	8.7 (0.9)	526	1.3 (0.7)	607	16.6 (1.8)
50-59	1,137	5.5 (0.7)	466	3.0 (0.9)	671	7.9 (1.2)
60-69	970	6.8 (0.9)	452	5.7 (1.2)	518	7.7 (1.3)
70+	729	17.6 (1.6)	332	12.8 (2.4)	397	20.7 (2.6)
12-18	636	4.0 (0.9)	347	0.6 (0.6)	289	8.1 (1.7)
19-64	4,704	7.2 (0.4)	2,028	1.8 (0.4)	2,676	12.8 (0.8)
65+	1,202	13.6 (1.2)	548	9.5 (1.6)	654	16.6 (1.8)
거주지역						
동	5,377	7.4 (0.4)	2,415	2.0 (0.4)	2,962	12.9 (0.7)
읍면	1,381	7.6 (0.7)	626	3.6 (0.9)	755	11.6 (1.2)
소득수준[2]						
하	1,637	8.8 (0.8)	740	3.9 (1.1)	897	13.7 (1.1)
중하	1,660	7.5 (0.7)	747	1.5 (0.4)	913	13.7 (1.4)
중상	1,682	7.4 (0.7)	762	2.1 (0.6)	920	12.9 (1.3)
상	1,682	5.7 (0.6)	751	1.5 (0.3)	931	10.1 (1.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,377	7.5 (0.4)	2,415	2.2 (0.4)	2,962	12.8 (0.7)
읍면	1,381	6.7 (0.8)	626	2.7 (0.7)	755	11.0 (1.4)
소득수준(표준화)						
하	1,637	8.8 (0.8)	740	4.2 (1.3)	897	13.6 (1.2)
중하	1,660	7.5 (0.7)	747	1.6 (0.4)	913	13.7 (1.4)
중상	1,682	7.4 (0.7)	762	2.0 (0.5)	920	13.0 (1.3)
상	1,682	5.4 (0.6)	751	1.4 (0.3)	931	9.7 (1.1)

1) 빈혈 유병률 : 헤모글로빈이 다음 경우에 해당되는 분율, 만10세이상
헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-1. 시력장애 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,207	1.1 (0.2)	1,866	0.8 (0.2)	2,341	1.4 (0.3)
65세이상	1,366	4.0 (0.7)	618	3.5 (1.0)	748	4.4 (0.9)
연령(세)						
40-49	1,155	0.0 (-)[4]	527	0.0 (-)	628	0.0 (-)
50-59	1,169	0.2 (0.1)	478	0.0 (-)	691	0.3 (0.2)
60-69	1,027	1.1 (0.3)	474	0.6 (0.3)	553	1.6 (0.6)
70+	856	5.4 (1.0)	387	5.1 (1.6)	469	5.7 (1.3)
거주지역						
동	3,128	0.6 (0.1)	1,387	0.4 (0.1)	1,741	0.8 (0.2)
읍면	1,079	2.4 (0.5)	479	1.9 (0.7)	600	3.0 (0.7)
소득수준[2]						
하	1,026	1.2 (0.4)	458	0.7 (0.3)	568	1.7 (0.7)
중하	1,029	1.1 (0.3)	457	0.3 (0.2)	572	2.0 (0.6)
중상	1,060	0.9 (0.4)	468	1.1 (0.5)	592	0.8 (0.4)
상	1,027	1.0 (0.3)	459	0.9 (0.4)	568	1.2 (0.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,128	0.6 (0.1)	1,387	0.4 (0.1)	1,741	0.8 (0.2)
읍면	1,079	1.6 (0.3)	479	1.5 (0.6)	600	1.6 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,026	1.1 (0.3)	458	0.8 (0.3)	568	1.3 (0.5)
중하	1,029	1.1 (0.3)	457	0.3 (0.2)	572	1.8 (0.5)
중상	1,060	0.9 (0.3)	468	1.0 (0.5)	592	0.7 (0.3)
상	1,027	0.9 (0.3)	459	0.9 (0.4)	568	0.9 (0.3)

1) 시력장애 : 단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32이하인 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-IX-2. 근시 분포[1] : 성별, 만5세이상, 2010

(단위: %)

구 분	N	≤−6.0	≤−5.0	≤−4.0	≤−3.0	≤−2.0	≤−1.0	≤−0.75
5세이상	7,712	6.1	9.5	14.0	20.1	28.8	46.2	53.3
10세이상	7,096	6.4	10.0	14.6	20.8	29.6	47.1	54.2
19세이상	6,100	5.7	8.9	12.8	18.3	26.4	43.2	50.6
30세이상	5,350	4.2	6.5	9.8	14.1	21.6	37.5	44.9
65세이상	1,297	1.0	1.6	2.2	3.2	7.4	18.5	23.8
연령(세)								
5-11	889	2.7	4.3	7.8	13.5	23.9	41.7	48.8
12-18	723	11.3	18.9	28.9	39.2	51.8	73.6	78.1
19-29	750	11.9	18.5	24.7	35.3	46.1	66.0	73.8
30-39	1,228	6.7	11.2	16.0	23.0	34.9	56.9	66.0
40-49	1,154	6.0	9.1	14.3	20.8	29.0	49.6	57.6
50-59	1,158	2.2	2.8	4.7	6.7	12.2	21.8	29.2
60-69	1,004	1.6	2.0	2.8	3.4	5.9	12.4	16.2
70+	806	0.9	1.3	1.8	3.1	7.8	21.0	27.0
남자								
5세이상	3,489	5.8	9.0	13.5	20.0	29.4	47.2	53.8
10세이상	3,167	6.1	9.5	14.1	20.7	30.2	48.3	54.9
19세이상	2,629	5.2	8.1	12.0	17.8	26.8	43.8	50.8
30세이상	2,328	3.8	6.0	9.2	14.0	22.6	38.1	44.8
65세이상	580	0.1	0.4	0.9	2.3	5.1	14.5	19.3
연령(세)								
5-11	467	3.4	5.3	9.4	14.2	23.1	40.7	46.8
12-18	393	11.7	18.5	27.7	39.7	52.1	76.9	80.7
19-29	301	10.6	16.0	22.4	32.2	43.0	65.4	73.6
30-39	510	5.4	9.4	14.0	21.9	36.2	57.0	65.6
40-49	526	5.9	9.2	13.8	20.3	29.6	50.4	57.2
50-59	471	1.9	2.6	4.6	6.6	12.9	21.9	28.3
60-69	463	1.2	1.5	2.6	3.5	5.4	10.4	13.5
70+	358	0.0	0.0	0.4	2.2	5.7	19.2	25.3
여자								
5세이상	4,223	6.3	10.1	14.5	20.2	28.3	45.0	52.7
10세이상	3,929	6.7	10.5	15.1	21.0	29.1	45.9	53.6
19세이상	3,471	6.3	9.7	13.6	18.8	26.0	42.6	50.5
30세이상	3,022	4.7	7.0	10.4	14.3	20.6	37.0	45.0
65세이상	717	1.6	2.4	3.1	3.8	9.0	21.3	26.9
연령(세)								
5-11	422	1.8	3.3	6.1	12.7	24.7	42.9	51.0
12-18	330	10.8	19.5	30.3	38.6	51.4	69.4	74.9
19-29	449	13.2	21.1	27.3	38.6	49.5	66.7	74.1
30-39	718	8.1	13.1	18.1	24.1	33.6	56.8	66.3
40-49	628	6.1	9.0	14.9	21.4	28.3	48.8	58.0
50-59	687	2.5	3.0	4.9	6.8	11.4	21.8	30.2
60-69	541	2.0	2.5	3.0	3.4	6.4	14.2	18.7
70+	448	1.4	2.1	2.7	3.7	9.2	22.2	28.0

1) 근시 분포 : 단안 또는 양안의 구면렌즈대응치(SE)가 근시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상

표 3-IX-3. 근시 유병률[1] : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,712	53.3 (0.9)	3,489	53.8 (1.2)	4,223	52.7 (1.1)
10세이상	7,096	54.2 (1.0)	3,167	54.9 (1.3)	3,929	53.6 (1.2)
19세이상	6,100	50.6 (1.1)	2,629	50.8 (1.4)	3,471	50.5 (1.2)
30세이상	5,350	44.9 (1.1)	2,328	44.8 (1.4)	3,022	45.0 (1.3)
연령(세)						
5-11	889	48.8 (2.3)	467	46.8 (3.1)	422	51.0 (2.9)
12-18	723	78.1 (1.8)	393	80.7 (2.4)	330	74.9 (2.8)
19-29	750	73.8 (1.8)	301	73.6 (3.0)	449	74.1 (2.3)
30-39	1,228	66.0 (1.8)	510	65.6 (2.4)	718	66.3 (2.2)
40-49	1,154	57.6 (1.9)	526	57.2 (2.5)	628	58.0 (2.4)
50-59	1,158	29.2 (1.5)	471	28.3 (2.4)	687	30.2 (2.0)
60-69	1,004	16.2 (1.4)	463	13.5 (1.8)	541	18.7 (1.9)
70+	806	27.0 (2.0)	358	25.3 (2.5)	448	28.0 (2.6)
19-64	4,803	54.7 (1.1)	2,049	54.7 (1.5)	2,754	54.8 (1.3)
65+	1,297	23.8 (1.6)	580	19.3 (1.9)	717	26.9 (2.1)
거주지역						
동	6,152	56.2 (0.8)	2,791	57.0 (1.2)	3,361	55.3 (1.1)
읍면	1,560	42.2 (2.2)	698	41.2 (2.5)	862	43.2 (2.6)
소득수준[2]						
하	1,876	53.1 (1.6)	850	52.2 (2.2)	1,026	54.1 (2.3)
중하	1,890	51.8 (1.7)	859	51.4 (2.1)	1,031	52.2 (2.0)
중상	1,929	53.3 (1.5)	864	55.7 (1.9)	1,065	50.9 (1.9)
상	1,906	54.8 (1.6)	869	55.7 (2.3)	1,037	53.9 (2.1)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,152	56.3 (0.7)	2,791	56.2 (1.1)	3,361	56.3 (1.0)
읍면	1,560	48.3 (2.0)	698	47.1 (2.6)	862	49.8 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	1,876	53.8 (1.5)	850	51.8 (2.1)	1,026	55.6 (2.1)
중하	1,890	53.1 (1.5)	859	52.3 (1.8)	1,031	53.9 (1.8)
중상	1,929	56.0 (1.4)	864	57.2 (1.8)	1,065	54.8 (1.6)
상	1,906	56.7 (1.6)	869	56.7 (2.2)	1,037	56.9 (1.9)

1) 근시 유병률 : 단안 또는 양안의 구면렌즈 대응치(SE)가 -0.75이하인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-4. 원시 분포[1] : 성별, 만5세이상, 2010

(단위: %)

구 분	N	≥1.0	≥2.0	≥3.0	≥4.0	≥5.0	≥6.0
5세이상	7,712	11.2	3.4	1.0	0.4	0.1	0.1
10세이상	7,096	11.5	3.6	1.0	0.4	0.2	0.1
19세이상	6,100	12.8	3.9	1.0	0.3	0.1	0.0
30세이상	5,350	15.3	4.7	1.1	0.3	0.0	0.0
65세이상	1,297	46.2	18.7	4.8	0.8	0.1	0.1
연령(세)							
5-11	889	5.5	1.3	0.7	0.6	0.1	0.1
12-18	723	3.3	1.7	1.2	1.0	0.7	0.4
19-29	750	2.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.0
30-39	1,228	0.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
40-49	1,154	2.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
50-59	1,158	17.6	3.1	0.7	0.5	0.0	0.0
60-69	1,004	44.4	12.8	2.4	0.8	0.3	0.2
70+	806	45.0	19.6	5.1	0.5	0.0	0.0
남자							
5세이상	3,489	9.8	2.8	1.0	0.4	0.1	0.0
10세이상	3,167	10.1	3.0	1.0	0.4	0.1	0.0
19세이상	2,629	11.1	3.1	0.9	0.2	0.0	0.0
30세이상	2,328	13.6	3.8	1.0	0.2	0.0	0.0
65세이상	580	48.8	18.8	4.9	0.8	0.3	0.3
연령(세)							
5-11	467	6.0	1.5	1.4	1.1	0.1	0.1
12-18	393	3.4	2.1	1.2	1.2	0.5	0.0
19-29	301	1.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
30-39	510	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
40-49	526	2.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
50-59	471	14.9	2.2	0.7	0.5	0.0	0.0
60-69	463	42.6	11.2	2.5	0.7	0.3	0.3
70+	358	47.7	19.9	4.9	0.3	0.0	0.0
여자							
5세이상	4,223	12.6	4.1	1.0	0.4	0.2	0.1
10세이상	3,929	12.9	4.2	1.1	0.4	0.2	0.1
19세이상	3,471	14.3	4.7	1.1	0.3	0.2	0.0
30세이상	3,022	16.9	5.5	1.2	0.3	0.1	0.0
65세이상	717	44.5	18.7	4.7	0.8	0.1	0.0
연령(세)							
5-11	422	5.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
12-18	330	3.3	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8
19-29	449	3.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.0
30-39	718	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
40-49	628	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
50-59	687	20.3	4.1	0.6	0.4	0.0	0.0
60-69	541	46.0	14.3	2.3	0.9	0.3	0.2
70+	448	43.3	19.3	5.3	0.6	0.1	0.0

1) 원시 분포 : 단안 또는 양안의 구면렌즈대응치(SE)가 원시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상

표 3-IX-5. 원시 유병률[1] : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,712	11.2 (0.5)	3,489	9.8 (0.6)	4,223	12.6 (0.7)
10세이상	7,096	11.5 (0.5)	3,167	10.1 (0.6)	3,929	12.9 (0.7)
19세이상	6,100	12.8 (0.6)	2,629	11.1 (0.7)	3,471	14.3 (0.7)
30세이상	5,350	15.3 (0.6)	2,328	13.6 (0.8)	3,022	16.9 (0.8)
연령(세)						
5-11	889	5.5 (1.3)	467	6.0 (1.6)	422	5.0 (1.4)
12-18	723	3.3 (0.9)	393	3.4 (1.2)	330	3.3 (1.3)
19-29	750	2.3 (0.6)	301	1.6 (0.9)	449	3.1 (0.9)
30-39	1,228	0.8 (0.2)	510	0.6 (0.3)	718	1.0 (0.4)
40-49	1,154	2.3 (0.6)	526	2.3 (0.9)	628	2.3 (0.6)
50-59	1,158	17.6 (1.4)	471	14.9 (1.9)	687	20.3 (2.0)
60-69	1,004	44.4 (1.9)	463	42.6 (2.9)	541	46.0 (2.5)
70+	806	45.0 (2.0)	358	47.7 (3.0)	448	43.3 (2.7)
19-64	4,803	7.6 (0.5)	2,049	6.5 (0.6)	2,754	8.9 (0.7)
65+	1,297	46.2 (1.8)	580	48.8 (2.2)	717	44.5 (2.3)
거주지역						
동	6,152	10.0 (0.5)	2,791	8.8 (0.6)	3,361	11.2 (0.7)
읍면	1,560	15.8 (1.6)	698	13.8 (1.8)	862	17.7 (1.7)
소득수준[2]						
하	1,876	10.2 (0.9)	850	8.5 (1.1)	1,026	11.9 (1.2)
중하	1,890	10.5 (0.8)	859	9.7 (1.1)	1,031	11.4 (1.1)
중상	1,929	12.6 (1.0)	864	11.2 (1.1)	1,065	13.9 (1.4)
상	1,906	11.5 (0.8)	869	10.2 (1.0)	1,037	12.8 (1.3)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,152	10.0 (0.3)	2,791	9.5 (0.5)	3,361	10.5 (0.5)
읍면	1,560	10.2 (1.0)	698	10.0 (1.1)	862	10.6 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,876	9.8 (0.7)	850	8.8 (1.0)	1,026	10.6 (0.9)
중하	1,890	9.7 (0.6)	859	9.6 (0.9)	1,031	9.9 (0.9)
중상	1,929	10.8 (0.6)	864	10.5 (0.9)	1,065	11.1 (1.0)
상	1,906	9.8 (0.7)	869	9.3 (0.8)	1,037	10.4 (1.0)

1) 원시 유병률 : 단안 또는 양안의 구면렌즈 대응치(SE)가 1.0이상인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-6. 난시 분포[1] : 성별, 만5세이상, 2010

(단위: %)

구 분	N	Dcyl≥0.75	Dcyl≥1	Dcyl≥2	Dcyl≥3	Dcyl≥4	Dcyl≥5	Dcyl≥6
5세이상	7,712	58.8	42.3	11.7	3.7	1.5	0.7	0.4
10세이상	7,096	60.2	43.6	12.1	3.7	1.6	0.8	0.4
19세이상	6,100	61.1	44.1	11.6	3.4	1.5	0.7	0.4
30세이상	5,350	62.5	45.1	11.7	3.3	1.3	0.7	0.4
65세이상	1,297	91.4	75.9	26.1	7.8	3.1	2.0	1.2
연령(세)								
5-11	889	39.4	24.5	7.3	3.3	0.8	0.4	0.4
12-18	723	56.5	42.8	16.6	5.9	2.6	1.0	0.1
19-29	750	55.5	40.0	10.9	3.7	2.1	0.9	0.5
30-39	1,228	48.6	31.1	8.3	3.1	1.2	0.5	0.3
40-49	1,154	54.4	36.5	7.7	2.0	0.9	0.4	0.1
50-59	1,158	63.6	44.8	9.2	1.9	0.7	0.3	0.2
60-69	1,004	80.8	63.5	17.1	3.4	1.4	0.7	0.4
70+	806	93.4	80.7	29.2	10.1	3.8	2.6	1.7
남자								
5세이상	3,489	57.6	42.2	11.7	4.1	1.9	0.9	0.5
10세이상	3,167	58.8	43.3	12.0	4.2	2.0	1.0	0.6
19세이상	2,629	59.8	43.7	11.0	3.6	1.7	0.9	0.6
30세이상	2,328	60.7	43.8	10.9	3.5	1.3	0.7	0.5
65세이상	580	90.0	76.2	28.3	8.4	2.4	1.1	0.9
연령(세)								
5-11	467	41.7	27.2	9.2	4.5	1.2	0.7	0.7
12-18	393	53.8	42.9	18.7	7.7	3.8	1.2	0.2
19-29	301	56.3	43.1	11.2	3.7	3.1	1.6	0.9
30-39	510	50.0	33.7	8.9	3.2	1.6	0.8	0.5
40-49	526	50.9	34.1	5.5	1.9	0.6	0.6	0.2
50-59	471	64.6	43.7	7.8	2.6	1.1	0.4	0.4
60-69	463	77.7	63.2	18.4	4.6	2.1	0.8	0.7
70+	358	93.4	81.6	32.8	10.7	2.0	1.3	1.0
여자								
5세이상	4,223	60.1	42.5	11.8	3.2	1.2	0.5	0.2
10세이상	3,929	61.6	43.8	12.2	3.3	1.2	0.6	0.3
19세이상	3,471	62.4	44.5	12.1	3.3	1.3	0.6	0.3
30세이상	3,022	64.2	46.3	12.5	3.2	1.3	0.7	0.3
65세이상	717	92.3	75.8	24.6	7.3	3.6	2.6	1.5
연령(세)								
5-11	422	36.9	21.6	5.2	2.0	0.4	0.0	0.0
12-18	330	59.7	42.7	14.0	3.7	1.2	0.7	0.0
19-29	449	54.7	36.8	10.6	3.8	1.1	0.2	0.1
30-39	718	47.1	28.4	7.6	3.0	0.8	0.2	0.1
40-49	628	58.0	39.0	10.0	2.2	1.2	0.2	0.0
50-59	687	62.7	45.8	10.7	1.3	0.2	0.2	0.1
60-69	541	83.6	63.7	15.9	2.2	0.9	0.5	0.2
70+	448	93.3	80.1	26.9	9.6	4.9	3.4	2.1

1) 난시 분포 : 단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상

표 3-IX-7. 난시 유병률[1] : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,712	58.8 (0.9)	3,489	57.6 (1.2)	4,223	60.1 (1.0)
10세이상	7,096	60.2 (0.9)	3,167	58.8 (1.2)	3,929	61.6 (1.0)
19세이상	6,100	61.1 (0.9)	2,629	59.8 (1.3)	3,471	62.4 (1.1)
30세이상	5,350	62.5 (0.9)	2,328	60.7 (1.3)	3,022	64.2 (1.1)
연령(세)						
5-11	889	39.4 (2.0)	467	41.7 (2.5)	422	36.9 (2.8)
12-18	723	56.5 (2.6)	393	53.8 (3.4)	330	59.7 (3.2)
19-29	750	55.5 (2.0)	301	56.3 (3.1)	449	54.7 (2.7)
30-39	1,228	48.6 (1.9)	510	50.0 (2.5)	718	47.1 (2.3)
40-49	1,154	54.4 (1.7)	526	50.9 (2.5)	628	58.0 (2.5)
50-59	1,158	63.6 (1.7)	471	64.6 (2.6)	687	62.7 (2.2)
60-69	1,004	80.8 (1.4)	463	77.7 (2.5)	541	83.6 (1.8)
70+	806	93.4 (1.0)	358	93.4 (1.3)	448	93.3 (1.4)
19-64	4,803	56.5 (1.0)	2,049	56.1 (1.4)	2,754	56.9 (1.2)
65+	1,297	91.4 (0.8)	580	90.0 (1.4)	717	92.3 (1.1)
거주지역						
동	6,152	58.2 (1.0)	2,791	57.6 (1.3)	3,361	58.9 (1.2)
읍면	1,560	61.1 (2.1)	698	57.5 (2.8)	862	64.5 (2.2)
소득수준[2]						
하	1,876	58.6 (1.7)	850	58.7 (2.2)	1,026	58.5 (2.0)
중하	1,890	58.8 (1.5)	859	57.0 (2.2)	1,031	60.6 (1.8)
중상	1,929	59.3 (1.5)	864	58.5 (2.1)	1,065	60.0 (2.0)
상	1,906	58.2 (1.5)	869	55.6 (2.4)	1,037	61.0 (1.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,152	58.0 (0.9)	2,791	57.9 (1.2)	3,361	58.2 (1.1)
읍면	1,560	55.6 (2.1)	698	53.9 (3.1)	862	57.6 (2.3)
소득수준(표준화)						
하	1,876	58.3 (1.6)	850	58.9 (2.1)	1,026	57.3 (1.9)
중하	1,890	57.8 (1.5)	859	56.8 (2.1)	1,031	58.9 (1.7)
중상	1,929	57.7 (1.4)	864	57.6 (2.0)	1,065	57.5 (2.0)
상	1,906	56.3 (1.6)	869	54.7 (2.4)	1,037	58.1 (1.6)

1) 난시 유병률 : 단안 또는 양안의 실린더(Dcyl)값이 0.75이상인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-8. 사시 유병률[1] : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
3세이상	8,063	1.3 (0.2)	3,648	1.6 (0.3)	4,415	1.1 (0.2)
10세이상	7,223	1.3 (0.2)	3,218	1.6 (0.3)	4,005	1.0 (0.2)
19세이상	6,223	1.2 (0.2)	2,680	1.3 (0.2)	3,543	1.0 (0.2)
30세이상	5,464	1.1 (0.2)	2,376	1.2 (0.2)	3,088	1.0 (0.2)
연령(세)						
3-5	341	1.0 (0.5)	170	0.4 (0.4)	171	1.6 (1.0)
6-11	772	2.4 (0.7)	405	1.6 (0.7)	367	3.2 (1.2)
12-18	727	2.2 (0.7)	393	3.9 (1.3)	334	0.1 (0.1)
19-29	759	1.5 (0.5)	304	1.7 (0.8)	455	1.2 (0.6)
30-39	1,231	0.7 (0.2)	511	0.7 (0.3)	720	0.7 (0.3)
40-49	1,157	0.7 (0.3)	528	0.7 (0.4)	629	0.7 (0.5)
50-59	1,165	1.6 (0.5)	475	2.2 (0.8)	690	1.0 (0.5)
60-69	1,030	1.2 (0.4)	474	1.1 (0.5)	556	1.3 (0.6)
70+	881	1.8 (0.6)	388	2.2 (0.9)	493	1.6 (0.7)
19-64	4,830	1.1 (0.2)	2,061	1.3 (0.3)	2,769	0.9 (0.2)
65+	1,393	1.7 (0.4)	619	1.7 (0.5)	774	1.6 (0.6)
거주지역						
동	6,413	1.3 (0.2)	2,911	1.6 (0.3)	3,502	1.0 (0.2)
읍면	1,650	1.4 (0.4)	737	1.5 (0.5)	913	1.3 (0.5)
소득수준[2]						
하	1,972	1.6 (0.4)	900	2.1 (0.7)	1,072	1.1 (0.4)
중하	1,974	1.0 (0.3)	892	1.3 (0.5)	1,082	0.7 (0.3)
중상	2,002	1.4 (0.3)	901	1.8 (0.6)	1,101	1.0 (0.3)
상	1,998	1.4 (0.4)	907	1.3 (0.5)	1,091	1.5 (0.6)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,413	1.3 (0.2)	2,911	1.6 (0.3)	3,502	1.1 (0.2)
읍면	1,650	1.1 (0.4)	737	1.3 (0.5)	913	1.0 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,972	1.6 (0.4)	900	2.0 (0.7)	1,072	1.1 (0.4)
중하	1,974	1.0 (0.3)	892	1.2 (0.5)	1,082	0.7 (0.3)
중상	2,002	1.5 (0.3)	901	1.7 (0.5)	1,101	1.3 (0.4)
상	1,998	1.3 (0.4)	907	1.2 (0.4)	1,091	1.4 (0.6)

1) 사시 유병률 : 수평사시이거나, 수직사시이거나 기타사시인 분율, 만3세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-9. MRD1 분포[1] : 성별, 만3세이상, 2010

(단위: %)

구 분	MRD1(mm)					
	N	MRD1<1.0	MRD1<2.0	MRD1<3.0	MRD1<4.0	4.0≤MRD1
3세이상	8,058	1.7	6.8	19.6	55.0	45.0
10세이상	7,225	1.8	7.0	19.9	54.5	45.5
19세이상	6,225	1.7	6.9	19.7	54.4	45.6
30세이상	5,466	2.1	8.2	22.3	57.5	42.5
65세이상	1,393	8.1	25.5	50.7	84.5	15.5
연령(세)						
3-5	334	0.0	2.1	14.9	61.2	38.8
6-11	772	0.8	5.9	19.4	61.7	38.3
12-18	727	2.1	8.1	20.1	52.9	47.1
19-29	759	0.3	1.3	9.5	42.0	58.0
30-39	1,231	0.1	2.1	9.3	39.3	60.7
40-49	1,158	0.7	3.2	14.4	49.4	50.6
50-59	1,166	0.8	6.6	21.2	61.9	38.1
60-69	1,029	3.9	15.9	37.6	76.8	23.2
70+	882	10.0	28.4	55.1	87.5	12.5
남자						
3세이상	3,647	1.6	7.6	21.4	58.0	42.0
10세이상	3,219	1.7	7.8	21.7	57.6	42.4
19세이상	2,681	1.6	7.3	21.2	57.2	42.8
30세이상	2,377	1.9	8.5	23.0	59.1	40.9
65세이상	619	7.5	23.6	46.3	81.3	18.7
연령(세)						
3-5	168	0.0	2.1	14.6	59.9	40.1
6-11	405	0.9	7.3	22.3	66.6	33.4
12-18	393	2.1	11.3	24.0	57.7	42.3
19-29	304	0.5	2.4	14.1	49.6	50.4
30-39	511	0.3	3.0	12.6	45.5	54.5
40-49	528	1.0	5.2	17.7	53.2	46.8
50-59	476	0.8	7.6	22.9	63.5	36.5
60-69	473	3.5	16.0	37.9	76.3	23.7
70+	389	9.9	26.8	49.9	83.6	16.4
여자						
3세이상	4,411	1.7	6.0	17.9	51.9	48.1
10세이상	4,006	1.8	6.2	18.1	51.4	48.6
19세이상	3,544	1.8	6.5	18.4	51.8	48.2
30세이상	3,089	2.3	7.9	21.6	55.9	44.1
65세이상	774	8.5	26.7	53.8	86.8	13.2
연령(세)						
3-5	166	0.0	2.0	15.2	62.7	37.3
6-11	367	0.7	4.5	16.3	56.4	43.6
12-18	334	2.1	4.3	15.3	47.0	53.0
19-29	455	0.0	0.2	4.6	33.9	66.1
30-39	720	0.0	1.1	5.9	32.9	67.1
40-49	630	0.4	1.1	11.0	45.5	54.5
50-59	690	0.8	5.6	19.5	60.5	39.5
60-69	556	4.3	15.8	37.3	77.2	22.8
70+	493	10.1	29.5	58.3	90.0	10.0

1) MRD1 분포 : 단안 또는 양안의 MRD1(각막반사점으로부터 위눈꺼풀테까지의 거리)이 각 범주에 해당하는 분율, 만3세이상

표 3-IX-10. 안검하수 유병률[1] : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
3세이상	8,058	6.8 (0.7)	3,647	7.6 (0.8)	4,411	6.0 (0.8)
10세이상	7,225	7.0 (0.7)	3,219	7.8 (0.8)	4,006	6.2 (0.8)
19세이상	6,225	6.9 (0.8)	2,681	7.3 (0.8)	3,544	6.5 (0.8)
30세이상	5,466	8.2 (0.9)	2,377	8.5 (1.0)	3,089	7.9 (1.0)
연령(세)						
3-5	334	2.1 (0.8)	168	2.1 (1.0)	166	2.0 (0.9)
6-11	772	5.9 (1.3)	405	7.3 (1.7)	367	4.5 (1.4)
12-18	727	8.1 (1.6)	393	11.3 (2.1)	334	4.3 (1.6)
19-29	759	1.3 (0.5)	304	2.4 (1.0)	455	0.2 (0.2)
30-39	1,231	2.1 (0.6)	511	3.0 (0.9)	720	1.1 (0.5)
40-49	1,158	3.2 (0.7)	528	5.2 (1.3)	630	1.1 (0.4)
50-59	1,166	6.6 (1.1)	476	7.6 (1.5)	690	5.6 (1.3)
60-69	1,029	15.9 (2.3)	473	16.0 (2.6)	556	15.8 (2.6)
70+	882	28.4 (2.9)	389	26.8 (3.3)	493	29.5 (3.4)
19-64	4,832	3.8 (0.5)	2,062	5.1 (0.7)	2,770	2.5 (0.5)
65+	1,393	25.5 (2.5)	619	23.6 (2.6)	774	26.7 (3.1)
거주지역						
동	6,408	5.5 (0.6)	2,910	6.6 (0.8)	3,498	4.4 (0.6)
읍면	1,650	11.5 (2.1)	737	11.1 (2.2)	913	11.9 (2.3)
소득수준[2]						
하	1,971	6.2 (0.9)	898	7.0 (1.1)	1,073	5.5 (1.0)
중하	1,973	7.5 (1.1)	893	8.1 (1.2)	1,080	6.8 (1.3)
중상	2,002	8.0 (1.0)	901	8.3 (1.2)	1,101	7.6 (1.1)
상	1,994	5.4 (0.9)	906	6.4 (1.2)	1,088	4.4 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,408	5.5 (0.6)	2,910	6.8 (0.8)	3,498	4.1 (0.6)
읍면	1,650	7.8 (1.6)	737	8.8 (1.8)	913	6.4 (1.5)
소득수준(표준화)						
하	1,971	5.8 (0.8)	898	6.7 (1.0)	1,073	4.6 (0.8)
중하	1,973	6.9 (0.9)	893	8.1 (1.1)	1,080	5.7 (0.9)
중상	2,002	7.1 (0.8)	901	7.9 (1.1)	1,101	5.9 (0.8)
상	1,994	4.8 (0.8)	906	6.1 (1.1)	1,088	3.5 (0.7)

1) 안검하수 유병률 : 단안 또는 양안의 MRD1(각막반사점으로부터 위눈꺼풀테까지의 거리)값이 2.0mm 미만인 분율, 만3세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-11. 백내장 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자		최대교정시력 0.8미만					
							전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,233	40.0 (2.0)	1,865	38.5 (2.2)	2,368	41.4 (2.2)	4,199	10.9 (0.8)	1,859	8.2 (0.8)	2,340	13.3 (1.0)
65세이상	1,393	87.4 (1.7)	619	86.9 (2.1)	774	87.8 (1.8)	1,363	36.9 (2.1)	615	30.2 (2.6)	748	41.8 (2.4)
연령(세)												
40-49	1,155	10.5 (1.9)	527	11.1 (2.1)	628	10.0 (2.2)	1,154	1.4 (0.6)	526	1.3 (0.7)	628	1.4 (0.7)
50-59	1,169	32.2 (3.1)	477	33.9 (3.5)	692	30.4 (3.5)	1,167	3.1 (0.7)	476	2.8 (0.9)	691	3.3 (0.9)
60-69	1,028	69.2 (3.0)	473	69.7 (3.6)	555	68.8 (3.4)	1,024	14.0 (1.5)	472	11.4 (1.9)	552	16.5 (1.8)
70+	881	91.3 (1.6)	388	91.0 (2.2)	493	91.5 (1.9)	854	45.7 (2.6)	385	38.7 (3.2)	469	50.3 (3.3)
거주지역												
동	3,133	36.1 (1.9)	1,382	35.7 (2.1)	1,751	36.5 (2.1)	3,120	8.4 (0.7)	1,381	6.7 (0.7)	1,739	10.0 (0.9)
읍면	1,100	50.6 (5.1)	483	46.1 (5.5)	617	54.6 (5.0)	1,079	17.7 (2.1)	478	12.6 (2.2)	601	22.4 (2.5)
소득수준[2]												
하	1,031	38.4 (2.6)	458	36.1 (3.3)	573	40.6 (2.8)	1,021	12.3 (1.5)	455	9.1 (1.6)	566	15.4 (2.0)
중하	1,035	39.6 (3.2)	458	38.7 (3.5)	577	40.5 (3.7)	1,030	10.3 (1.1)	457	7.5 (1.1)	573	13.0 (1.7)
중상	1,066	40.4 (2.6)	469	38.6 (3.0)	597	41.9 (3.0)	1,059	9.6 (1.3)	467	8.0 (1.4)	592	10.9 (1.5)
상	1,037	41.2 (2.7)	457	40.8 (3.2)	580	41.6 (3.1)	1,025	10.8 (1.2)	457	8.8 (1.4)	568	12.8 (1.6)
거주지역(표준화)[3]												
동	3,133	36.7 (1.9)	1,382	37.5 (2.0)	1,751	36.0 (2.0)	3,120	8.8 (0.7)	1,381	7.6 (0.7)	1,739	9.8 (0.9)
읍면	1,100	41.6 (3.9)	483	42.1 (4.0)	617	40.9 (4.4)	1,079	12.9 (1.3)	478	10.9 (1.7)	601	14.5 (1.6)
소득수준(표준화)												
하	1,031	37.9 (2.2)	458	38.5 (2.7)	573	37.3 (2.3)	1,021	12.0 (1.3)	455	10.0 (1.6)	566	13.6 (1.6)
중하	1,035	38.7 (2.7)	458	39.5 (3.0)	577	37.6 (2.8)	1,030	10.4 (0.8)	457	8.7 (1.2)	573	11.6 (1.0)
중상	1,066	37.9 (2.2)	469	37.9 (2.4)	597	38.0 (2.5)	1,059	9.0 (1.2)	467	7.9 (1.3)	592	9.7 (1.4)
상	1,037	37.2 (2.1)	457	38.4 (2.6)	580	36.1 (2.7)	1,025	9.3 (0.9)	457	8.3 (1.2)	568	10.2 (1.2)

1) 백내장 유병률 : 단안 또는 양안이 백내장이거나 인공수정체안이거나 무수정체안인 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-12. 군날개 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,225	8.9 (0.6)	1,860	9.5 (0.8)	2,365	8.4 (0.7)
65세이상	1,389	17.1 (1.4)	617	18.4 (1.9)	772	16.1 (1.8)
연령(세)						
40-49	1,155	3.3 (0.6)	526	4.5 (1.1)	629	2.0 (0.6)
50-59	1,165	8.4 (1.2)	475	9.0 (1.7)	690	7.9 (1.5)
60-69	1,026	12.9 (1.2)	471	15.4 (2.0)	555	10.5 (1.5)
70+	879	18.8 (1.7)	388	17.7 (2.2)	491	19.5 (2.2)
거주지역						
동	3,126	7.0 (0.6)	1,378	7.8 (0.9)	1,748	6.2 (0.8)
읍면	1,099	14.3 (1.2)	482	14.0 (2.1)	617	14.5 (1.2)
소득수준[2]						
하	1,029	9.4 (1.1)	457	8.8 (1.6)	572	10.0 (1.5)
중하	1,033	9.3 (1.1)	457	10.8 (1.6)	576	7.9 (1.5)
중상	1,064	9.2 (1.1)	468	10.5 (1.8)	596	8.0 (1.4)
상	1,035	7.7 (1.1)	455	7.8 (1.7)	580	7.7 (1.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,126	7.0 (0.6)	1,378	8.0 (0.9)	1,748	6.0 (0.7)
읍면	1,099	12.0 (1.0)	482	13.2 (1.8)	617	10.4 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,029	9.4 (1.0)	457	9.3 (1.5)	572	9.2 (1.3)
중하	1,033	9.1 (1.0)	457	11.2 (1.6)	576	7.1 (1.2)
중상	1,064	8.5 (1.0)	468	10.0 (1.6)	596	7.2 (1.2)
상	1,035	7.2 (1.1)	455	7.7 (1.7)	580	6.5 (1.3)

1) 군날개 유병률 : 단안 또는 양안에 군날개가 있는 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IX-13. 당뇨망막병증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	490	16.1 (2.1)	253	14.8 (2.7)	237	17.5 (3.1)
40세이상	462	15.1 (2.1)	240	13.7 (2.7)	222	16.7 (3.1)
65세이상	218	20.1 (3.8)	98	16.7 (4.4)	120	22.2 (5.5)
연령(세)						
30-49	85	13.5 (4.0)	46	9.8 (4.6)	39	19.1 (7.0)
50-59	125	14.3 (3.5)	79	18.1 (5.3)	46	7.1 (3.9)
60-69	151	16.0 (3.3)	68	13.6 (4.2)	83	17.8 (4.9)
70+	129	22.3 (5.2)	60	18.1 (5.9)	69	25.0 (7.5)
거주지역						
동	375	14.7 (2.3)	193	13.5 (3.0)	182	16.1 (3.4)
읍면	115	20.3 (4.4)	60	19.1 (5.2)	55	21.4 (6.9)

1) 당뇨망막병증 유병률 : 당뇨병유병자(공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여) 중 단안 또는 양안의 무산동안저촬영결과 당뇨망막병증 혹은 유사소견이 있는 분율, 만30세이상

표 3-IX-14. 나이관련황반변성 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 2010

(단위: %)

구 분	초기		후기		습성		건성	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체								
40세이상	3,870	6.2 (0.5)	3,870	0.5 (0.1)	3,870	0.4 (0.1)	3,870	0.1 (-)[2]
65세이상	1,154	16.5 (1.6)	1,154	1.7 (0.5)	1,154	1.3 (0.5)	1,154	0.4 (0.2)
연령(세)								
40-49	1,127	1.3 (0.4)	1,127	0.1 (0.1)	1,127	0.1 (0.1)	1,127	0.0 (-)
50-59	1,113	4.6 (0.8)	1,113	0.2 (0.1)	1,113	0.2 (0.1)	1,113	0.0 (-)
60-69	933	11.1 (1.2)	933	1.5 (0.6)	933	1.3 (0.6)	933	0.3 (0.2)
70+	697	18.2 (2.3)	697	1.1 (0.4)	697	0.6 (0.3)	697	0.5 (0.3)
남자								
40세이상	1,692	5.3 (0.6)	1,692	0.8 (0.3)	1,692	0.6 (0.2)	1,692	0.2 (0.1)
65세이상	505	13.8 (2.1)	505	3.3 (1.3)	505	2.4 (1.2)	505	0.9 (0.5)
연령(세)								
40-49	516	1.4 (0.6)	516	0.1 (0.1)	516	0.1 (0.1)	516	0.0 (-)
50-59	447	4.6 (1.0)	447	0.2 (0.2)	447	0.2 (0.2)	447	0.0 (-)
60-69	428	10.2 (1.7)	428	3.1 (1.3)	428	2.5 (1.2)	428	0.6 (0.4)
70+	301	14.8 (2.4)	301	1.8 (0.9)	301	0.5 (0.3)	301	1.3 (0.8)
여자								
40세이상	2,178	7.1 (0.6)	2,178	0.2 (0.1)	2,178	0.2 (0.1)	2,178	0.0 (-)
65세이상	649	18.3 (2.3)	649	0.6 (0.3)	649	0.6 (0.3)	649	0.0 (-)
연령(세)								
40-49	611	1.1 (0.5)	611	0.0 (-)	611	0.0 (-)	611	0.0 (-)
50-59	666	4.7 (1.0)	666	0.2 (0.1)	666	0.2 (0.1)	666	0.0 (-)
60-69	505	11.8 (1.9)	505	0.1 (0.1)	505	0.1 (0.1)	505	0.0 (-)
70+	396	20.2 (3.2)	396	0.7 (0.3)	396	0.7 (0.3)	396	0.0 (-)

1) 나이관련황반변성 유병률 : 단안 또는 양안의 무산동안저사진촬영 결과 나이관련황반변성(초기, 후기, 습성, 건성)이 있는 분율, 만40세이상

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-X-1. 만성중이염 유병률[1] : 성별, 만4세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
4세이상	7,352	3.2 (0.3)	3,305	2.6 (0.4)	4,047	3.8 (0.4)
19세이상	5,837	3.8 (0.3)	2,489	3.1 (0.5)	3,348	4.4 (0.5)
30세이상	5,112	4.3 (0.4)	2,205	3.9 (0.6)	2,907	4.8 (0.5)
연령(세)						
4-9	598	1.0 (0.6)	318	1.1 (0.8)	280	0.9 (0.6)
10-18	917	0.4 (0.2)	498	0.3 (0.2)	419	0.5 (0.3)
19-29	725	1.6 (0.6)	284	0.4 (0.4)	441	2.7 (1.1)
30-39	1,185	2.4 (0.7)	493	1.4 (0.6)	692	3.3 (1.2)
40-49	1,113	3.3 (0.7)	504	2.3 (0.9)	609	4.3 (1.0)
50-59	1,104	5.2 (0.9)	445	5.1 (1.4)	659	5.2 (1.1)
60-69	948	6.4 (0.9)	428	7.0 (1.4)	520	5.9 (1.4)
70+	762	7.7 (1.3)	335	9.4 (2.1)	427	6.7 (1.6)
6-11	668	0.7 (0.3)	357	0.8 (0.5)	311	0.6 (0.4)
12-18	672	0.1 (0.1)	364	0.0 (-)[4]	308	0.3 (0.3)
19-64	4,608	3.2 (0.3)	1,946	2.4 (0.4)	2,662	4.0 (0.6)
65+	1,229	7.6 (1.0)	543	9.0 (1.8)	686	6.7 (1.3)
거주지역						
동	5,871	2.9 (0.3)	2,651	2.3 (0.4)	3,220	3.5 (0.5)
읍면	1,481	4.3 (0.6)	654	3.8 (0.9)	827	4.7 (1.0)
소득수준[2]						
하	1,800	3.1 (0.5)	814	2.0 (0.6)	986	4.3 (0.7)
중하	1,808	2.8 (0.5)	824	3.4 (0.8)	984	2.2 (0.5)
중상	1,828	3.9 (0.6)	811	2.8 (0.7)	1,017	5.0 (1.1)
상	1,813	2.7 (0.5)	814	2.1 (0.6)	999	3.4 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,871	2.9 (0.3)	2,651	2.4 (0.4)	3,220	3.3 (0.5)
읍면	1,481	3.2 (0.5)	654	2.8 (0.6)	827	3.6 (0.9)
소득수준(표준화)						
하	1,800	3.0 (0.4)	814	2.1 (0.5)	986	4.1 (0.7)
중하	1,808	2.5 (0.4)	824	3.2 (0.7)	984	2.0 (0.5)
중상	1,828	3.6 (0.6)	811	2.7 (0.7)	1,017	4.6 (1.1)
상	1,813	2.3 (0.4)	814	1.9 (0.6)	999	2.7 (0.6)

1) 만성중이염 유병률 : 일측 혹은 양측 고막의 천공 또는 진주종(함입낭, 진주종, 선천성 진주종)이 있는 분율, 만4세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-X-2. 일측성 난청유병률[1] : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,532	6.3 (0.6)	2,903	6.7 (0.8)	3,629	5.9 (0.6)
연령(세)						
12-18	681	1.6 (0.6)	369	2.3 (1.1)	312	0.7 (0.5)
19-29	721	2.7 (1.0)	287	2.5 (1.3)	434	3.0 (1.0)
30-39	1,171	2.3 (0.9)	481	2.4 (0.8)	690	2.3 (1.2)
40-49	1,110	4.3 (0.9)	506	4.3 (1.1)	604	4.3 (1.1)
50-59	1,110	8.3 (1.3)	451	9.6 (1.9)	659	7.1 (1.4)
60-69	972	15.8 (1.5)	452	18.6 (2.4)	520	13.2 (1.8)
70+	767	20.6 (2.1)	357	24.3 (2.9)	410	18.0 (2.4)
19-64	4,604	5.0 (0.7)	1,957	5.4 (0.9)	2,647	4.6 (0.7)
65+	1,247	19.1 (1.5)	577	22.0 (2.2)	670	16.9 (1.8)
거주지역						
동	5,146	5.7 (0.7)	2,279	6.3 (1.0)	2,867	5.1 (0.7)
읍면	1,386	8.5 (1.1)	624	8.1 (1.5)	762	8.9 (1.3)
소득수준[2]						
하	1,599	6.0 (0.8)	717	7.0 (1.2)	882	4.9 (0.8)
중하	1,605	6.2 (0.9)	719	6.6 (1.1)	886	5.9 (1.0)
중상	1,627	7.1 (1.0)	710	6.3 (1.2)	917	7.8 (1.3)
상	1,609	6.0 (1.0)	721	7.0 (1.4)	888	4.9 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,146	5.7 (0.7)	2,279	6.6 (1.0)	2,867	4.9 (0.7)
읍면	1,386	5.8 (0.8)	624	5.6 (0.8)	762	6.4 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	1,599	5.8 (0.7)	717	7.3 (1.0)	882	4.6 (0.8)
중하	1,605	5.9 (0.8)	719	6.6 (1.1)	886	5.2 (0.9)
중상	1,627	6.4 (1.0)	710	5.8 (1.1)	917	7.0 (1.3)
상	1,609	5.4 (0.9)	721	6.7 (1.4)	888	4.1 (0.8)

1) 일측성 난청유병률 : 일측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-3. 양측성 난청유병률[1] : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,532	3.8 (0.3)	2,903	4.1 (0.5)	3,629	3.6 (0.4)
19세이상	5,851	4.3 (0.3)	2,534	4.6 (0.5)	3,317	4.0 (0.4)
30세이상	5,130	5.3 (0.4)	2,247	5.7 (0.6)	2,883	4.9 (0.5)
연령(세)						
12-18	681	0.2 (0.2)	369	0.3 (0.3)	312	0.0 (-)[4]
19-29	721	0.1 (0.1)	287	0.2 (0.2)	434	0.0 (-)
30-39	1,171	0.3 (0.2)	481	0.4 (0.3)	690	0.1 (0.1)
40-49	1,110	1.0 (0.4)	506	1.1 (0.6)	604	0.9 (0.4)
50-59	1,110	2.9 (0.6)	451	3.6 (1.0)	659	2.1 (0.7)
60-69	972	9.9 (1.2)	452	13.1 (2.1)	520	7.0 (1.3)
70+	767	28.6 (2.5)	357	31.2 (3.3)	410	26.7 (3.1)
19-64	4,604	1.5 (0.2)	1,957	1.8 (0.3)	2,647	1.2 (0.2)
65+	1,247	22.3 (1.9)	577	25.7 (2.7)	670	19.7 (2.2)
거주지역						
동	5,146	3.3 (0.3)	2,279	3.6 (0.5)	2,867	3.0 (0.4)
읍면	1,386	5.6 (0.8)	624	5.6 (1.1)	762	5.7 (1.0)
소득수준[2]						
하	1,599	3.9 (0.6)	717	4.1 (0.7)	882	3.8 (0.8)
중하	1,605	4.1 (0.6)	719	5.1 (1.0)	886	3.0 (0.6)
중상	1,627	3.8 (0.5)	710	3.8 (0.7)	917	3.9 (0.6)
상	1,609	3.3 (0.5)	721	2.9 (0.6)	888	3.6 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,146	3.5 (0.3)	2,279	4.2 (0.5)	2,867	2.9 (0.3)
읍면	1,386	3.4 (0.5)	624	3.9 (0.7)	762	2.8 (0.5)
소득수준(표준화)						
하	1,599	3.7 (0.4)	717	4.3 (0.7)	882	3.3 (0.6)
중하	1,605	3.9 (0.5)	719	5.4 (0.9)	886	2.6 (0.5)
중상	1,627	3.3 (0.4)	710	3.5 (0.5)	917	3.0 (0.5)
상	1,609	2.6 (0.4)	721	2.7 (0.5)	888	2.4 (0.4)

1) 양측성 난청유병률 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-X-4. 평형기관 이상 유병률[1] : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,126	3.3 (0.4)	1,823	2.4 (0.4)	2,303	4.1 (0.7)
65세이상	1,314	10.3 (1.3)	594	7.6 (1.3)	720	12.2 (1.8)
연령(세)						
40-49	1,139	0.5 (0.3)	519	0.5 (0.5)	620	0.5 (0.4)
50-59	1,158	1.5 (0.6)	470	1.2 (0.7)	688	1.7 (0.7)
60-69	1,015	4.0 (1.0)	466	3.7 (1.2)	549	4.3 (1.3)
70+	814	13.2 (1.8)	368	9.7 (1.8)	446	15.6 (2.5)
40-64	2,812	1.2 (0.3)	1,229	1.1 (0.4)	1,583	1.3 (0.4)
65+	1,314	10.3 (1.3)	594	7.6 (1.3)	720	12.2 (1.8)
거주지역						
동	3,067	2.3 (0.4)	1,355	2.0 (0.5)	1,712	2.7 (0.6)
읍면	1,059	5.9 (1.2)	468	3.7 (0.9)	591	8.0 (1.6)
소득수준[2]						
하	1,003	3.1 (0.7)	447	2.1 (0.9)	556	4.0 (1.3)
중하	1,012	3.5 (0.8)	452	3.0 (0.7)	560	4.0 (1.4)
중상	1,038	3.9 (1.0)	456	3.1 (1.1)	582	4.5 (1.1)
상	1,013	2.9 (1.0)	448	1.6 (0.6)	565	4.0 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	3,067	2.5 (0.4)	1,355	2.2 (0.5)	1,712	2.7 (0.6)
읍면	1,059	4.5 (1.0)	468	3.2 (0.8)	591	5.6 (1.3)
소득수준(표준화)						
하	1,003	3.1 (0.7)	447	2.3 (0.9)	556	3.8 (1.1)
중하	1,012	3.6 (0.7)	452	3.3 (0.7)	560	3.6 (1.1)
중상	1,038	3.6 (0.9)	456	2.9 (1.0)	582	4.1 (1.0)
상	1,013	2.5 (0.8)	448	1.6 (0.6)	565	3.2 (1.4)

1) 평형기관 이상 유병률 : 어지럼증 검사 미통과(조건1~2 15초미만, 조건3~4 20초미만)한 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-5. 비염 유병률[1] : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
6세이상	7,702	27.4 (0.9)	3,477	27.7 (1.3)	4,225	27.0 (1.0)
19세이상	6,206	26.2 (1.0)	2,675	25.9 (1.3)	3,531	26.5 (1.1)
30세이상	5,455	24.3 (1.0)	2,375	24.2 (1.4)	3,080	24.4 (1.2)
연령(세)						
6-9	498	31.0 (2.9)	262	30.1 (3.3)	236	32.1 (3.9)
10-18	998	33.4 (2.3)	540	37.1 (3.3)	458	29.1 (3.0)
19-29	751	34.1 (1.9)	300	32.9 (3.2)	451	35.4 (2.3)
30-39	1,216	33.7 (1.9)	507	33.8 (2.7)	709	33.5 (2.2)
40-49	1,153	22.2 (1.7)	528	20.6 (2.2)	625	23.8 (2.2)
50-59	1,171	22.6 (1.6)	476	22.2 (2.4)	695	22.9 (1.9)
60-69	1,032	16.6 (1.6)	475	16.2 (2.2)	557	17.0 (1.8)
70+	883	20.1 (1.8)	389	22.1 (2.6)	494	18.9 (2.2)
6-11	772	30.7 (2.4)	408	31.5 (3.0)	364	29.8 (3.1)
12-18	724	34.3 (2.7)	394	37.9 (3.8)	330	29.9 (3.4)
19-64	4,812	27.4 (1.0)	2,054	26.7 (1.4)	2,758	28.1 (1.2)
65+	1,394	19.0 (1.5)	621	20.3 (2.0)	773	18.1 (1.7)
거주지역						
동	6,109	28.7 (1.0)	2,765	28.8 (1.4)	3,344	28.7 (1.2)
읍면	1,593	22.3 (2.2)	712	23.5 (2.9)	881	21.1 (1.9)
소득수준[2]						
하	1,889	28.6 (1.5)	859	30.4 (2.2)	1,030	26.8 (1.9)
중하	1,879	27.0 (1.5)	851	26.0 (2.0)	1,028	28.0 (2.0)
중상	1,911	28.1 (1.5)	856	28.1 (2.0)	1,055	28.1 (2.2)
상	1,909	25.5 (1.5)	863	25.8 (2.1)	1,046	25.1 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	6,109	28.9 (1.0)	2,765	28.7 (1.3)	3,344	29.0 (1.2)
읍면	1,593	24.7 (2.6)	712	25.8 (3.4)	881	23.6 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	1,889	29.0 (1.4)	859	30.7 (2.2)	1,030	27.2 (1.9)
중하	1,879	27.6 (1.5)	851	26.2 (2.1)	1,028	29.0 (2.1)
중상	1,911	28.9 (1.5)	856	28.5 (2.0)	1,055	29.3 (2.2)
상	1,909	26.1 (1.5)	863	26.1 (2.1)	1,046	26.4 (1.9)

1) 비염 유병률 : 최근 1년이내 감기(발열, 인후통증)와 관련없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 분율, 만6세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-6. 만성 비부비동염 유병률[1] : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,830	5.1 (0.4)	3,035	5.7 (0.6)	3,795	4.6 (0.5)
19세이상	6,118	5.2 (0.4)	2,649	5.6 (0.6)	3,469	4.9 (0.5)
30세이상	5,382	5.6 (0.5)	2,350	6.6 (0.7)	3,032	4.7 (0.6)
연령(세)						
12-18	712	4.2 (0.9)	386	6.3 (1.5)	326	1.7 (0.8)
19-29	736	3.6 (0.8)	299	1.9 (0.7)	437	5.6 (1.5)
30-39	1,188	5.4 (0.8)	502	6.3 (1.3)	686	4.5 (0.9)
40-49	1,138	4.8 (0.8)	521	5.0 (1.1)	617	4.6 (1.1)
50-59	1,163	6.0 (0.9)	474	7.7 (1.4)	689	4.4 (0.9)
60-69	1,021	6.5 (1.0)	468	9.2 (1.7)	553	4.1 (1.2)
70+	872	6.4 (1.4)	385	6.3 (1.6)	487	6.4 (1.8)
19-64	4,738	5.0 (0.4)	2,034	5.3 (0.6)	2,704	4.7 (0.6)
65+	1,380	6.6 (1.1)	615	7.9 (1.4)	765	5.6 (1.3)
거주지역						
동	5,361	4.8 (0.5)	2,385	5.1 (0.6)	2,976	4.4 (0.6)
읍면	1,469	6.5 (0.8)	650	8.0 (1.4)	819	5.1 (0.9)
소득수준[2]						
하	1,679	5.6 (0.7)	751	7.0 (1.2)	928	4.2 (0.8)
중하	1,663	5.4 (0.8)	745	4.9 (0.9)	918	6.0 (1.1)
중상	1,693	5.9 (0.8)	747	6.9 (1.2)	946	4.8 (1.0)
상	1,694	3.8 (0.6)	752	4.2 (0.9)	942	3.3 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,361	4.7 (0.5)	2,385	5.1 (0.6)	2,976	4.3 (0.6)
읍면	1,469	6.3 (0.8)	650	7.0 (1.2)	819	5.6 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,679	5.6 (0.7)	751	7.0 (1.1)	928	4.1 (0.8)
중하	1,663	5.3 (0.8)	745	4.6 (0.8)	918	6.0 (1.2)
중상	1,693	5.8 (0.8)	747	6.9 (1.2)	946	4.9 (1.0)
상	1,694	3.7 (0.6)	752	4.0 (0.8)	942	3.5 (0.8)

1) 만성 비부비동염 유병률 : 3개월이상 주증상(비루 혹은 후비루, 코막힘, 안면부 동통이나 압박감, 후각장애) 중 비루 혹은 후비루, 코막힘 중 1개이상을 포함하여 2개이상 지속되거나 수축후 비강검사에서 비용종이 있는 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-7. 비중격 만곡증 유병률[1] : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,833	49.7 (1.7)	3,036	58.8 (2.0)	3,797	40.6 (1.7)
19세이상	6,121	50.7 (1.6)	2,650	60.2 (1.9)	3,471	41.4 (1.7)
30세이상	5,385	50.3 (1.6)	2,351	60.1 (1.8)	3,034	40.9 (1.7)
연령(세)						
12-18	712	41.7 (3.1)	386	48.4 (4.1)	326	33.6 (3.5)
19-29	736	52.4 (3.1)	299	60.6 (4.4)	437	43.7 (3.1)
30-39	1,189	51.2 (2.4)	502	59.8 (3.1)	687	42.1 (2.6)
40-49	1,138	51.6 (2.3)	521	60.8 (3.0)	617	42.0 (2.7)
50-59	1,163	51.9 (2.1)	474	62.4 (3.0)	689	41.6 (2.3)
60-69	1,021	48.5 (2.0)	468	59.6 (2.6)	553	38.6 (2.6)
70+	874	44.0 (2.8)	386	53.9 (3.5)	488	37.8 (3.2)
19-64	4,739	51.5 (1.7)	2,034	60.6 (2.1)	2,705	42.1 (1.8)
65+	1,382	45.6 (2.4)	616	56.7 (3.1)	766	37.9 (2.7)
거주지역						
동	5,362	50.7 (1.9)	2,385	59.7 (2.2)	2,977	41.6 (1.9)
읍면	1,471	46.1 (3.7)	651	55.3 (4.7)	820	37.2 (3.2)
소득수준[2]						
하	1,680	51.1 (2.7)	752	58.9 (3.4)	928	43.3 (2.8)
중하	1,663	51.8 (2.1)	745	60.6 (2.6)	918	42.7 (2.3)
중상	1,693	47.3 (2.1)	747	55.9 (2.8)	946	38.9 (2.4)
상	1,696	49.2 (2.1)	752	60.2 (2.5)	944	37.9 (2.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	5,362	50.7 (1.9)	2,385	59.7 (2.2)	2,977	41.5 (2.0)
읍면	1,471	48.2 (4.1)	651	55.9 (5.3)	820	39.9 (3.5)
소득수준(표준화)						
하	1,680	51.1 (2.7)	752	58.4 (3.4)	928	43.7 (2.7)
중하	1,663	52.0 (2.1)	745	60.9 (2.5)	918	42.8 (2.4)
중상	1,693	47.4 (2.2)	747	56.0 (2.8)	946	38.7 (2.6)
상	1,696	49.2 (2.2)	752	60.1 (2.6)	944	37.8 (2.5)

1) 비중격만곡증 유병률 : 수축후 비강검사에서 비중격만곡이 있는 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-8. 후각장애 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,206	4.8 (0.4)	2,675	4.3 (0.6)	3,531	5.3 (0.5)
30세이상	5,455	5.6 (0.5)	2,375	5.2 (0.7)	3,080	6.0 (0.5)
연령(세)						
19-29	751	1.4 (0.5)	300	0.8 (0.6)	451	1.9 (0.8)
30-39	1,216	2.7 (0.6)	507	2.3 (0.8)	709	3.1 (0.7)
40-49	1,153	4.3 (0.8)	528	5.0 (1.2)	625	3.5 (1.0)
50-59	1,171	5.9 (0.8)	476	4.1 (0.9)	695	7.6 (1.2)
60-69	1,032	8.5 (1.2)	475	8.9 (1.9)	557	8.1 (1.6)
70+	883	11.8 (1.6)	389	12.2 (2.5)	494	11.6 (1.7)
19-64	4,812	3.8 (0.4)	2,054	3.3 (0.5)	2,758	4.2 (0.4)
65+	1,394	11.3 (1.3)	621	12.1 (2.3)	773	10.7 (1.3)
거주지역						
동	4,843	4.1 (0.4)	2,082	3.7 (0.6)	2,761	4.5 (0.5)
읍면	1,363	7.4 (1.2)	593	6.7 (1.8)	770	8.1 (1.2)
소득수준[2]						
하	1,529	5.4 (0.7)	663	5.1 (0.9)	866	5.7 (0.9)
중하	1,516	4.5 (0.7)	660	3.4 (0.8)	856	5.6 (1.1)
중상	1,546	4.0 (0.6)	664	3.9 (1.0)	882	4.1 (0.7)
상	1,527	4.7 (0.8)	656	4.3 (1.3)	871	5.1 (1.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,843	4.1 (0.4)	2,082	3.8 (0.6)	2,761	4.3 (0.5)
읍면	1,363	5.4 (0.8)	593	5.4 (1.3)	770	5.2 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,529	5.1 (0.6)	663	5.0 (0.8)	866	5.2 (0.8)
중하	1,516	4.2 (0.6)	660	3.3 (0.7)	856	5.1 (1.0)
중상	1,546	3.7 (0.6)	664	3.9 (1.0)	882	3.5 (0.6)
상	1,527	4.4 (0.8)	656	4.2 (1.3)	871	4.6 (0.9)

1) 후각장애 유병률 : 후각장애가 3개월이상 지속되고 있는 분율, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-9. 후두양성점막질환 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	5,224	2.4 (0.3)	2,257	2.5 (0.5)	2,967	2.4 (0.3)
30세이상	4,563	2.3 (0.3)	1,996	2.4 (0.5)	2,567	2.3 (0.3)
연령(세)						
19-29	661	2.9 (0.9)	261	2.9 (1.5)	400	2.9 (1.0)
30-39	1,063	3.1 (0.6)	452	2.1 (0.8)	611	4.2 (0.9)
40-49	982	2.6 (0.7)	446	2.5 (0.9)	536	2.6 (0.8)
50-59	964	1.9 (0.5)	394	2.3 (0.8)	570	1.5 (0.5)
60-69	845	1.6 (0.6)	395	2.7 (1.3)	450	0.6 (0.3)
70+	709	1.4 (0.4)	309	2.2 (0.9)	400	0.9 (0.4)
19-64	4,096	2.5 (0.4)	1,750	2.4 (0.6)	2,346	2.7 (0.4)
65+	1,128	1.8 (0.5)	507	3.2 (1.3)	621	0.8 (0.3)
거주지역						
동	4,072	2.5 (0.4)	1,762	2.5 (0.6)	2,310	2.6 (0.3)
읍면	1,152	2.1 (0.6)	495	2.4 (0.9)	657	1.8 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,282	3.1 (0.5)	560	2.7 (0.8)	722	3.5 (0.7)
중하	1,277	1.8 (0.6)	564	2.1 (1.0)	713	1.5 (0.5)
중상	1,314	2.3 (0.6)	554	1.6 (0.7)	760	2.9 (0.8)
상	1,273	2.6 (0.7)	549	3.6 (1.4)	724	1.6 (0.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,072	2.5 (0.4)	1,762	2.5 (0.7)	2,310	2.6 (0.4)
읍면	1,152	2.6 (0.7)	495	3.0 (1.1)	657	2.2 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,282	3.2 (0.5)	560	2.8 (0.9)	722	3.7 (0.8)
중하	1,277	1.9 (0.7)	564	2.1 (1.1)	713	1.6 (0.5)
중상	1,314	2.3 (0.6)	554	1.6 (0.6)	760	3.1 (0.8)
상	1,273	2.6 (0.8)	549	3.7 (1.5)	724	1.7 (0.5)

1) 후두양성점막질환 유병률 : 후두내시경검사 상 일측 혹은 양측에 성대 폴립이나 성대 결절이나 라인케부종이 있는 분율, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-10. 본인인지 음성장애 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,207	5.8 (0.4)	2,676	4.5 (0.5)	3,531	7.0 (0.6)
30세이상	5,456	6.3 (0.5)	2,376	4.9 (0.5)	3,080	7.5 (0.6)
연령(세)						
19-29	751	3.6 (0.8)	300	2.6 (1.0)	451	4.7 (1.1)
30-39	1,216	4.3 (0.7)	507	2.1 (0.6)	709	6.5 (1.3)
40-49	1,153	6.5 (0.9)	528	5.9 (1.2)	625	7.2 (1.2)
50-59	1,171	6.5 (1.0)	476	4.2 (1.2)	695	8.8 (1.4)
60-69	1,032	7.1 (1.1)	475	5.9 (1.3)	557	8.3 (1.6)
70+	884	8.7 (1.2)	390	10.7 (2.0)	494	7.4 (1.3)
19-64	4,812	5.5 (0.4)	2,054	4.0 (0.5)	2,758	7.0 (0.6)
65+	1,395	7.3 (0.9)	622	8.1 (1.4)	773	6.8 (1.1)
거주지역						
동	4,843	5.7 (0.5)	2,082	4.1 (0.5)	2,761	7.2 (0.7)
읍면	1,364	6.1 (0.9)	594	5.9 (1.3)	770	6.3 (1.1)
소득수준[2]						
하	1,530	5.6 (0.8)	664	4.2 (0.9)	866	7.0 (1.1)
중하	1,516	6.6 (0.9)	660	6.1 (1.1)	856	7.1 (1.1)
중상	1,546	5.7 (0.7)	664	4.2 (0.9)	882	7.0 (1.1)
상	1,527	4.9 (0.6)	656	3.4 (0.8)	871	6.5 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,843	5.6 (0.5)	2,082	4.2 (0.5)	2,761	7.1 (0.7)
읍면	1,364	5.9 (0.9)	594	5.3 (1.3)	770	6.7 (1.3)
소득수준(표준화)						
하	1,530	5.4 (0.7)	664	4.2 (1.0)	866	6.9 (1.1)
중하	1,516	6.5 (0.8)	660	6.0 (1.0)	856	7.0 (1.1)
중상	1,546	5.6 (0.8)	664	4.3 (0.8)	882	7.0 (1.2)
상	1,527	4.7 (0.6)	656	3.4 (0.8)	871	6.2 (0.9)

1) 본인인지 음성장애 유병률 : 현재 본인의 목소리에 이상을 경험한 분율, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XI-1. 혈중 비타민D 분포 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : ng/mL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	3,064	18.7	0.29	9.9	11.4	14.1	17.7	22.2	27.4	30.9
19세이상	2,588	18.9	0.31	9.9	11.5	14.2	17.9	22.5	27.9	31.2
30세이상	2,294	19.4	0.33	10.0	11.7	14.6	18.5	23.1	28.5	32.0
65세이상	554	21.3	0.61	10.4	11.9	15.8	20.6	25.6	32.0	36.2
연령(세)										
10-18	476	17.2	0.35	9.4	11.1	13.3	16.8	20.0	24.0	26.3
19-29	294	17.0	0.44	9.6	10.9	13.0	16.1	19.7	24.4	27.9
30-39	508	18.0	0.43	9.9	11.3	13.8	17.1	21.2	25.4	28.7
40-49	526	19.1	0.46	10.0	11.8	14.2	18.3	22.9	27.6	30.4
50-59	467	20.2	0.49	9.7	11.9	15.8	19.4	24.1	29.3	33.2
60-69	457	21.1	0.57	10.5	12.4	16.2	20.2	25.0	32.2	35.6
70+	336	21.1	0.65	10.0	12.3	15.7	20.6	25.4	30.7	34.7
여자										
10세이상	3,751	16.6	0.28	8.5	9.8	12.4	15.5	19.7	24.9	28.6
19세이상	3,354	16.7	0.29	8.4	9.8	12.4	15.5	19.9	25.3	29.0
30세이상	2,909	17.1	0.30	8.7	10.0	12.7	16.0	20.5	25.9	29.5
65세이상	659	18.3	0.50	8.4	10.3	13.4	16.7	22.2	28.2	31.9
연령(세)										
10-18	397	16.0	0.37	9.3	10.5	12.7	15.5	18.5	22.4	25.9
19-29	445	14.8	0.43	7.5	8.7	11.0	13.7	17.6	22.1	25.1
30-39	697	16.1	0.40	8.2	9.4	12.3	15.2	18.8	23.9	28.5
40-49	611	16.1	0.37	8.8	10.0	12.2	15.1	18.9	23.3	27.5
50-59	677	18.3	0.43	9.2	10.9	13.9	17.5	21.9	26.6	30.2
60-69	524	18.5	0.50	8.7	10.5	13.5	17.4	22.8	28.2	30.9
70+	400	18.2	0.54	8.6	10.7	13.4	16.7	21.7	27.5	33.3

표 3-XI-2. 혈중 부갑상선호르몬 분포 : 성별, 만50세이상, 2010

(단위 : pg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
50세이상	1,259	66.8	1.51	33.9	39.8	48.9	61.5	78.6	95.8	111.0
65세이상	554	66.5	1.72	33.4	39.0	49.7	62.0	78.2	93.5	109.0
연령(세)										
50-59	466	67.5	2.11	33.9	39.8	48.0	61.6	79.2	98.2	112.0
60-69	457	64.1	1.65	32.8	39.3	47.9	60.1	75.7	93.7	104.0
70+	336	68.9	2.02	36.1	40.8	51.8	63.4	81.2	94.9	112.0
여자										
50세이상	1,600	69.8	1.16	35.1	40.3	50.8	64.1	81.7	106.0	123.0
65세이상	659	74.1	1.74	36.0	42.3	52.9	67.9	86.2	113.0	134.0
연령(세)										
50-59	676	66.9	1.43	34.8	39.4	49.7	61.8	77.6	98.7	113.0
60-69	524	68.3	1.72	33.8	38.5	48.8	63.2	80.2	106.0	120.0
70+	400	76.8	2.19	40.3	43.3	55.4	69.5	89.3	115.0	137.0

표 3-XI-3. 골밀도 분포(대퇴골) : 성별, 만10세이상, 2008-2010

(단위 : g/cm^2)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	8,088	0.970	0.002	0.754	0.806	0.882	0.970	1.056	1.137	1.188
19세이상	7,244	0.977	0.002	0.773	0.819	0.891	0.975	1.060	1.141	1.192
30세이상	6,280	0.965	0.002	0.762	0.809	0.880	0.965	1.049	1.127	1.170
65세이상	1,584	0.873	0.004	0.654	0.713	0.789	0.869	0.959	1.045	1.089
10-18	844	0.898	0.006	0.673	0.717	0.796	0.891	0.994	1.087	1.133
19-29	964	1.025	0.004	0.842	0.872	0.946	1.020	1.102	1.194	1.236
30-39	1,381	0.994	0.004	0.806	0.844	0.914	0.993	1.075	1.147	1.198
40-49	1,430	0.988	0.004	0.801	0.842	0.902	0.986	1.065	1.142	1.191
50-59	1,254	0.965	0.004	0.788	0.820	0.888	0.963	1.037	1.110	1.152
60-69	1,225	0.929	0.004	0.724	0.771	0.853	0.926	1.011	1.084	1.135
70+	990	0.848	0.005	0.627	0.689	0.769	0.844	0.936	1.018	1.067
여자										
10세이상	10,288	0.851	0.002	0.630	0.686	0.768	0.854	0.938	1.014	1.056
19세이상	9,546	0.852	0.002	0.627	0.685	0.770	0.855	0.939	1.015	1.056
30세이상	8,332	0.843	0.002	0.612	0.672	0.756	0.847	0.934	1.014	1.056
65세이상	2,165	0.698	0.003	0.516	0.554	0.624	0.701	0.769	0.836	0.872
10-18	742	0.844	0.006	0.661	0.688	0.754	0.842	0.926	0.998	1.040
19-29	1,214	0.891	0.003	0.731	0.767	0.825	0.891	0.954	1.016	1.054
30-39	1,834	0.897	0.003	0.724	0.759	0.821	0.894	0.971	1.038	1.080
40-49	1,854	0.910	0.003	0.745	0.775	0.836	0.909	0.976	1.051	1.097
50-59	1,730	0.851	0.003	0.682	0.723	0.781	0.845	0.915	0.994	1.036
60-69	1,544	0.769	0.003	0.608	0.648	0.704	0.766	0.837	0.894	0.936
70+	1,370	0.673	0.004	0.500	0.533	0.598	0.674	0.743	0.807	0.845

* 골밀도 측정장비 : Dual energy X-ray absorptiometry(DXA), (Hologic Discovery W, Hologlc, USA)

표 3-XI-4. 골밀도 분포(대퇴경부) : 성별, 만10세이상, 2008-2010

(단위 : g/cm^2)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	8,088	0.825	0.002	0.612	0.658	0.730	0.816	0.909	1.007	1.067
19세이상	7,244	0.826	0.002	0.615	0.660	0.733	0.817	0.910	1.008	1.067
30세이상	6,280	0.802	0.002	0.603	0.645	0.717	0.797	0.883	0.967	1.022
65세이상	1,584	0.694	0.004	0.512	0.550	0.611	0.692	0.768	0.851	0.903
10-18	844	0.808	0.006	0.590	0.622	0.704	0.804	0.904	0.997	1.065
19-29	964	0.918	0.005	0.720	0.756	0.821	0.904	1.007	1.090	1.157
30-39	1,381	0.857	0.004	0.668	0.706	0.774	0.848	0.932	1.015	1.070
40-49	1,430	0.823	0.003	0.652	0.688	0.740	0.810	0.895	0.979	1.029
50-59	1,254	0.790	0.004	0.618	0.656	0.716	0.785	0.853	0.928	0.987
60-69	1,225	0.748	0.004	0.568	0.604	0.670	0.742	0.821	0.900	0.946
70+	990	0.671	0.004	0.494	0.532	0.591	0.669	0.745	0.809	0.862
여자										
10세이상	10,288	0.712	0.002	0.498	0.547	0.628	0.714	0.798	0.873	0.920
19세이상	9,546	0.710	0.002	0.494	0.544	0.626	0.713	0.795	0.870	0.918
30세이상	8,332	0.695	0.002	0.481	0.528	0.609	0.696	0.781	0.860	0.906
65세이상	2,165	0.551	0.003	0.399	0.432	0.490	0.551	0.612	0.666	0.706
10-18	742	0.734	0.006	0.544	0.581	0.645	0.731	0.818	0.897	0.942
19-29	1,214	0.777	0.004	0.621	0.653	0.704	0.770	0.836	0.915	0.955
30-39	1,834	0.762	0.003	0.598	0.634	0.691	0.755	0.831	0.900	0.939
40-49	1,854	0.757	0.003	0.596	0.629	0.685	0.753	0.822	0.889	0.931
50-59	1,730	0.696	0.003	0.543	0.574	0.627	0.690	0.760	0.828	0.874
60-69	1,544	0.617	0.003	0.477	0.509	0.558	0.613	0.669	0.732	0.772
70+	1,370	0.530	0.003	0.384	0.416	0.471	0.528	0.587	0.645	0.674

* 골밀도 측정장비 : Dual energy X-ray absorptiometry(DXA), (Hologic Discovery W, Hologlc, USA)

표 3-XI-5. 골밀도 분포(요추) : 성별, 만10세이상 , 2008-2010

(단위 : g/cm^2)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	7,964	0.957	0.002	0.713	0.778	0.868	0.959	1.050	1.137	1.196
19세이상	7,130	0.973	0.002	0.761	0.809	0.884	0.970	1.059	1.144	1.205
30세이상	6,172	0.967	0.002	0.750	0.798	0.873	0.962	1.055	1.143	1.203
65세이상	1,515	0.923	0.005	0.669	0.722	0.804	0.909	1.025	1.150	1.225
10-18	834	0.801	0.007	0.549	0.586	0.675	0.805	0.926	1.001	1.047
19-29	958	0.999	0.004	0.819	0.860	0.924	0.992	1.069	1.154	1.206
30-39	1,370	0.992	0.004	0.809	0.835	0.910	0.988	1.073	1.146	1.186
40-49	1,430	0.976	0.004	0.783	0.824	0.893	0.966	1.059	1.132	1.205
50-59	1,237	0.955	0.005	0.742	0.787	0.856	0.947	1.038	1.136	1.210
60-69	1,198	0.945	0.005	0.710	0.754	0.839	0.934	1.038	1.157	1.209
70+	937	0.913	0.007	0.658	0.708	0.789	0.901	1.021	1.155	1.230
여자										
10세이상	10,162	0.910	0.002	0.641	0.701	0.809	0.919	1.015	1.101	1.150
19세이상	9,419	0.916	0.002	0.649	0.708	0.817	0.926	1.020	1.105	1.153
30세이상	8,214	0.906	0.003	0.633	0.687	0.796	0.914	1.018	1.107	1.156
65세이상	2,069	0.741	0.004	0.549	0.584	0.653	0.731	0.823	0.910	0.966
10-18	743	0.845	0.008	0.594	0.645	0.751	0.850	0.947	1.036	1.086
19-29	1,205	0.961	0.003	0.788	0.834	0.889	0.953	1.028	1.095	1.143
30-39	1,831	0.995	0.003	0.810	0.849	0.916	0.993	1.075	1.141	1.183
40-49	1,861	0.987	0.004	0.795	0.837	0.905	0.983	1.069	1.146	1.193
50-59	1,712	0.880	0.004	0.667	0.711	0.782	0.874	0.970	1.056	1.128
60-69	1,510	0.791	0.004	0.604	0.639	0.706	0.782	0.871	0.950	0.995
70+	1,300	0.726	0.004	0.528	0.573	0.639	0.713	0.809	0.899	0.959

* 골밀도 측정장비 : Dual energy X-ray absorptiometry(DXA), (Hologic Discovery W, Hologlc, USA)

표 3-XI-6. 골다공증 유병률[1] : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별[2], 2010

(단위 : %)

구 분	전체		부위별					
			대퇴경부		대퇴골 전체		요추	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체								
50세이상	2,773	21.8 (1.0)	2,910	12.7 (0.7)	2,910	3.9 (0.4)	2,809	17.8 (1.0)
65세이상	1,256	40.2 (1.8)	1,359	27.6 (1.4)	1,359	9.8 (1.1)	1,272	30.9 (1.9)
연령(세)								
50-59	1,019	9.6 (1.2)	1,042	2.5 (0.6)	1,042	0.1 (0.1)	1,031	8.7 (1.1)
60-69	971	19.8 (1.3)	1,009	8.3 (1.0)	1,009	0.5 (0.3)	985	17.1 (1.2)
70+	783	47.8 (2.2)	859	36.0 (1.9)	859	14.7 (1.6)	793	35.8 (2.3)
남자								
50세이상	1,243	7.8 (0.9)	1,298	3.2 (0.5)	1,298	1.1 (0.3)	1,259	5.9 (0.8)
65세이상	556	15.2 (2.0)	597	8.6 (1.4)	597	3.1 (1.0)	563	10.0 (1.4)
연령(세)								
50-59	456	4.5 (1.2)	465	0.3 (0.2)	465	0.0 (-)[6]	461	4.3 (1.2)
60-69	445	5.5 (1.0)	461	1.6 (0.6)	461	0.2 (0.2)	451	4.5 (0.9)
70+	342	20.0 (2.7)	372	12.8 (2.2)	372	5.1 (1.6)	347	12.1 (2.1)
여자								
50세이상	1,530	34.9 (1.7)	1,612	21.3 (1.3)	1,612	6.5 (0.8)	1,550	28.8 (1.6)
65세이상	700	57.6 (2.5)	762	40.7 (2.1)	762	14.4 (1.6)	709	45.4 (2.6)
연령(세)								
50-59	563	15.4 (2.0)	577	5.0 (1.3)	577	0.3 (0.2)	570	13.8 (1.8)
60-69	526	32.8 (2.3)	548	14.2 (1.8)	548	0.8 (0.5)	534	28.4 (2.2)
70+	441	65.2 (2.7)	487	50.1 (2.6)	487	20.5 (2.3)	446	50.6 (2.8)
거주지역								
동	1,086	32.9 (1.9)	1,136	20.3 (1.5)	1,136	5.2 (0.8)	1,101	25.6 (1.8)
읍면	444	39.2 (3.7)	476	23.5 (2.3)	476	9.3 (1.6)	449	35.7 (3.8)
소득수준[3]								
하	389	36.3 (2.9)	401	19.9 (2.1)	401	5.5 (1.4)	391	31.4 (2.7)
중하	370	35.6 (3.4)	398	20.9 (2.7)	398	7.3 (1.5)	376	29.6 (3.0)
중상	373	35.2 (3.5)	402	21.5 (2.4)	402	7.3 (1.6)	380	30.6 (3.3)
상	374	34.1 (3.1)	382	24.4 (2.8)	382	6.2 (1.6)	379	24.6 (2.7)
거주지역(표준화)[4]								
동	1,086	32.4 (1.8)	1,136	19.2 (1.3)	1,136	4.7 (0.7)	1,101	25.3 (1.8)
읍면	444	32.3 (2.5)	476	16.6 (1.3)	476	5.7 (0.9)	449	29.1 (2.7)
소득수준(표준화)								
하	389	35.3 (2.6)	401	18.1 (1.8)	401	4.5 (1.0)	391	30.4 (2.4)
중하	370	34.1 (2.9)	398	18.6 (1.9)	398	6.2 (1.1)	376	28.4 (2.6)
중상	373	33.8 (3.2)	402	20.0 (2.1)	402	6.4 (1.2)	380	29.4 (3.1)
상	374	28.3 (2.2)	382	19.0 (2.0)	382	4.2 (1.1)	379	20.8 (2.1)

1) 골다공증 유병률 : 폐경 후 여자 혹은 50세이상 남자에서 대퇴경부, 대퇴골, 요추 골밀도 검사결과 가장 낮은 T-score[5]가 -2.5 이하인 분율, 만50세이상

2) 사회경제위치지표별 자료는 여자만 제시

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) T-score = (대상자골밀도 - 최대골밀도) / 최대표준편차
※최대골밀도 Asia(일본기준, g/cm2) : 대퇴경부 남자 0.846 여자 0.803, 대퇴골 남자 0.940 여자 0.851, 요추 남자 1.024 여자 1.006

6) 분율 0.1%미만으로 표준오차 미제시

표 3-XI-7. 골감소증 유병률[1] : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별[2], 2010

(단위 %)

구 분	전체		부위별					
			대퇴경부		대퇴골 전체		요추	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체								
50세이상	2,773	48.4 (1.3)	2,910	46.1 (1.2)	2,910	24.8 (1.0)	2,809	40.2 (1.2)
65세이상	1,256	45.0 (1.8)	1,359	52.2 (1.6)	1,359	40.9 (1.6)	1,272	39.0 (1.9)
연령(세)								
50-59	1,019	48.9 (2.3)	1,042	38.8 (2.1)	1,042	11.1 (1.2)	1,031	40.1 (1.9)
60-69	971	53.4 (1.7)	1,009	54.5 (1.7)	1,009	27.9 (1.9)	985	43.0 (1.9)
70+	783	41.3 (2.3)	859	49.3 (2.2)	859	45.7 (1.9)	793	37.1 (2.2)
남자								
50세이상	1,243	46.4 (1.7)	1,298	36.4 (1.7)	1,298	14.6 (1.1)	1,259	35.4 (1.7)
65세이상	556	54.6 (2.6)	597	52.2 (2.6)	597	26.3 (2.3)	563	36.4 (2.6)
연령(세)								
50-59	456	41.6 (3.0)	465	26.3 (2.7)	465	7.6 (1.5)	461	34.9 (2.7)
60-69	445	49.1 (2.7)	461	41.0 (2.3)	461	14.8 (1.7)	451	35.2 (3.0)
70+	342	55.0 (3.4)	372	55.0 (3.5)	372	31.8 (3.0)	347	37.1 (2.9)
여자								
50세이상	1,530	50.3 (1.7)	1,612	54.9 (1.4)	1,612	34.1 (1.5)	1,550	44.8 (1.6)
65세이상	700	38.4 (2.4)	762	52.3 (2.0)	762	50.9 (2.4)	709	40.8 (2.5)
연령(세)								
50-59	563	57.4 (2.6)	577	53.1 (2.7)	577	15.1 (1.7)	570	46.2 (2.3)
60-69	526	57.3 (2.6)	548	66.5 (2.4)	548	39.7 (2.9)	534	50.1 (2.8)
70+	441	32.8 (2.7)	487	45.9 (2.6)	487	54.1 (2.9)	446	37.2 (2.7)
거주지역								
동	1,086	51.4 (1.8)	1,136	54.8 (1.7)	1,136	33.1 (1.8)	1,101	46.6 (1.9)
읍면	444	48.0 (3.7)	476	54.9 (2.6)	476	36.4 (2.7)	449	40.8 (3.4)
소득수준[3]								
하	389	48.8 (3.0)	401	59.1 (3.0)	401	35.5 (2.4)	391	42.9 (2.7)
중하	370	49.3 (3.5)	398	52.7 (2.9)	398	31.6 (2.5)	376	42.6 (3.5)
중상	373	51.2 (3.0)	402	55.2 (2.8)	402	34.8 (2.7)	380	45.2 (2.9)
상	374	50.5 (3.3)	382	49.7 (3.2)	382	34.4 (3.3)	379	48.0 (3.1)
거주지역(표준화)[4]								
동	1,086	51.7 (1.8)	1,136	55.3 (1.6)	1,136	32.3 (1.7)	1,101	46.7 (1.9)
읍면	444	52.2 (3.2)	476	56.2 (3.1)	476	30.9 (2.6)	449	43.7 (3.5)
소득수준(표준화)								
하	389	49.2 (3.0)	401	59.7 (3.0)	401	34.1 (2.4)	391	43.0 (2.8)
중하	370	50.2 (3.3)	398	53.5 (2.8)	398	29.9 (2.3)	376	43.1 (3.5)
중상	373	52.2 (2.9)	402	55.8 (2.8)	402	33.5 (2.6)	380	45.6 (3.0)
상	374	53.9 (3.1)	382	50.8 (3.2)	382	30.2 (2.7)	379	49.6 (3.1)

1) 골감소증 유병률 : 폐경 후 여자 혹은 50세이상 남자에서 대퇴경부, 대퇴골, 요추 골밀도 검사결과 가장 낮은 T-score[5]가 -2.5 초과 -1.0 미만인 분율, 만50세이상

2) 사회경제위치지표별 자료는 여자만 제시

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) T-score = (대상자골밀도 - 최대골밀도) / 최대표준편차

※최대골밀도 Asia(일본기준, g/cm2) : 대퇴경부 남자 0.846 여자 0.803, 대퇴골 남자 0.940 여자 0.851, 요추 남자 1.024 여자 1.006

표 3-XII-1. 골관절염 유병률[1] : 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
50세이상	3,023	14.7 (0.9)	1,314	5.5 (0.7)	1,709	22.7 (1.3)
65세이상	1,355	26.5 (1.4)	604	9.8 (1.4)	751	38.1 (1.9)
연령(세)						
50-59	1,154	5.7 (0.9)	469	1.8 (0.7)	685	9.5 (1.6)
60-69	1,012	17.1 (1.3)	466	8.1 (1.5)	546	25.3 (1.9)
70+	857	29.6 (1.8)	379	10.9 (1.7)	478	41.5 (2.6)
거주지역						
동	2,152	12.3 (1.0)	936	4.5 (0.8)	1,216	19.2 (1.5)
읍면	871	20.3 (1.6)	378	7.8 (1.2)	493	30.4 (2.3)
소득수준[2]						
하	739	17.7 (1.8)	322	4.9 (1.3)	417	28.7 (2.7)
중하	740	14.2 (1.5)	321	5.7 (1.3)	419	21.6 (2.3)
중상	768	15.2 (1.8)	337	7.2 (1.6)	431	22.2 (2.8)
상	736	11.5 (1.6)	321	4.0 (1.3)	415	18.2 (2.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,152	13.1 (0.9)	936	4.9 (0.8)	1,216	19.7 (1.4)
읍면	871	18.8 (1.6)	378	7.9 (1.2)	493	27.2 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	739	18.0 (1.8)	322	5.6 (1.3)	417	27.8 (2.8)
중하	740	14.8 (1.3)	321	6.3 (1.3)	419	21.2 (2.1)
중상	768	15.8 (1.7)	337	7.7 (1.6)	431	22.2 (2.8)
상	736	11.1 (1.4)	321	4.1 (1.3)	415	17.0 (2.2)

1) 골관절염유병률 : 무릎관절 통증이 있고 무릎관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상 또는 엉덩관절 통증이 있고 엉덩관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상인 대상자 분율, 만50세이상

* 측정장비 : 디지털 X선 촬영기(DigiRad-PG/Korea)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-1. 혈중 납 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : ug/dL)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,355	2.09 (2.04-2.13)	1.01	1.20	1.55	2.12	2.76	3.56	4.15
20세이상	1,959	2.24 (2.19-2.29)	1.16	1.33	1.71	2.25	2.90	3.71	4.23
연령(세)									
10-18	366	1.40 (1.34-1.46)	0.77	0.90	1.11	1.43	1.80	2.16	2.50
19-29	401	1.73 (1.66-1.81)	0.94	1.10	1.38	1.75	2.23	2.68	3.04
30-39	397	2.08 (2.00-2.17)	1.16	1.34	1.60	2.12	2.68	3.30	3.83
40-49	397	2.36 (2.24-2.49)	1.24	1.43	1.80	2.34	3.04	3.98	4.61
50-59	401	2.61 (2.51-2.71)	1.33	1.71	2.09	2.63	3.17	4.02	4.68
60+	393	2.45 (2.30-2.60)	1.30	1.41	1.80	2.53	3.20	4.08	4.66
남자									
10세이상	1,164	2.44 (2.37-2.51)	1.22	1.44	1.88	2.45	3.15	4.07	4.66
20세이상	965	2.66 (2.58-2.74)	1.49	1.69	2.09	2.64	3.26	4.16	4.72
연령(세)									
10-18	186	1.56 (1.47-1.65)	0.94	0.99	1.25	1.53	1.96	2.31	2.54
19-29	186	1.96 (1.85-2.07)	1.20	1.25	1.65	2.01	2.41	2.91	3.10
30-39	197	2.55 (2.43-2.67)	1.60	1.73	2.12	2.59	3.11	3.83	4.11
40-49	199	2.85 (2.66-3.05)	1.58	1.84	2.21	2.77	3.46	4.52	4.94
50-59	200	3.03 (2.87-3.20)	1.94	2.07	2.45	2.90	3.61	4.64	5.02
60+	196	3.03 (2.82-3.26)	1.49	1.81	2.45	3.03	4.00	4.71	5.53
여자									
10세이상	1,191	1.78 (1.73-1.83)	0.94	1.08	1.40	1.77	2.34	2.95	3.28
20세이상	994	1.89 (1.83-1.94)	0.99	1.17	1.48	1.92	2.43	3.04	3.33
연령(세)									
10-18	180	1.24 (1.16-1.32)	0.69	0.80	0.97	1.26	1.52	1.89	2.22
19-29	215	1.52 (1.44-1.60)	0.88	0.97	1.21	1.52	1.89	2.27	2.67
30-39	200	1.68 (1.58-1.78)	0.94	1.18	1.45	1.68	2.08	2.54	2.79
40-49	198	1.95 (1.83-2.07)	1.08	1.25	1.54	1.97	2.43	3.12	3.35
50-59	201	2.24 (2.12-2.38)	1.16	1.40	1.89	2.30	2.81	3.35	3.71
60+	197	2.08 (1.91-2.26)	1.18	1.32	1.60	2.14	2.65	3.20	3.58

표 3-XIII-2. 혈중 수은 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : ug/L)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,355	3.64 (3.49-3.80)	1.45	1.70	2.37	3.51	5.38	8.37	10.69
20세이상	1,959	3.95 (3.77-4.14)	1.56	1.87	2.57	3.87	5.72	8.82	11.20
연령(세)									
10-18	366	2.22 (2.09-2.34)	1.17	1.34	1.66	2.19	2.89	3.74	4.85
19-29	401	3.26 (3.05-3.48)	1.47	1.64	2.27	3.17	4.65	6.24	7.97
30-39	397	3.86 (3.59-4.16)	1.67	1.90	2.56	3.77	5.42	8.56	11.49
40-49	397	4.36 (4.12-4.62)	1.79	2.28	2.94	4.29	5.93	8.87	10.54
50-59	401	4.83 (4.47-5.22)	1.84	2.24	3.14	4.82	6.81	10.37	13.75
60+	393	3.53 (3.12-4.0)	1.04	1.53	2.34	3.26	5.54	9.03	12.06
남자									
10세이상	1,164	4.22 (3.99-4.46)	1.50	1.84	2.74	4.20	6.41	9.50	12.06
20세이상	965	4.71 (4.44-5.01)	1.65	2.26	3.14	4.72	6.77	10.37	12.36
연령(세)									
10-18	186	2.22 (2.05-2.40)	1.16	1.34	1.66	2.23	2.82	3.74	4.66
19-29	186	3.53 (3.21-3.88)	1.52	1.64	2.62	3.40	5.06	6.56	8.60
30-39	197	4.56 (4.14-5.01)	1.82	2.26	3.18	4.72	6.46	10.22	11.55
40-49	199	5.42 (5.00-5.89)	2.42	2.95	3.84	5.20	7.48	9.78	12.90
50-59	200	5.94 (5.35-6.60)	2.35	2.68	4.17	5.92	8.40	12.64	18.60
60+	196	4.34 (3.66-5.16)	1.24	1.73	2.76	4.13	7.29	11.37	12.79
여자									
10세이상	1,191	3.14 (2.99-3.29)	1.42	1.66	2.20	3.04	4.48	6.23	8.56
20세이상	994	3.33 (3.16-3.50)	1.48	1.75	2.34	3.20	4.68	6.50	9.00
연령(세)									
10-18	180	2.22 (2.06-2.38)	1.26	1.34	1.64	2.14	3.00	3.75	5.06
19-29	215	2.98 (2.75-3.23)	1.44	1.65	2.08	2.94	4.00	5.54	7.46
30-39	200	3.24 (2.98-3.54)	1.60	1.72	2.40	3.18	4.48	5.84	8.56
40-49	198	3.48 (3.22-3.77)	1.62	1.85	2.42	3.54	4.87	6.23	8.33
50-59	201	3.92 (3.58-4.29)	1.76	2.01	2.67	3.78	5.31	8.00	10.42
60+	197	3.02 (2.62-3.49)	0.85	1.46	2.10	2.56	4.64	7.35	9.12

표 3-XIII-3. 혈중 카드뮴 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : ug/L)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,355	0.89 (0.87-0.92)	0.27	0.37	0.60	0.97	1.41	1.95	2.31
20세이상	1,959	1.03 (1.00-1.07)	0.41	0.51	0.73	1.08	1.50	2.04	2.39
연령(세)									
10-18	366	0.38 (0.35-0.41)	0.15	0.18	0.26	0.39	0.54	0.78	0.94
19-29	401	0.66 (0.61-0.70)	0.27	0.33	0.46	0.65	0.94	1.34	1.66
30-39	397	0.92 (0.86-0.98)	0.40	0.47	0.69	0.96	1.32	1.65	2.05
40-49	397	1.16 (1.10-1.22)	0.53	0.62	0.86	1.15	1.56	2.09	2.48
50-59	401	1.24 (1.16-1.32)	0.54	0.65	0.94	1.30	1.71	2.31	2.75
60+	393	1.28 (1.20-1.37)	0.61	0.73	0.98	1.29	1.79	2.16	2.72
남자									
10세이상	1,164	0.83 (0.79-0.86)	0.26	0.35	0.55	0.89	1.30	1.83	2.17
20세이상	965	0.95 (0.91-0.99)	0.36	0.46	0.66	1.00	1.37	1.93	2.26
연령(세)									
10-18	186	0.38 (0.34-0.43)	0.13	0.17	0.26	0.39	0.55	0.88	1.16
19-29	186	0.61 (0.56-0.67)	0.26	0.29	0.42	0.62	0.95	1.28	1.58
30-39	197	0.88 (0.80-0.96)	0.40	0.46	0.62	0.89	1.28	1.60	1.98
40-49	199	1.08 (1.00-1.17)	0.49	0.58	0.76	1.09	1.53	2.08	2.48
50-59	200	1.10 (0.99-1.22)	0.51	0.58	0.83	1.12	1.58	2.20	2.54
60+	196	1.19 (1.08-1.30)	0.54	0.71	0.89	1.25	1.65	2.05	2.44
여자									
10세이상	1,191	0.97 (0.93-1.01)	0.29	0.42	0.66	1.06	1.51	2.06	2.40
20세이상	994	1.12 (1.08-1.17)	0.46	0.58	0.81	1.16	1.59	2.14	2.57
연령(세)									
10-18	180	0.38 (0.34-0.41)	0.15	0.19	0.26	0.41	0.53	0.66	0.78
19-29	215	0.71 (0.64-0.78)	0.29	0.37	0.50	0.70	0.93	1.41	1.73
30-39	200	0.97 (0.89-1.05)	0.38	0.53	0.72	0.99	1.33	1.73	2.11
40-49	198	1.25 (1.16-1.35)	0.60	0.68	0.89	1.27	1.64	2.17	2.57
50-59	201	1.40 (1.29-1.50)	0.64	0.79	1.12	1.42	1.81	2.34	2.79
60+	197	1.35 (1.23-1.48)	0.68	0.77	1.06	1.39	1.81	2.19	2.72

표 3-XIV-1. 혈중 총 IgE 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : KU/L)

연령	N	기하평균(표준오차)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,342	94.96 (87.96-102.53)	9.59	15.50	33.50	89.14	260.00	698.00	1075.00
연령(세)									
10-18	365	102.38 (86.44-121.26)	9.77	17.50	34.90	100.00	302.00	692.00	875.00
19-29	400	87.22 (73.38-103.67)	8.77	16.30	32.80	88.40	206.00	616.00	965.00
30-39	393	88.56 (75.32-104.12)	9.98	14.30	30.90	82.20	231.00	714.00	968.00
40-49	393	79.04 (67.59-92.43)	9.04	15.10	34.80	73.00	187.00	487.00	670.00
50-59	400	103.48 (85.07-125.89)	9.50	11.80	32.40	100.00	306.00	851.00	1460.00
60+	391	119.73 (93.09-153.99)	10.30	15.80	46.20	117.00	314.00	1015.00	1736.00
남자									
10세이상	1,159	138.11 (124.54-153.16)	13.50	22.20	49.10	135.00	373.00	940.00	1557.00
연령(세)									
10-18	186	114.08 (91.86-141.68)	10.30	20.20	37.10	124.00	348.00	692.00	875.00
19-29	185	110.71 (89.86-136.39)	15.80	20.00	39.30	124.00	285.00	670.00	1018.00
30-39	194	120.49 (95.47-152.07)	11.40	22.20	40.60	130.00	326.00	931.00	1557.00
40-49	198	126.36 (102.83-155.27)	16.10	26.30	48.70	110.00	326.00	623.00	1231.00
50-59	200	195.75 (150.24-255.04)	15.50	24.30	64.80	222.00	536.00	1443.00	2231.00
60+	196	201.62 (148.84-273.10)	13.20	28.30	75.30	195.00	541.00	1377.00	2556.00
여자									
10세이상	1,183	65.13 (59.15-71.71)	7.36	11.40	25.60	61.30	162.00	383.00	771.00
연령(세)									
10-18	179	90.67 (70.16-117.17)	9.43	16.80	31.20	78.60	255.00	771.00	934.00
19-29	215	67.31 (53.20-85.15)	6.63	9.73	24.60	79.90	161.00	362.00	691.00
30-39	199	63.78 (50.47-80.60)	8.19	13.20	22.20	59.90	153.00	462.00	770.00
40-49	195	48.36 (39.41-59.34)	6.44	10.10	25.10	45.40	105.00	236.00	380.00
50-59	200	54.33 (42.02-70.27)	7.36	9.81	21.90	50.20	117.00	313.00	747.00
60+	195	80.23 (57.50-111.93)	7.10	14.20	29.30	78.50	217.00	589.00	1379.00

표 3-XIV-2. 혈중 집먼지진드기(미국형) 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : KU/L)

연령	N	기하평균(표준오차)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,339	0.26 (0.23-0.29)	0.01	0.01	0.03	0.17	1.53	14.80	52.90
연령(세)									
10-18	365	0.55 (0.35-0.86)	0.01	0.01	0.02	0.28	14.80	100.01	100.01
19-29	399	0.46 (0.33-0.64)	0.01	0.01	0.02	0.34	5.83	53.30	95.70
30-39	393	0.27 (0.20-0.36)	0.01	0.01	0.03	0.17	1.81	12.10	32.30
40-49	392	0.17 (0.14-0.22)	0.01	0.01	0.03	0.13	0.68	6.09	13.10
50-59	400	0.19 (0.15-0.26)	0.01	0.01	0.03	0.15	1.06	6.08	10.60
60+	390	0.17 (0.12-0.25)	0.01	0.01	0.03	0.15	0.63	3.53	9.28
남자									
10세이상	1,157	0.42 (0.36-0.50)	0.01	0.01	0.05	0.30	2.71	17.00	52.00
연령(세)									
10-18	186	0.64 (0.36-1.14)	0.01	0.01	0.02	0.40	17.00	65.90	100.01
19-29	184	0.69 (0.46-1.05)	0.01	0.02	0.05	0.55	9.07	59.30	100.01
30-39	194	0.41 (0.27-0.62)	0.01	0.02	0.06	0.30	3.64	10.10	27.50
40-49	198	0.26 (0.19-0.36)	0.01	0.02	0.05	0.26	1.12	4.71	14.60
50-59	200	0.36 (0.24-0.54)	0.01	0.02	0.06	0.34	2.10	9.24	14.60
60+	195	0.35 (0.22-0.54)	0.01	0.02	0.08	0.29	1.46	8.26	12.80
여자									
10세이상	1,182	0.16 (0.14-0.19)	0.01	0.01	0.02	0.09	0.67	13.60	53.60
연령(세)									
10-18	179	0.46 (0.24-0.85)	0.01	0.01	0.02	0.19	13.90	100.01	100.01
19-29	215	0.29 (0.18-0.49)	0.01	0.01	0.02	0.14	2.90	41.50	74.90
30-39	199	0.17 (0.11-0.26)	0.01	0.01	0.02	0.08	1.00	14.20	50.20
40-49	194	0.11 (0.08-0.16)	0.01	0.01	0.02	0.06	0.39	7.38	9.43
50-59	200	0.10 (0.07-0.15)	0.01	0.01	0.02	0.07	0.32	2.52	7.86
60+	195	0.10 (0.06-0.16)	0.01	0.01	0.02	0.08	0.24	1.32	6.35

표 3-XIV-3. 혈중 바퀴 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : KU/L)

연령	N	기하평균(표준오차)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,337	0.10 (0.09-0.11)	0.02	0.02	0.03	0.07	0.27	0.83	2.00
연령(세)									
10-18	365	0.08 (0.07-0.09)	0.02	0.02	0.03	0.05	0.22	0.60	0.84
19-29	399	0.09 (0.07-0.11)	0.02	0.02	0.03	0.06	0.23	0.73	1.51
30-39	392	0.12 (0.10-0.15)	0.02	0.02	0.03	0.09	0.33	1.19	3.73
40-49	391	0.10 (0.08-0.11)	0.01	0.02	0.03	0.07	0.26	0.85	2.03
50-59	400	0.10 (0.08-0.12)	0.01	0.02	0.03	0.06	0.25	0.82	2.31
60+	390	0.11 (0.08-0.13)	0.01	0.02	0.03	0.08	0.32	0.94	2.34
남자									
10세이상	1,156	0.14 (0.13-0.16)	0.02	0.02	0.04	0.11	0.44	1.49	3.67
연령(세)									
10-18	186	0.09 (0.07-0.12)	0.02	0.02	0.03	0.06	0.27	0.70	0.90
19-29	184	0.12 (0.09-0.16)	0.02	0.02	0.04	0.07	0.38	1.21	2.08
30-39	193	0.19 (0.14-0.26)	0.02	0.02	0.04	0.15	0.59	3.66	5.12
40-49	198	0.15 (0.12-0.19)	0.02	0.02	0.04	0.13	0.41	1.30	3.37
50-59	200	0.16 (0.12-0.21)	0.02	0.02	0.04	0.12	0.47	1.92	3.27
60+	195	0.16 (0.11-0.23)	0.02	0.02	0.04	0.10	0.68	2.65	4.25
여자									
10세이상	1,181	0.07 (0.06-0.08)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.16	0.46	0.75
연령(세)									
10-18	179	0.07 (0.05-0.08)	0.02	0.02	0.03	0.04	0.16	0.55	0.82
19-29	215	0.07 (0.05-0.09)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.14	0.51	1.15
30-39	199	0.08 (0.06-0.09)	0.01	0.02	0.03	0.06	0.17	0.47	0.69
40-49	193	0.06 (0.05-0.08)	0.01	0.02	0.02	0.04	0.13	0.41	0.98
50-59	200	0.06 (0.05-0.07)	0.01	0.02	0.02	0.04	0.11	0.29	0.55
60+	195	0.08 (0.06-0.10)	0.01	0.02	0.03	0.07	0.21	0.46	0.71

표 3-XIV-4. 혈중 개털 알레르겐 수준 : 성별, 만10세이상, 2010

(단위 : KU/L)

연령	N	기하평균(표준오차)	백분위수						
			5	10	25	50	75	90	95
전체									
10세이상	2,338	0.03 (0.03-0.03)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.19	0.48
연령(세)									
10-18	365	0.04 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.23	0.74
19-29	399	0.04 (0.03-0.05)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.37	1.23
30-39	393	0.03 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.19	0.61
40-49	392	0.03 (0.02-0.03)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.14	0.31
50-59	400	0.03 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.21	0.51
60+	389	0.03 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.17	0.29
남자									
10세이상	1,157	0.04 (0.04-0.05)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.31	0.73
연령(세)									
10-18	186	0.04 (0.03-0.05)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.37	0.98
19-29	184	0.05 (0.04-0.08)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.64	7.97
30-39	194	0.04 (0.03-0.05)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.22	0.65
40-49	198	0.03 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.22	0.35
50-59	200	0.05 (0.03-0.06)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.34	1.95
60+	195	0.04 (0.03-0.06)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.29	0.65
여자									
10세이상	1,181	0.02 (0.02-0.03)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.10	0.24
연령(세)									
10-18	179	0.03 (0.02-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.13	0.23
19-29	215	0.03 (0.03-0.04)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.19	0.51
30-39	199	0.03 (0.02-0.03)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.12	0.41
40-49	194	0.02 (0.02-0.02)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.17
50-59	200	0.02 (0.02-0.02)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.11
60+	194	0.02 (0.02-0.03)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.09	0.17

표 3-XV-1. 뇌졸중 유병률[1] 추이 : 성별, 만50세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98[2]		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
50세이상	9,250	2.8 (0.2)	8,660	3.4 (0.2)	9,318	4.5 (0.2)	1,444	4.7 (0.7)	3,177	4.3 (0.4)	3,532	3.3 (0.3)	3,071	2.9 (0.4)
65세이상	3,329	4.6 (0.4)	3,289	5.3 (0.4)	3,706	6.8 (0.5)	722	7.6 (1.5)	1,519	7.6 (0.7)	1,670	5.1 (0.6)	1,380	4.5 (0.6)
50세이상(표준화)[3]	9,250	2.9 (0.2)	8,660	3.4 (0.2)	9,318	4.5 (0.2)	1,444	4.8 (0.7)	3,177	4.3 (0.4)	3,532	3.3 (0.3)	3,071	2.9 (0.4)
연령(세)														
50-59	4,017	1.4 (0.2)	3,712	1.8 (0.2)	3,935	2.4 (0.3)	505	2.6 (0.8)	1,135	1.8 (0.4)	1,252	1.5 (0.4)	1,170	2.0 (0.6)
60-69	3,212	3.0 (0.3)	3,024	3.7 (0.3)	3,189	5.8 (0.5)	490	5.5 (1.0)	1,081	5.3 (0.8)	1,210	4.2 (0.6)	1,028	2.6 (0.5)
70+	2,021	5.5 (0.6)	1,924	5.9 (0.5)	2,194	6.8 (0.6)	449	7.8 (1.5)	961	8.0 (1.0)	1,070	5.6 (0.8)	873	5.0 (0.8)
거주지역														
동	4,585	2.7 (0.2)	5,802	3.1 (0.2)	6,538	4.3 (0.3)	920	4.3 (0.8)	1,945	4.0 (0.5)	2,285	3.1 (0.4)	2,188	3.1 (0.5)
읍면	4,665	2.9 (0.3)	2,858	3.9 (0.3)	2,780	5.0 (0.4)	524	6.0 (1.6)	1,232	5.2 (0.6)	1,247	4.0 (0.5)	883	2.5 (0.5)
소득수준[4]														
하	2,405	3.1 (0.4)	2,076	3.7 (0.4)	2,330	4.9 (0.5)	347	5.1 (1.6)	749	4.8 (0.8)	867	5.0 (0.9)	753	3.5 (0.8)
중하	2,338	2.9 (0.4)	1,995	3.9 (0.5)	2,311	4.8 (0.5)	333	6.1 (1.9)	765	4.9 (0.9)	887	3.7 (0.6)	751	2.5 (0.6)
중상	2,228	3.0 (0.4)	2,037	3.1 (0.4)	2,293	4.0 (0.4)	341	2.7 (0.8)	754	3.7 (0.7)	844	3.0 (0.6)	779	3.9 (0.9)
상	2,279	2.2 (0.3)	1,951	2.9 (0.4)	2,257	4.1 (0.4)	331	4.6 (1.6)	767	3.4 (0.6)	893	1.8 (0.6)	747	1.8 (0.4)
거주지역(표준화)														
동	4,585	3.0 (0.3)	5,802	3.3 (0.2)	6,538	4.5 (0.3)	920	4.6 (0.8)	1,945	4.2 (0.5)	2,285	3.3 (0.4)	2,188	3.2 (0.5)
읍면	4,665	2.7 (0.3)	2,858	3.5 (0.3)	2,780	4.6 (0.4)	524	6.0 (1.9)	1,232	4.6 (0.6)	1,247	3.7 (0.5)	883	2.2 (0.5)
소득수준(표준화)														
하	2,405	3.1 (0.4)	2,076	3.7 (0.4)	2,330	5.0 (0.5)	347	5.1 (1.5)	749	4.9 (0.8)	867	5.0 (0.9)	753	3.4 (0.8)
중하	2,338	3.0 (0.4)	1,995	3.8 (0.5)	2,311	4.8 (0.5)	333	6.3 (1.8)	765	5.0 (0.9)	887	3.7 (0.6)	751	2.5 (0.6)
중상	2,228	3.1 (0.4)	2,037	3.1 (0.4)	2,293	3.9 (0.4)	341	3.0 (0.8)	754	3.7 (0.7)	844	3.0 (0.6)	779	3.9 (0.9)
상	2,279	2.3 (0.3)	1,951	2.9 (0.4)	2,257	4.1 (0.4)	331	4.5 (1.6)	767	3.4 (0.6)	893	1.9 (0.6)	747	1.8 (0.5)
남자														
50세이상	4,070	2.7 (0.2)	3,852	4.1 (0.3)	4,166	5.0 (0.4)	606	4.1 (1.2)	1,299	5.0 (0.7)	1,524	3.8 (0.5)	1,336	3.7 (0.7)
65세이상	1,268	4.9 (0.6)	1,289	6.7 (0.7)	1,481	7.7 (0.7)	302	5.5 (1.5)	583	9.3 (1.3)	697	6.3 (0.9)	615	5.6 (1.1)
50세이상(표준화)	4,070	3.1 (0.3)	3,852	4.4 (0.3)	4,166	5.3 (0.4)	606	4.2 (1.2)	1,299	5.4 (0.7)	1,524	4.0 (0.5)	1,336	3.8 (0.7)
연령(세)														
50-59	1,936	1.5 (0.3)	1,803	2.3 (0.4)	1,918	2.9 (0.4)	205	2.6 (1.5)	491	1.6 (0.6)	545	2.3 (0.6)	478	2.9 (1.0)
60-69	1,429	3.2 (0.5)	1,379	4.4 (0.6)	1,449	5.6 (0.7)	217	5.6 (2.0)	441	7.0 (1.6)	542	4.0 (1.0)	473	2.8 (0.7)
70+	705	5.9 (1.0)	670	8.3 (1.0)	799	9.3 (1.0)	184	5.4 (2.1)	367	10.3 (1.8)	437	7.5 (1.2)	385	6.9 (1.5)
거주지역														
동	2,084	2.6 (0.3)	2,636	4.0 (0.4)	2,957	4.8 (0.4)	378	3.2 (1.1)	792	4.4 (0.8)	986	3.3 (0.6)	953	4.4 (0.9)
읍면	1,986	2.9 (0.4)	1,216	4.4 (0.5)	1,209	5.4 (0.7)	228	6.6 (3.4)	507	6.5 (1.3)	538	5.2 (0.8)	383	2.0 (0.8)

1) 뇌졸중 유병률 : 의사로부터 뇌졸중 진단을 받은 분율

2) '98년, '01년 : 의사로부터 중풍 및 뇌혈관질환 진단을 받은 분율

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 뇌졸중 유병률 추이, 성별, 만50세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	1,059	3.9 (0.6)	939	4.3 (0.6)	1,058	6.0 (0.7)	150	4.8 (2.6)	306	5.9 (1.4)	386	6.2 (1.5)	327	5.5 (1.6)
중하	1,020	2.6 (0.5)	850	4.6 (0.7)	1,007	4.8 (0.7)	135	6.9 (3.4)	309	6.0 (1.4)	377	4.1 (0.9)	326	2.0 (0.7)
중상	989	2.5 (0.5)	931	4.0 (0.7)	1,025	5.0 (0.7)	147	3.5 (1.3)	310	4.7 (1.2)	356	3.0 (0.8)	344	5.0 (1.6)
상	1,002	2.0 (0.4)	853	3.3 (0.6)	1,019	3.8 (0.6)	142	0.5 (0.4)	319	3.6 (1.1)	388	2.3 (0.9)	326	2.2 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	2,084	3.3 (0.4)	2,636	4.7 (0.4)	2,957	5.4 (0.5)	378	3.6 (1.2)	792	4.9 (0.8)	986	3.7 (0.7)	953	4.6 (0.8)
읍면	1,986	2.8 (0.3)	1,216	4.0 (0.5)	1,209	5.0 (0.6)	228	6.8 (3.9)	507	6.2 (1.2)	538	5.0 (0.8)	383	2.0 (0.7)
소득수준(표준화)														
하	1,059	3.8 (0.6)	939	4.4 (0.6)	1,058	6.1 (0.8)	150	5.0 (2.5)	306	6.6 (1.5)	386	6.3 (1.5)	327	5.5 (1.5)
중하	1,020	3.0 (0.6)	850	4.7 (0.8)	1,007	5.1 (0.7)	135	7.0 (3.2)	309	6.2 (1.3)	377	4.4 (0.9)	326	2.2 (0.8)
중상	989	2.9 (0.6)	931	4.5 (0.8)	1,025	5.3 (0.7)	147	4.2 (1.5)	310	5.0 (1.2)	356	3.2 (0.8)	344	5.0 (1.5)
상	1,002	2.5 (0.6)	853	3.7 (0.7)	1,019	4.2 (0.7)	142	0.5 (0.4)	319	4.1 (1.2)	388	2.4 (0.9)	326	2.3 (0.7)
여자														
50세이상	5,180	2.8 (0.2)	4,808	2.8 (0.2)	5,152	4.1 (0.3)	838	5.3 (1.2)	1,878	3.8 (0.5)	2,008	2.8 (0.4)	1,735	2.3 (0.4)
65세이상	2,061	4.4 (0.5)	2,000	4.4 (0.5)	2,225	6.1 (0.5)	420	9.1 (2.2)	936	6.4 (0.9)	973	4.2 (0.8)	765	3.7 (0.6)
50세이상(표준화)	5,180	2.7 (0.2)	4,808	2.6 (0.2)	5,152	4.0 (0.3)	838	5.1 (1.1)	1,878	3.6 (0.5)	2,008	2.8 (0.4)	1,735	2.2 (0.3)
연령(세)														
50-59	2,081	1.4 (0.3)	1,909	1.3 (0.3)	2,017	1.9 (0.3)	300	2.6 (1.2)	644	2.0 (0.6)	707	0.8 (0.3)	692	1.2 (0.5)
60-69	1,783	2.8 (0.4)	1,645	3.1 (0.4)	1,740	6.0 (0.6)	273	5.5 (2.0)	640	3.7 (0.8)	668	4.3 (0.9)	555	2.4 (0.6)
70+	1,316	5.3 (0.6)	1,254	4.6 (0.6)	1,395	5.4 (0.6)	265	9.2 (2.1)	594	6.6 (1.3)	633	4.5 (1.0)	488	3.8 (0.8)
거주지역														
동	2,501	2.7 (0.3)	3,166	2.4 (0.3)	3,581	3.9 (0.4)	542	5.3 (1.5)	1,153	3.7 (0.6)	1,299	2.8 (0.5)	1,235	2.0 (0.4)
읍면	2,679	2.9 (0.4)	1,642	3.6 (0.4)	1,571	4.7 (0.6)	296	5.5 (1.6)	725	4.1 (0.8)	709	2.9 (0.7)	500	2.9 (0.6)
소득수준														
하	1,346	2.5 (0.4)	1,137	3.2 (0.5)	1,272	4.0 (0.6)	197	5.4 (1.7)	443	3.8 (0.9)	481	3.8 (1.0)	426	1.8 (0.7)
중하	1,318	3.0 (0.5)	1,145	3.4 (0.6)	1,304	4.8 (0.7)	198	5.5 (1.9)	456	4.0 (1.0)	510	3.4 (0.9)	425	2.9 (0.9)
중상	1,239	3.3 (0.5)	1,106	2.2 (0.4)	1,268	3.1 (0.5)	194	2.0 (1.0)	444	2.9 (0.9)	488	3.1 (0.9)	435	3.0 (0.8)
상	1,277	2.4 (0.5)	1,098	2.5 (0.5)	1,238	4.4 (0.6)	189	8.2 (3.0)	448	3.1 (0.8)	505	1.5 (0.6)	421	1.5 (0.5)
거주지역(표준화)														
동	2,501	2.8 (0.3)	3,166	2.4 (0.3)	3,581	3.9 (0.4)	542	5.3 (1.5)	1,153	3.7 (0.6)	1,299	2.9 (0.5)	1,235	2.1 (0.4)
읍면	2,679	2.6 (0.3)	1,642	3.2 (0.4)	1,571	4.2 (0.6)	296	5.1 (1.6)	725	3.6 (0.7)	709	2.8 (0.7)	500	2.3 (0.5)
소득수준(표준화)														
하	1,346	2.5 (0.4)	1,137	3.1 (0.5)	1,272	3.9 (0.6)	197	4.9 (1.5)	443	3.8 (0.9)	481	3.7 (1.0)	426	1.7 (0.6)
중하	1,318	3.1 (0.5)	1,145	3.2 (0.5)	1,304	4.6 (0.6)	198	5.5 (1.8)	456	4.0 (1.0)	510	3.4 (0.9)	425	2.9 (0.9)
중상	1,239	3.3 (0.5)	1,106	2.1 (0.4)	1,268	3.0 (0.5)	194	2.0 (1.0)	444	2.8 (0.8)	488	2.9 (0.8)	435	2.9 (0.8)
상	1,277	2.3 (0.4)	1,098	2.4 (0.5)	1,238	4.2 (0.6)	189	7.6 (2.7)	448	2.9 (0.7)	505	1.4 (0.6)	421	1.4 (0.5)

표 3-XV-2. 천식 유병률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	15.2 (0.6)	8,055	7.4 (0.4)	-	- -	2,943	5.4 (0.5)	6,785	7.6 (0.4)	7,468	7.7 (0.4)	6,254	6.7 (0.4)
65세이상	1,044	24.8 (1.6)	977	14.1 (1.4)	-	- -	715	15.0 (1.7)	1,510	13.8 (1.1)	1,647	14.3 (1.0)	1,380	9.8 (1.1)
19세이상(표준화)[2]	8,991	15.5 (0.6)	8,055	7.4 (0.3)	-	- -	2,943	5.2 (0.5)	6,785	7.4 (0.4)	7,468	7.6 (0.4)	6,254	6.5 (0.4)
연령(세)														
19-29	1,959	15.0 (1.0)	1,623	7.3 (0.8)	-	- -	332	2.3 (0.9)	889	6.2 (1.0)	1,048	6.2 (0.9)	767	6.8 (1.0)
30-39	2,213	11.4 (0.9)	1,996	5.7 (0.6)	-	- -	627	3.2 (1.1)	1,409	5.6 (0.9)	1,424	7.0 (0.8)	1,253	6.0 (0.9)
40-49	1,804	14.0 (0.9)	1,866	5.8 (0.7)	-	- -	557	4.7 (1.0)	1,323	5.9 (0.7)	1,495	6.0 (0.7)	1,162	4.3 (0.8)
50-59	1,338	16.1 (1.2)	1,114	6.9 (0.8)	-	- -	496	6.1 (1.0)	1,132	7.6 (0.8)	1,246	7.3 (0.8)	1,171	7.0 (1.0)
60-69	1,066	19.9 (1.3)	876	10.7 (1.2)	-	- -	486	8.9 (1.4)	1,075	11.8 (1.1)	1,205	10.3 (1.0)	1,028	8.7 (1.0)
70+	611	27.7 (2.1)	580	14.9 (1.7)	-	- -	445	15.6 (2.4)	957	15.0 (1.3)	1,050	15.1 (1.2)	873	10.9 (1.5)
거주지역														
동	5,848	14.9 (0.7)	6,405	7.1 (0.4)	-	- -	2,088	4.9 (0.6)	4,993	7.1 (0.5)	5,553	7.3 (0.4)	4,885	6.4 (0.5)
읍면	3,143	16.3 (0.8)	1,650	9.1 (1.0)	-	- -	855	7.2 (1.4)	1,792	9.8 (0.9)	1,915	9.4 (0.8)	1,369	7.7 (1.1)
소득수준[3]														
하	2,141	16.9 (1.0)	1,694	8.4 (0.8)	-	- -	697	6.9 (1.2)	1,628	9.0 (0.9)	1,859	8.6 (0.8)	1,540	8.4 (1.0)
중하	2,309	15.2 (1.1)	1,844	7.4 (0.7)	-	- -	691	5.2 (0.9)	1,630	7.8 (0.7)	1,861	8.0 (0.7)	1,540	7.0 (0.9)
중상	2,224	14.5 (0.9)	1,997	6.7 (0.6)	-	- -	723	4.4 (1.0)	1,660	6.0 (0.7)	1,817	7.1 (0.7)	1,562	4.4 (0.7)
상	2,317	14.6 (0.9)	2,049	7.2 (0.7)	-	- -	693	5.0 (0.9)	1,657	7.1 (0.8)	1,851	6.9 (0.6)	1,532	6.8 (0.9)
거주지역(표준화)														
동	5,848	15.7 (0.7)	6,405	7.3 (0.4)	-	- -	2,088	5.0 (0.6)	4,993	7.2 (0.5)	5,553	7.4 (0.4)	4,885	6.4 (0.5)
읍면	3,143	15.3 (0.8)	1,650	8.0 (0.8)	-	- -	855	6.4 (1.2)	1,792	9.0 (1.1)	1,915	8.4 (1.0)	1,369	6.5 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	2,141	17.1 (1.0)	1,694	8.2 (0.7)	-	- -	697	6.9 (1.2)	1,628	8.9 (0.9)	1,859	8.4 (0.8)	1,540	8.5 (1.0)
중하	2,309	15.5 (1.1)	1,844	7.4 (0.7)	-	- -	691	5.1 (0.9)	1,630	7.7 (0.7)	1,861	7.8 (0.7)	1,540	6.8 (0.9)
중상	2,224	14.9 (0.9)	1,997	6.7 (0.6)	-	- -	723	4.5 (1.0)	1,660	6.0 (0.7)	1,817	7.0 (0.7)	1,562	4.2 (0.6)
상	2,317	14.8 (0.8)	2,049	7.3 (0.7)	-	- -	693	4.6 (0.8)	1,657	7.0 (0.8)	1,851	6.5 (0.6)	1,532	6.4 (0.9)
남자														
19세이상	4,180	16.4 (0.7)	3,669	7.4 (0.5)	-	- -	1,226	5.6 (0.7)	2,828	8.1 (0.7)	3,230	8.1 (0.6)	2,699	7.6 (0.7)
65세이상	411	22.8 (2.0)	378	11.6 (1.8)	-	- -	300	13.2 (2.6)	579	11.6 (1.5)	686	12.4 (1.4)	615	9.3 (1.4)
19세이상(표준화)	4,180	16.8 (0.7)	3,669	7.5 (0.5)	-	- -	1,226	5.6 (0.7)	2,828	8.2 (0.7)	3,230	8.1 (0.6)	2,699	7.6 (0.7)
연령(세)														
19-29	886	16.6 (1.5)	714	7.6 (1.0)	-	- -	138	1.3 (0.9)	365	7.3 (1.6)	485	6.8 (1.3)	306	7.3 (1.6)
30-39	1,091	12.7 (1.1)	943	6.9 (0.9)	-	- -	245	4.8 (1.8)	595	7.3 (1.5)	594	8.6 (1.3)	525	7.9 (1.4)
40-49	888	17.7 (1.4)	907	6.4 (0.9)	-	- -	244	6.4 (1.8)	577	6.6 (1.2)	642	8.2 (1.2)	531	5.6 (1.3)
50-59	616	16.0 (1.5)	520	6.4 (1.1)	-	- -	201	7.0 (1.5)	488	7.9 (1.2)	541	6.9 (1.1)	479	8.3 (1.6)
60-69	476	19.8 (1.9)	380	9.2 (1.5)	-	- -	215	6.7 (1.8)	437	13.0 (1.9)	541	6.9 (1.1)	473	9.1 (1.7)
70+	223	25.5 (2.7)	205	12.3 (2.5)	-	- -	183	15.3 (3.0)	366	12.5 (1.8)	427	14.3 (1.8)	385	10.7 (1.9)
거주지역														
동	2,746	16.4 (0.9)	2,925	7.1 (0.5)	-	- -	855	4.7 (0.8)	2,075	7.7 (0.8)	2,388	7.7 (0.7)	2,102	7.3 (0.8)
읍면	1,434	16.3 (0.9)	744	8.9 (1.3)	-	- -	371	8.7 (2.1)	753	10.2 (1.5)	842	9.7 (1.5)	597	8.9 (1.5)

1) 천식 유병률 : 최근 1년동안 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 천식 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	1,005	18.3 (1.5)	758	7.2 (1.1)	-	- -	295	7.9 (1.8)	679	9.8 (1.5)	816	9.0 (1.2)	667	8.8 (1.6)
중하	1,053	16.1 (1.5)	853	8.7 (1.1)	-	- -	283	5.1 (1.2)	672	8.2 (1.1)	800	9.0 (1.1)	668	7.5 (1.3)
중상	1,063	15.1 (1.2)	918	6.7 (0.9)	-	- -	305	4.5 (1.6)	706	6.8 (1.1)	773	8.0 (1.2)	675	5.3 (1.2)
상	1,059	16.4 (1.3)	941	7.1 (0.9)	-	- -	294	5.4 (1.5)	689	7.3 (1.2)	803	6.1 (0.8)	661	8.7 (1.4)
거주지역(표준화)														
동	2,746	17.2 (0.9)	2,925	7.2 (0.5)	-	- -	855	5.0 (0.7)	2,075	8.0 (0.8)	2,388	7.8 (0.6)	2,102	7.3 (0.8)
읍면	1,434	15.6 (0.9)	744	8.5 (1.2)	-	- -	371	8.1 (2.0)	753	10.2 (2.0)	842	9.2 (1.8)	597	7.7 (1.5)
소득수준(표준화)														
하	1,005	18.7 (1.5)	758	7.2 (1.1)	-	- -	295	8.0 (1.7)	679	9.8 (1.6)	816	9.0 (1.2)	667	8.9 (1.5)
중하	1,053	16.3 (1.5)	853	8.6 (1.1)	-	- -	283	5.1 (1.2)	672	8.2 (1.1)	800	9.0 (1.1)	668	7.6 (1.3)
중상	1,063	15.8 (1.3)	918	6.8 (0.9)	-	- -	305	5.0 (1.7)	706	6.9 (1.1)	773	8.0 (1.2)	675	5.3 (1.2)
상	1,059	16.5 (1.3)	941	7.3 (0.9)	-	- -	294	5.3 (1.4)	689	7.4 (1.2)	803	6.1 (0.9)	661	8.3 (1.4)
여자														
19세이상	4,811	14.2 (0.7)	4,386	7.5 (0.4)	-	- -	1,717	5.2 (0.6)	3,957	7.0 (0.5)	4,238	7.4 (0.5)	3,555	5.7 (0.4)
65세이상	633	26.1 (2.1)	599	15.6 (1.7)	-	- -	415	16.2 (2.4)	931	15.3 (1.4)	961	15.5 (1.3)	765	10.1 (1.4)
19세이상(표준화)	4,811	14.2 (0.6)	4,386	7.3 (0.4)	-	- -	1,717	4.8 (0.5)	3,957	6.5 (0.4)	4,238	6.9 (0.5)	3,555	5.4 (0.4)
연령(세)														
19-29	1,073	13.8 (1.1)	909	7.1 (1.0)	-	- -	194	3.3 (1.6)	524	5.1 (1.0)	563	5.4 (1.2)	461	6.2 (1.3)
30-39	1,122	10.2 (1.1)	1,053	4.7 (0.6)	-	- -	382	1.5 (0.8)	814	3.8 (0.7)	830	5.3 (0.9)	728	4.0 (0.9)
40-49	916	10.4 (1.1)	959	5.3 (0.8)	-	- -	313	2.9 (1.0)	746	5.2 (0.9)	853	3.7 (0.7)	631	2.9 (0.8)
50-59	722	16.1 (1.6)	594	7.4 (1.2)	-	- -	295	5.3 (1.3)	644	7.3 (1.2)	705	7.7 (1.3)	692	5.8 (1.0)
60-69	590	19.9 (1.7)	496	11.8 (1.6)	-	- -	271	10.9 (2.5)	638	10.8 (1.3)	664	13.4 (1.4)	555	8.3 (1.5)
70+	388	28.9 (2.8)	375	16.4 (2.1)	-	- -	262	15.7 (3.1)	591	16.5 (1.9)	623	15.6 (1.6)	488	11.0 (1.8)
거주지역														
동	3,102	13.6 (0.8)	3,480	7.1 (0.4)	-	- -	1,233	5.1 (0.7)	2,918	6.5 (0.5)	3,165	7.0 (0.6)	2,783	5.5 (0.4)
읍면	1,709	16.4 (1.2)	906	9.2 (1.3)	-	- -	484	5.6 (1.5)	1,039	9.4 (1.2)	1,073	9.2 (1.0)	772	6.6 (1.0)
소득수준														
하	1,136	15.7 (1.3)	936	9.4 (1.1)	-	- -	402	6.0 (1.5)	949	8.3 (1.1)	1,043	8.2 (0.9)	873	8.1 (1.0)
중하	1,256	14.4 (1.2)	991	6.3 (0.9)	-	- -	408	5.3 (1.2)	958	7.4 (1.0)	1,061	7.0 (0.9)	872	6.4 (0.9)
중상	1,161	14.1 (1.1)	1,079	6.6 (0.8)	-	- -	418	4.3 (1.1)	954	5.2 (0.8)	1,044	6.3 (0.8)	887	3.6 (0.7)
상	1,258	13.1 (1.0)	1,108	7.3 (0.9)	-	- -	399	4.5 (1.2)	968	6.9 (1.0)	1,048	7.7 (1.1)	871	4.8 (0.9)
거주지역(표준화)														
동	3,102	14.2 (0.8)	3,480	7.3 (0.5)	-	- -	1,233	4.8 (0.7)	2,918	6.3 (0.5)	3,165	6.8 (0.5)	2,783	5.4 (0.4)
읍면	1,709	14.9 (1.1)	906	7.6 (0.9)	-	- -	484	4.4 (1.2)	1,039	7.8 (1.4)	1,073	7.5 (1.0)	772	5.3 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	1,136	15.6 (1.2)	936	9.0 (1.0)	-	- -	402	5.8 (1.4)	949	7.9 (1.0)	1,043	7.8 (0.8)	873	7.9 (1.0)
중하	1,256	14.5 (1.1)	991	6.1 (0.8)	-	- -	408	5.1 (1.2)	958	7.0 (0.9)	1,061	6.6 (0.9)	872	6.1 (1.0)
중상	1,161	14.1 (1.1)	1,079	6.7 (0.8)	-	- -	418	4.0 (0.9)	954	4.9 (0.7)	1,044	5.9 (0.8)	887	3.1 (0.6)
상	1,258	13.1 (1.0)	1,108	7.3 (0.8)	-	- -	399	3.9 (1.0)	968	6.5 (1.0)	1,048	6.9 (1.1)	871	4.2 (0.8)

표 3-XV-3. 아토피피부염 유병률[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,983	2.3 (0.4)	6,817	3.1 (0.3)	7,511	2.7 (0.3)	6,251	3.1 (0.3)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	722	1.1 (0.5)	1,519	2.2 (0.4)	1,670	0.6 (0.2)	1,379	0.6 (0.2)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,983	2.4 (0.4)	6,817	3.2 (0.3)	7,511	2.9 (0.3)	6,251	3.3 (0.4)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	339	5.7 (1.5)	894	5.4 (0.7)	1,050	6.1 (0.9)	767	7.9 (1.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	635	1.6 (0.5)	1,416	3.3 (0.6)	1,430	3.9 (0.6)	1,253	3.1 (0.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	565	1.5 (0.6)	1,330	2.3 (0.5)	1,499	1.0 (0.2)	1,161	1.5 (0.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	505	1.0 (0.6)	1,135	2.4 (0.5)	1,252	1.9 (0.4)	1,170	2.3 (0.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	490	1.6 (0.6)	1,081	1.7 (0.4)	1,210	0.6 (0.2)	1,027	0.9 (0.3)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	449	0.8 (0.4)	961	2.2 (0.6)	1,070	0.6 (0.2)	873	0.5 (0.3)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,120	2.6 (0.5)	5,010	3.4 (0.3)	5,581	3.1 (0.3)	4,884	3.4 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	1.2 (0.4)	1,807	1.7 (0.4)	1,930	1.4 (0.3)	1,367	1.9 (0.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	713	2.3 (0.7)	1,636	3.8 (0.6)	1,876	2.4 (0.4)	1,539	3.3 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	697	2.6 (0.7)	1,638	2.6 (0.4)	1,865	2.9 (0.5)	1,540	3.1 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	733	2.2 (0.8)	1,665	3.0 (0.5)	1,827	2.6 (0.4)	1,561	3.0 (0.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	701	2.3 (0.7)	1,663	3.3 (0.5)	1,859	3.1 (0.6)	1,531	3.0 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,120	2.6 (0.5)	5,010	3.4 (0.3)	5,581	3.1 (0.3)	4,884	3.4 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	863	1.2 (0.5)	1,807	2.0 (0.6)	1,930	1.7 (0.5)	1,367	2.8 (0.8)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	713	2.4 (0.7)	1,636	3.8 (0.6)	1,876	2.5 (0.5)	1,539	3.5 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	697	2.6 (0.8)	1,638	2.7 (0.4)	1,865	3.1 (0.6)	1,540	3.3 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	733	2.2 (0.8)	1,665	3.0 (0.5)	1,827	2.7 (0.5)	1,561	3.3 (0.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	701	2.5 (0.8)	1,663	3.5 (0.6)	1,859	3.4 (0.6)	1,531	3.3 (0.8)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,242	2.3 (0.5)	2,847	2.8 (0.4)	3,252	2.6 (0.4)	2,698	3.2 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	302	2.2 (1.1)	583	2.1 (0.7)	697	0.8 (0.4)	615	0.9 (0.5)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,242	2.3 (0.5)	2,847	2.8 (0.4)	3,252	2.7 (0.4)	2,698	3.3 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	141	4.4 (1.8)	367	4.4 (1.0)	485	4.7 (1.0)	306	7.8 (1.8)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	247	1.8 (0.8)	600	3.8 (1.0)	597	4.3 (1.0)	525	3.1 (0.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	248	1.2 (0.9)	581	2.4 (0.7)	646	0.8 (0.3)	531	0.9 (0.6)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	205	1.9 (1.2)	491	0.9 (0.4)	545	2.1 (0.7)	478	2.8 (1.2)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	217	2.5 (1.2)	441	1.4 (0.6)	542	0.7 (0.3)	473	1.2 (0.5)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	184	1.5 (0.9)	367	2.0 (1.1)	437	0.9 (0.5)	385	1.2 (0.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	869	2.3 (0.6)	2,085	3.1 (0.4)	2,401	3.0 (0.4)	2,102	3.5 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	2.2 (0.9)	762	1.6 (0.6)	851	1.1 (0.4)	596	2.1 (0.7)

1) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 아토피 피부염 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	0.8 (0.6)	683	3.5 (0.9)	826	2.2 (0.6)	666	2.5 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	2.7 (1.2)	677	1.7 (0.5)	801	3.1 (0.8)	668	4.1 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	308	3.4 (1.4)	707	2.3 (0.7)	776	2.9 (0.7)	675	3.7 (1.0)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	2.5 (1.1)	693	4.0 (0.9)	808	2.3 (0.7)	661	2.5 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	869	2.3 (0.6)	2,085	3.0 (0.4)	2,401	3.0 (0.4)	2,102	3.5 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	373	2.3 (1.0)	762	2.0 (0.9)	851	1.1 (0.4)	596	2.7 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	300	0.7 (0.5)	683	3.6 (0.9)	826	2.3 (0.6)	666	2.5 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	2.6 (1.1)	677	1.8 (0.5)	801	3.2 (0.9)	668	4.3 (1.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	308	3.3 (1.3)	707	2.2 (0.7)	776	3.0 (0.7)	675	4.0 (1.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	299	2.6 (1.2)	693	4.1 (0.9)	808	2.4 (0.7)	661	2.5 (1.0)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,741	2.3 (0.5)	3,970	3.4 (0.3)	4,259	2.8 (0.3)	3,553	3.0 (0.4)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	420	0.3 (0.3)	936	2.2 (0.5)	973	0.4 (0.2)	764	0.4 (0.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,741	2.4 (0.5)	3,970	3.5 (0.3)	4,259	3.1 (0.4)	3,553	3.3 (0.5)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	198	7.0 (1.9)	527	6.5 (1.2)	565	7.7 (1.4)	461	8.1 (1.5)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	388	1.3 (0.5)	816	2.8 (0.7)	833	3.6 (0.7)	728	3.1 (0.8)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	317	1.9 (0.9)	749	2.2 (0.5)	853	1.1 (0.4)	630	2.0 (0.9)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	300	0.2 (0.2)	644	3.8 (0.8)	707	1.8 (0.5)	692	1.8 (0.6)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	273	0.8 (0.6)	640	1.9 (0.5)	668	0.4 (0.3)	554	0.5 (0.3)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	265	0.4 (0.4)	594	2.3 (0.8)	633	0.5 (0.2)	488	0.1 (0.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,251	2.8 (0.6)	2,925	3.7 (0.4)	3,180	3.1 (0.4)	2,782	3.3 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	0.1 (0.1)	1,045	1.9 (0.6)	1,079	1.6 (0.6)	771	1.8 (0.6)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	3.8 (1.2)	953	4.0 (0.8)	1,050	2.5 (0.6)	873	4.1 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	411	2.4 (1.0)	961	3.5 (0.7)	1,064	2.7 (0.6)	872	2.1 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	1.0 (0.5)	958	3.6 (0.7)	1,051	2.2 (0.5)	886	2.3 (0.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	2.1 (0.8)	970	2.7 (0.6)	1,051	3.9 (0.9)	870	3.6 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,251	3.0 (0.6)	2,925	3.7 (0.4)	3,180	3.3 (0.4)	2,782	3.5 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	490	0.1 (0.1)	1,045	1.7 (0.5)	1,079	2.3 (0.8)	771	2.9 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	3.9 (1.2)	953	4.0 (0.8)	1,050	2.7 (0.6)	873	4.3 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	411	2.5 (1.0)	961	3.5 (0.7)	1,064	3.0 (0.8)	872	2.3 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	425	1.0 (0.5)	958	3.7 (0.8)	1,051	2.4 (0.6)	886	2.6 (0.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	402	2.5 (1.0)	970	2.9 (0.6)	1,051	4.5 (1.0)	870	4.0 (1.1)

표 3-XV-4. 뇌졸중 유병률[1] : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
50세이상	3,071	2.9 (0.4)	1,336	3.7 (0.7)	1,735	2.3 (0.4)
65세이상	1,380	4.5 (0.6)	615	5.6 (1.1)	765	3.7 (0.6)
연령(세)						
50-59	1,170	2.0 (0.6)	478	2.9 (1.0)	692	1.2 (0.5)
60-69	1,028	2.6 (0.5)	473	2.8 (0.7)	555	2.4 (0.6)
70+	873	5.0 (0.8)	385	6.9 (1.5)	488	3.8 (0.8)
거주지역						
동	2,188	3.1 (0.5)	953	4.4 (0.9)	1,235	2.0 (0.4)
읍면	883	2.5 (0.5)	383	2.0 (0.8)	500	2.9 (0.6)
소득수준[2]						
하	753	3.5 (0.8)	327	5.5 (1.6)	426	1.8 (0.7)
중하	751	2.5 (0.6)	326	2.0 (0.7)	425	2.9 (0.9)
중상	779	3.9 (0.9)	344	5.0 (1.6)	435	3.0 (0.8)
상	747	1.8 (0.4)	326	2.2 (0.7)	421	1.5 (0.5)
거주지역(표준화)[3]						
동	2,188	3.2 (0.5)	953	4.6 (0.8)	1,235	2.1 (0.4)
읍면	883	2.2 (0.5)	383	2.0 (0.7)	500	2.3 (0.5)
소득수준(표준화)						
하	753	3.4 (0.8)	327	5.5 (1.5)	426	1.7 (0.6)
중하	751	2.5 (0.6)	326	2.2 (0.8)	425	2.9 (0.9)
중상	779	3.9 (0.9)	344	5.0 (1.5)	435	2.9 (0.8)
상	747	1.8 (0.5)	326	2.3 (0.7)	421	1.4 (0.5)

1) 뇌졸중 유병률 : 의사로부터 뇌졸중 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-5. 협심증 또는 심근경색증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,486	2.4 (0.2)	2,392	2.4 (0.3)	3,094	2.4 (0.3)
65세이상	1,380	6.9 (0.8)	615	7.5 (1.2)	765	6.5 (1.1)
연령(세)						
30-39	1,253	0.1 (0.1)	525	0.2 (0.1)	728	0.0 (-)[4]
40-49	1,162	0.4 (0.2)	531	0.5 (0.3)	631	0.3 (0.2)
50-59	1,170	3.1 (0.6)	478	3.1 (1.0)	692	3.0 (0.7)
60-69	1,028	6.3 (0.9)	473	7.3 (1.4)	555	5.4 (1.1)
70+	873	6.8 (1.0)	385	6.2 (1.4)	488	7.1 (1.5)
거주지역						
동	4,218	2.3 (0.2)	1,833	2.5 (0.4)	2,385	2.1 (0.3)
읍면	1,268	2.8 (0.6)	559	2.1 (0.7)	709	3.4 (0.9)
소득수준[2]						
하	1,350	2.4 (0.4)	593	2.1 (0.5)	757	2.6 (0.6)
중하	1,343	2.7 (0.5)	588	3.1 (0.9)	755	2.4 (0.6)
중상	1,381	2.5 (0.4)	598	2.6 (0.6)	783	2.4 (0.7)
상	1,341	2.0 (0.4)	588	1.8 (0.6)	753	2.3 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,218	2.3 (0.2)	1,833	2.6 (0.4)	2,385	2.0 (0.3)
읍면	1,268	1.9 (0.4)	559	1.7 (0.5)	709	2.0 (0.5)
소득수준(표준화)						
하	1,350	2.2 (0.4)	593	2.3 (0.5)	757	2.2 (0.5)
중하	1,343	2.5 (0.4)	588	3.0 (0.8)	755	2.1 (0.5)
중상	1,381	2.2 (0.4)	598	2.3 (0.5)	783	2.0 (0.5)
상	1,341	1.8 (0.4)	588	1.6 (0.5)	753	1.8 (0.5)

1) 협심증 또는 심근경색증 유병률 : 의사로부터 협심증 또는 심근경색증 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-XV-6. 암 유병률 : 성별, 만30세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
암[1]						
30세이상	5,483	3.2 (0.3)	2,392	2.1 (0.3)	3,091	4.3 (0.4)
65세이상	1,379	6.0 (0.8)	615	6.1 (1.2)	764	5.9 (1.1)
위암[2]						
30세이상	5,483	0.6 (0.1)	2,392	0.7 (0.2)	3,091	0.5 (0.1)
65세이상	1,379	1.3 (0.4)	615	1.7 (0.8)	764	1.0 (0.4)
대장암[3]						
30세이상	5,483	0.2 (0.1)	2,392	0.2 (0.1)	3,091	0.2 (0.1)
65세이상	1,379	0.7 (0.3)	615	0.5 (0.3)	764	0.8 (0.5)
유방암[4]						
30세이상	3,091	1.1 (0.2)	-	- -	3,091	1.1 (0.2)
65세이상	764	1.2 (0.4)	-	- -	764	1.2 (0.4)
자궁경부암[5]						
30세이상	3,091	0.8 (0.2)	-	- -	3,091	0.8 (0.2)
65세이상	764	1.8 (0.6)	-	- -	764	1.8 (0.6)
기타[6]						
30세이상	5,483	1.4 (0.2)	2,392	1.2 (0.2)	3,091	1.6 (0.3)
65세이상	1,379	2.5 (0.5)	615	4.0 (0.9)	764	1.4 (0.5)

1) 암 유병률 : 의사로부터 암(위암, 대방암, 유방암, 자궁경부암 등)을 진단받은 분율
2) 위암 유병률 : 의사로부터 위암 진단을 받은 분율
3) 대장암 유병률 : 의사로부터 대장암 진단을 받은 분율
4) 유방암 유병률 : 의사로부터 유방암 진단을 받은 분율, 여자
5) 자궁경부암 유병률 : 의사로부터 자궁경부암 진단을 받은 분율, 여자
6) 기타 : 위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암을 제외한 암

표 3-XV-7. 천식 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,254	6.7 (0.4)	2,699	7.6 (0.7)	3,555	5.7 (0.4)
연령(세)						
19-29	767	6.8 (1.0)	306	7.3 (1.6)	461	6.2 (1.3)
30-39	1,253	6.0 (0.9)	525	7.9 (1.4)	728	4.0 (0.9)
40-49	1,162	4.3 (0.8)	531	5.6 (1.3)	631	2.9 (0.8)
50-59	1,171	7.0 (1.0)	479	8.3 (1.6)	692	5.8 (1.0)
60-69	1,028	8.7 (1.0)	473	9.1 (1.7)	555	8.3 (1.5)
70+	873	10.9 (1.5)	385	10.7 (1.9)	488	11.0 (1.8)
19-64	4,874	6.2 (0.5)	2,084	7.4 (0.8)	2,790	4.9 (0.4)
65+	1,380	9.8 (1.1)	615	9.3 (1.4)	765	10.1 (1.4)
거주지역						
동	4,885	6.4 (0.5)	2,102	7.3 (0.8)	2,783	5.5 (0.4)
읍면	1,369	7.7 (1.1)	597	8.9 (1.5)	772	6.6 (1.0)
소득수준[2]						
하	1,540	8.4 (1.0)	667	8.8 (1.6)	873	8.1 (1.0)
중하	1,540	7.0 (0.9)	668	7.5 (1.3)	872	6.4 (0.9)
중상	1,562	4.4 (0.7)	675	5.3 (1.2)	887	3.6 (0.7)
상	1,532	6.8 (0.9)	661	8.7 (1.4)	871	4.8 (0.9)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,885	6.4 (0.5)	2,102	7.3 (0.8)	2,783	5.4 (0.4)
읍면	1,369	6.5 (1.1)	597	7.7 (1.5)	772	5.3 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,540	8.5 (1.0)	667	8.9 (1.5)	873	7.9 (1.0)
중하	1,540	6.8 (0.9)	668	7.6 (1.3)	872	6.1 (1.0)
중상	1,562	4.2 (0.6)	675	5.3 (1.2)	887	3.1 (0.6)
상	1,532	6.4 (0.9)	661	8.3 (1.4)	871	4.2 (0.8)

1) 천식 유병률 : 최근 1년 동안 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-8. 운동유발성천식 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,254	4.5 (0.3)	2,699	5.0 (0.6)	3,555	4.1 (0.4)
연령(세)						
19-29	767	5.9 (1.1)	306	7.0 (1.7)	461	4.7 (1.4)
30-39	1,253	4.7 (0.7)	525	5.4 (1.2)	728	3.9 (0.9)
40-49	1,162	2.8 (0.6)	531	3.4 (1.0)	631	2.3 (0.6)
50-59	1,171	4.1 (0.7)	479	3.5 (1.0)	692	4.7 (1.0)
60-69	1,028	3.7 (0.8)	473	4.6 (1.3)	555	3.0 (0.8)
70+	873	6.9 (1.0)	385	7.4 (1.5)	488	6.6 (1.4)
19-64	4,874	4.4 (0.3)	2,084	4.9 (0.6)	2,790	3.9 (0.4)
65+	1,380	5.5 (0.7)	615	5.8 (1.1)	765	5.2 (1.0)
거주지역						
동	4,885	4.7 (0.4)	2,102	5.0 (0.6)	2,783	4.3 (0.5)
읍면	1,369	4.0 (0.6)	597	4.9 (1.3)	772	3.1 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,540	5.0 (0.7)	667	5.0 (1.0)	873	5.0 (0.9)
중하	1,540	4.0 (0.6)	668	4.3 (1.0)	872	3.7 (0.7)
중상	1,562	4.5 (0.6)	675	4.6 (1.1)	887	4.4 (0.8)
상	1,532	4.7 (0.7)	661	6.3 (1.2)	871	3.2 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,885	4.7 (0.4)	2,102	5.1 (0.6)	2,783	4.3 (0.5)
읍면	1,369	3.5 (0.9)	597	4.6 (1.7)	772	2.4 (0.7)
소득수준(표준화)						
하	1,540	5.1 (0.7)	667	5.2 (1.0)	873	4.9 (0.9)
중하	1,540	4.1 (0.7)	668	4.6 (1.1)	872	3.5 (0.7)
중상	1,562	4.5 (0.7)	675	4.6 (1.1)	887	4.3 (0.8)
상	1,532	4.7 (0.8)	661	6.1 (1.2)	871	3.2 (0.8)

1) 운동유발성천식 유병률 : 최근 1년 동안 운동중이나 운동후에 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-9. 소아청소년 천식 유병률[1], 운동유발성천식 유병률[2] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
천식 유병률						
1-18세	2,115	6.2 (0.7)	1,101	8.4 (1.1)	1,014	3.7 (0.7)
연령(세)						
1-5	604	11.8 (1.6)	297	17.5 (2.4)	307	5.6 (1.5)
6-11	779	5.2 (1.0)	407	8.4 (1.8)	372	1.8 (0.8)
12-14	371	2.5 (0.9)	203	2.4 (1.3)	168	2.5 (1.3)
15-18	361	5.4 (1.5)	194	5.2 (2.0)	167	5.6 (2.1)
1-11	1,383	7.9 (0.8)	704	12.1 (1.3)	679	3.4 (0.7)
12-18	732	4.2 (1.0)	397	4.1 (1.5)	335	4.2 (1.3)
거주지역						
동	1,782	6.8 (0.8)	934	9.3 (1.3)	848	3.9 (0.8)
읍면	333	3.6 (0.9)	167	4.1 (1.4)	166	3.1 (1.4)
소득수준[3]						
하	510	7.0 (1.3)	267	9.4 (2.3)	243	4.0 (1.3)
중하	516	7.1 (1.7)	269	9.9 (2.7)	247	4.0 (1.3)
중상	532	5.4 (1.2)	273	8.0 (2.0)	259	2.3 (1.0)
상	523	5.4 (1.3)	274	5.8 (1.4)	249	4.9 (2.1)
운동유발성천식 유병률						
1-18세	2,115	2.8 (0.4)	1,101	3.6 (0.6)	1,014	1.8 (0.6)
연령(세)						
1-5	604	3.0 (0.8)	297	4.9 (1.5)	307	0.9 (0.7)
6-11	779	2.2 (0.6)	407	3.0 (1.1)	372	1.4 (0.8)
12-14	371	3.3 (1.1)	203	3.6 (1.5)	168	3.0 (1.5)
15-18	361	3.0 (0.8)	194	3.4 (1.3)	167	2.4 (1.6)
1-11	1,383	2.5 (0.5)	704	3.8 (0.8)	679	1.2 (0.5)
12-18	732	3.1 (0.6)	397	3.5 (0.9)	335	2.7 (1.1)
거주지역						
동	1,782	2.5 (0.4)	934	3.4 (0.6)	848	1.5 (0.5)
읍면	333	4.0 (1.4)	167	4.6 (1.8)	166	3.3 (1.8)
소득수준						
하	510	3.2 (0.8)	267	4.3 (1.3)	243	2.0 (1.0)
중하	516	2.5 (0.8)	269	3.3 (1.1)	247	1.6 (1.3)
중상	532	3.1 (1.0)	273	3.5 (1.4)	259	2.5 (1.5)
상	523	2.4 (0.8)	274	3.4 (1.1)	249	1.4 (0.8)

1) 천식 유병률 : 최근 1년 동안 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율

2) 운동유발성천식 유병률 : 최근 1년 동안 운동중이나 운동후에 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 3-XV-10. 아토피피부염 유병률[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,251	3.1 (0.3)	2,698	3.2 (0.5)	3,553	3.0 (0.4)
연령(세)						
19-29	767	7.9 (1.3)	306	7.8 (1.8)	461	8.1 (1.5)
30-39	1,253	3.1 (0.6)	525	3.1 (0.9)	728	3.1 (0.8)
40-49	1,161	1.5 (0.6)	531	0.9 (0.6)	630	2.0 (0.9)
50-59	1,170	2.3 (0.7)	478	2.8 (1.2)	692	1.8 (0.6)
60-69	1,027	0.9 (0.3)	473	1.2 (0.5)	554	0.5 (0.3)
70+	873	0.5 (0.3)	385	1.2 (0.7)	488	0.1 (0.1)
19-64	4,872	3.5 (0.4)	2,083	3.5 (0.6)	2,789	3.5 (0.5)
65+	1,379	0.6 (0.2)	615	0.9 (0.5)	764	0.4 (0.2)
거주지역						
동	4,884	3.4 (0.4)	2,102	3.5 (0.7)	2,782	3.3 (0.5)
읍면	1,367	1.9 (0.5)	596	2.1 (0.7)	771	1.8 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,539	3.3 (0.7)	666	2.5 (0.9)	873	4.1 (0.9)
중하	1,540	3.1 (0.7)	668	4.1 (1.2)	872	2.1 (0.8)
중상	1,561	3.0 (0.6)	675	3.7 (1.0)	886	2.3 (0.5)
상	1,531	3.0 (0.8)	661	2.5 (1.0)	870	3.6 (1.0)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,884	3.4 (0.4)	2,102	3.5 (0.7)	2,782	3.5 (0.5)
읍면	1,367	2.8 (0.8)	596	2.7 (1.1)	771	2.9 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,539	3.5 (0.7)	666	2.5 (0.9)	873	4.3 (0.9)
중하	1,540	3.3 (0.8)	668	4.3 (1.2)	872	2.3 (0.9)
중상	1,561	3.3 (0.6)	675	4.0 (1.1)	886	2.6 (0.6)
상	1,531	3.3 (0.8)	661	2.5 (1.0)	870	4.0 (1.1)

1) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-11. 류마티스성관절염 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,485	2.1 (0.2)	2,392	1.1 (0.3)	3,093	3.1 (0.4)
65세이상	1,380	3.5 (0.5)	615	1.6 (0.7)	765	4.8 (0.8)
연령(세)						
30-39	1,253	1.1 (0.4)	525	0.5 (0.3)	728	1.8 (0.8)
40-49	1,161	1.2 (0.5)	531	0.9 (0.6)	630	1.6 (0.6)
50-59	1,170	2.9 (0.5)	478	1.3 (0.5)	692	4.5 (0.9)
60-69	1,028	3.4 (0.7)	473	2.2 (0.9)	555	4.4 (0.9)
70+	873	3.8 (0.7)	385	1.6 (0.7)	488	5.3 (1.0)
거주지역						
동	4,217	2.0 (0.3)	1,833	1.0 (0.3)	2,384	2.9 (0.4)
읍면	1,268	2.7 (0.5)	559	1.2 (0.7)	709	4.1 (0.6)
소득수준[2]						
하	1,350	2.4 (0.5)	593	0.7 (0.5)	757	4.0 (0.8)
중하	1,343	2.0 (0.4)	588	1.3 (0.5)	755	2.7 (0.8)
중상	1,380	2.2 (0.4)	598	1.1 (0.5)	782	3.2 (0.7)
상	1,341	1.9 (0.4)	588	1.2 (0.6)	753	2.6 (0.6)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,217	1.9 (0.3)	1,833	1.0 (0.3)	2,384	2.8 (0.4)
읍면	1,268	2.2 (0.5)	559	1.1 (0.6)	709	3.2 (0.6)
소득수준(표준화)						
하	1,350	2.3 (0.5)	593	0.7 (0.4)	757	3.8 (0.8)
중하	1,343	2.0 (0.4)	588	1.3 (0.5)	755	2.5 (0.7)
중상	1,380	2.0 (0.4)	598	1.0 (0.4)	782	2.8 (0.6)
상	1,341	1.8 (0.4)	588	1.2 (0.7)	753	2.4 (0.6)

1) 류마티스성관절염 유병률 : 의사로부터 류마티스성 관절염 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-12. 우울증 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,484	3.4 (0.3)	2,392	1.5 (0.3)	3,092	5.2 (0.5)
65세이상	1,379	3.9 (0.6)	615	1.5 (0.5)	764	5.6 (1.1)
연령(세)						
30-39	1,253	2.6 (0.5)	525	0.9 (0.4)	728	4.4 (0.9)
40-49	1,161	1.7 (0.4)	531	0.7 (0.4)	630	2.8 (0.7)
50-59	1,170	5.4 (0.9)	478	2.6 (0.9)	692	8.1 (1.4)
60-69	1,027	4.9 (0.8)	473	2.2 (0.7)	554	7.3 (1.2)
70+	873	3.4 (0.7)	385	1.7 (0.6)	488	4.5 (1.1)
거주지역						
동	4,217	3.6 (0.3)	1,833	1.6 (0.3)	2,384	5.5 (0.6)
읍면	1,267	2.7 (0.6)	559	1.0 (0.4)	708	4.3 (1.1)
소득수준[2]						
하	1,350	3.9 (0.7)	593	2.2 (0.8)	757	5.5 (1.1)
중하	1,343	3.6 (0.5)	588	1.1 (0.5)	755	6.0 (1.0)
중상	1,380	3.1 (0.5)	598	1.0 (0.4)	782	5.0 (0.9)
상	1,340	2.6 (0.5)	588	1.4 (0.5)	752	3.8 (0.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,217	3.5 (0.3)	1,833	1.6 (0.3)	2,384	5.3 (0.5)
읍면	1,267	2.5 (0.6)	559	0.9 (0.4)	708	4.1 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	1,350	3.8 (0.6)	593	2.1 (0.7)	757	5.4 (1.1)
중하	1,343	3.4 (0.5)	588	1.2 (0.5)	755	5.5 (0.9)
중상	1,380	3.0 (0.5)	598	0.9 (0.4)	782	4.8 (0.9)
상	1,340	2.5 (0.5)	588	1.4 (0.5)	752	3.6 (0.8)

1) 우울증 유병률 : 의사로부터 우울증 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-13. 갑상샘질환 유병률[1] : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,483	3.9 (0.3)	2,391	1.0 (0.3)	3,092	6.6 (0.5)
65세이상	1,378	4.5 (0.6)	614	1.2 (0.6)	764	6.8 (1.0)
연령(세)						
30-39	1,253	2.4 (0.5)	525	0.6 (0.3)	728	4.3 (0.9)
40-49	1,162	3.9 (0.7)	531	0.8 (0.5)	631	7.1 (1.3)
50-59	1,170	5.7 (0.8)	478	2.0 (0.7)	692	9.3 (1.4)
60-69	1,025	4.3 (0.7)	472	0.9 (0.6)	553	7.3 (1.2)
70+	873	3.5 (0.7)	385	0.6 (0.3)	488	5.4 (1.1)
거주지역						
동	4,215	4.2 (0.4)	1,832	1.0 (0.3)	2,383	7.2 (0.6)
읍면	1,268	3.0 (0.4)	559	1.1 (0.6)	709	4.8 (0.7)
소득수준[2]						
하	1,350	3.1 (0.6)	593	1.4 (0.6)	757	4.9 (0.9)
중하	1,342	4.0 (0.8)	588	1.4 (0.5)	754	6.5 (1.2)
중상	1,380	3.9 (0.6)	598	0.6 (0.3)	782	7.0 (1.2)
상	1,340	4.3 (0.6)	587	0.6 (0.4)	753	8.0 (1.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,215	4.1 (0.4)	1,832	1.0 (0.3)	2,383	7.1 (0.6)
읍면	1,268	2.7 (0.5)	559	1.0 (0.6)	709	4.5 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,350	3.0 (0.6)	593	1.3 (0.5)	757	4.8 (0.9)
중하	1,342	3.8 (0.7)	588	1.4 (0.5)	754	6.1 (1.2)
중상	1,380	3.9 (0.6)	598	0.5 (0.2)	782	7.1 (1.2)
상	1,340	4.2 (0.6)	587	0.6 (0.3)	753	8.0 (1.2)

1) 갑상샘질환 유병률 : 의사로부터 갑상샘질환 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XV-14. C형간염[1], 간경변증[2] 유병률 : 성별, 만30세이상, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
C형간염						
30세이상	5,484	0.2 (0.1)	2,392	0.1 (0.1)	3,092	0.2 (0.1)
65세이상	1,379	0.1 (0.1)	615	0.2 (0.2)	764	0.0 (-)[3]
간경변증						
30세이상	5,483	0.5 (0.1)	2,392	0.5 (0.2)	3,091	0.4 (0.1)
65세이상	1,379	0.8 (0.3)	615	1.1 (0.5)	764	0.6 (0.4)

1) C형간염 유병률 : 의사로부터 C형간염 진단을 받은 분율
2) 간경변증 유병률 : 의사로부터 간경변증 진단을 받은 분율
3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-XV-15. 소아청소년 질환별 유병률 : 성별, 만1-18세, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
선천성심장질환[1]						
1-18세	2,115	0.9 (0.3)	1,101	0.7 (0.3)	1,014	1.1 (0.4)
1-11세	1,384	1.3 (0.4)	705	1.0 (0.6)	679	1.6 (0.7)
12-18세	731	0.4 (0.3)	396	0.3 (0.3)	335	0.5 (0.5)
아토피피부염[2]						
1-18세	2,116	15.0 (1.1)	1,102	14.5 (1.3)	1,014	15.5 (1.7)
1-11세	1,384	17.5 (1.3)	705	17.5 (1.6)	679	17.6 (2.2)
12-18세	732	11.9 (1.8)	397	11.2 (1.8)	335	12.9 (2.6)
주의력결핍장애[3]						
1-18세	2,115	0.6 (0.2)	1,101	1.1 (0.4)	1,014	0.0 (-)[6]
1-11세	1,384	0.4 (0.2)	705	0.6 (0.4)	679	0.1 (0.1)
12-18세	731	0.9 (0.5)	396	1.6 (0.8)	335	0.0 (-)
요로감염[4]						
1-18세	2,115	1.8 (0.4)	1,101	2.2 (0.6)	1,014	1.2 (0.4)
1-11세	1,384	2.4 (0.5)	705	2.6 (0.7)	679	2.2 (0.6)
12-18세	731	1.0 (0.6)	396	1.8 (1.0)	335	0.0 (-)
폐렴[5]						
1-18세	2,115	9.6 (1.1)	1,101	10.4 (1.5)	1,014	8.6 (1.0)
1-11세	1,384	11.9 (1.4)	705	13.6 (2.0)	679	10.0 (1.4)
12-18세	731	6.8 (1.3)	396	6.8 (2.0)	335	6.8 (1.5)

1) 선천성심장질환 유병률 : 의사로부터 선천성심장질환 진단을 받은 분율
2) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 분율
3) 주의력결핍장애 : 의사로부터 주의력결핍장애 진단을 받은 분율
4) 요로감염 유병률 : 의사로부터 요로감염 진단을 받은 분율
5) 폐렴 유병률 : 의사로부터 폐렴 진단을 받은 분율
6) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제 4 장 삶의 질

표 4-1. 주관적건강인지율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	8,991	42.8 (0.7)	8,066	44.3 (0.8)	25,196	46.8 (0.5)	2,980	32.2 (1.2)	6,802	42.4 (0.9)	7,472	43.4 (0.9)	6,254	36.0 (0.8)
65세이상	1,044	37.9 (1.7)	978	28.0 (1.9)	3,705	17.8 (0.7)	722	23.1 (1.8)	1,515	34.4 (1.5)	1,648	32.7 (1.7)	1,380	29.7 (1.9)
19세이상(표준화)[2]	8,991	42.5 (0.7)	8,066	44.7 (0.7)	25,196	46.8 (0.5)	2,980	32.4 (1.3)	6,802	42.8 (0.9)	7,472	43.9 (0.9)	6,254	36.6 (0.8)
연령(세)														
19-29	1,959	50.4 (1.4)	1,624	53.0 (1.6)	4,556	65.9 (0.9)	338	36.6 (3.2)	891	52.8 (2.0)	1,049	52.5 (1.7)	767	43.4 (2.2)
30-39	2,213	45.3 (1.2)	1,998	50.9 (1.5)	5,521	54.7 (0.8)	634	35.2 (2.1)	1,411	41.6 (1.7)	1,425	42.8 (1.6)	1,253	39.8 (1.5)
40-49	1,804	39.6 (1.4)	1,870	47.0 (1.4)	5,808	47.3 (0.8)	565	31.6 (2.5)	1,328	43.6 (1.5)	1,495	45.3 (1.6)	1,162	34.4 (1.6)
50-59	1,338	36.9 (1.6)	1,115	37.7 (1.7)	3,931	34.8 (0.9)	505	30.9 (2.5)	1,134	37.6 (2.0)	1,247	40.7 (1.8)	1,171	31.5 (1.7)
60-69	1,066	34.7 (1.7)	878	28.9 (1.9)	3,187	23.5 (0.9)	489	26.9 (2.3)	1,080	35.2 (1.9)	1,205	37.7 (1.9)	1,028	32.1 (2.0)
70+	611	39.6 (2.2)	581	26.8 (2.2)	2,193	15.3 (0.9)	449	22.8 (2.3)	958	33.6 (1.8)	1,051	31.3 (1.8)	873	27.9 (2.2)
거주지역														
동	5,848	43.3 (0.8)	6,417	46.0 (0.9)	20,230	48.7 (0.5)	2,118	32.0 (1.5)	5,001	42.5 (1.0)	5,556	44.7 (1.1)	4,885	36.4 (1.0)
읍면	3,143	41.0 (1.1)	1,649	37.0 (1.6)	4,966	38.2 (1.1)	862	32.5 (2.1)	1,801	41.9 (2.1)	1,916	37.9 (2.0)	1,369	34.7 (1.4)
소득수준[3]														
하	2,141	36.6 (1.2)	1,703	38.4 (1.6)	6,283	39.4 (0.8)	713	28.2 (2.2)	1,632	34.1 (1.6)	1,860	38.5 (1.5)	1,540	32.4 (1.4)
중하	2,309	42.8 (1.2)	1,845	41.1 (1.4)	6,289	45.8 (0.8)	696	30.0 (2.1)	1,634	41.9 (1.6)	1,862	41.1 (1.4)	1,540	34.4 (1.3)
중상	2,224	43.3 (1.2)	1,995	44.2 (1.4)	6,188	49.9 (0.9)	731	35.6 (1.9)	1,665	45.4 (1.6)	1,819	44.6 (1.5)	1,562	36.8 (1.7)
상	2,317	47.1 (1.2)	2,051	52.7 (1.3)	6,132	52.5 (0.9)	701	34.3 (2.5)	1,659	48.7 (1.6)	1,851	49.7 (1.6)	1,532	41.3 (1.5)
거주지역(표준화)														
동	5,848	42.5 (0.8)	6,417	45.6 (0.9)	20,230	47.3 (0.5)	2,118	32.1 (1.5)	5,001	42.5 (1.0)	5,556	44.7 (1.0)	4,885	36.5 (1.0)
읍면	3,143	42.5 (1.1)	1,649	42.3 (1.7)	4,966	44.2 (1.2)	862	33.4 (2.4)	1,801	44.5 (2.6)	1,916	39.7 (2.4)	1,369	37.4 (1.7)
소득수준(표준화)														
하	2,141	36.5 (1.2)	1,703	39.7 (1.6)	6,283	38.9 (0.7)	713	28.3 (2.2)	1,632	34.4 (1.6)	1,860	39.0 (1.4)	1,540	33.0 (1.4)
중하	2,309	42.3 (1.1)	1,845	41.2 (1.4)	6,289	45.8 (0.8)	696	29.9 (2.1)	1,634	42.4 (1.6)	1,862	41.7 (1.4)	1,540	35.1 (1.3)
중상	2,224	43.0 (1.2)	1,995	44.5 (1.4)	6,188	50.1 (0.8)	731	35.8 (1.9)	1,665	45.6 (1.6)	1,819	45.2 (1.5)	1,562	37.6 (1.7)
상	2,317	46.9 (1.2)	2,051	52.5 (1.3)	6,132	52.7 (0.8)	701	34.6 (2.6)	1,659	49.2 (1.6)	1,851	50.1 (1.6)	1,532	41.8 (1.5)
남자														
19세이상	4,180	46.8 (0.8)	3,677	50.0 (0.9)	11,712	52.9 (0.6)	1,240	36.1 (1.6)	2,836	46.9 (1.2)	3,233	47.6 (1.1)	2,699	40.0 (1.2)
65세이상	411	44.0 (2.6)	379	33.4 (2.5)	1,481	25.7 (1.3)	302	26.1 (2.4)	581	43.1 (2.4)	687	39.6 (2.3)	615	37.1 (2.6)
19세이상(표준화)	4,180	46.6 (0.8)	3,677	50.2 (0.9)	11,712	52.0 (0.6)	1,240	36.2 (1.6)	2,836	47.1 (1.2)	3,233	47.7 (1.1)	2,699	40.3 (1.2)
연령(세)														
19-29	886	55.4 (1.7)	714	61.3 (2.2)	2,050	70.5 (1.3)	141	41.4 (4.0)	366	58.4 (3.0)	485	55.4 (2.4)	306	50.1 (3.2)
30-39	1,091	48.6 (1.6)	944	53.1 (1.8)	2,683	58.2 (1.1)	246	37.2 (3.0)	595	44.3 (2.3)	595	44.7 (2.2)	525	42.4 (2.3)
40-49	888	43.7 (1.8)	911	50.2 (1.8)	2,818	52.1 (1.0)	248	37.7 (3.6)	579	46.7 (2.3)	642	49.1 (2.3)	531	33.7 (2.3)
50-59	616	38.5 (2.3)	521	47.2 (2.5)	1,915	41.7 (1.3)	205	29.7 (3.4)	490	39.8 (2.8)	542	46.5 (2.5)	479	36.6 (2.6)
60-69	476	42.1 (2.4)	381	34.7 (2.7)	1,447	32.2 (1.4)	216	34.6 (3.6)	440	42.6 (2.7)	541	45.3 (2.4)	473	39.6 (2.6)
70+	223	43.7 (3.7)	206	33.4 (3.0)	799	21.0 (1.6)	184	27.1 (3.3)	366	42.8 (3.0)	428	34.3 (2.8)	385	32.3 (3.1)
거주지역														
동	2,746	47.0 (1.0)	2,933	51.0 (1.1)	9,399	54.4 (0.6)	868	35.8 (1.9)	2,080	46.7 (1.4)	2,390	49.2 (1.3)	2,102	39.9 (1.4)
읍면	1,434	46.2 (1.5)	744	45.7 (1.8)	2,313	46.4 (1.3)	372	37.2 (3.4)	756	47.7 (2.9)	843	40.9 (2.3)	597	40.2 (2.5)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 주관적건강인지율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	1,005	40.9 (1.7)	763	43.0 (2.2)	2,946	44.6 (1.0)	300	31.1 (2.8)	681	37.5 (2.3)	817	42.6 (2.0)	667	36.9 (2.2)
중하	1,053	47.0 (1.7)	852	47.0 (2.0)	2,859	53.0 (1.1)	286	35.2 (3.1)	673	47.0 (2.5)	801	44.5 (1.9)	668	37.5 (2.1)
중상	1,063	46.1 (1.5)	919	50.7 (1.8)	2,893	56.1 (1.1)	306	40.1 (3.5)	707	50.1 (2.2)	774	48.0 (2.2)	675	42.0 (2.5)
상	1,059	52.0 (1.6)	943	57.8 (1.8)	2,863	58.6 (1.1)	299	37.3 (3.1)	691	53.2 (2.3)	803	56.0 (2.0)	661	44.5 (2.2)
거주지역(표준화)														
동	2,746	46.4 (1.0)	2,933	50.7 (1.1)	9,399	52.5 (0.6)	868	35.9 (1.8)	2,080	46.6 (1.3)	2,390	48.9 (1.3)	2,102	39.9 (1.4)
읍면	1,434	47.7 (1.7)	744	49.1 (1.8)	2,313	49.9 (1.4)	372	37.5 (3.5)	756	48.3 (3.3)	843	42.1 (2.7)	597	42.9 (2.9)
소득수준(표준화)														
하	1,005	40.8 (1.6)	763	44.0 (2.1)	2,946	43.2 (0.9)	300	30.9 (2.7)	681	37.9 (2.2)	817	42.8 (2.0)	667	37.6 (2.3)
중하	1,053	46.7 (1.6)	852	46.7 (1.9)	2,859	52.0 (1.0)	286	35.0 (3.1)	673	47.3 (2.5)	801	44.5 (1.9)	668	37.9 (2.1)
중상	1,063	45.9 (1.6)	919	51.2 (1.9)	2,893	55.3 (1.0)	306	40.2 (3.3)	707	50.3 (2.1)	774	48.1 (2.2)	675	42.6 (2.6)
상	1,059	51.8 (1.6)	943	57.6 (1.8)	2,863	58.0 (1.1)	299	37.4 (3.1)	691	53.6 (2.4)	803	55.8 (2.0)	661	44.3 (2.2)
여자														
19세이상	4,811	39.1 (0.8)	4,389	39.8 (0.9)	13,484	40.8 (0.6)	1,740	28.3 (1.5)	3,966	38.0 (1.0)	4,239	39.2 (1.1)	3,555	32.1 (1.1)
65세이상	633	34.2 (2.2)	599	24.5 (2.4)	2,224	12.5 (0.8)	420	21.1 (2.2)	934	28.4 (1.8)	961	28.0 (1.9)	765	24.5 (2.3)
19세이상(표준화)	4,811	38.9 (0.8)	4,389	40.4 (0.9)	13,484	41.7 (0.5)	1,740	28.7 (1.6)	3,966	38.7 (1.1)	4,239	40.2 (1.1)	3,555	32.9 (1.2)
연령(세)														
19-29	1,073	46.1 (1.9)	910	46.6 (1.9)	2,506	61.0 (1.1)	197	31.7 (4.3)	525	46.8 (2.6)	564	49.4 (2.4)	461	36.3 (3.1)
30-39	1,122	42.1 (1.6)	1,054	49.1 (1.9)	2,838	51.0 (1.0)	388	33.2 (2.7)	816	38.8 (2.1)	830	40.8 (2.1)	728	37.1 (2.2)
40-49	916	35.4 (1.8)	959	44.2 (1.8)	2,990	42.4 (1.0)	317	25.2 (2.9)	749	40.5 (1.9)	853	41.3 (2.0)	631	35.1 (2.2)
50-59	722	35.3 (1.9)	594	29.9 (2.1)	2,016	28.0 (1.1)	300	32.1 (3.4)	644	35.4 (2.2)	705	34.8 (2.2)	692	26.5 (2.0)
60-69	590	28.6 (2.2)	497	24.5 (2.5)	1,740	16.0 (1.0)	273	20.1 (2.9)	640	28.5 (2.1)	664	30.9 (2.3)	555	25.4 (2.4)
70+	388	37.5 (2.9)	375	23.2 (2.6)	1,394	12.1 (0.9)	265	20.3 (2.6)	592	28.1 (2.1)	623	29.5 (2.2)	488	25.2 (2.7)
거주지역														
동	3,102	39.9 (1.0)	3,484	42.0 (1.0)	10,831	43.1 (0.6)	1,250	28.4 (1.9)	2,921	38.3 (1.2)	3,166	40.3 (1.3)	2,783	32.9 (1.3)
읍면	1,709	36.4 (1.4)	905	30.0 (2.1)	2,653	30.3 (1.2)	490	27.8 (2.6)	1,045	36.4 (1.8)	1,073	34.9 (2.4)	772	29.3 (1.9)
소득수준														
하	1,136	32.6 (1.5)	940	34.8 (1.7)	3,337	34.2 (1.0)	413	25.3 (2.9)	951	30.7 (2.1)	1,043	34.3 (1.6)	873	28.1 (1.9)
중하	1,256	39.0 (1.4)	993	36.3 (1.8)	3,430	39.0 (1.0)	410	25.4 (2.6)	961	37.0 (1.8)	1,061	37.8 (2.1)	872	31.4 (1.7)
중상	1,161	40.7 (1.6)	1,076	39.0 (1.8)	3,295	43.8 (1.1)	425	31.1 (2.6)	958	40.6 (1.9)	1,045	41.4 (2.1)	887	31.8 (2.1)
상	1,258	42.8 (1.5)	1,108	48.5 (1.5)	3,269	46.6 (1.0)	402	31.2 (2.7)	968	44.2 (1.8)	1,048	43.6 (1.9)	871	38.0 (2.1)
거주지역(표준화)														
동	3,102	39.1 (1.0)	3,484	41.6 (1.0)	10,831	42.4 (0.6)	1,250	28.6 (1.9)	2,921	38.5 (1.2)	3,166	40.7 (1.2)	2,783	33.2 (1.3)
읍면	1,709	37.7 (1.4)	905	36.4 (2.4)	2,653	38.3 (1.3)	490	28.6 (2.8)	1,045	39.8 (2.9)	1,073	37.4 (3.0)	772	31.6 (2.4)
소득수준(표준화)														
하	1,136	32.4 (1.5)	940	36.4 (1.7)	3,337	34.6 (0.9)	413	25.4 (3.0)	951	31.3 (2.2)	1,043	35.1 (1.6)	873	28.8 (2.0)
중하	1,256	38.6 (1.4)	993	36.7 (1.8)	3,430	40.0 (0.9)	410	25.2 (2.5)	961	37.8 (1.9)	1,061	38.9 (2.1)	872	32.3 (1.7)
중상	1,161	40.3 (1.6)	1,076	39.3 (1.8)	3,295	45.1 (1.0)	425	31.2 (2.6)	958	41.1 (1.9)	1,045	42.4 (2.2)	887	32.7 (2.2)
상	1,258	42.7 (1.6)	1,108	48.5 (1.5)	3,269	47.7 (1.0)	402	32.0 (2.7)	968	45.0 (1.9)	1,048	44.5 (1.9)	871	39.0 (2.2)

표 4-2. 소아청소년 주관적건강인지율[1] 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
1-18세	-	- -	-	- -	8,293	77.5 (0.6)	1,162	58.2 (1.9)	2,463	69.9 (1.1)	2,539	71.9 (1.1)	2,116	67.8 (1.6)
연령(세)														
1-5	-	- -	-	- -	1,965	77.8 (1.1)	314	60.1 (3.0)	656	69.3 (2.1)	664	76.8 (2.0)	604	73.0 (2.3)
6-11	-	- -	-	- -	3,025	80.3 (0.9)	477	66.0 (2.8)	971	74.4 (1.4)	894	75.7 (1.7)	780	73.1 (2.0)
12-14	-	- -	-	- -	1,592	77.6 (1.1)	192	50.2 (4.7)	429	73.0 (2.5)	470	72.6 (2.1)	371	63.5 (3.3)
15-18	-	- -	-	- -	1,711	72.6 (1.3)	179	51.9 (4.5)	407	62.0 (2.6)	511	63.1 (2.5)	361	60.3 (3.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	7,106	77.3 (0.7)	871	58.6 (2.3)	2,057	69.5 (1.2)	2,124	71.5 (1.2)	1,783	66.4 (1.8)
읍면	-	- -	-	- -	1,187	78.5 (1.7)	291	57.0 (3.0)	406	72.3 (3.3)	415	74.2 (3.0)	333	74.0 (3.1)
소득수준[2]														
하	-	- -	-	- -	2,079	72.2 (1.3)	282	54.9 (5.1)	595	66.7 (2.3)	614	70.5 (2.3)	510	63.5 (2.8)
중하	-	- -	-	- -	2,085	76.9 (1.2)	286	53.8 (3.3)	611	69.8 (2.3)	621	73.1 (2.0)	516	68.9 (2.8)
중상	-	- -	-	- -	2,036	79.7 (1.1)	276	61.6 (3.6)	614	72.0 (2.4)	624	70.1 (2.1)	532	70.9 (2.6)
상	-	- -	-	- -	2,019	81.4 (1.1)	275	61.8 (3.6)	601	71.3 (2.3)	656	73.9 (2.4)	524	69.8 (3.0)
남자	-	- -	-	- -										
1-18세					4,276	77.5 (0.8)	622	60.0 (2.7)	1,277	68.3 (1.5)	1,337	71.1 (1.4)	1,102	66.6 (2.1)
연령(세)	-	- -	-	- -										
1-5	-	- -	-	- -	987	76.4 (1.5)	178	59.4 (3.5)	329	63.7 (3.1)	367	72.2 (2.9)	297	72.9 (3.2)
6-11	-	- -	-	- -	1,561	80.3 (1.2)	246	67.9 (3.2)	506	72.8 (2.0)	460	73.0 (2.5)	408	73.0 (2.6)
12-14	-	- -	-	- -	826	78.2 (1.5)	107	53.9 (6.9)	230	73.8 (3.3)	245	74.9 (2.9)	203	55.1 (4.5)
15-18					902	73.8 (1.5)	91	55.3 (6.4)	212	62.2 (3.6)	265	65.1 (3.1)	194	62.3 (5.0)
거주지역	-	- -	-	- -										
동	-	- -	-	- -	3,667	77.2 (0.8)	465	60.4 (3.1)	1,053	67.9 (1.7)	1,118	70.4 (1.5)	935	63.6 (2.3)
읍면					609	79.6 (1.8)	157	58.6 (5.3)	224	70.2 (4.0)	219	74.6 (3.7)	167	80.4 (3.6)
소득수준	-	- -	-	- -										
하	-	- -	-	- -	1,068	71.7 (1.6)	150	54.8 (6.1)	320	63.4 (3.4)	320	67.8 (2.9)	267	61.3 (4.1)
중하	-	- -	-	- -	1,069	78.5 (1.5)	153	53.9 (4.8)	306	69.7 (3.0)	318	72.7 (2.7)	269	66.2 (4.1)
중상	-	- -	-	- -	1,050	79.6 (1.4)	151	64.7 (5.1)	314	71.5 (3.0)	346	67.4 (3.0)	273	71.7 (3.1)
상					1,053	80.4 (1.4)	150	64.8 (5.2)	314	68.2 (3.1)	343	76.4 (2.6)	275	69.7 (3.5)
여자	-	- -	-	- -										
1-18세					4,017	77.5 (0.8)	540	56.2 (2.7)	1,186	71.7 (1.5)	1,202	72.9 (1.4)	1,014	69.3 (2.0)
연령(세)	-	- -	-	- -										
1-5	-	- -	-	- -	978	79.2 (1.5)	136	60.9 (4.8)	327	75.6 (2.5)	297	81.7 (2.5)	307	73.1 (3.3)
6-11	-	- -	-	- -	1,464	80.4 (1.1)	231	64.1 (3.7)	465	76.2 (2.1)	434	78.6 (2.3)	372	73.3 (3.3)
12-14	-	- -	-	- -	766	77.1 (1.6)	85	45.4 (6.2)	199	72.2 (3.7)	225	70.1 (3.1)	168	73.1 (4.5)
15-18					809	71.4 (2.0)	88	47.7 (7.0)	195	61.8 (4.0)	246	60.8 (3.4)	167	57.7 (5.2)
거주지역	-	- -	-	- -										
동	-	- -	-	- -	3,439	77.5 (0.9)	406	56.5 (3.3)	1,004	71.2 (1.5)	1,006	72.7 (1.5)	848	69.7 (2.1)
읍면					578	77.2 (2.5)	134	55.1 (3.2)	182	74.7 (4.5)	196	73.6 (3.7)	166	67.6 (5.7)
소득수준	-	- -	-	- -										
하	-	- -	-	- -	1,011	72.8 (1.5)	132	55.0 (5.8)	275	70.6 (2.9)	294	73.2 (3.1)	243	66.1 (3.8)
중하	-	- -	-	- -	1,016	75.2 (1.6)	133	53.6 (5.0)	305	70.0 (3.2)	303	73.5 (2.8)	247	71.9 (3.8)
중상	-	- -	-	- -	986	79.7 (1.5)	125	57.7 (5.7)	300	72.6 (3.3)	278	73.4 (3.1)	259	70.0 (3.9)
상	-	- -	-	- -	966	82.7 (1.5)	125	58.0 (3.5)	287	74.6 (3.1)	313	70.8 (3.1)	249	69.9 (4.1)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 4-3. EQ-5D 지수[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
전체														
19세이상	-	--	-	--	24,700	0.939 (0.001)	2,981	0.931 (0.003)	6,800	0.937 (0.002)	7,470	0.948 (0.002)	6,249	0.948 (0.002)
65세이상	-	--	-	--	3,621	0.821 (0.004)	720	0.793 (0.010)	1,515	0.818 (0.007)	1,646	0.832 (0.006)	1,378	0.841 (0.007)
19세이상(표준화)[2]	-	--	-	--	24,700	0.939 (0.001)	2,981	0.933 (0.002)	6,800	0.940 (0.002)	7,470	0.951 (0.001)	6,249	0.953 (0.001)
연령(세)														
19-29	-	--	-	--	4,409	0.978 (0.001)	339	0.972 (0.003)	890	0.973 (0.002)	1,049	0.978 (0.002)	767	0.982 (0.002)
30-39	-	--	-	--	5,420	0.971 (0.001)	635	0.967 (0.002)	1,411	0.967 (0.003)	1,425	0.978 (0.002)	1,253	0.975 (0.003)
40-49	-	--	-	--	5,710	0.954 (0.001)	565	0.948 (0.005)	1,328	0.963 (0.002)	1,495	0.972 (0.002)	1,162	0.972 (0.003)
50-59	-	--	-	--	3,885	0.922 (0.002)	505	0.925 (0.007)	1,134	0.925 (0.004)	1,247	0.945 (0.003)	1,170	0.946 (0.003)
60-69	-	--	-	--	3,142	0.869 (0.003)	489	0.857 (0.009)	1,079	0.876 (0.005)	1,205	0.895 (0.005)	1,025	0.906 (0.005)
70+	-	--	-	--	2,134	0.800 (0.005)	448	0.777 (0.011)	958	0.796 (0.008)	1,049	0.810 (0.008)	872	0.811 (0.010)
거주지역														
동	-	--	-	--	19,827	0.944 (0.001)	2,118	0.934 (0.003)	4,999	0.943 (0.002)	5,554	0.955 (0.002)	4,881	0.955 (0.002)
읍면	-	--	-	--	4,873	0.916 (0.004)	863	0.917 (0.009)	1,801	0.910 (0.007)	1,916	0.918 (0.007)	1,368	0.924 (0.005)
소득수준[3]														
하	-	--	-	--	6,153	0.917 (0.002)	713	0.917 (0.005)	1,631	0.919 (0.004)	1,860	0.936 (0.004)	1,538	0.935 (0.005)
중하	-	--	-	--	6,189	0.939 (0.002)	696	0.927 (0.005)	1,633	0.938 (0.003)	1,861	0.942 (0.004)	1,539	0.947 (0.004)
중상	-	--	-	--	6,065	0.947 (0.002)	733	0.942 (0.004)	1,664	0.947 (0.003)	1,819	0.951 (0.003)	1,560	0.954 (0.003)
상	-	--	-	--	5,997	0.954 (0.001)	700	0.943 (0.004)	1,660	0.949 (0.004)	1,850	0.962 (0.002)	1,532	0.960 (0.003)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	19,827	0.940 (0.001)	2,118	0.934 (0.003)	4,999	0.941 (0.002)	5,554	0.954 (0.002)	4,881	0.955 (0.002)
읍면	-	--	-	--	4,873	0.938 (0.002)	863	0.929 (0.005)	1,801	0.937 (0.004)	1,916	0.946 (0.003)	1,368	0.948 (0.002)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	6,153	0.916 (0.002)	713	0.918 (0.005)	1,631	0.921 (0.003)	1,860	0.939 (0.003)	1,538	0.940 (0.004)
중하	-	--	-	--	6,189	0.940 (0.001)	696	0.928 (0.004)	1,633	0.941 (0.003)	1,861	0.947 (0.002)	1,539	0.950 (0.003)
중상	-	--	-	--	6,065	0.948 (0.001)	733	0.942 (0.003)	1,664	0.948 (0.002)	1,819	0.954 (0.002)	1,560	0.958 (0.002)
상	-	--	-	--	5,997	0.955 (0.001)	700	0.947 (0.003)	1,660	0.952 (0.003)	1,850	0.966 (0.002)	1,532	0.964 (0.002)
남자														
19세이상	-	--	-	--	11,392	0.953 (0.001)	1,240	0.952 (0.003)	2,835	0.955 (0.002)	3,231	0.964 (0.002)	2,698	0.966 (0.002)
65세이상	-	--	-	--	1,451	0.854 (0.006)	300	0.850 (0.014)	581	0.868 (0.009)	685	0.878 (0.008)	615	0.896 (0.009)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	11,392	0.949 (0.001)	1,240	0.951 (0.003)	2,835	0.955 (0.002)	3,231	0.964 (0.002)	2,698	0.967 (0.002)
연령(세)														
19-29	-	--	-	--	1,971	0.982 (0.001)	141	0.979 (0.005)	365	0.980 (0.003)	485	0.981 (0.002)	306	0.989 (0.002)
30-39	-	--	-	--	2,605	0.974 (0.001)	247	0.978 (0.003)	595	0.973 (0.005)	595	0.984 (0.002)	525	0.982 (0.003)
40-49	-	--	-	--	2,736	0.960 (0.002)	248	0.960 (0.005)	579	0.972 (0.003)	642	0.979 (0.004)	531	0.978 (0.003)
50-59	-	--	-	--	1,880	0.938 (0.003)	205	0.941 (0.009)	490	0.945 (0.005)	542	0.963 (0.004)	478	0.960 (0.004)
60-69	-	--	-	--	1,420	0.904 (0.004)	216	0.909 (0.012)	440	0.913 (0.007)	541	0.926 (0.006)	473	0.941 (0.007)
70+	-	--	-	--	780	0.822 (0.009)	183	0.830 (0.018)	366	0.844 (0.012)	426	0.851 (0.011)	385	0.867 (0.013)
거주지역														
동	-	--	-	--	9,133	0.956 (0.001)	867	0.958 (0.003)	2,079	0.959 (0.003)	2,388	0.969 (0.002)	2,102	0.971 (0.002)
읍면	-	--	-	--	2,259	0.937 (0.003)	373	0.934 (0.009)	756	0.939 (0.006)	843	0.942 (0.006)	596	0.951 (0.005)

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : EQ-5D 지수 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
소득수준														
하	-	--	-	--	2,854	0.927 (0.003)	300	0.937 (0.007)	681	0.939 (0.005)	817	0.948 (0.005)	666	0.955 (0.006)
중하	-	--	-	--	2,786	0.954 (0.002)	285	0.944 (0.007)	673	0.954 (0.004)	800	0.961 (0.004)	668	0.964 (0.004)
중상	-	--	-	--	2,815	0.962 (0.002)	308	0.964 (0.005)	706	0.967 (0.003)	774	0.971 (0.003)	675	0.971 (0.003)
상	-	--	-	--	2,790	0.969 (0.002)	298	0.967 (0.004)	691	0.963 (0.005)	802	0.977 (0.002)	661	0.976 (0.003)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	9,133	0.950 (0.001)	867	0.954 (0.003)	2,079	0.956 (0.002)	2,388	0.967 (0.002)	2,102	0.969 (0.002)
읍면	-	--	-	--	2,259	0.947 (0.002)	373	0.940 (0.007)	756	0.952 (0.005)	843	0.958 (0.004)	596	0.962 (0.003)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	2,854	0.922 (0.003)	300	0.934 (0.006)	681	0.939 (0.004)	817	0.948 (0.004)	666	0.956 (0.005)
중하	-	--	-	--	2,786	0.951 (0.002)	285	0.941 (0.006)	673	0.953 (0.004)	800	0.961 (0.003)	668	0.964 (0.004)
중상	-	--	-	--	2,815	0.959 (0.002)	308	0.961 (0.005)	706	0.965 (0.003)	774	0.970 (0.003)	675	0.973 (0.003)
상	-	--	-	--	2,790	0.967 (0.002)	298	0.967 (0.003)	691	0.963 (0.005)	802	0.977 (0.002)	661	0.977 (0.002)
여자														
19세이상	-	--	-	--	13,308	0.926 (0.001)	1,741	0.909 (0.004)	3,965	0.918 (0.003)	4,239	0.931 (0.003)	3,551	0.931 (0.003)
65세이상	-	--	-	--	2,170	0.800 (0.005)	420	0.754 (0.012)	934	0.783 (0.008)	961	0.801 (0.009)	763	0.802 (0.010)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	13,308	0.930 (0.001)	1,741	0.917 (0.003)	3,965	0.926 (0.002)	4,239	0.940 (0.002)	3,551	0.940 (0.002)
연령(세)														
19-29	-	--	-	--	2,438	0.974 (0.001)	198	0.964 (0.004)	525	0.966 (0.004)	564	0.973 (0.002)	461	0.975 (0.003)
30-39	-	--	-	--	2,815	0.968 (0.001)	388	0.956 (0.004)	816	0.960 (0.003)	830	0.972 (0.002)	728	0.967 (0.005)
40-49	-	--	-	--	2,974	0.947 (0.002)	317	0.935 (0.007)	749	0.954 (0.003)	853	0.965 (0.003)	631	0.966 (0.004)
50-59	-	--	-	--	2,005	0.906 (0.003)	300	0.909 (0.007)	644	0.905 (0.006)	705	0.926 (0.005)	692	0.931 (0.005)
60-69	-	--	-	--	1,722	0.840 (0.005)	273	0.812 (0.014)	639	0.843 (0.008)	664	0.867 (0.008)	552	0.875 (0.008)
70+	-	--	-	--	1,354	0.788 (0.006)	265	0.745 (0.015)	592	0.767 (0.010)	623	0.785 (0.010)	487	0.776 (0.014)
거주지역														
동	-	--	-	--	10,694	0.933 (0.001)	1,251	0.912 (0.004)	2,920	0.926 (0.003)	3,166	0.940 (0.003)	2,779	0.940 (0.003)
읍면	-	--	-	--	2,614	0.896 (0.005)	490	0.900 (0.012)	1,045	0.881 (0.009)	1,073	0.894 (0.009)	772	0.898 (0.007)
소득수준														
하	-	--	-	--	3,299	0.907 (0.003)	413	0.897 (0.008)	950	0.899 (0.007)	1,043	0.923 (0.005)	872	0.917 (0.007)
중하	-	--	-	--	3,403	0.925 (0.002)	411	0.912 (0.008)	960	0.924 (0.004)	1,061	0.924 (0.005)	871	0.930 (0.005)
중상	-	--	-	--	3,250	0.933 (0.002)	425	0.921 (0.006)	958	0.926 (0.004)	1,045	0.932 (0.004)	885	0.937 (0.005)
상	-	--	-	--	3,207	0.940 (0.002)	402	0.918 (0.007)	969	0.935 (0.004)	1,048	0.948 (0.003)	871	0.944 (0.005)
거주지역(표준화)														
동	-	--	-	--	10,694	0.930 (0.001)	1,251	0.916 (0.004)	2,920	0.928 (0.003)	3,166	0.943 (0.002)	2,779	0.943 (0.002)
읍면	-	--	-	--	2,614	0.931 (0.002)	490	0.919 (0.006)	1,045	0.922 (0.004)	1,073	0.935 (0.004)	772	0.935 (0.003)
소득수준(표준화)														
하	-	--	-	--	3,299	0.910 (0.002)	413	0.902 (0.006)	950	0.905 (0.006)	1,043	0.930 (0.004)	872	0.925 (0.006)
중하	-	--	-	--	3,403	0.930 (0.002)	411	0.915 (0.007)	960	0.930 (0.003)	1,061	0.934 (0.003)	871	0.939 (0.004)
중상	-	--	-	--	3,250	0.938 (0.002)	425	0.925 (0.004)	958	0.933 (0.003)	1,045	0.940 (0.003)	885	0.945 (0.003)
상	-	--	-	--	3,207	0.944 (0.002)	402	0.929 (0.005)	969	0.942 (0.004)	1,048	0.956 (0.002)	871	0.953 (0.004)

표 4-4. EQ-VAS[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : 점)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	24,425	72.6 (0.2)	2,973	71.9 (0.4)	6,781	74.4 (0.4)	7,447	75.0 (0.3)	6,217	73.7 (0.3)
65세이상	-	- -	-	- -	3,586	62.0 (0.4)	715	64.5 (1.0)	1,503	66.6 (0.8)	1,630	67.4 (0.7)	1,350	66.1 (0.8)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	24,425	72.6 (0.2)	2,973	72.0 (0.4)	6,781	74.6 (0.3)	7,447	75.2 (0.3)	6,217	74.0 (0.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	4,323	78.0 (0.3)	339	73.9 (0.8)	889	76.9 (0.6)	1,049	76.6 (0.5)	767	76.3 (0.6)
30-39	-	- -	-	- -	5,373	75.5 (0.2)	634	73.7 (0.7)	1,409	76.0 (0.6)	1,424	76.0 (0.5)	1,249	75.9 (0.5)
40-49	-	- -	-	- -	5,650	73.3 (0.3)	564	72.5 (0.6)	1,327	76.4 (0.5)	1,491	77.2 (0.4)	1,162	75.9 (0.6)
50-59	-	- -	-	- -	3,849	70.1 (0.4)	505	73.0 (1.0)	1,132	74.5 (0.7)	1,245	75.2 (0.6)	1,170	72.9 (0.7)
60-69	-	- -	-	- -	3,122	65.1 (0.4)	489	66.9 (1.0)	1,078	69.8 (0.8)	1,201	72.1 (0.7)	1,024	68.8 (0.9)
70+	-	- -	-	- -	2,108	60.3 (0.5)	442	64.3 (1.2)	946	64.8 (1.0)	1,037	66.2 (0.8)	845	64.4 (1.1)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	19,571	73.1 (0.2)	2,117	71.9 (0.5)	4,987	74.6 (0.4)	5,542	75.4 (0.3)	4,859	73.8 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	4,854	70.3 (0.4)	856	72.0 (1.0)	1,794	73.7 (0.8)	1,905	73.2 (0.6)	1,358	73.6 (0.8)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	6,097	69.7 (0.3)	710	67.4 (0.8)	1,628	71.4 (0.6)	1,851	72.9 (0.5)	1,521	72.0 (0.6)
중하	-	- -	-	- -	6,129	72.4 (0.3)	694	71.6 (0.7)	1,627	75.3 (0.6)	1,856	74.5 (0.5)	1,537	73.2 (0.6)
중상	-	- -	-	- -	5,992	73.6 (0.3)	730	74.9 (0.6)	1,662	75.4 (0.5)	1,815	75.6 (0.5)	1,554	74.2 (0.5)
상	-	- -	-	- -	5,928	75.0 (0.3)	700	74.1 (0.8)	1,654	76.3 (0.5)	1,846	77.2 (0.4)	1,526	76.0 (0.5)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	19,571	72.7 (0.2)	2,117	71.8 (0.5)	4,987	74.5 (0.4)	5,542	75.4 (0.3)	4,859	73.7 (0.3)
읍면	-	- -	-	- -	4,854	72.5 (0.4)	856	72.9 (0.9)	1,794	75.5 (0.7)	1,905	75.0 (0.5)	1,358	75.7 (0.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	6,097	69.6 (0.3)	710	67.4 (0.8)	1,628	71.5 (0.6)	1,851	73.1 (0.5)	1,521	72.2 (0.5)
중하	-	- -	-	- -	6,129	72.4 (0.3)	694	71.5 (0.7)	1,627	75.5 (0.5)	1,856	74.7 (0.4)	1,537	73.5 (0.6)
중상	-	- -	-	- -	5,992	73.7 (0.3)	730	74.8 (0.6)	1,662	75.6 (0.4)	1,815	75.8 (0.5)	1,554	74.6 (0.5)
상	-	- -	-	- -	5,928	75.0 (0.3)	700	74.2 (0.7)	1,654	76.4 (0.5)	1,846	77.3 (0.4)	1,526	76.3 (0.5)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	11,222	74.7 (0.2)	1,236	73.7 (0.6)	2,834	76.0 (0.4)	3,224	76.5 (0.3)	2,687	75.5 (0.4)
65세이상	-	- -	-	- -	1,443	65.8 (0.6)	298	68.4 (1.1)	581	70.7 (1.1)	682	70.1 (1.0)	607	70.3 (1.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,222	74.4 (0.2)	1,236	73.7 (0.6)	2,834	76.0 (0.4)	3,224	76.4 (0.3)	2,687	75.6 (0.3)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	1,926	79.2 (0.4)	141	75.8 (1.3)	365	78.2 (0.8)	485	78.1 (0.7)	306	77.9 (0.8)
30-39	-	- -	-	- -	2,567	76.4 (0.3)	246	74.5 (1.0)	595	76.8 (0.7)	595	75.9 (0.6)	523	76.2 (0.7)
40-49	-	- -	-	- -	2,687	74.5 (0.3)	247	74.5 (0.9)	578	77.3 (0.7)	638	78.5 (0.6)	531	76.8 (0.8)
50-59	-	- -	-	- -	1,856	72.5 (0.4)	205	73.1 (1.5)	490	75.5 (0.9)	542	76.5 (0.8)	478	74.9 (0.9)
60-69	-	- -	-	- -	1,409	69.4 (0.5)	217	70.1 (1.3)	440	72.5 (1.0)	539	75.2 (0.9)	472	72.4 (1.1)
70+	-	- -	-	- -	777	63.3 (0.8)	180	68.3 (1.4)	366	68.5 (1.4)	425	68.2 (1.2)	377	68.3 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	8,974	75.1 (0.2)	868	73.5 (0.7)	2,078	76.1 (0.4)	2,383	76.9 (0.4)	2,095	75.5 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	2,248	72.7 (0.5)	368	74.7 (1.1)	756	75.8 (0.9)	841	74.7 (0.7)	592	75.6 (0.9)

1) EQ-VAS : 시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : EQ-VAS 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,815	71.7 (0.4)	298	69.7 (1.0)	681	73.2 (0.7)	814	74.0 (0.7)	658	74.0 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	2,753	74.3 (0.4)	284	73.6 (1.1)	673	76.4 (0.8)	799	75.8 (0.6)	668	75.7 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	2,778	75.8 (0.4)	307	75.9 (1.0)	706	77.7 (0.6)	772	77.5 (0.6)	674	75.5 (0.7)
상	-	- -	-	- -	2,740	77.0 (0.3)	298	75.6 (0.9)	690	77.0 (0.7)	801	78.9 (0.6)	660	77.2 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	8,974	74.6 (0.2)	868	73.4 (0.7)	2,078	75.9 (0.4)	2,383	76.7 (0.3)	2,095	75.4 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	2,248	73.9 (0.5)	368	75.3 (1.1)	756	76.7 (0.9)	841	76.1 (0.7)	592	76.6 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,815	71.4 (0.3)	298	69.5 (1.1)	681	73.2 (0.7)	814	74.0 (0.7)	658	73.9 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	2,753	74.0 (0.4)	284	73.3 (1.1)	673	76.4 (0.7)	799	75.8 (0.5)	668	75.7 (0.7)
중상	-	- -	-	- -	2,778	75.5 (0.3)	307	76.0 (1.0)	706	77.6 (0.6)	772	77.4 (0.6)	674	75.8 (0.6)
상	-	- -	-	- -	2,740	76.8 (0.3)	298	75.5 (0.9)	690	76.9 (0.7)	801	78.8 (0.6)	660	77.3 (0.7)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	13,203	70.6 (0.2)	1,737	70.1 (0.5)	3,947	72.9 (0.4)	4,223	73.6 (0.4)	3,530	71.9 (0.4)
65세이상	-	- -	-	- -	2,143	59.5 (0.5)	417	61.9 (1.3)	922	63.8 (1.0)	948	65.5 (1.0)	743	63.1 (1.1)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,203	71.0 (0.2)	1,737	70.4 (0.5)	3,947	73.4 (0.4)	4,223	74.0 (0.3)	3,530	72.6 (0.4)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,397	76.6 (0.3)	198	71.8 (1.2)	524	75.6 (0.7)	564	74.8 (0.7)	461	74.7 (0.9)
30-39	-	- -	-	- -	2,806	74.6 (0.3)	388	72.8 (1.0)	814	75.2 (0.7)	829	76.1 (0.6)	726	75.6 (0.7)
40-49	-	- -	-	- -	2,963	72.0 (0.3)	317	70.6 (0.7)	749	75.4 (0.7)	853	75.9 (0.6)	631	74.9 (0.8)
50-59	-	- -	-	- -	1,993	67.7 (0.4)	300	73.0 (1.3)	642	73.5 (0.9)	703	74.0 (0.8)	692	70.9 (1.0)
60-69	-	- -	-	- -	1,713	61.5 (0.6)	272	64.1 (1.5)	638	67.3 (1.2)	662	69.3 (1.1)	552	65.5 (1.2)
70+	-	- -	-	- -	1,331	58.5 (0.6)	262	62.0 (1.6)	580	62.6 (1.2)	612	64.9 (1.2)	468	62.0 (1.4)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	10,597	71.2 (0.2)	1,249	70.4 (0.6)	2,909	73.2 (0.5)	3,159	74.0 (0.4)	2,764	72.1 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	2,606	68.0 (0.5)	488	69.2 (1.3)	1,038	71.6 (1.0)	1,064	71.7 (0.8)	766	71.6 (1.1)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	3,282	67.7 (0.4)	412	65.1 (1.2)	947	69.6 (0.8)	1,037	71.8 (0.7)	863	70.1 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	3,376	70.5 (0.4)	410	69.8 (1.0)	954	74.3 (0.7)	1,057	73.3 (0.7)	869	70.7 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	3,214	71.4 (0.4)	423	73.8 (0.9)	956	73.1 (0.7)	1,043	73.8 (0.6)	880	72.9 (0.7)
상	-	- -	-	- -	3,188	73.1 (0.3)	402	72.5 (0.9)	964	75.7 (0.7)	1,045	75.5 (0.5)	866	74.8 (0.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	10,597	71.0 (0.2)	1,249	70.5 (0.6)	2,909	73.2 (0.5)	3,159	74.1 (0.4)	2,764	72.2 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	2,606	71.2 (0.5)	488	70.4 (1.1)	1,038	74.2 (0.9)	1,064	73.8 (0.6)	766	74.8 (1.1)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	3,282	67.9 (0.3)	412	65.3 (1.2)	947	69.9 (0.8)	1,037	72.1 (0.7)	863	70.6 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	3,376	71.0 (0.3)	410	70.0 (1.0)	954	74.5 (0.7)	1,057	73.7 (0.7)	869	71.4 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	3,214	71.9 (0.3)	423	73.7 (0.9)	956	73.5 (0.6)	1,043	74.2 (0.6)	880	73.6 (0.6)
상	-	- -	-	- -	3,188	73.4 (0.3)	402	72.9 (0.9)	964	76.0 (0.7)	1,045	76.0 (0.5)	866	75.3 (0.7)

표 4-5. 활동제한율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	25,215	8.3 (0.3)	2,981	14.4 (1.0)	6,802	15.8 (0.7)	7,471	13.5 (0.7)	6,251	10.1 (0.5)
65세이상	-	- -	-	- -	3,706	37.7 (1.2)	721	42.1 (2.6)	1,515	44.6 (1.6)	1,648	43.5 (1.8)	1,378	28.1 (1.6)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	25,215	8.3 (0.3)	2,981	13.8 (0.9)	6,802	14.9 (0.5)	7,471	12.5 (0.5)	6,251	9.4 (0.4)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	4,561	1.4 (0.2)	339	4.9 (1.2)	891	6.0 (0.9)	1,049	3.8 (0.7)	767	4.2 (0.8)
30-39	-	- -	-	- -	5,523	2.2 (0.2)	635	5.1 (1.0)	1,411	7.1 (0.8)	1,424	5.8 (0.7)	1,253	4.8 (0.8)
40-49	-	- -	-	- -	5,813	4.4 (0.3)	565	9.5 (1.3)	1,328	8.3 (0.8)	1,495	7.0 (0.7)	1,162	6.3 (0.9)
50-59	-	- -	-	- -	3,935	8.6 (0.6)	505	20.5 (2.4)	1,134	21.8 (1.6)	1,247	15.0 (1.2)	1,170	11.9 (1.2)
60-69	-	- -	-	- -	3,189	20.7 (1.0)	489	30.1 (2.8)	1,080	33.6 (1.7)	1,205	31.4 (1.7)	1,027	19.1 (1.5)
70+	-	- -	-	- -	2,194	44.6 (1.4)	448	46.9 (3.0)	958	49.0 (1.8)	1,051	46.7 (2.3)	872	31.1 (2.0)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	20,248	6.6 (0.3)	2,118	13.9 (1.1)	5,001	14.4 (0.7)	5,555	11.5 (0.7)	4,883	8.7 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	4,967	16.0 (1.1)	863	16.2 (2.3)	1,801	22.3 (2.1)	1,916	21.8 (2.3)	1,368	15.1 (1.5)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	6,288	12.2 (0.6)	713	18.8 (1.5)	1,632	21.0 (1.2)	1,860	16.9 (1.1)	1,538	13.7 (1.1)
중하	-	- -	-	- -	6,294	8.2 (0.5)	696	14.7 (1.9)	1,634	15.2 (1.2)	1,862	13.3 (1.0)	1,540	10.6 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	6,191	7.0 (0.4)	733	12.0 (1.3)	1,664	12.6 (0.9)	1,818	12.6 (0.9)	1,561	8.6 (0.8)
상	-	- -	-	- -	6,138	5.8 (0.4)	701	11.1 (1.4)	1,660	13.3 (1.0)	1,851	10.8 (0.9)	1,532	7.2 (0.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	20,248	7.6 (0.3)	2,118	13.9 (1.1)	5,001	14.7 (0.6)	5,555	11.7 (0.6)	4,883	8.7 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	4,967	10.6 (0.7)	863	13.0 (1.2)	1,801	15.8 (1.4)	1,916	14.5 (1.2)	1,368	10.3 (0.9)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	6,288	12.6 (0.6)	713	18.7 (1.6)	1,632	20.4 (1.0)	1,860	16.1 (0.9)	1,538	12.9 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	6,294	8.1 (0.4)	696	14.5 (1.5)	1,634	14.2 (0.9)	1,862	12.2 (0.7)	1,540	9.9 (0.9)
중상	-	- -	-	- -	6,191	6.8 (0.4)	733	11.9 (1.2)	1,664	12.3 (0.8)	1,818	11.8 (0.7)	1,561	7.7 (0.7)
상	-	- -	-	- -	6,138	5.7 (0.3)	701	10.4 (1.2)	1,660	12.5 (0.9)	1,851	9.7 (0.8)	1,532	6.7 (0.7)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	11,726	7.0 (0.3)	1,242	11.5 (1.2)	2,836	12.2 (0.7)	3,232	10.3 (0.7)	2,698	8.1 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	1,481	30.6 (1.5)	302	36.8 (4.0)	581	37.3 (2.6)	687	37.5 (2.3)	615	20.9 (2.0)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,726	7.8 (0.3)	1,242	11.8 (1.1)	2,836	12.3 (0.7)	3,232	10.4 (0.6)	2,698	8.0 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,052	1.7 (0.3)	141	4.7 (1.9)	366	6.4 (1.3)	485	4.3 (1.1)	306	3.8 (1.1)
30-39	-	- -	-	- -	2,685	2.5 (0.3)	247	3.4 (1.2)	595	5.4 (1.0)	594	5.4 (1.0)	525	4.6 (1.1)
40-49	-	- -	-	- -	2,823	4.9 (0.5)	248	9.1 (1.7)	579	6.4 (1.2)	642	4.8 (0.9)	531	5.9 (1.4)
50-59	-	- -	-	- -	1,918	8.3 (0.7)	205	19.7 (3.7)	490	16.2 (1.8)	542	11.3 (1.5)	478	9.7 (1.6)
60-69	-	- -	-	- -	1,449	16.9 (1.2)	217	18.2 (2.9)	440	27.7 (2.4)	541	22.9 (2.2)	473	15.5 (1.8)
70+	-	- -	-	- -	799	38.4 (2.0)	184	44.5 (5.2)	366	42.5 (3.3)	428	42.8 (2.8)	385	24.2 (2.7)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	9,412	5.6 (0.3)	869	10.9 (1.4)	2,080	11.1 (0.8)	2,389	8.7 (0.7)	2,102	7.2 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	2,314	13.3 (1.1)	373	13.8 (2.6)	756	17.3 (2.1)	843	17.2 (2.3)	596	11.6 (1.9)

1) 활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 활동제한율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	2,950	12.2 (0.7)	300	14.9 (2.3)	681	18.4 (1.7)	817	14.9 (1.4)	666	12.7 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	2,864	6.2 (0.5)	286	13.3 (2.4)	673	11.6 (1.4)	801	9.9 (1.1)	668	7.9 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	2,894	5.4 (0.5)	308	11.0 (2.0)	707	8.4 (1.1)	773	7.8 (0.9)	675	6.2 (0.9)
상	-	- -	-	- -	2,867	3.8 (0.4)	299	7.8 (1.8)	691	10.5 (1.3)	803	8.6 (1.2)	661	5.3 (1.0)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	9,412	6.8 (0.4)	869	11.5 (1.4)	2,080	12.0 (0.7)	2,389	9.4 (0.7)	2,102	7.3 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	2,314	10.6 (0.8)	373	11.4 (1.5)	756	13.7 (1.8)	843	12.7 (1.7)	596	9.2 (1.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	2,950	13.3 (0.7)	300	15.6 (2.1)	681	18.5 (1.6)	817	14.9 (1.2)	666	12.4 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	2,864	6.9 (0.5)	286	13.9 (2.0)	673	11.5 (1.1)	801	10.2 (1.0)	668	7.8 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	2,894	6.2 (0.5)	308	11.5 (1.8)	707	9.0 (1.2)	773	8.0 (0.9)	675	5.9 (0.9)
상	-	- -	-	- -	2,867	4.3 (0.4)	299	7.9 (1.8)	691	10.7 (1.2)	803	8.5 (1.1)	661	5.2 (1.0)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	13,489	9.7 (0.4)	1,739	17.1 (1.2)	3,966	19.3 (0.9)	4,239	16.6 (0.8)	3,553	12.1 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	2,225	42.5 (1.4)	419	45.8 (3.4)	934	49.7 (2.0)	961	47.6 (2.3)	763	33.2 (2.3)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,489	8.7 (0.3)	1,739	15.6 (1.1)	3,966	17.3 (0.7)	4,239	14.4 (0.6)	3,553	10.5 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	2,509	1.0 (0.2)	198	5.1 (1.7)	525	5.6 (1.2)	564	3.3 (0.8)	461	4.5 (1.0)
30-39	-	- -	-	- -	2,838	1.8 (0.3)	388	6.9 (1.5)	816	8.8 (1.3)	830	6.3 (0.9)	728	5.0 (1.0)
40-49	-	- -	-	- -	2,990	3.7 (0.4)	317	9.9 (1.9)	749	10.2 (1.1)	853	9.2 (1.0)	631	6.9 (1.2)
50-59	-	- -	-	- -	2,017	8.9 (0.8)	300	21.3 (2.7)	644	27.4 (2.1)	705	18.7 (1.8)	692	14.0 (1.6)
60-69	-	- -	-	- -	1,740	24.0 (1.3)	272	40.6 (3.7)	640	38.8 (2.2)	664	39.0 (2.3)	554	22.4 (2.2)
70+	-	- -	-	- -	1,395	48.2 (1.7)	264	48.4 (3.9)	592	52.9 (2.3)	623	49.1 (2.7)	487	35.4 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	10,836	7.7 (0.4)	1,249	16.8 (1.4)	2,921	17.6 (0.9)	3,166	14.3 (0.9)	2,781	10.3 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	18.7 (1.4)	490	18.6 (2.6)	1,045	27.2 (2.6)	1,073	26.3 (2.7)	772	18.5 (1.8)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	3,338	12.1 (0.7)	413	22.7 (2.2)	951	23.6 (1.7)	1,043	18.9 (1.6)	872	14.6 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	3,430	10.0 (0.6)	410	15.9 (2.5)	961	18.6 (1.5)	1,061	16.5 (1.3)	872	13.3 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	3,297	8.5 (0.6)	425	13.0 (1.7)	957	16.9 (1.5)	1,045	17.2 (1.4)	886	11.0 (1.3)
상	-	- -	-	- -	3,271	7.8 (0.5)	402	14.6 (2.2)	969	16.0 (1.3)	1,048	13.1 (1.2)	871	9.2 (1.2)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	10,836	8.0 (0.3)	1,249	15.9 (1.3)	2,921	17.0 (0.8)	3,166	13.7 (0.7)	2,781	9.9 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	10.3 (0.8)	490	15.0 (1.5)	1,045	17.4 (1.5)	1,073	16.4 (1.4)	772	11.1 (1.0)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	3,338	11.6 (0.6)	413	21.9 (2.2)	951	22.3 (1.4)	1,043	17.3 (1.3)	872	13.3 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	3,430	8.9 (0.5)	410	15.1 (2.1)	961	16.7 (1.2)	1,061	14.0 (0.9)	872	11.6 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	3,297	7.2 (0.4)	425	12.1 (1.4)	957	15.1 (1.2)	1,045	15.2 (1.1)	886	9.3 (1.0)
상	-	- -	-	- -	3,271	6.8 (0.4)	402	12.8 (1.8)	969	14.3 (1.3)	1,048	10.9 (1.0)	871	7.9 (1.1)

표 4-6. 2주간 이환율[1] 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2010

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
전체														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	2,976	16.5 (1.2)	6,803	24.2 (0.8)	7,472	22.2 (0.8)	6,254	22.2 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	721	30.6 (2.7)	1,516	46.6 (1.7)	1,648	47.3 (1.9)	1,380	44.2 (1.8)
19세이상(표준화)[2]	-	- -	-	- -	-	- -	2,976	16.4 (1.2)	6,803	23.6 (0.8)	7,472	21.3 (0.7)	6,254	21.1 (0.6)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	338	16.1 (2.6)	891	19.9 (1.5)	1,049	15.1 (1.3)	767	14.0 (1.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	634	12.3 (2.1)	1,411	16.7 (1.3)	1,425	15.3 (1.2)	1,253	15.8 (1.2)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	563	11.9 (2.0)	1,328	17.9 (1.2)	1,495	15.6 (1.0)	1,162	15.3 (1.2)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	504	15.4 (1.8)	1,134	26.4 (1.6)	1,247	24.4 (1.5)	1,171	27.5 (1.7)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	489	26.4 (3.0)	1,080	38.0 (1.9)	1,205	36.4 (2.0)	1,028	36.8 (1.7)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	448	31.9 (3.3)	959	49.7 (1.9)	1,051	51.2 (2.2)	873	44.8 (2.2)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,117	16.8 (1.3)	5,002	23.1 (1.0)	5,556	20.2 (0.8)	4,885	20.3 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	859	15.6 (2.8)	1,801	29.4 (2.0)	1,916	30.7 (2.4)	1,369	29.2 (2.1)
소득수준[3]														
하	-	- -	-	- -	-	- -	712	19.7 (1.8)	1,632	26.6 (1.4)	1,860	23.5 (1.2)	1,540	25.1 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	696	20.4 (2.3)	1,634	23.9 (1.3)	1,862	23.8 (1.3)	1,540	22.4 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	730	12.4 (1.5)	1,665	21.7 (1.3)	1,819	21.0 (1.2)	1,562	20.9 (1.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	699	12.8 (1.5)	1,660	23.6 (1.3)	1,851	20.6 (1.3)	1,532	20.6 (1.3)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	2,117	16.9 (1.3)	5,002	23.4 (0.9)	5,556	20.3 (0.8)	4,885	20.2 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	859	14.5 (2.9)	1,801	24.3 (1.6)	1,916	24.0 (1.6)	1,369	23.5 (1.6)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	712	19.8 (1.8)	1,632	26.3 (1.3)	1,860	22.9 (1.0)	1,540	24.1 (1.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	696	20.4 (2.2)	1,634	23.3 (1.2)	1,862	22.7 (1.2)	1,540	21.3 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	730	12.4 (1.6)	1,665	21.6 (1.2)	1,819	20.3 (1.1)	1,562	19.7 (1.2)
상	-	- -	-	- -	-	- -	699	12.7 (1.5)	1,660	22.9 (1.3)	1,851	19.7 (1.3)	1,532	19.8 (1.3)
남자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,238	12.2 (1.3)	2,836	17.4 (0.9)	3,233	15.6 (0.9)	2,699	16.4 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	301	23.7 (3.1)	581	32.2 (2.5)	687	35.9 (2.4)	615	32.0 (2.4)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,238	12.4 (1.3)	2,836	17.6 (0.9)	3,233	15.7 (0.9)	2,699	16.3 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	141	13.2 (2.7)	366	17.9 (2.0)	485	11.6 (1.7)	306	14.0 (2.0)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	246	8.2 (1.9)	595	12.7 (1.7)	595	12.9 (1.7)	525	13.3 (1.6)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	247	9.0 (2.2)	579	12.2 (1.6)	642	9.9 (1.2)	531	10.7 (1.4)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	205	11.8 (2.4)	490	17.8 (1.8)	542	15.0 (1.5)	479	18.9 (2.1)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	216	20.8 (4.1)	440	27.7 (2.4)	541	26.1 (2.3)	473	26.1 (2.3)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	183	24.2 (4.5)	366	34.4 (3.1)	428	41.4 (3.1)	385	31.2 (2.8)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	868	12.2 (1.4)	2,080	16.9 (1.1)	2,390	14.2 (1.0)	2,102	15.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	370	12.5 (2.7)	756	19.6 (1.9)	843	21.1 (2.3)	597	20.3 (2.0)

1) 2주간 이환율 : 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 이환율 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2010)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	299	17.6 (2.6)	681	19.4 (1.7)	817	17.6 (1.5)	667	18.5 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	14.1 (2.6)	673	17.0 (1.6)	801	15.9 (1.5)	668	16.0 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	9.3 (1.8)	707	14.9 (1.6)	774	13.8 (1.6)	675	16.3 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	7.9 (1.8)	691	17.8 (1.7)	803	15.1 (1.6)	661	15.0 (1.7)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	868	12.5 (1.4)	2,080	17.5 (1.1)	2,390	14.9 (1.0)	2,102	15.5 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	370	11.8 (2.6)	756	17.0 (2.0)	843	17.1 (1.8)	597	16.7 (1.7)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	299	18.0 (2.6)	681	19.7 (1.7)	817	17.6 (1.4)	667	18.2 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	14.5 (2.5)	673	16.9 (1.6)	801	16.0 (1.5)	668	15.7 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	9.8 (1.8)	707	15.4 (1.6)	774	14.0 (1.6)	675	16.0 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	8.2 (1.9)	691	17.9 (1.8)	803	15.1 (1.6)	661	14.9 (1.7)
여자														
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	20.7 (1.8)	3,967	30.9 (1.1)	4,239	28.7 (0.9)	3,555	27.9 (1.0)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	420	35.2 (3.3)	935	56.4 (1.9)	961	55.1 (2.2)	765	52.7 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	20.1 (1.8)	3,967	29.3 (1.1)	4,239	26.8 (0.8)	3,555	25.6 (0.8)
연령(세)														
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	19.2 (4.0)	525	22.1 (2.1)	564	18.8 (1.7)	461	14.0 (1.7)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	388	16.5 (3.2)	816	20.9 (1.9)	830	17.7 (1.6)	728	18.4 (1.9)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	316	14.9 (3.3)	749	23.9 (1.8)	853	21.5 (1.6)	631	20.1 (1.9)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	299	19.0 (2.6)	644	35.1 (2.3)	705	33.8 (2.3)	692	36.0 (2.6)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	273	31.3 (4.3)	640	47.2 (2.6)	664	45.6 (2.4)	555	46.3 (2.2)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	265	36.4 (3.8)	593	59.0 (2.3)	623	57.1 (2.6)	488	53.4 (2.9)
거주지역														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,249	21.2 (2.0)	2,922	29.1 (1.3)	3,166	26.0 (1.0)	2,783	25.1 (1.1)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	18.7 (3.9)	1,045	38.9 (2.5)	1,073	40.2 (2.9)	772	37.7 (2.8)
소득수준														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	21.8 (2.3)	951	33.6 (2.0)	1,043	29.5 (1.5)	873	31.4 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	26.2 (3.5)	961	30.4 (1.7)	1,061	31.5 (1.7)	872	28.8 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	15.6 (2.1)	958	28.6 (1.8)	1,045	27.9 (1.6)	887	25.3 (1.8)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	17.8 (2.4)	969	29.3 (1.7)	1,048	26.1 (1.7)	871	26.5 (1.8)
거주지역(표준화)														
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,249	20.9 (2.0)	2,922	28.7 (1.2)	3,166	25.4 (0.9)	2,783	24.4 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	16.9 (4.4)	1,045	32.1 (2.0)	1,073	31.1 (2.3)	772	30.4 (2.5)
소득수준(표준화)														
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	21.3 (2.3)	951	32.5 (2.0)	1,043	28.2 (1.3)	873	29.3 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	25.9 (3.4)	961	29.0 (1.7)	1,061	29.2 (1.5)	872	26.3 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	14.9 (2.0)	958	27.4 (1.7)	1,045	26.0 (1.4)	887	23.0 (1.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	17.5 (2.4)	969	27.7 (1.7)	1,048	24.0 (1.6)	871	24.4 (1.8)

표 4-7. 주관적건강인지율[1] : 전체, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	6,254	36.0 (0.8)	4.9 (0.4)	31.1 (0.7)	45.2 (1.0)	16.2 (0.7)	2.6 (0.2)
연령(세)							
19-29	767	43.4 (2.2)	7.9 (1.3)	35.5 (2.1)	45.0 (2.4)	11.2 (1.3)	0.3 (0.2)
30-39	1,253	39.8 (1.5)	3.0 (0.5)	36.8 (1.5)	47.5 (1.6)	12.3 (1.2)	0.4 (0.2)
40-49	1,162	34.4 (1.6)	3.9 (0.6)	30.4 (1.6)	50.8 (1.8)	13.7 (1.6)	1.1 (0.3)
50-59	1,171	31.5 (1.7)	4.3 (0.6)	27.2 (1.7)	45.9 (1.8)	19.3 (1.4)	3.3 (0.6)
60-69	1,028	32.1 (2.0)	6.9 (0.9)	25.2 (1.9)	39.6 (2.2)	22.7 (1.9)	5.6 (0.9)
70+	873	27.9 (2.2)	3.7 (0.7)	24.3 (2.0)	31.7 (2.1)	28.5 (1.5)	11.9 (1.4)
19-64	4,874	37.0 (0.9)	4.9 (0.4)	32.1 (0.8)	47.0 (1.1)	14.6 (0.8)	1.4 (0.2)
65+	1,380	29.7 (1.9)	4.5 (0.8)	25.1 (1.8)	33.8 (1.7)	26.0 (1.4)	10.5 (1.1)
거주지역							
동	4,885	36.4 (1.0)	4.8 (0.4)	31.6 (0.9)	46.1 (1.2)	15.2 (0.9)	2.3 (0.3)
읍면	1,369	34.7 (1.4)	5.2 (0.7)	29.5 (1.2)	41.8 (2.2)	19.8 (1.8)	3.8 (0.5)
소득수준[2]							
하	1,540	32.4 (1.4)	3.7 (0.6)	28.7 (1.3)	45.5 (1.6)	18.2 (1.4)	3.8 (0.6)
중하	1,540	34.4 (1.3)	5.6 (0.7)	28.9 (1.2)	45.6 (1.5)	17.2 (1.2)	2.8 (0.5)
중상	1,562	36.8 (1.7)	4.4 (0.7)	32.4 (1.6)	45.1 (1.7)	16.0 (1.1)	2.1 (0.4)
상	1,532	41.3 (1.5)	5.9 (0.8)	35.4 (1.4)	43.5 (1.7)	13.3 (1.1)	1.8 (0.4)
거주지역(표준화)[3]							
동	4,885	36.5 (1.0)	4.8 (0.4)	31.6 (0.8)	46.1 (1.2)	15.1 (0.8)	2.3 (0.3)
읍면	1,369	37.4 (1.7)	5.4 (0.8)	32.0 (1.8)	44.3 (2.3)	16.1 (1.5)	2.1 (0.3)
소득수준(표준화)							
하	1,540	33.0 (1.4)	3.8 (0.6)	29.2 (1.4)	45.8 (1.7)	17.7 (1.4)	3.4 (0.5)
중하	1,540	35.1 (1.3)	5.5 (0.7)	29.6 (1.2)	46.0 (1.5)	16.4 (1.2)	2.5 (0.4)
중상	1,562	37.6 (1.7)	4.5 (0.7)	33.0 (1.7)	45.1 (1.8)	15.4 (1.1)	1.8 (0.3)
상	1,532	41.8 (1.5)	6.0 (0.8)	35.8 (1.4)	43.9 (1.7)	12.9 (1.1)	1.5 (0.3)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-8. 주관적건강인지율[1] : 남자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	2,699	40.0 (1.2)	5.7 (0.6)	34.3 (1.1)	45.8 (1.3)	12.9 (0.9)	1.3 (0.2)
연령(세)							
19-29	306	50.1 (3.2)	11.4 (2.1)	38.7 (3.1)	42.7 (3.1)	6.9 (1.5)	0.3 (0.3)
30-39	525	42.4 (2.3)	1.5 (0.5)	40.9 (2.3)	46.3 (2.5)	11.3 (1.5)	0.0 (-)[4]
40-49	531	33.7 (2.3)	2.9 (0.7)	30.8 (2.3)	54.7 (2.5)	11.2 (2.2)	0.4 (0.3)
50-59	479	36.6 (2.6)	6.0 (1.1)	30.6 (2.6)	45.5 (2.6)	15.6 (2.1)	2.3 (0.8)
60-69	473	39.6 (2.6)	9.3 (1.7)	30.2 (2.5)	39.8 (3.1)	18.7 (2.3)	2.0 (0.7)
70+	385	32.3 (3.1)	5.3 (1.5)	26.9 (2.7)	33.6 (3.2)	25.9 (2.6)	8.2 (2.0)
19-64	2,084	40.4 (1.3)	5.6 (0.6)	34.8 (1.2)	47.3 (1.4)	11.6 (1.0)	0.8 (0.2)
65+	615	37.1 (2.6)	6.5 (1.2)	30.6 (2.2)	34.1 (2.3)	23.1 (2.0)	5.8 (1.4)
거주지역							
동	2,102	39.9 (1.4)	5.6 (0.6)	34.3 (1.2)	46.6 (1.5)	12.3 (1.0)	1.2 (0.3)
읍면	597	40.2 (2.5)	6.0 (1.3)	34.2 (2.6)	42.7 (3.2)	15.3 (2.6)	1.7 (0.5)
소득수준[2]							
하	667	36.9 (2.2)	4.3 (1.0)	32.6 (2.2)	45.3 (2.0)	15.4 (1.9)	2.4 (0.7)
중하	668	37.5 (2.1)	6.5 (1.2)	31.0 (2.0)	46.4 (2.4)	14.9 (1.6)	1.2 (0.4)
중상	675	42.0 (2.5)	4.2 (1.1)	37.8 (2.5)	44.5 (2.6)	12.4 (1.6)	1.0 (0.4)
상	661	44.5 (2.2)	8.1 (1.5)	36.4 (2.0)	45.8 (2.3)	9.1 (1.2)	0.6 (0.2)
거주지역(표준화)[3]							
동	2,102	39.9 (1.4)	5.7 (0.6)	34.2 (1.2)	46.4 (1.5)	12.4 (1.0)	1.3 (0.3)
읍면	597	42.9 (2.9)	5.8 (1.6)	37.1 (3.3)	43.4 (3.5)	12.7 (2.1)	1.1 (0.3)
소득수준(표준화)							
하	667	37.6 (2.3)	4.7 (1.0)	32.9 (2.3)	45.3 (2.1)	14.9 (1.7)	2.2 (0.6)
중하	668	37.9 (2.1)	6.3 (1.2)	31.6 (2.0)	46.0 (2.4)	14.9 (1.7)	1.2 (0.4)
중상	675	42.6 (2.6)	4.3 (1.1)	38.4 (2.5)	44.5 (2.7)	11.8 (1.5)	1.0 (0.4)
상	661	44.3 (2.2)	8.0 (1.4)	36.3 (2.0)	46.3 (2.3)	8.9 (1.2)	0.6 (0.2)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 4-9. 주관적건강인지율[1] : 여자, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
19세이상	3,555	32.1 (1.1)	4.1 (0.4)	28.0 (1.0)	44.6 (1.3)	19.4 (0.8)	3.9 (0.4)
연령(세)							
19-29	461	36.3 (3.1)	4.3 (1.2)	32.1 (2.9)	47.5 (3.7)	15.8 (2.1)	0.3 (0.3)
30-39	728	37.1 (2.2)	4.6 (0.8)	32.5 (2.2)	48.7 (2.4)	13.4 (1.6)	0.8 (0.5)
40-49	631	35.1 (2.2)	5.0 (1.0)	30.1 (2.2)	46.8 (2.1)	16.2 (1.7)	1.9 (0.6)
50-59	692	26.5 (2.0)	2.7 (0.8)	23.8 (2.0)	46.2 (2.3)	22.9 (2.1)	4.3 (0.8)
60-69	555	25.4 (2.4)	4.6 (1.1)	20.7 (2.1)	39.5 (2.5)	26.2 (2.5)	8.9 (1.5)
70+	488	25.2 (2.7)	2.6 (0.8)	22.6 (2.6)	30.5 (2.6)	30.1 (2.2)	14.2 (1.9)
19-64	2,790	33.6 (1.2)	4.2 (0.4)	29.3 (1.2)	46.7 (1.4)	17.7 (1.0)	2.0 (0.3)
65+	765	24.5 (2.3)	3.1 (0.8)	21.3 (2.2)	33.7 (2.2)	28.1 (1.8)	13.8 (1.5)
거주지역							
동	2,783	32.9 (1.3)	4.0 (0.4)	28.9 (1.2)	45.7 (1.6)	18.0 (1.0)	3.4 (0.4)
읍면	772	29.3 (1.9)	4.3 (0.9)	25.0 (1.7)	40.8 (2.4)	24.1 (1.6)	5.7 (0.8)
소득수준[2]							
하	873	28.1 (1.9)	3.2 (0.6)	25.0 (1.7)	45.7 (2.3)	21.0 (1.7)	5.1 (0.9)
중하	872	31.4 (1.7)	4.7 (0.9)	26.7 (1.6)	44.8 (1.9)	19.4 (1.6)	4.4 (0.8)
중상	887	31.8 (2.1)	4.6 (0.9)	27.2 (2.0)	45.6 (2.1)	19.4 (1.5)	3.1 (0.7)
상	871	38.0 (2.1)	3.6 (0.7)	34.4 (2.1)	41.1 (2.4)	17.8 (1.6)	3.0 (0.6)
거주지역(표준화)[3]							
동	2,783	33.2 (1.3)	4.0 (0.4)	29.1 (1.2)	45.9 (1.6)	17.7 (1.0)	3.2 (0.4)
읍면	772	31.6 (2.4)	5.0 (1.2)	26.6 (2.3)	45.5 (2.6)	19.9 (1.7)	3.0 (0.4)
소득수준(표준화)							
하	873	28.8 (2.0)	3.1 (0.7)	25.7 (1.8)	46.5 (2.4)	20.1 (1.7)	4.6 (0.8)
중하	872	32.3 (1.7)	4.9 (0.9)	27.4 (1.7)	45.9 (1.8)	18.0 (1.5)	3.8 (0.6)
중상	887	32.7 (2.2)	4.9 (1.0)	27.8 (2.1)	45.9 (2.2)	18.9 (1.5)	2.5 (0.5)
상	871	39.0 (2.2)	3.6 (0.6)	35.4 (2.2)	41.8 (2.5)	17.1 (1.6)	2.1 (0.4)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-10. 소아청소년 주관적건강인지율[1] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체							
1-18세	2,116	67.8 (1.6)	19.1 (1.1)	48.7 (1.5)	25.3 (1.5)	6.7 (1.0)	0.2 (0.1)
연령(세)							
1-5	604	73.0 (2.3)	23.0 (2.2)	50.0 (2.8)	21.3 (2.1)	5.7 (1.2)	0.0 (-)[3]
6-11	780	73.1 (2.0)	21.8 (2.1)	51.3 (2.3)	20.6 (1.9)	6.3 (1.6)	0.0 (-)
12-14	371	63.5 (3.3)	15.1 (2.2)	48.4 (3.2)	30.5 (3.2)	5.1 (1.5)	0.9 (0.5)
15-18	361	60.3 (3.9)	15.5 (2.2)	44.7 (3.6)	30.5 (3.5)	9.3 (1.9)	0.0 (-)
1-11	1,384	73.1 (1.7)	22.3 (1.6)	50.8 (1.9)	20.9 (1.6)	6.1 (1.2)	0.0 (-)
12-18	732	61.6 (3.0)	15.3 (1.7)	46.2 (2.6)	30.5 (2.6)	7.6 (1.5)	0.4 (0.2)
거주지역							
동	1,783	66.4 (1.8)	19.3 (1.3)	47.1 (1.6)	26.0 (1.8)	7.5 (1.1)	0.1 (0.1)
읍면	333	74.0 (3.1)	18.3 (2.7)	55.7 (3.8)	22.0 (2.5)	3.7 (1.3)	0.3 (0.3)
소득수준[2]							
하	510	63.5 (2.8)	16.9 (1.8)	46.6 (3.0)	24.1 (2.6)	12.0 (2.3)	0.4 (0.3)
중하	516	68.9 (2.8)	22.3 (2.9)	46.6 (2.8)	25.9 (2.8)	5.1 (1.1)	0.1 (0.1)
중상	532	70.9 (2.6)	17.9 (2.3)	53.0 (2.5)	24.2 (2.4)	4.9 (1.2)	0.0 (-)
상	524	69.8 (3.0)	20.6 (2.5)	49.2 (3.3)	26.5 (2.9)	3.7 (1.2)	0.0 (-)
남자							
1-18세	1,102	66.6 (2.1)	20.4 (1.6)	46.2 (1.9)	25.8 (1.8)	7.6 (1.1)	0.1 (0.1)
연령(세)							
1-5	297	72.9 (3.2)	22.4 (3.0)	50.6 (3.8)	19.4 (2.8)	7.7 (2.0)	0.0 (-)
6-11	408	73.0 (2.6)	23.2 (3.0)	49.8 (3.2)	20.2 (2.5)	6.8 (1.6)	0.0 (-)
12-14	203	55.1 (4.5)	15.8 (3.3)	39.3 (3.7)	39.1 (4.3)	5.5 (2.1)	0.3 (0.3)
15-18	194	62.3 (5.0)	18.7 (3.5)	43.6 (4.3)	28.0 (4.1)	9.7 (2.5)	0.0 (-)
1-11	705	72.9 (2.2)	22.9 (2.1)	50.1 (2.4)	19.9 (2.0)	7.2 (1.3)	0.0 (-)
12-18	397	59.4 (3.7)	17.6 (2.4)	41.9 (3.0)	32.4 (3.2)	8.1 (2.0)	0.1 (0.1)
거주지역							
동	935	63.6 (2.3)	20.4 (1.9)	43.2 (1.9)	27.7 (2.1)	8.7 (1.2)	0.1 (0.1)
읍면	167	80.4 (3.6)	20.2 (3.7)	60.2 (4.2)	17.0 (3.1)	2.6 (1.5)	0.0 (-)
소득수준							
하	267	61.3 (4.1)	16.4 (2.3)	45.0 (4.3)	27.0 (3.5)	11.6 (2.5)	0.0 (-)
중하	269	66.2 (4.1)	24.8 (4.2)	41.4 (4.3)	26.3 (4.1)	7.3 (1.9)	0.2 (0.2)
중상	273	71.7 (3.1)	19.5 (3.0)	52.2 (3.4)	23.8 (2.9)	4.5 (1.6)	0.0 (-)
상	275	69.7 (3.5)	23.0 (3.5)	46.7 (4.2)	24.4 (3.2)	5.9 (2.1)	0.0 (-)
여자							
1-18세	1,014	69.3 (2.0)	17.7 (1.3)	51.5 (2.1)	24.7 (2.1)	5.8 (1.2)	0.3 (0.2)
연령(세)							
1-5	307	73.1 (3.3)	23.7 (2.7)	49.4 (3.9)	23.5 (3.1)	3.4 (1.1)	0.0 (-)
6-11	372	73.3 (3.3)	20.4 (2.9)	52.9 (3.3)	21.0 (3.1)	5.8 (2.4)	0.0 (-)
12-14	168	73.1 (4.5)	14.2 (3.2)	58.9 (4.9)	20.7 (4.0)	4.7 (2.3)	1.5 (1.1)
15-18	167	57.7 (5.2)	11.5 (2.2)	46.2 (5.1)	33.7 (5.2)	8.7 (2.5)	0.0 (-)
1-11	679	73.2 (2.6)	21.7 (2.0)	51.5 (2.7)	22.0 (2.5)	4.8 (1.5)	0.0 (-)
12-18	335	64.2 (3.5)	12.6 (1.8)	51.6 (3.6)	28.1 (3.5)	7.0 (1.7)	0.6 (0.5)
거주지역							
동	848	69.7 (2.1)	18.1 (1.5)	51.6 (2.2)	24.1 (2.4)	6.0 (1.4)	0.2 (0.2)
읍면	166	67.6 (5.7)	16.4 (2.8)	51.2 (6.1)	27.0 (4.7)	4.7 (2.2)	0.7 (0.7)
소득수준							
하	243	66.1 (3.8)	17.5 (3.1)	48.6 (3.8)	20.5 (3.6)	12.4 (3.1)	1.0 (0.7)
중하	247	71.9 (3.8)	19.7 (2.9)	52.2 (4.1)	25.5 (3.7)	2.6 (1.0)	0.0 (-)
중상	259	70.0 (3.9)	16.0 (2.5)	53.9 (3.5)	24.7 (3.8)	5.4 (2.0)	0.0 (-)
상	249	69.9 (4.1)	18.1 (2.8)	51.9 (4.1)	28.8 (4.1)	1.2 (0.7)	0.0 (-)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별 · 연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 4-11. EQ-5D 지수[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	전체		남자		여자	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
19세이상	6,249	0.948 (0.002)	2,698	0.966 (0.002)	3,551	0.931 (0.003)
연령(세)						
19-29	767	0.982 (0.002)	306	0.989 (0.002)	461	0.975 (0.003)
30-39	1,253	0.975 (0.003)	525	0.982 (0.003)	728	0.967 (0.005)
40-49	1,162	0.972 (0.003)	531	0.978 (0.003)	631	0.966 (0.004)
50-59	1,170	0.946 (0.003)	478	0.960 (0.004)	692	0.931 (0.005)
60-69	1,025	0.906 (0.005)	473	0.941 (0.007)	552	0.875 (0.008)
70+	872	0.811 (0.010)	385	0.867 (0.013)	487	0.776 (0.014)
19-64	4,871	0.966 (0.001)	2,083	0.975 (0.002)	2,788	0.956 (0.002)
65+	1,378	0.841 (0.007)	615	0.896 (0.009)	763	0.802 (0.010)
거주지역						
동	4,881	0.955 (0.002)	2,102	0.971 (0.002)	2,779	0.940 (0.003)
읍면	1,368	0.924 (0.005)	596	0.951 (0.005)	772	0.898 (0.007)
소득수준[2]						
하	1,538	0.935 (0.005)	666	0.955 (0.006)	872	0.917 (0.007)
중하	1,539	0.947 (0.004)	668	0.964 (0.004)	871	0.930 (0.005)
중상	1,560	0.954 (0.003)	675	0.971 (0.003)	885	0.937 (0.005)
상	1,532	0.960 (0.003)	661	0.976 (0.003)	871	0.944 (0.005)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,881	0.955 (0.002)	2,102	0.969 (0.002)	2,779	0.943 (0.002)
읍면	1,368	0.948 (0.002)	596	0.962 (0.003)	772	0.935 (0.003)
소득수준(표준화)						
하	1,538	0.940 (0.004)	666	0.956 (0.005)	872	0.925 (0.006)
중하	1,539	0.950 (0.003)	668	0.964 (0.004)	871	0.939 (0.004)
중상	1,560	0.958 (0.002)	675	0.973 (0.003)	885	0.945 (0.003)
상	1,532	0.964 (0.002)	661	0.977 (0.002)	871	0.953 (0.004)

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-12. EQ-VAS[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 점)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)
19세이상	6,217	73.7 (0.3)	2,687	75.5 (0.4)	3,530	71.9 (0.4)
연령(세)						
19-29	767	76.3 (0.6)	306	77.9 (0.8)	461	74.7 (0.9)
30-39	1,249	75.9 (0.5)	523	76.2 (0.7)	726	75.6 (0.7)
40-49	1,162	75.9 (0.6)	531	76.8 (0.8)	631	74.9 (0.8)
50-59	1,170	72.9 (0.7)	478	74.9 (0.9)	692	70.9 (1.0)
60-69	1,024	68.8 (0.9)	472	72.4 (1.1)	552	65.5 (1.2)
70+	845	64.4 (1.1)	377	68.3 (1.4)	468	62.0 (1.4)
19-64	4,867	74.9 (0.3)	2,080	76.2 (0.4)	2,787	73.6 (0.4)
65+	1,350	66.1 (0.8)	607	70.3 (1.1)	743	63.1 (1.1)
거주지역						
동	4,859	73.8 (0.4)	2,095	75.5 (0.4)	2,764	72.1 (0.5)
읍면	1,358	73.6 (0.8)	592	75.6 (0.9)	766	71.6 (1.1)
소득수준[2]						
하	1,521	72.0 (0.6)	658	74.0 (0.8)	863	70.1 (0.9)
중하	1,537	73.2 (0.6)	668	75.7 (0.7)	869	70.7 (0.8)
중상	1,554	74.2 (0.5)	674	75.5 (0.7)	880	72.9 (0.7)
상	1,526	76.0 (0.5)	660	77.2 (0.7)	866	74.8 (0.7)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,859	73.7 (0.3)	2,095	75.4 (0.4)	2,764	72.2 (0.5)
읍면	1,358	75.7 (0.7)	592	76.6 (0.9)	766	74.8 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,521	72.2 (0.5)	658	73.9 (0.8)	863	70.6 (0.8)
중하	1,537	73.5 (0.6)	668	75.7 (0.7)	869	71.4 (0.8)
중상	1,554	74.6 (0.5)	674	75.8 (0.6)	880	73.6 (0.6)
상	1,526	76.3 (0.5)	660	77.3 (0.7)	866	75.3 (0.7)

1) EQ-VAS : 시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-13. 만성질환별 EQ-5D 지수[1] : 전체, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	정상[2]		골관절염[3]		고혈압[4]		당뇨병[5]		고콜레스테롤혈증[6]		양측성 난청[7]	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
40세이상	1,517	0.966 (0.002)	679	0.811 (0.011)	1,678	0.896 (0.005)	525	0.897 (0.008)	688	0.905 (0.007)	323	0.846 (0.015)
연령(세)												
40-49	753	0.977 (0.003)	29	0.918 (0.032)	186	0.965 (0.008)	61	0.958 (0.015)	115	0.963 (0.010)	10	- -[10]
50-59	434	0.960 (0.004)	141	0.872 (0.012)	422	0.937 (0.006)	133	0.934 (0.010)	240	0.918 (0.009)	29	0.960 (0.016)
60-69	227	0.936 (0.007)	255	0.834 (0.012)	549	0.900 (0.007)	171	0.893 (0.011)	203	0.892 (0.011)	89	0.871 (0.024)
70+	103	0.910 (0.014)	254	0.730 (0.022)	521	0.797 (0.013)	160	0.804 (0.024)	130	0.811 (0.022)	195	0.796 (0.019)
40-64	1,319	0.970 (0.002)	282	0.868 (0.010)	865	0.938 (0.004)	262	0.936 (0.007)	466	0.929 (0.006)	77	0.930 (0.017)
65+	198	0.913 (0.010)	397	0.760 (0.017)	813	0.829 (0.010)	263	0.832 (0.017)	222	0.835 (0.016)	246	0.809 (0.017)
거주지역												
동	1,162	0.972 (0.002)	475	0.816 (0.011)	1,213	0.907 (0.006)	398	0.902 (0.010)	542	0.909 (0.008)	219	0.845 (0.018)
읍면	355	0.948 (0.006)	204	0.801 (0.024)	465	0.866 (0.011)	127	0.883 (0.017)	146	0.892 (0.012)	104	0.846 (0.027)
소득수준[8]												
하	338	0.959 (0.005)	177	0.752 (0.027)	433	0.861 (0.013)	130	0.890 (0.014)	169	0.876 (0.016)	86	0.838 (0.029)
중하	390	0.959 (0.004)	166	0.807 (0.015)	407	0.888 (0.009)	151	0.909 (0.014)	143	0.910 (0.013)	89	0.856 (0.022)
중상	395	0.974 (0.003)	168	0.825 (0.013)	424	0.905 (0.009)	115	0.892 (0.020)	168	0.919 (0.012)	85	0.852 (0.021)
상	376	0.972 (0.004)	158	0.863 (0.018)	391	0.935 (0.007)	124	0.892 (0.019)	196	0.921 (0.014)	59	0.843 (0.044)
거주지역(표준화)[9]												
동	1,162	0.964 (0.003)	475	0.868 (0.015)	1,213	0.927 (0.005)	398	0.921 (0.009)	542	0.921 (0.007)	219	- -[11]
읍면	355	0.941 (0.006)	204	- -	465	0.913 (0.006)	127	- -	146	0.909 (0.009)	104	- -
소득수준(표준화)												
하	338	0.946 (0.006)	177	- -	433	0.890 (0.011)	130	0.896 (0.015)	169	0.885 (0.017)	86	- -
중하	390	0.949 (0.005)	166	- -	407	0.917 (0.009)	151	- -	143	0.918 (0.009)	89	- -
중상	395	0.968 (0.004)	168	- -	424	0.936 (0.005)	115	- -	168	0.929 (0.012)	85	- -
상	376	0.963 (0.006)	158	- -	391	0.951 (0.006)	124	- -	196	0.939 (0.010)	59	- -

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용
2) 정상 : 골관절염, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 양측성 난청 유병자가 아닌 사람
3) 골관절염 : 골관절염을 의사로부터 진단받은 사람
4) 고혈압 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 혈압강하제를 복용하는 사람
5) 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상 또는 의사로부터 당뇨병진단을 받은 적이 있거나 혈당강하제를 복용하거나 인슐린 주사를 투여받는 사람
6) 고콜레스테롤혈증 : 8시간 이상 공복자 중 총콜레스테롤 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤 강하제를 복용하는 사람
7) 양측성 난청 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 사람
8) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
9) 2005년 추계인구로 연령표준화
10) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시
11) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 4-14. 만성질환별 EQ-5D 지수[1] : 남자, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	정상[2]		골관절염[3]		고혈압[4]		당뇨병[5]		고콜레스테롤혈증[6]		양측성 난청[7]	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
40세이상	675	0.973 (0.003)	107	0.862 (0.018)	744	0.942 (0.005)	277	0.931 (0.008)	240	0.952 (0.007)	177	0.912 (0.012)
연령(세)												
40-49	307	0.982 (0.004)	9	- -[10]	118	0.976 (0.008)	37	0.972 (0.011)	74	0.973 (0.008)	4	- -
50-59	178	0.970 (0.005)	13	- -	185	0.954 (0.008)	85	0.941 (0.012)	79	0.941 (0.014)	14	- -
60-69	125	0.950 (0.009)	45	0.858 (0.023)	241	0.948 (0.008)	79	0.938 (0.014)	56	0.960 (0.010)	60	0.909 (0.021)
70+	65	0.933 (0.017)	40	0.790 (0.035)	200	0.860 (0.019)	76	0.848 (0.033)	31	0.887 (0.031)	99	0.881 (0.016)
40-64	552	0.977 (0.003)	47	0.906 (0.021)	428	0.959 (0.005)	155	0.951 (0.008)	188	0.957 (0.007)	39	0.955 (0.013)
65+	123	0.933 (0.012)	60	0.813 (0.028)	316	0.897 (0.014)	122	0.877 (0.024)	52	0.917 (0.021)	138	0.889 (0.015)
거주지역												
동	493	0.979 (0.003)	69	0.861 (0.024)	555	0.950 (0.006)	212	0.935 (0.009)	195	0.954 (0.008)	122	0.918 (0.013)
읍면	182	0.958 (0.008)	38	0.865 (0.021)	189	0.918 (0.012)	65	0.916 (0.021)	45	0.943 (0.018)	55	0.898 (0.025)
소득수준[8]												
하	157	0.969 (0.007)	34	0.827 (0.044)	185	0.918 (0.014)	80	0.918 (0.014)	56	0.933 (0.019)	49	0.914 (0.022)
중하	167	0.964 (0.006)	24	0.832 (0.023)	187	0.943 (0.010)	72	0.948 (0.014)	57	0.963 (0.011)	55	0.904 (0.021)
중상	175	0.981 (0.005)	25	0.863 (0.037)	192	0.939 (0.012)	56	0.902 (0.035)	56	0.943 (0.017)	45	0.903 (0.025)
상	170	0.979 (0.005)	23	0.923 (0.027)	170	0.973 (0.006)	64	0.945 (0.012)	65	0.962 (0.011)	28	0.937 (0.024)
거주지역(표준화)[9]												
동	493	0.974 (0.003)	69	- -[11]	555	0.955 (0.006)	212	0.945 (0.008)	195	0.952 (0.007)	122	- -
읍면	182	0.953 (0.008)	38	- -	189	0.936 (0.009)	65	- -	45	- -	55	- -
소득수준(표준화)												
하	157	- -	34	- -	185	0.927 (0.011)	80	- -	56	- -	49	- -
중하	167	- -	24	- -	187	0.947 (0.012)	72	- -	57	- -	55	- -
중상	175	- -	25	- -	192	0.953 (0.007)	56	- -	56	- -	45	- -
상	170	- -	23	- -	170	0.977 (0.005)	64	- -	65	- -	28	- -

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용
2) 정상 : 골관절염, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 양측성 난청 유병자가 아닌 사람
3) 골관절염 : 골관절염을 의사로부터 진단받은 사람
4) 고혈압 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 혈압강하제를 복용하는 사람
5) 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상 또는 의사로부터 당뇨병진단을 받은 적이 있거나 혈당강하제를 복용하거나 인슐린 주사를 투여받는 사람
6) 고콜레스테롤혈증 : 8시간 이상 공복자 중 총콜레스테롤 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤 강하제를 복용하는 사람
7) 양측성 난청 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 사람
8) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
9) 2005년 추계인구로 연령표준화
10) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시
11) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 4-15. 만성질환별 EQ-5D 지수[1] : 여자, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

구 분	정상[2]		골관절염[3]		고혈압[4]		당뇨병[5]		고콜레스테롤혈증[6]		양측성 난청[7]	
	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)	N	EQ-5D index (표준오차)
40세이상	842	0.960 (0.003)	572	0.802 (0.011)	934	0.853 (0.008)	248	0.857 (0.013)	448	0.870 (0.010)	146	0.774 (0.026)
연령(세)												
40-49	446	0.973 (0.003)	20	0.895 (0.044)	68	0.942 (0.016)	24	0.932 (0.036)	41	0.941 (0.027)	6	- -[10]
50-59	256	0.951 (0.005)	128	0.865 (0.013)	237	0.916 (0.009)	48	0.918 (0.018)	161	0.900 (0.014)	15	- -
60-69	102	0.915 (0.014)	210	0.829 (0.014)	308	0.861 (0.010)	92	0.858 (0.013)	147	0.864 (0.015)	29	0.804 (0.047)
70+	38	0.868 (0.020)	214	0.721 (0.024)	321	0.768 (0.017)	84	0.771 (0.029)	99	0.791 (0.025)	96	0.728 (0.034)
40-64	767	0.964 (0.003)	235	0.861 (0.011)	437	0.910 (0.007)	107	0.909 (0.014)	278	0.902 (0.011)	38	0.894 (0.035)
65+	75	0.878 (0.017)	337	0.751 (0.018)	497	0.794 (0.013)	141	0.802 (0.021)	170	0.813 (0.018)	108	0.730 (0.031)
거주지역												
동	669	0.966 (0.003)	406	0.809 (0.011)	658	0.865 (0.009)	186	0.860 (0.016)	347	0.873 (0.012)	97	0.762 (0.032)
읍면	173	0.936 (0.008)	166	0.788 (0.027)	276	0.827 (0.017)	62	0.848 (0.022)	101	0.862 (0.019)	49	0.795 (0.047)
소득수준[8]												
하	181	0.949 (0.007)	143	0.738 (0.029)	248	0.810 (0.020)	50	0.841 (0.030)	113	0.836 (0.022)	37	0.757 (0.056)
중하	223	0.955 (0.006)	142	0.803 (0.017)	220	0.833 (0.014)	79	0.866 (0.019)	86	0.852 (0.021)	34	0.778 (0.040)
중상	220	0.968 (0.005)	143	0.819 (0.013)	232	0.873 (0.012)	59	0.882 (0.019)	112	0.905 (0.014)	40	0.800 (0.038)
상	206	0.966 (0.006)	135	0.851 (0.020)	221	0.901 (0.011)	60	0.834 (0.031)	131	0.890 (0.021)	31	0.770 (0.069)
거주지역(표준화)[9]												
동	669	- -[11]	406	- -	658	0.899 (0.009)	186	- -	347	0.896 (0.017)	97	- -
읍면	173	0.924 (0.009)	166	- -	276	- -	62	- -	101	- -	49	- -
소득수준(표준화)												
하	181	- -	143	- -	248	- -	50	- -	113	- -	37	- -
중하	223	- -	142	- -	220	- -	79	- -	86	- -	34	- -
중상	220	- -	143	- -	232	- -	59	- -	112	- -	40	- -
상	206	- -	135	- -	221	- -	60	- -	131	- -	31	- -

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용
2) 정상 : 골관절염, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 양측성 난청 유병자가 아닌 사람
3) 골관절염 : 골관절염을 의사로부터 진단받은 사람
4) 고혈압 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 혈압강하제를 복용하는 사람
5) 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상 또는 의사로부터 당뇨병진단을 받은 적이 있거나 혈당강하제를 복용하거나 인슐린 주사를 투여받는 사람
6) 고콜레스테롤혈증 : 8시간 이상 공복자 중 총콜레스테롤 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤 강하제를 복용하는 사람
7) 양측성 난청 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 사람
8) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
9) 2005년 추계인구로 연령표준화
10) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시
11) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 4-16. 활동제한율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,251	10.1 (0.5)	2,698	8.1 (0.7)	3,553	12.1 (0.7)
연령(세)						
19-29	767	4.2 (0.8)	306	3.8 (1.1)	461	4.5 (1.0)
30-39	1,253	4.8 (0.8)	525	4.6 (1.1)	728	5.0 (1.0)
40-49	1,162	6.3 (0.9)	531	5.9 (1.4)	631	6.9 (1.2)
50-59	1,170	11.9 (1.2)	478	9.7 (1.6)	692	14.0 (1.6)
60-69	1,027	19.1 (1.5)	473	15.5 (1.8)	554	22.4 (2.2)
70+	872	31.1 (2.0)	385	24.2 (2.7)	487	35.4 (2.9)
19-64	4,873	7.3 (0.4)	2,083	6.5 (0.6)	2,790	8.1 (0.6)
65+	1,378	28.1 (1.6)	615	20.9 (2.0)	763	33.2 (2.3)
거주지역						
동	4,883	8.7 (0.6)	2,102	7.2 (0.7)	2,781	10.3 (0.7)
읍면	1,368	15.1 (1.5)	596	11.6 (1.9)	772	18.5 (1.8)
소득수준[2]						
하	1,538	13.7 (1.1)	666	12.7 (1.6)	872	14.6 (1.5)
중하	1,540	10.6 (1.1)	668	7.9 (1.3)	872	13.3 (1.4)
중상	1,561	8.6 (0.8)	675	6.2 (0.9)	886	11.0 (1.3)
상	1,532	7.2 (0.8)	661	5.3 (1.0)	871	9.2 (1.2)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,883	8.7 (0.5)	2,102	7.3 (0.7)	2,781	9.9 (0.7)
읍면	1,368	10.3 (0.9)	596	9.2 (1.5)	772	11.1 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	1,538	12.9 (1.0)	666	12.4 (1.4)	872	13.3 (1.3)
중하	1,540	9.9 (0.9)	668	7.8 (1.3)	872	11.6 (1.1)
중상	1,561	7.7 (0.7)	675	5.9 (0.9)	886	9.3 (1.0)
상	1,532	6.7 (0.7)	661	5.2 (1.0)	871	7.9 (1.1)

1) 활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별・연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-17. 월간와병경험률[1], 월간결근결석경험률[2] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	월간와병경험률						월간결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,251	8.1 (0.4)	2,698	5.1 (0.5)	3,553	10.9 (0.6)	3,816	5.3 (0.4)	2,093	3.9 (0.5)	1,723	7.4 (0.7)
연령(세)												
19-29	767	10.1 (1.1)	306	6.6 (1.5)	461	13.7 (1.7)	547	8.6 (1.3)	230	5.4 (1.8)	317	12.3 (2.0)
30-39	1,253	6.0 (0.7)	525	4.8 (1.0)	728	7.2 (1.1)	802	3.9 (0.8)	491	3.6 (1.0)	311	4.6 (1.4)
40-49	1,162	7.0 (1.0)	531	5.1 (1.1)	631	9.1 (1.5)	900	4.3 (0.8)	506	3.7 (0.9)	394	5.4 (1.7)
50-59	1,170	6.8 (1.0)	478	4.1 (1.1)	692	9.6 (1.4)	816	5.1 (1.0)	420	3.9 (1.2)	396	6.8 (1.4)
60-69	1,027	9.0 (1.0)	473	4.5 (1.1)	554	13.0 (1.7)	518	4.6 (0.9)	320	2.8 (1.0)	198	7.5 (2.1)
70+	872	12.6 (1.5)	385	5.8 (1.4)	487	16.8 (2.2)	233	4.5 (1.8)	126	3.1 (1.2)	107	5.9 (2.9)
19-64	4,873	7.5 (0.5)	2,083	5.1 (0.5)	2,790	9.9 (0.7)	3,361	5.4 (0.4)	1,829	4.1 (0.5)	1,532	7.5 (0.8)
65+	1,378	11.7 (1.1)	615	5.1 (1.1)	763	16.3 (1.6)	455	3.8 (1.1)	264	2.1 (0.7)	191	6.1 (2.1)
거주지역												
동	4,883	8.1 (0.5)	2,102	5.2 (0.6)	2,781	11.0 (0.7)	2,863	5.4 (0.5)	1,603	4.1 (0.6)	1,260	7.5 (0.9)
읍면	1,368	7.9 (0.9)	596	4.9 (0.9)	772	10.8 (1.3)	953	5.0 (0.8)	490	3.5 (0.8)	463	7.0 (1.4)
소득수준[3]												
하	1,538	9.2 (0.8)	666	5.2 (0.9)	872	13.0 (1.3)	862	6.2 (0.9)	463	3.7 (0.9)	399	9.9 (1.6)
중하	1,540	7.8 (0.8)	668	5.0 (1.0)	872	10.6 (1.3)	982	4.2 (0.8)	534	2.8 (0.9)	448	6.2 (1.3)
중상	1,561	6.7 (0.7)	675	4.1 (1.0)	886	9.3 (1.1)	959	4.1 (0.8)	539	3.3 (1.0)	420	5.2 (1.4)
상	1,532	8.7 (1.0)	661	6.6 (1.3)	871	11.0 (1.3)	971	7.0 (1.2)	537	6.1 (1.5)	434	8.6 (1.8)
거주지역(표준화)[4]												
동	4,883	8.1 (0.5)	2,102	5.2 (0.6)	2,781	11.0 (0.7)	2,863	5.1 (0.5)	1,603	3.9 (0.6)	1,260	6.8 (0.8)
읍면	1,368	7.3 (1.0)	596	4.4 (1.0)	772	10.1 (1.6)	953	5.4 (0.8)	490	3.5 (1.1)	463	8.2 (1.6)
소득수준(표준화)												
하	1,538	9.2 (0.8)	666	5.2 (1.0)	872	12.8 (1.3)	862	6.2 (0.9)	463	3.5 (0.9)	399	9.6 (1.6)
중하	1,540	7.7 (0.8)	668	5.1 (1.0)	872	10.0 (1.2)	982	4.5 (0.8)	534	3.2 (0.9)	448	6.1 (1.2)
중상	1,561	6.7 (0.8)	675	4.2 (1.0)	886	9.0 (1.1)	959	3.9 (0.7)	539	3.4 (1.0)	420	4.6 (1.2)
상	1,532	9.0 (1.0)	661	6.6 (1.4)	871	11.4 (1.4)	971	7.0 (1.2)	537	6.1 (1.5)	434	- -[5]

1) 월간와병경험률 : 최근 1달간 질병이나 손상으로 거의 하루종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 월간결근결석경험률 : 최근 1달간 취업자 또는 재학생 중 질병이나 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 4-18. 소아청소년 월간와병경험률[1], 월간결근결석경험률[2] : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	월간와병경험률						월간결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	2,116	3.7 (0.5)	1,102	2.4 (0.6)	1,014	5.2 (0.9)	1,876	5.9 (0.7)	982	4.5 (0.7)	894	7.4 (1.2)
연령(세)												
1-5	604	4.2 (1.0)	297	4.2 (1.4)	307	4.2 (1.5)	397	15.2 (2.0)	199	12.7 (2.6)	198	17.9 (3.4)
6-11	780	3.0 (0.7)	408	2.3 (1.0)	372	3.8 (1.1)	771	3.6 (0.7)	402	3.4 (1.0)	369	3.8 (1.1)
12-14	371	3.9 (1.4)	203	2.3 (1.4)	168	5.7 (2.6)	369	4.0 (1.4)	201	2.6 (1.5)	168	5.4 (2.4)
15-18	361	4.2 (1.1)	194	1.5 (0.9)	167	7.6 (2.1)	339	4.6 (1.8)	180	2.5 (1.5)	159	7.4 (3.6)
1-11	1,384	3.5 (0.6)	705	3.0 (0.8)	679	4.0 (0.9)	1,168	7.3 (0.8)	601	6.4 (1.1)	567	8.2 (1.4)
12-18	732	4.1 (0.8)	397	1.8 (0.8)	335	6.8 (1.6)	708	4.3 (1.2)	381	2.5 (1.1)	327	6.5 (2.2)
거주지역												
동	1,783	3.8 (0.6)	935	2.4 (0.6)	848	5.5 (1.1)	1,575	5.8 (0.8)	827	4.5 (0.8)	748	7.3 (1.5)
읍면	333	3.5 (1.1)	167	2.8 (1.4)	166	4.2 (1.7)	301	6.3 (1.6)	155	4.5 (1.9)	146	7.9 (2.1)
소득수준[3]												
하	510	5.3 (1.2)	267	2.5 (1.0)	243	8.6 (2.4)	457	6.9 (1.3)	239	4.6 (1.3)	218	9.6 (2.4)
중하	516	1.5 (0.6)	269	2.0 (1.1)	247	0.9 (0.5)	450	3.2 (0.9)	234	3.4 (1.4)	216	3.0 (1.1)
중상	532	3.7 (1.2)	273	2.7 (1.3)	259	4.9 (1.5)	470	5.6 (1.2)	247	5.2 (1.5)	223	6.0 (1.8)
상	524	4.4 (1.2)	275	2.8 (1.1)	249	6.0 (1.9)	467	8.0 (2.4)	245	5.3 (2.2)	222	10.9 (4.1)

1) 월간와병경험률 : 최근 1달간 질병이나 손상으로 거의 하루종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 월간결근결석경험률 : 최근 1달간 취업자 또는 재학생 중 질병이나 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 4-19. 2주간 이환율[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,254	22.2 (0.7)	2,699	16.4 (0.8)	3,555	27.9 (1.0)
연령(세)						
19-29	767	14.0 (1.3)	306	14.0 (2.0)	461	14.0 (1.7)
30-39	1,253	15.8 (1.2)	525	13.3 (1.6)	728	18.4 (1.9)
40-49	1,162	15.3 (1.2)	531	10.7 (1.4)	631	20.1 (1.9)
50-59	1,171	27.5 (1.7)	479	18.9 (2.1)	692	36.0 (2.6)
60-69	1,028	36.8 (1.7)	473	26.1 (2.3)	555	46.3 (2.2)
70+	873	44.8 (2.2)	385	31.2 (2.8)	488	53.4 (2.9)
19-64	4,874	18.7 (0.7)	2,084	14.4 (0.8)	2,790	23.2 (1.0)
65+	1,380	44.2 (1.8)	615	32.0 (2.4)	765	52.7 (2.2)
거주지역						
동	4,885	20.3 (0.8)	2,102	15.3 (1.0)	2,783	25.1 (1.1)
읍면	1,369	29.2 (2.1)	597	20.3 (2.0)	772	37.7 (2.8)
소득수준[2]						
하	1,540	25.1 (1.4)	667	18.5 (1.8)	873	31.4 (1.8)
중하	1,540	22.4 (1.3)	668	16.0 (1.8)	872	28.8 (1.9)
중상	1,562	20.9 (1.3)	675	16.3 (1.7)	887	25.3 (1.8)
상	1,532	20.6 (1.3)	661	15.0 (1.7)	871	26.5 (1.8)
거주지역(표준화)[3]						
동	4,885	20.2 (0.7)	2,102	15.5 (0.9)	2,783	24.4 (0.9)
읍면	1,369	23.5 (1.6)	597	16.7 (1.7)	772	30.4 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	1,540	24.1 (1.3)	667	18.2 (1.8)	873	29.3 (1.6)
중하	1,540	21.3 (1.1)	668	15.7 (1.8)	872	26.3 (1.6)
중상	1,562	19.7 (1.2)	675	16.0 (1.7)	887	23.0 (1.5)
상	1,532	19.8 (1.3)	661	14.9 (1.7)	871	24.4 (1.8)

1) 2주간 이환율 : 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-20. 2주간 이환일수[1] : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2010

(단위 : 일)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	1,594	9.5 (0.2)	488	9.1 (0.3)	1,106	9.8 (0.2)
연령(세)						
19-29	116	7.2 (0.5)	45	6.5 (0.8)	71	7.9 (0.6)
30-39	190	7.8 (0.4)	63	7.3 (0.7)	127	8.1 (0.5)
40-49	187	8.8 (0.5)	54	9.4 (0.8)	133	8.4 (0.6)
50-59	333	10.3 (0.3)	79	10.3 (0.6)	254	10.2 (0.3)
60-69	381	10.5 (0.2)	123	10.1 (0.6)	258	10.6 (0.3)
70+	387	11.5 (0.3)	124	11.4 (0.5)	263	11.5 (0.3)
19-64	987	9.0 (0.2)	290	8.6 (0.4)	697	9.2 (0.2)
65+	607	11.1 (0.2)	198	10.7 (0.4)	409	11.3 (0.3)
거주지역						
동	1,121	9.3 (0.2)	339	8.6 (0.3)	782	9.7 (0.2)
읍면	473	10.2 (0.3)	149	10.4 (0.5)	324	10.1 (0.4)
소득수준[2]						
하	446	9.6 (0.3)	145	9.2 (0.5)	301	9.9 (0.4)
중하	400	10.1 (0.3)	116	10.1 (0.5)	284	10.1 (0.4)
중상	386	9.2 (0.3)	119	8.3 (0.6)	267	9.7 (0.3)
상	350	9.1 (0.4)	105	8.7 (0.7)	245	9.3 (0.4)
거주지역(표준화)[3]						
동	1,121	8.7 (0.2)	339	8.4 (0.3)	782	9.1 (0.3)
읍면	473	- -	149	- -	324	- -
소득수준(표준화)						
하	446	8.7 (0.3)	145	- -	301	- -
중하	400	9.5 (0.4)	116	- -	284	- -
중상	386	8.5 (0.3)	119	- -	267	- -
상	350	8.5 (0.4)	105	- -	245	- -

1) 2주간 이환일수 : 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 일수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제 4 부 부 록

제 1 장 . 지 표 정 의
제 2 장 . 조 사 표
제 3 장 . 참 여 진

제 1 장 지 표 정 의

Ⅰ. 건강행태
- Ⅰ-1. 흡연
- Ⅰ-2. 음주
- Ⅰ-4. 신체활동
- Ⅰ-5. 우울 및 스트레스
- Ⅰ-6. 손상 및 안전의식
- Ⅰ-7. 건강검진
- Ⅰ-8. 의료이용

Ⅱ. 영양
- Ⅱ-1. 식품 섭취
- Ⅱ-2. 에너지 및 영양소 섭취
- Ⅱ-3. 식생활 행태
- Ⅱ-4. 수유 및 이유 현황

Ⅲ. 만성질환
- Ⅲ-1. 비만
- Ⅲ-2. 고혈압
- Ⅲ-3. 당뇨병
- Ⅲ-4. 이상지혈증
- Ⅲ-5. 폐쇄성폐질환
- Ⅲ-6. 구강질환
- Ⅲ-7. B형간염
- Ⅲ-8. 빈혈
- Ⅲ-9. 안질환
- Ⅲ-10. 이비인후질환
- Ⅲ-11. 골다공증
- Ⅲ-12. 골관절염
- Ⅲ-13. 기타질환

Ⅳ. 삶의 질

Ⅴ. 소득 분류 기준

Ⅰ. 건강행태

Ⅰ-1. 흡연

Ⅰ-1-1. 현재흡연율

정의	평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율	
산출식	분자	평생 '②5갑(100개비) 이상' 흡연자이면서 현재 '①매일피움' 또는 '②가끔피움'으로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	19.현재 담배를 피우십니까? ①매일피움 ②가끔피움 ③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	

Ⅰ-1-2. 과거흡연율

정의	평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 담배를 피우지 않는 분율	
산출식	분자	평생 '②5갑(100개비) 이상' 흡연자이면서 '③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음'으로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	19.현재 담배를 피우십니까? ①매일피움 ②가끔피움 ③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	

Ⅰ-1-3. 평생흡연율

정의	지금까지 살아오면서 담배를 5갑(100개비) 이상 피운 분율	
산출식	분자	평생 담배를 '②5갑(100개비) 이상' 피웠다고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	17.지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까? ①5갑(100개비) 미만 ②5갑(100개비) 이상 ③피운 적 없음	

Ⅰ-1-4. 평생흡연자의 흡연시작연령

정의	평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이	
산출식	분자	처음으로 담배 한 대를 다 피운 만나이의 총 합
	분모	평생 담배를 '②5갑(100개비) 이상' 피웠다고 응답한 사람 수
단위	세	
설문	18.처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까? 만 □□세	
비고	'01년 정의 : 평생 담배 100개비 이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이	

Ⅰ-1-5. 현재흡연자의 하루평균흡연량

정의	현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수	
산출식	분자	하루 평균 흡연한 개비의 합
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	개비	
설문	19-1.하루 평균 흡연량은? □□□개비 19-2.최근 1달 간 흡연일수? □□일 19-3.흡연한 날 하루 평균 흡연량? □□□개비	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	

I -1-6. 현재흡연자의 금연시도율

정의	현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연을 시도한 분율	
산출식	분자	최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있는 현재흡연자 수
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	%	
설문	20.최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	

I -1-7. 현재흡연자의 1개월내금연계획률

정의	현재흡연자 중 1개월 내 금연할 계획이 있는 분율	
산출식	분자	1개월 안에 금연할 계획이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ①해당)
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	%	
설문	21.앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? ①1개월 안에 금연할 계획이 있다. ②6개월 안에 금연할 계획이 있다. ③6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다. ④현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다.	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	

I -1-8. 현재비흡연자의 간접흡연노출률

정의	현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 또는 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율	
산출식	분자	24문항 ②③번 응답자 또는 25-1문항 ②③번 응답자의 수
	분모	만19세이상 현재비흡연자 수
단위	%	
설문	23. 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간 ⑧직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 24-2. 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간	
비고	현재비흡연자 : 현재 흡연하지 않는 사람(과거흡연자 포함)	

I -1-9 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률

정의	현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율	
산출식	분자	'②1시간 미만' 또는 '③1시간 이상'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상, 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자 수
단위	%	
설문	23.직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간 ⑧직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)	
비고	현재비흡연자 : 현재 흡연하지 않는 사람(과거흡연자 포함)	

I -1-10. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률

정의	현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율	
산출식	분자	'②1시간 미만' 또는 '③1시간 이상'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 현재비흡연자 수
단위	%	
설문	24-2.가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간	
비고	현재비흡연자 : 현재 흡연하지 않는 사람(과거흡연자 포함)	

I -1-11. 흡연예방 또는 금연교육경험률

정의	최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	25.최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I-2. 음주

I -2-1. 평생음주율

정의	지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 분율	
산출식	분자	'②있음'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	4.지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ※제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. ①술을 마셔 본 적 없음 ②있음	

I -2-2. 연간음주율

정의	최근 1년 동안 1회 이상 음주한 분율	
산출식	분자	최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ②③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년 간 전혀 마시지 않았다. ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번 ⑤일주일에 2-3번 ⑥일주일에 4번 이상	

I -2-3. 월간음주율

정의	최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율	
산출식	분자	한달에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년 간 전혀 마시지 않았다. ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번 ⑤일주일에 2-3번 ⑥일주일에 4번 이상	

I -2-4. 평생음주자의 음주시작연령

정의	평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이	
산출식	분자	처음 술 1잔을 모두 마셔본 만 나이의 합
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	세	
설문	4-1.처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? ※제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. 만 □□세	
비고	평생음주자 : 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람	

I -2-5. 연간음주자의 고위험음주율

정의	연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 분율	
산출식	분자	5-1 문항 ⑤⑥번 응답자이면서 5-2 문항 ④⑤번 응답자(여자③④⑤번 응답자)
	분모	만19세이상 연간음주자
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번 ⑤일주일에 2-3번 정도 ⑥일주일에 4번 이상 5-2.한번에 술을 얼마나 마십니까? ①1-2잔 ②3-4잔 ③5-6잔 ④7-9잔 ⑤10잔 이상	
비고	연간음주자 : 최근 1년 동안 술을 마셔본 적이 있는 사람 ※HP2010 고도위험음주자 : 평소에 소주 5잔이상('98년 : 반병이상) 마시며 주 3회 이상 음주자	

I -2-6. 연간음주자의 연간폭음빈도

정의	연간음주자 중 최근 1년간 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 빈도	
산출식	분자	최근1년 동안 한번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마신 적이 있다고 응답한 남성의 수 또는 한번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수
	분모	만19세이상 연간음주 남성(또는 여성)의 수
단위	%	
설문	5-3.(※남성분만 응답해 주십시오.) 한번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도)이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ①전혀 없다 ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④일주일에 1번 정도 ⑤거의 매일 5-4.(※여성분만 응답해 주십시오.) 한번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도)이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ①전혀 없다 ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④일주일에 1번 정도 ⑤거의 매일	
비고	연간음주자 : 최근 1년 동안 술을 마셔본 적이 있는 사람	

I -2-7. 평생음주자의 정상음주율

정의	평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 7점 이하에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 10문항에서 총점 7점이하에 해당하는 사람 수(5-1 ~ 5-11문항)
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-8. 평생음주자의 문제음주율

정의	평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 8점 이상 15점 이하에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 10문항에서 총점 8점-15점에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-9. 평생음주자의 알코올남용률

정의	평생음주자 중 AUDIT 10문항에서 총점 16점 이상 19점 이하에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 점수가 총점 16-19점 이상에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-10. 평생음주자의 알코올의존율

정의	평생음주자 중 AUDIT 10문항에서 총점 20점 이상에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 점수가 총점 20점 이상에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-11. 평생음주자의 연간음주문제상담경험률

정의	평생음주자 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	6.최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -2-12. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률

정의	자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위	%	
설문	10-2~10-3.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자동차 : ①예 □□□회 ②아니오 ③자동차를 운전하지 않는다 -오토바이 : ①예 □□□회 ②아니오 ③오토바이를 운전하지 않는다	

I -2-13. 자동차 운전자의 연간음주운전경험률

정의	자동차 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 자동차 운전자 수
단위	%	
설문	10-3.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자동차 : ①예 □□□회 ②아니오 ③자동차를 운전하지 않는다	

I -2-14. 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률

정의	오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 오토바이 운전자 수
단위	%	
설문	10-2.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -오토바이 : ①예 □□□회 ②아니오 ③오토바이를 운전하지 않는다	

I -2-15. 자전거 운전자의 연간음주운전경험률

정의	자전거 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 자전거 운전자 수
단위	%	
설문	10-1.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자전거 : ①예 □□□회 ②아니오 ③자전거를 운전하지 않는다	

I -2-16. 연간음주운전차량동승률

정의	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분율	
산출식	분자	1번 이상 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ②③④⑤ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	11.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까? ①없다 ②1번 ③2-3번 ④4-5번 ⑤6번 이상	

3. 신체활동

I -3-1. 중등도이상 신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일이상 실천한 분율	
산출식	분자	26번문항 ④⑤⑥⑦⑧번 응답자이면서 26-1번 20분 이상이거나 27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 27-1번 문항 30분 이상인 응답자의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분	

I -3-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	26번문항 ④⑤⑥⑦⑧번 응답자이면서 26-1번 20분 이상이거나, 27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 27-1번 문항 30분 이상이거나, 28번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 28-1번 문항 30분 이상인 응답자의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 28.최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞29번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 28-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분	

I -3-3. 격렬한신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람 수(26번 문항 ④⑤⑥⑦⑧ 이고 26-1번 20분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분	

I -3-4. 중등도신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람 수(27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧ 이고 27-1번 문항 30분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분	

I -3-5. 걷기실천율

정의	최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수(28번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧ 이고 28-1번 문항 30분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	28.최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞29번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 28-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분	

I -3-6. 근력운동실천율

정의	최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	근력운동을 2일 이상 했다고 응답한 사람 수(응답보기: ③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	29.최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음 ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 이상	
비고	청소년 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 3일 이상 실천한 분율 ※ WHO 권고기준	

4. 우울 및 스트레스

I -4-1. 스트레스인지율

정의	평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율	
산출식	분자	'①대단히 많이 느낀다' 또는 '②많이 느끼는 편이다'라고 응답한 대상자 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	13.평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ①대단히 많이 느낀다 ②많이 느끼는 편이다 ③조금 느끼는 편이다 ④거의 느끼지 않는다	

I -4-2. 우울증상경험률

정의	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	14.최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -4-3. 자살생각률

정의	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	15.최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -4-4. 자살생각자의 자살시도율

정의	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 중 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	15-1.최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -4-5. 정신문제상담경험률

정의	최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	16.최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

5. 손상 및 안전의식

I -5-1. 연간손상경험률

정의	최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만 19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -5-2. 연간손상 와병경험률

정의	최근 1년 동안 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 건수의 합
	분모	최근 1년 동안 손상 건수의 합
단위	%	
설문	6.이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -5-3. 연간손상 결근결석경험률

정의	최근 1년 동안 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 건수의 합
	분모	최근 1년간 취업자 또는 재학생 중 최근 1년 동안 손상 건수의 합
단위	%	
설문	7.이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 7-1.있었다면, 며칠입니까? □□□일	
비고	취업자 : 최근 1년동안 일한적이 있는 사람 재학생 : 유치원, 보육원, 어린이집, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원에 재학중인 사람	

I -5-4. 운전자의 안전벨트착용률

정의	운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 분율	
산출식	분자	'⑤항상 맨다'고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 운전자 수
단위	%	
설문	7.운전할 때 안전벨트를 맵니까? ①전혀 매지 않는다 ②거의 매지 않는 편이다 ③가끔 매는 편이다 ④대체로 매는 편이다 ⑤항상 맨다 ⑧운전을 하지 않는다(비해당)	

I -5-5. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률

정의	다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율	
산출식	분자	'⑤항상 맨다'고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 동승차량앞좌석 탑승 경험자 수(⑧번 제외)
단위	%	
설문	8.다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? ①전혀 매지 않는다 ②거의 매지 않는 편이다 ③가끔 매는 편이다 ④대체로 매는 편이다 ⑤항상 맨다 ⑧자동차 앞좌석에 앉은 적이 없다	

I -5-6. 소아의 자동차보호장구이용률

정의	자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율	
산출식	분자	항상 보호장구를 사용하는 소아(응답보기 ①)
	분모	만1~5세 자동차 탑승 경험이 있는 소아 수(⑥,⑨번제외)
단위	%	
설문	3.○○는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까? ①항상 사용 ②자주 사용 ③가끔 사용 ④거의 사용하지 않음 ⑤전혀 사용하지 않음 ⑥자동차에 태우지 않음 ⑨모름	
비고	도로교통법 제 50조 1항	

I -5-7. 자전거 헬멧착용률

정의	최근 1년 동안 자전거 탑승 경험자 중 헬멧을 항상 착용하는 분율	
산출식	분자	'①항상착용' 이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 자전거 탑승 경험자 수
단위	%	
설문	9.최근 1년 동안 ○○는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? ①항상 착용 ②자주 착용 ③가끔 착용 ④거의 착용하지 않음 ⑤전혀 착용하지 않음 ⑥자전거를 타지않음	

I -5-8. 소아의 자전거 헬멧착용률

정의	최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율	
산출식	분자	'①항상착용' 이라고 응답한 사람 수
	분모	만3~11세 자전거 탑승 경험이 있는 소아 수(⑥,⑨번제외)
단위	%	
설문	2.최근 1년 동안 ○○는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? ①항상 착용 ②자주 착용 ③가끔 착용 ④거의 착용하지 않음 ⑤전혀 착용하지 않음 ⑥자전거에 태우지 않음 ⑨모름	

6. 건강검진

I -6-1. 건강검진수진율

정의	최근 2년동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -6-2. 암검진수진율

정의	최근 2년 동안 암검진을 받은 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	8.최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -6-3. 위암검사수진율

정의	최근 2년이내 위암검사를 받은 분율	
산출식	분자	최근 2년 동안 위암검사를 받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	3.위암검사(위내시경 또는 위장조영술)를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 3-1. 가장 최근에 받아보신 위암검사는 언제입니까? ①1년 이내에 받았음 ②1년 이상 2년 이내에 받았음 ③2년 이상 되었음	
비고	국가암조기검진(위암) : 만40세이상, 위장조영검사 또는 위내시경검사, 2년주기	

I -6-4. 유방암검사수진율

정의	최근 2년이내 유방암검사를 받은 분율	
산출식	분자	최근 2년 동안 유방암검사를 받은 사람 수
	분모	만19세이상 여자 대상자 수
단위	%	
설문	6.(여성분만 응답)유방암검사(유방단순촬영)를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 6-1. 가장 최근에 받아보신 유방암검사는 언제입니까? ①1년 이내에 받았음 ②1년 이상 2년 이내에 받았음 ③2년 이상 되었음	
비고	국가암조기검진(유방암) : 만40세이상, 유방임상진찰+유방단순촬영술, 2년주기	

I -6-5. 자궁경부암검사수진율

정의	최근 2년이내 자궁경부암검사를 받은 분율	
산출식	분자	최근 2년 동안 자궁경부암검사를 받은 사람 수
	분모	만19세이상 여자 대상자 수
단위	%	
설문	7.(여성분만 응답)자궁경부암검사(자궁경부도말세포검사)를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 7-1. 가장 최근에 받아보신 자궁경부암검사는 언제입니까? ①1년 이내에 받았음 ②1년 이상 2년 이내에 받았음 ③2년 이상 되었음	
비고	국가암조기검진(자궁경부암) : 만30세이상, 자궁경부세포검사, 2년주기	

I -6-6. 대장암검사수진율

정의	최근 5년이내 대장암검사를 받은 분율	
산출식	분자	최근 5년 동안 대장암검사를 받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	4.대장암검사(분변잠혈반응검사, 대장내시경 등)를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 4-1. 가장 최근에 받아보신 대장암검사는 언제입니까? ①1년 이내에 받았음 ②1년 이상 2년 이내에 받았음 ③2년 이상 5년 이내에 받았음 ④5년이상 10년 이내에 받았음 ⑤10년 이상 되었음	
비고	국가암조기검진(위암) : 만40세이상, 위장조영검사 또는 위내시경검사, 2년주기	

I -6-7. 간암검사수진율(고위험군)

정의	간염 및 간질환을 가진 사람 중 최근 6개월이내 간암검사를 받은 분율	
산출식	분자	최근 6개월 동안 간암검사를 받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 중 간염 또는 간질환을 가진 사람 수
단위	%	
설문	5.간암 검사(복부초음파, 혈청알파태아단백검사)를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 4-1. 가장 최근에 받아보신 간암검사는 언제입니까? ①6개월 이내에 받았음 ②6개월 이상 1년 이내에 받았음 ③1년 이상 2년 이내에 받았음 ④2년 이상 되었음	
비고	국가암조기검진(간암) : 만40세이상 고위험군, 간초음파검사+혈청알파태아단백검사, 6개월주기 ※간염 및 간질환자 : B형간염표면항원(HBsAg) 양성 또는 C형 간염, 간경변증을 의사로부터 진단받았다고 응답한사람	

I -6-8. 인플루엔자예방접종률

정의	최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1-1.최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -6-9. 소아선천성대사이상검사 수진율

정의	신생아(선천성)대사이상검사를 받은 분율	
산출식	분자	'①예'으로 응답한 사람수
	분모	만1-11세 대상자 수
단위	%	
설문	6.○○○는 신생아(선천성) 대사이상검사를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 ③모름	

7. 의료이용

I -7-1. 연간미치료율(병의원)

정의	최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -7-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)

정의	최근 1년 동안 병의원(치과 제외) 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율	
산출식	분자	'①경제적인 이유로'로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 병의원(치과 제외) 미치료자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적인 있습니까? ①예 ②아니오 1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까? ①경제적인 이유로 ②병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서 ③교통편이 불편해서 ④내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서 ⑤병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서 ⑥증상이 가벼워서 ⑦기타__	
비고	병의원(치과 제외) 미치료자 : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람	

I -7-3. 연간미치료율(치과)

정의	최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	32.최근 1년 동안, 치과치료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅰ-7-4. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과)

정의	최근 1년 동안 치과 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율	
산출식	분자	'①경제적인 이유로'로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 치과 미치료자 수
단위	%	
설문	32.최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 32-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? ①경제적인 이유로 ②치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서 ③직장이나 학교를 비울 수 없어서 ④거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에 ⑤아이를 봐줄 사람이 없어서 ⑥다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서 ⑦치과진료를 받기가 무서워서 ⑧기타____	
비고	치과 미치료자 : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율	

Ⅰ-7-5. 연간입원율

정의	최근 1년 동안 입원한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅰ-7-6. 2주간 외래이용률

정의	최근 2주 간 입원을 하지 않고, 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 2주 간 입원을 하지 않고, 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅰ-7-7. 2주간 약국이용률

정의	최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅱ. 영양

1. 식품 섭취

Ⅱ-1-1. 식품군별 섭취량

정의	식품군별 1인 1일 평균 섭취량	
산출식	분자	식품군별 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	g	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-1-2. 다소비식품

정의	중량을 기준으로 1일 평균 섭취량이 높은 식품	
산출식	분자	식품별 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	-	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-1-3. 식품별 섭취빈도 분포

정의	식품섭취빈도조사표의 각 식품항목에 대한 식품별 섭취빈도 분포	
산출식	분자	빈도별 응답자 수
	분모	만12세이상 대상자 수
단위	%	
설문	각 해당 식품을 얼마나 자주 섭취하셨습니까? ⑨1일 3회 ⑧1일 2회 ⑦1일 1회 ⑥1주 4-6회 ⑤1주 2-3회 ④1주 1회 ③1개월 2-3회 ②1개월 1회 ①1년 6-11회 ⓪거의 안 먹음	
비고	총 63개 항목 식품섭취빈도조사표 참조	

Ⅱ-1-4. 식품별 평균섭취빈도

정의	식품섭취빈도조사표의 각 식품항목에 대한 주당 평균섭취빈도	
산출식	분자	21×(⑨ 응답자 수) + 14×(⑧ 응답자 수) + 7×(⑦ 응답자 수) + 5×(⑥ 응답자 수) + 2.5×(⑤ 응답자 수) + 1×(④ 응답자 수) + 0.58×(③ 응답자 수) + 0.23×(② 응답자 수) + 0.16×(① 응답자 수)
	분모	만12세이상 대상자 수
단위	회/주	
설문	각 해당 식품을 얼마나 자주 섭취하셨습니까? ⑨1일 3회 ⑧1일 2회 ⑦1일 1회 ⑥1주 4-6회 ⑤1주 2-3회 ④1주 1회 ③1개월 2-3회 ②1개월 1회 ①1년 6-11회 ⓪거의 안 먹음	
비고	총 63개 항목 식품섭취빈도조사표 참조	

2. 에너지 및 영양소 섭취

Ⅱ-2-1. 영양소별 섭취량

정의	에너지 및 영양소의 1일 평균섭취량	
산출식	분자	개인의 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	에너지 : kcal 단백질, 지방, 탄수화물, 조섬유 : g 칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 철, 티아민, 리보플라빈, 나이아신, 비타민 C : mg 비타민 A : ㎍RE	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-2. 식품군별 영양소 섭취량

정의	식품군별 1일 에너지 및 영양소의 평균섭취량	
산출식	분자	개인의 식품군별 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	에너지 : kcal 단백질, 지방, 탄수화물, 조섬유 : g 칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 철, 나이아신, 비타민 C : mg 티아민, 리보플라빈 : ㎍ 비타민 A : ㎍RE	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-3. 영양소별 주요 급원식품

정의	에너지 및 영양소별 섭취량에 기여도가 큰 식품	
산출식	분자	식품별 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	-	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-4. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율

정의	한국인 영양섭취기준의 필요추정량, 권장섭취량 혹은 충분섭취량에 대한 개인별 영양소 섭취량 백분율의 평균값	
산출식	분자	{(영양소 섭취량)/(영양섭취기준) × 100}의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-5. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율

정의	에너지 및 영양소별 섭취량이 영양섭취기준 미만인 분율	
산출식	분자	섭취량이 영양섭취기준 미만인 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-6. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율

정의	에너지 및 영양소별 섭취량이 영양섭취기준 이상인 분율	
산출식	분자	섭취량이 영양섭취기준 이상인 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-7. 영양섭취부족자 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율	
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만을 섭취한 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-8. 영양섭취부족자(비타민 C 포함) 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율	
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만을 섭취한 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조	

Ⅱ-2-9. 에너지/지방과잉섭취자 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율	
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조	

3. 식생활 행태

Ⅱ-3-1. 아침식사 결식률

정의	{(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율	
산출식	분자	1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수
	분모	만1세이상 대상자 중 (1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)
단위	%	
설문	지난 2일간 매끼 식사를 하셨습니까? 2일전 아침 ①예 ②아니오 1일전 아침 ①예 ②아니오 점심 ①예 ②아니오 점심 ①예 ②아니오 저녁 ①예 ②아니오 저녁 ①예 ②아니오	
비고	점심 및 저녁식사 결식률도 아침식사 결식률과 같은 정의로 산출	

Ⅱ-3-2. 아침식사 가족동반식사율

정의	아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 대체로 가족(가족 중 한사람 이상)과 함께 식사하셨습니까? 끼니별로 답해주십시오. 아침 ①예 ②아니오 점심 ①예 ②아니오 저녁 ①예 ②아니오	
비고	점심 및 저녁식사 가족동반식사율도 아침식사 가족동반식사율과 같은 정의로 산출	

Ⅱ-3-3. 외식 섭취빈도

정의	외식 섭취빈도별 응답 분포	
산출식	분자	빈도(응답보기)별 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식, 직장 급식, 학교 급식)을 얼마나 자주 하셨습니까? ①하루 2회 이상 ②하루 1회 ③주 5-6회 ④주 3-4회 ⑤주 1-2회 ⑥월 1-3회 ⑦거의 안 한다	

Ⅱ-3-4. 1일 1회 이상 외식자 분율

정의	외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 분율	
산출식	분자	외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 수
	분모	만1세이상 대상자수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식, 직장 급식, 학교 급식)을 얼마나 자주 하셨습니까? ①하루 2회 이상 ②하루 1회 ③주 5-6회 ④주 3-4회 ⑤주 1-2회 ⑥월 1-3회 ⑦거의 안 한다	

Ⅱ-3-5. 가공식품 선택 시 영양표시 인지율

정의	영양표시를 묻는 문항에 '안다'라고 응답한 사람 수	
산출식	분자	(응답변수 ①로 답한 응답자 수)
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	다음은 '영양표시'에 관한 내용입니다. '영양표시'를 알고 계십니까 ①예 ②아니오	

Ⅱ-3-6. 가공식품 선택 시 영양표시 이용율

정의	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 분율	
산출식	분자	(응답변수 ①로 답한 응답자 수)
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	6번 문항에서 '① 예'라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ①읽는다 ②읽지 않는다 ③영양표시가 무엇인지 모른다	

Ⅱ-3-7. 영양표시 중 관심항목

정의	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상의 가장 관심 있게 보는 영양표시 항목별 분율	
산출식	분자	응답변수별 응답자 수
	분모	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	6-1-1번 문항에서 '① 예' 고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까? ①열량 ②탄수화물 ③당류 ④단백질 ⑤지방 ⑥포화지방 ⑦트랜스지방 ⑧콜레스테롤 ⑨나트륨 ⑩기타	

Ⅱ-3-8. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률

정의	가공식품 구매 및 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상 중 영양표시 내용에 영향을 받는다고 답한 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	6-1-2번 문항에서 '읽는다' 고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까? ①예 ②아니오	

Ⅱ-3-9. 영양교육 및 상담 수혜율

정의	최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년간 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있으십니까? ①예 ②아니오	

Ⅱ-3-10. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률

정의	최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율	
산출식	분자	최근 1년 이내 2주 이상 식이보충제 복용 경험을 묻는 문항에 '예'로 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 2주이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅱ-3-11. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험률

정의	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율	
산출식	분자	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제 복용 경험을 묻는 문항에 '예'로 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있습니까 ①예 ②아니오	

Ⅱ-3-12. 식품안정성 확보가구 분율

정의	가구원 중 식품구매를 담당하는 1인에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다' 또는 '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'로 답한 가구 분율	
산출식	분자	응답변수 ① 또는 ②로 응답한 가구 수
	분모	대상가구 수
단위	%	
설문	다음 중 지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ①우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ②우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다	

4. 수유 및 이유 현황

Ⅱ-4-1. 출생 시 체중 분포

정의	출생 시 체중에 따른 분율	
산출식	분자	출생 시 체중이 '2.5kg 미만', '2.5 이상 3.0kg 미만', '3.0 이상 3.5kg 미만', '3.5 이상 4.0kg 미만', '4.0kg 이상' 등 각 범주에 해당하는 사람 수
	분모	만1~3세 대상자 수
단위	%	
설문	출생 시 아기의 신장 및 체중은 어느 정도였습니까?	
비고	저체중아 출생률 : 출생 체중이 2.5kg 미만인 대상자 분율	

Ⅱ-4-2. 모유수유경험률

정의	모유수유 여부에 '예'로 응답한 분율	
산출식	분자	모유수유 여부에 '예'로 응답한 사람 수
	분모	만1~3세 대상자 수
단위	%	
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.	
비고	조제분유수유경험률은 모유수유경험률과 같은 정의로 산출 월령별로 동일한 산출식을 적용하여 월령별 모유수유 분율, 조제분유수유 분율 산출	

	모유	조제분유
4-1. 수유 여부	①예 ②아니오	①예 ②아니오
4-2. 시작 시기	( ) 주	( ) 주
4-3. 총 수유기간	( ) 개월	( ) 개월

Ⅱ-4-3. 완전모유수유율

<table>
<tr><td>정의</td><td colspan="2">모유수유 여부에 ‘예’로 응답하고 조제분유 수유 여부에 ‘아니오’로 응답한 분율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">산출식</td><td>분자</td><td>모유수유 여부에 ‘예’로 응답하고 조제분유 수유 여부에 ‘아니오’로 응답한 사람 수</td></tr>
<tr><td>분모</td><td>만1~3세 대상자 수</td></tr>
<tr><td>단위</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>설문</td><td colspan="2">아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.
<table>
<tr><td></td><td>모유</td><td>조제분유</td></tr>
<tr><td>4-1. 수유 여부</td><td>①예 ②아니오</td><td>①예 ②아니오</td></tr>
<tr><td>4-2. 시작 시기</td><td>( ) 주</td><td>( ) 주</td></tr>
<tr><td>4-3. 총 수유기간</td><td>( ) 개월</td><td>( ) 개월</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>비고</td><td colspan="2">월령별 완전모유수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유 수유 없이 모유만 수유한 대상자 분율</td></tr>
</table>

Ⅱ-4-4. 모유수유기간

<table>
<tr><td>정의</td><td colspan="2">모유수유를 경험한 대상자의 총 모유수유기간의 평균</td></tr>
<tr><td rowspan="2">산출식</td><td>분자</td><td>총 모유수유기간의 합</td></tr>
<tr><td>분모</td><td>만1~3세 대상자 중 모유수유 여부에 ‘예’로 응답한 사람 수</td></tr>
<tr><td>단위</td><td colspan="2">개월</td></tr>
<tr><td>설문</td><td colspan="2">아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.
<table>
<tr><td></td><td>모유</td><td>조제분유</td></tr>
<tr><td>4-1. 수유 여부</td><td>①예 ②아니오</td><td>①예 ②아니오</td></tr>
<tr><td>4-2. 시작 시기</td><td>( ) 주</td><td>( ) 주</td></tr>
<tr><td>4-3. 총 수유기간</td><td>( ) 개월</td><td>( ) 개월</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Ⅱ-4-5. 혼합수유율

<table>
<tr><td>정의</td><td colspan="2">모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 ‘예’로 응답한 분율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">산출식</td><td>분자</td><td>모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 ‘예’로 응답한 사람 수</td></tr>
<tr><td>분모</td><td>만1~3세 대상자 수</td></tr>
<tr><td>단위</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>설문</td><td colspan="2">아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.
<table>
<tr><td></td><td>모유</td><td>조제분유</td></tr>
<tr><td>4-1. 수유 여부</td><td>①예 ②아니오</td><td>①예 ②아니오</td></tr>
<tr><td>4-2. 시작 시기</td><td>( ) 주</td><td>( ) 주</td></tr>
<tr><td>4-3. 총 수유기간</td><td>( ) 개월</td><td>( ) 개월</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>비고</td><td colspan="2">월령별 혼합수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유와 모유를 모두 수유한 대상자 분율</td></tr>
</table>

Ⅱ-4-6. 조제분유 시작 시기

<table>
<tr><td>정의</td><td colspan="2">혼합수유아의 경우 조제분유를 수유하기 시작한 시기</td></tr>
<tr><td rowspan="2">산출식</td><td>분자</td><td>모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 ‘예’로 응답한 사람의 조제분유수유 시작 주령의 합</td></tr>
<tr><td>분모</td><td>모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 ‘예’로 응답한 사람 수</td></tr>
<tr><td>단위</td><td colspan="2">주</td></tr>
<tr><td>설문</td><td colspan="2">아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.
<table>
<tr><td></td><td>모유</td><td>조제분유</td></tr>
<tr><td>4-1. 수유 여부</td><td>①예 ②아니오</td><td>①예 ②아니오</td></tr>
<tr><td>4-2. 시작 시기</td><td>( ) 주</td><td>( ) 주</td></tr>
<tr><td>4-3. 총 수유기간</td><td>( ) 개월</td><td>( ) 개월</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Ⅱ-4-7. 시판우유 시작 시기

정의	시판우유 섭취를 시작한 시기	
산출식	분자	시판우유 섭취를 시작한 월령의 합
	분모	만1~3세 대상자 수
단위	개월	
설문	일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까? ( ) 개월	
비고	이유보충식 시작 시기도 동일한 정의에 의해 산출 이유보충식 시작 시기 설문 젖이나 분유이외의 이유보충식을 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까? ( ) 개월	

Ⅲ. 만성질환

1. 비만

Ⅲ-1-1. 비만 유병률 : 체질량지수기준

정의	체질량지수 25kg/m^2 이상인 분율	
산출식	분자	체질량지수 25kg/m^2 이상인 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	세계보건기구 아시아태평양지부, 대한비만학회 진단 기준	

Ⅲ-1-2. 비만 유병률 : 허리둘레 기준

정의	허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율	
산출식	분자	허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	대한비만학회 진단 기준	

2. 고혈압

Ⅲ-2-1. 고혈압 유병률

정의	수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 분율	
산출식	분자	수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure(JNC) 7th, 2004 기준 고혈압전단계 : 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 분율 ※2008년 8월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)	

Ⅲ-2-2. 고혈압 인지율

정의	고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율	
산출식	분자	의사로부터 고혈압 진단을 받은 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압약물을 복용한 사람 ※2008년 8월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)	

Ⅲ-2-3. 고혈압 치료율

정의	고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율	
산출식	분자	혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압약물을 복용한 사람 ※2008년 8월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)	

Ⅲ-2-4. 고혈압 조절률(유병자 기준)

정의	고혈압 유병자 중 수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 분율	
산출식	분자	수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압 약물을 복용한 사람 ※2008년 8월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)	

Ⅲ-2-5. 고혈압 조절률(치료자 기준)

정의	고혈압 치료자 중 수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 분율	
산출식	분자	수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 치료자 수
단위	%	
비고	치료자 : 고혈압 유병자 중 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 사람 ※2008년 8월 이후 측정치는 보정하여 산출(13p 참고)	

3. 당뇨병

Ⅲ-3-1. 당뇨병 유병률

정의	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여받고 있는 분율	
산출식	분자	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 검진 대상자 수
단위	%	
비고	National Diabetes Statistics(2007), 대한당뇨병학회(2007) 기준 공복시간 8시간 미만자 제외 공복혈당장애 : 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL인 분율	

Ⅲ-3-2. 당뇨병 인지율

정의	당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율	
산출식	분자	의사로부터 당뇨병을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사로부터 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

Ⅲ-3-3. 당뇨병 치료율

정의	당뇨병 유병자 중 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율	
산출식	분자	혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사로부터 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

Ⅲ-3-4. 당뇨병 조절률(유병자 기준)

정의	당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율	
산출식	분자	당화혈색소가 6.5%미만인 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

Ⅲ-3-5. 당뇨병 조절률(치료자 기준)

정의	당뇨병 치료자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율	
산출식	분자	당화혈색소가 6.5%미만인 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 치료자 수
단위	%	
비고	치료자 : 당뇨병 유병자 중 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

4. 이상지혈증

Ⅲ-4-1. 고콜레스테롤혈증 유병률

정의	총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Ⅲ(NCEP-ATPⅢ) 기준, 공복시간 8시간 미만자 또는 지방성 및 용혈 검체 제외	

Ⅲ-4-2. 저HDL콜레스테롤혈증 유병률

정의	HDL콜레스테롤이 40mg/dL 미만인 분율	
산출식	분자	HDL콜레스테롤이 40mg/dL 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Ⅲ(NCEP-ATPⅢ) 기준, 공복시간 8시간 미만자 또는 지방성 및 용혈 검체 제외 ※ HDL콜레스테롤 전환식 = {(원자료) * 0.86}+2.98	

Ⅲ-4-3. 고중성지방혈증 유병률

정의	중성지방이 200mg/dL 이상인 분율	
산출식	분자	중성지방이 200mg/dL 이상인 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Ⅲ(NCEP-ATPⅢ) 기준, 공복시간 12시간 미만자 또는 지방성 및 용혈 검체 제외	

Ⅲ-4-4. 고콜레스테롤혈증 인지율

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증을 받은 분율	
산출식	분자	의사로부터 고콜레스테롤혈증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

Ⅲ-4-5. 고콜레스테롤혈증 치료율

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 분율	
산출식	분자	콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

Ⅲ-4-6. 고콜레스테롤혈증 조절률(유병자 기준)

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

Ⅲ-4-7. 고콜레스테롤혈증 조절률(치료자 기준)

정의	고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 치료자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

5. 폐쇄성폐질환

Ⅲ-5-1. 폐쇄성폐질환 유병률

정의	폐기능 검사 결과 기류제한이 있는 분율	
산출식	분자	FEV1/FVC의 실제수치가 0.7미만인 사람 수
	분모	만40세이상 폐기능 대상자 수
단위	%	
비고	적합성을 만족하고 재현성 0.15mL 미만인 경우만 유병률 산출	

6. 구강질환

Ⅲ-6-1. 영구치우식 경험률

정의	치아에 발생된 우식증(충치)을 1개 이상 경험한 분율 즉, 현재 충치가 있거나, 충치치료를 받았거나, 충치로 인해 치아를 상실한 경험이 있는 분율	
산출식	분자	우식경험 치아를 1개 이상 보유하고 있는 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-6-2. 우식경험영구치지수

정의	한 사람당 보유하고 있는 우식경험영구치수(평균)	
산출식	분자	연령대별 영구치우식을 경험한 치아 수의 합
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	개	

Ⅲ-6-3. 영구치우식 유병률

정의	치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분율	
산출식	분자	영구치 우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-6-4. 치면세마필요자율

정의	치면세마(치석제거)이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율	
산출식	분자	현재 치석제거 이상의 치주질환 치료가 필요한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-6-5. 치주질환 유병률

정의	치주조직병치료 이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율	
산출식	분자	현재 치주조직병치료 이상의 치주질환 치료가 필요한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수(CPI 6개 분악 모두 폐쇄분악인 경우 제외)
단위	%	
비고	HP2010 기준 대표 연령은 35-44세임 제5기(2010-2012) 구강검사 조사원 교육 시 치주탐침가압훈련 도입	

Ⅲ-6-6. 현존 자연치아 수

정의	한 사람이 보유하고 있는 평균 자연치아 수	
산출식	분자	만19세이상 성인의 자연치아 수 총 합(제3대구치 포함)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	개	
비고	HP2010 기준 대표 연령은 65-74세임 한 사람이 보유하는 최대 자연치아 수는 사랑니를 포함하여 32개임	

Ⅲ-6-7. 20개이상 치아보유율

정의	20개 이상의 자연치아를 보유하고 있는 사람의 분율	
산출식	분자	20개 이상의 치아를 보유하고 있는 사람의 수(제3대구치 포함)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-6-8. 의치필요자율

정의	상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람의 분율	
산출식	분자	상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-6-9. 저작불편호소율

정의	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율	
산출식	분자	'매우 불편하다' 또는 '불편하다'라고 응답한 사람 수(응답보기 : ①② 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	HP2010 기준 대표 연령은 65세 이상임 제4기(2007-2009) 자기기입 방법에서 제5기(2010-2012) 면접설문 방법으로 조사방법 변경	

Ⅲ-6-10. 구강검진율

정의	최근 1년 이내 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수(응답보기 : ① 해당)
	분모	만19세이상 대상자수
단위	%	

Ⅲ-6-11. 칫솔질 실천율

정의	어제 하루 동안 시기별 칫솔질을 실천한 분율	
산출식	분자	각 보기별 응답한 사람 수(응답보기 : ①②③④⑤⑥⑦⑧ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

7. B형간염

Ⅲ-7-1. B형간염 표면항원 양성률

정의	B형간염 표면항원 양성인 분율	
산출식	분자	B형간염 표면항원 양성인 사람의 수
	분모	만10세이상 대상자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

8. 빈혈

Ⅲ-8-1. 빈혈 유병률

정의	현재 빈혈을 가지고 있는 분율	
산출식	분자	헤모글로빈(g/dL)이 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신 여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만에 해당하는 사람 수
	분모	만10세이상 대상자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

9. 안질환

Ⅲ-9-1. 시력장애 유병률

정의	단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32 이하인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32 이하인 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※WHO ICD(International Statistical Classification of Diseases) - 10th Revision 정의 Visual impairment : 최대교정시력 0.33 미만(＜6/18)	

Ⅲ-9-2. 근시 분포

정의	단안 또는 양안이 근시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 근시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-3. 근시 유병률

정의	단안 또는 양안이 근시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 근시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※구면렌즈 대응치(SE) = Dsph+(-실린더(Dcyl)/2) ※근시 : 구면렌즈 대응치 -0.75D 이하	

Ⅲ-9-4. 원시 분포

정의	단안 또는 양안이 원시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 원시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-5. 원시 유병률

정의	단안 또는 양안이 원시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 원시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※원시 : 구면렌즈 대응치(SE) +1.0D 이상	

Ⅲ-9-6. 난시 분포

정의	단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-7. 난시 유병률

정의	단안 또는 양안이 난시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 난시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※난시 : 실린더(Dcyl) 0.75D 이상	

Ⅲ-9-8. 사시 유병률

정의	수평사시(10 PD 이상 내편위 또는 15 PD 이상 외편위)이거나, 수직사시이거나, 기타사시인 분율	
산출식	분자	수평사시(10 PD 이상 내편위 or 15 PD 이상 외편위)이거나, 수직사시이거나, 기타사시인 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-9. MRD1 분포

정의	단안 또는 양안의 MRD1이 4.0mm이상, 3-3.9mm, 2-2.9mm, 1-1.9mm, 1.0mm미만의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 MRD1이 4.0mm 이상, 3-3.9mm, 2-2.9mm, 1-1.9mm, 1.0mm미만의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※MRD1 : 각막반사점부터 위눈꺼풀테까지의 거리	

Ⅲ-9-10. 안검하수 유병률

정의	단안 또는 양안의 MRD1이 2.0mm 미만인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 MRD1이 2.0mm 미만인 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※MRD1 : 각막반사점부터 위눈꺼풀테까지의 거리	

Ⅲ-9-11. 백내장 유병률

정의	단안 또는 양안이 백내장이거나, 인공수정체안이거나, 무수정체안인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 백내장이거나, 인공수정체안이거나, 무수정체안인 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-12. 군날개 유병률

정의	단안 또는 양안에 군날개가 있는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안에 군날개가 있는 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-9-13. 당뇨망막병증 유병률

정의	당뇨병 유병자 중 단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 당뇨망막병증 혹은 유사소견이 있는 사람의 분율	
산출식	분자	당뇨병 유병자 중 단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 당뇨망막병증 혹은 유사소견이 있는 사람의 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	※당뇨병 유병자 :공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여받고 있는 분율	

Ⅲ-9-14. 나이관련황반변성 유병률

정의	단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 나이관련황반변성이 있는 사람의 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 나이관련황반변성이 있는 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

10. 이비인후질환

Ⅲ-10-1. 만성중이염 유병률

정의	만성중이염이 있는 분율	
산출식	분자	일측 혹은 양측 고막의 천공 또는 진주종(함입낭, 진주종, 선천성 진주종)이 있는 사람의 수
	분모	만4세이상 고막관찰이 가능한 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-2. 일측성 난청 유병률

정의	일측의 청력에 중등도이상의 난청이 있는 분율	
산출식	분자	일측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB이상인 사람의 수
	분모	만12세이상 청력검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-3. 양측성 난청 유병률

정의	양측의 청력에 모두 중등도이상의 난청이 있는 분율	
산출식	분자	양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB이상인 사람의 수
	분모	만12세이상 청력검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-4. 평형기관이상 유병률

정의	어지럼증 검사 미통과 한 분율	
산출식	분자	어지럼증 검사 미통과(조건1~2 15초미만, 조건3~4 20초미만)한 사람의 수
	분모	만40세이상 어지럼증검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-5. 비염 유병률

정의	비염증상을 경험한 분율	
산출식	분자	최근 1년이내 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 사람의 수
	분모	만6세이상 설문 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-6. 만성 비부비동염 유병률

정의	만성 비부비동염이 있는 분율	
산출식	분자	3개월이상 주증상(비루 혹은 후비루, 코막힘, 안면부 동통이나 압박감, 후각장애) 중 비루 혹은 후비루, 코막힘 중 1개이상을 포함하여 2개이상이 지속되거나 또는, 수축후 비강검사에서 비용종이 있는 사람의 수
	분모	만12세이상 대상자수
단위	%	

Ⅲ-10-7. 비중격만곡증 유병률

정의	비중격만곡증이 있는 분율	
산출식	분자	수축후 비강검사에서 비중격만곡증이 있는 사람의 수
	분모	만12세이상 수축후 비강검사 받은 대상자수
단위	%	

Ⅲ-10-8. 후각장애 유병률

정의	후각장애를 경험한 분율	
산출식	분자	후각장애가 3개월이상 지속되고 있는 사람의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-9. 후두양성점막질환 유병률

정의	후두양성점막질환이 있는 분율	
산출식	분자	후두내시경검사 상 일측 혹은 양측에 성대폴립이나 성대결절이나 라인케부종이 있는 사람의 수
	분모	만19세이상 후두내시경검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-10. 본인 인지 음성장애 유병률

정의	본인 인지 음성장애를 경험한 분율	
산출식	분자	현재 본인의 목소리에 이상을 경험한 사람의 수
	분모	만19세이상 설문 대상자 수
단위	%	

11. 골다공증

Ⅲ-11-1. 골다공증 유병률

지표	골다공증 유병률	
정의	대퇴경부, 대퇴골, 요추 골밀도 검사결과 가장 낮은 T-score가 -2.5 이하인 분율	
산출식	분자	검사결과 가장 낮은 T-score가 -2.5 이하인 대상자 수
	분모	폐경 후 여자, 만50세이상 남자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

Ⅲ-11-2. 골감소증 유병률

지표	골감소증 유병률(T-score 기준)	
정의	대퇴경부, 대퇴골, 요추 골밀도 검사결과 가장 낮은 T-score가 -2.5 초과 -1.0미만인 분율	
산출식	분자	검사결과 가장 낮은 T-score가 -2.5 초과 -1.0 미만인 대상자 수
	분모	폐경 후 여자, 만50세이상 남자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

12. 골관절염

Ⅲ-12-1. 골관절염 유병률

정의	무릎관절 또는 엉덩관절에 골관절염이 있는 분율	
산출식	분자	무릎관절 통증이 있고 무릎관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상 또는 엉덩관절 통증이 있고 엉덩관절 Kellgren Lawrence 등급이 2 이상인 대상자 수
	분모	만50세이상 설문 및 방사선촬영 대상자 수
단위	%	

13. 기타질환

Ⅲ-13-1. 뇌졸중 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 뇌졸중을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 뇌졸중을 진단받은 사람 수
	분모	만50세이상 대상자 수
단위	%	
설문	5.의사로부터 뇌졸중(중풍) 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-2. 협심증 또는 심근경색증 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 협심증 또는 심근경색증을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 협심증 또는 심근경색증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	6.의사로부터 심근경색증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 7.의사로부터 협심증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-3. 위암 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 위암을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 위암을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	31.의사로부터 위암 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-4. 대장암 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 대장암을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 대장암을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	33.의사로부터 대장암 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-5. 유방암 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 유방암을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 유방암을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 여자 대상자 수
단위	%	
설문	34.의사로부터 유방암 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-6. 자궁경부암 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 자궁경부암을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 자궁경부암을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 여자 대상자 수
단위	%	
설문	35.의사로부터 자궁경부암 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-7. 천식 유병률

정의	최근 1년 동안 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	15-11.최근 1년 동안 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-8. 운동유발성천식유병률

정의	최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	15-12.최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-9. 아토피피부염 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 아토피피부염을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 아토피피부염을 진단받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	22.의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-10. 류마티스성관절염 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 류마티스성 관절염을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 류마티스성 관절염을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	10.의사로부터 류마티스성관절염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-11. 우울증 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 우울증을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 우울증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	20.의사로부터 우울증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-12. 갑상샘장애 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 갑상샘장애를 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 갑상샘장애를 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	27.의사로부터 갑상선장애 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-13. C형간염 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 C형간염을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 C형간염을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	41.의사로부터 C형간염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-14. 간경변증 유병률

정의	평생 동안 의사로부터 간경변증을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 간경변증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	42.의사로부터 간경변증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-15. 선천성심장질환 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 선천성심장질환을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 선천성심장질환을 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	4.지금까지 살아오면서 선천성심장질환을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-16. 주의력결핍장애 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 주의력결핍장애를 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 주의력결핍장애를 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	8.지금까지 살아오면서 주의력결핍장애를 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-17. 요로감염 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 요로감염을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 요로감염을 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	12.지금까지 살아오면서 요로감염을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅲ-13-18. 폐렴 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 폐렴을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 폐렴을 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	16.지금까지 살아오면서 폐렴을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅳ. 삶의 질

Ⅳ-1-1. 주관적건강인지율

정의	평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율	
산출식	분자	'①매우좋음' 또는 '②좋음'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.평소에 ○○○님의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ①매우 좋음 ②좋음 ③보통 ④나쁨 ⑤매우 나쁨	

Ⅳ-1-2. EQ-5D 지수

정의	건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표
산출식	질병관리본부(2007) 질 가중치 사용
설문	<삶의 질> EQ-5D www.euroqol.org 참조
비고	질병관리본부(남해성 등, 2007) 질 가중치 사용

Ⅳ-1-3 EQ-VAS

정의	시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태	
산출식	분자	건강상태 점수의 총합
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	점	
설문	<삶의 질> EQ-5D www.euroqol.org 참조	

Ⅳ-1-4. 활동제한율

정의	현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까? ①예 ②아니오	

Ⅳ-1-5. 월간와병경험률

정의	최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? ①예 ②아니오	

Ⅳ-1-6 월간결근결석경험률

정의	취업자 또는 재학생 중 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 취업자 또는 재학생 수
단위	%	
설문	3.최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 ⑧직장 또는 학교에 다니지 않음	

Ⅳ-1-7. 2주간 이환율

정의	최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

V. 소득 분류 기준

V-1. 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액

(단위: 만원)

제5기 1차년도(2010)									
구분	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	구분	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
남자					여자				
1-4	231	111.80	150.00	238.14	1-4	254	122.47*	170.10*	216.51*
5-9	338	122.47*	166.67*	245.97*	5-9	307	126.17	187.50	250.00
10-14	365	122.47*	198.33*	270.83*	10-14	307	104.17*	173.21*	242.24*
15-19	232	111.80	174.10	257.52	15-19	222	87.80	150.00	250.00
20-24	116	105.12	173.21	230.05	20-24	189	120.00	185.75	282.84
25-29	199	114.00	178.89	250.00	25-29	259	138.64	200.00	272.17
30-34	230	120.28	166.67	229.17	30-34	338	125.09	177.83	241.00
35-39	349	125.00	191.88*	248.33*	35-39	411	130.44	192.45	259.81
40-44	330	125.00*	198.33*	290.69*	40-44	340	119.84	192.45	270.83
45-49	261	125.00	200.00	279.17*	45-49	327	125.00	201.25	291.67
50-54	265	141.42	214.66	300.00	50-54	381	123.33*	187.92*	287.79*
55-59	246	122.47	179.24	282.84	55-59	332	104.30	162.48	250.00
60-64	255	94.05	163.30	240.56	60-64	287	68.13	113.39	176.78
65-69	236	58.14*	101.25	168.05	65-69	285	42.43	70.71	147.31
70-74	210	41.25	70.71	141.42	70-74	250	35.83	62.59	134.16
75+	196	35.36	63.57	121.42	75+	276	33.42	61.47	148.78
가구	3,229	75.66	147.31	230.94					

* 소득수준을 월평균가구균등화소득[1]에 따라 성·연령별 4개 군으로 등분하기 위해 4분위수 일부 조정한 값

1) 월가구균등화소득 = 월가구소득/$\sqrt{\text{가구원수}}$

(계속 : 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액)

	제1기(1998)				제2기(2001)				제3기(2005)			
	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
남자												
1-4	1,210	45.00	67.08	98.39*	1,071	61.24	85.00	115.00	747	80.00	115.00*	150.00
5-9	1,541	46.19	69.40	98.39*	1,508	65.00	90.00	125.00	1,258	76.03	122.73	173.21*
10-14	1,493	40.41	61.24	95.00	1,388	67.08	98.39*	125.00	1,353	80.00	125.00	175.00
15-19	1,673	38.01*	58.14*	89.44	1,295	60.00	89.44	125.00	1,047	75.00	115.47	173.21
20-24	1,048	40.00	58.14*	94.75	897	56.69*	86.60	122.47*	822	80.00	115.87	161.66
25-29	1,538	44.55*	70.00	103.92	1,301	63.51	91.92	140.00*	1,079	91.92	133.33	180.00
30-34	1,613	49.50	73.48*	103.92	1,556	65.86	90.00	134.35	1,343	92.38	132.79	180.00
35-39	1,771	49.50*	70.50*	100.00	1,573	70.00	98.39*	130.00	1,350	88.33*	125.00	178.89
40-44	1,635	44.72	67.08	99.73*	1,658	70.00	98.39*	134.16	1,464	86.60	125.00	180.00
45-49	1,178	40.41*	65.32*	98.99*	1,249	69.28	98.99*	141.42	1,353	89.44	134.16	197.99*
50-54	985	40.41	61.24	98.39*	855	67.08	98.99	141.42	997	86.60	134.16	190.00
55-59	951	35.00	56.69*	91.92	813	56.57	85.00*	125.00	907	70.71	115.47	173.21
60-64	866	26.54	42.43	70.71	705	40.82*	65.00	100.00	765	56.57	90.00	143.11
65-69	563	21.21	35.36	56.57	583	34.64	50.00	81.65	688	41.57*	70.00*	113.14
70-74	370	15.00	30.00	54.85	302	28.28	42.43	77.78	420	31.82	55.52*	93.46
75+	335	13.42*	25.00*	53.07	317	21.21	40.00	70.71	370	27.00*	43.84	84.85*
여자												
1-4	1,062	44.72	66.40*	98.15*	910	64.25*	86.60	115.47	739	75.00	110.00	150.00
5-9	1,365	44.72	65.00	99.73*	1,357	65.00*	89.44	122.47*	1,183	76.03	115.47	160.00
10-14	1,386	40.41	61.24	86.60*	1,188	65.00	90.00	125.00	1,269	75.59	125.00	175.00
15-19	1,620	38.01*	58.14*	86.60*	1,222	58.14*	87.50*	122.47*	964	69.28	111.80	165.00
20-24	1,370	43.33	69.28	92.38	1,242	65.00	96.49	132.79	1,132	89.44	125.00	173.21
25-29	1,638	49.50*	70.71	103.92	1,452	68.03*	98.99*	140.00*	1,217	90.00	132.79	178.89
30-34	1,628	49.50*	70.71	100.00	1,589	67.08	90.00	125.00	1,410	86.60	125.00	175.00
35-39	1,796	46.19	69.28	99.73*	1,632	70.00	98.39*	135.00	1,432	87.50*	125.00	178.89
40-44	1,593	44.50*	67.08	98.39*	1,663	67.08	98.99*	132.79	1,551	86.60	125.00	180.00
45-49	1,143	40.00	60.00	94.49	1,195	60.00	98.99	141.42	1,420	85.00*	132.79	184.30
50-54	1,010	35.00*	57.74	98.99*	936	53.03*	84.85	122.47	1,090	70.71	115.47	173.21
55-59	1,071	28.28	44.72	70.71	851	42.43	70.00*	110.23	915	57.74	100.00	150.00
60-64	1,038	21.21	35.36	57.74	844	34.64	56.57	86.60	901	42.43	70.00*	120.00
65-69	745	17.32	31.11	56.69	691	28.87*	49.50	81.65	823	35.00	57.74	101.82
70-74	580	15.00	29.70*	53.35	510	25.98	44.72	85.00	616	29.70*	49.16	89.44
75+	736	16.50	34.64	66.04	658	25.00	49.75	80.83*	770	28.99*	52.48	106.07
가구	12,191	34.60	57.5*	89.40	11,489	50.00	85.00	123.70*	11,850	58.70	105.1*	163.30

(계속 : 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액)

	제4기 1차년도(2007)				제4기 2차년도(2008)				제4기 3차년도(2009)			
	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
남자												
1-4	143	94.49	134.16	170.00	257	98.15	137.50	188.98	304	98.39*	142.89*	200.00
5-9	209	89.44	125.22	201.25	402	89.44	134.16	187.50	385	98.39	144.34	208.33
10-14	190	71.81	125.00	190.00	419	90.00	149.07	204.97	406	86.60*	149.07*	217.73*
15-19	107	67.08	130.00	210.00	258	89.44	135.00*	204.12*	324	89.44*	149.07*	229.17*
20-24	64	49.60	90.83	151.03	148	55.00*	106.07	173.21	179	80.83*	138.56*	208.33*
25-29	92	67.08	120.14	174.99	197	85.00	141.42	212.13	290	100.17	155.88	230.94
30-34	125	89.44	140.00*	183.33	269	98.15*	141.42*	212.13	289	100.00	144.34	213.62
35-39	175	98.99*	144.34	202.07	380	102.06*	150.00*	215.00*	348	100.00	150.00	208.33
40-44	133	98.39	149.07	223.61	310	100.00	149.07	200.00	342	111.80	166.67	240.56*
45-49	140	84.97	139.25	202.07*	296	95.00*	149.07*	223.61	345	100.00	150.00	250.00
50-54	114	80.83	128.64	212.13	263	89.44	145.83	213.62	315	95.00	150.00	240.56
55-59	104	55.00*	103.92*	75.00*	240	70.71	120.28*	192.69*	256	86.60	150.00	245.18
60-64	106	56.57*	88.02	144.34	228	50.00*	98.99	145.83*	292	57.74	106.07	171.12
65-69	123	30.00	57.74	117.85	213	34.64*	56.57	116.67	261	56.57	77.78	141.42
70-74	102	21.21	41.63	90.00	198	25.00	46.19	86.60	223	34.02	56.69	111.80
75+	70	20.00	33.51	58.93*	162	19.25*	34.64*	69.28*	224	30.00	45.00	75.59
여자												
1-4	107	86.60	130.00	166.67*	264	93.17*	130.00*	186.34*	239	95.00	125.00	175.00
5-9	183	93.17	130.00	186.34	382	95.83*	136.08*	200.00	358	89.44	140.00	200.00
10-14	164	89.44	134.16	208.33	359	81.65	133.33	200.00	379	98.99*	147.58	208.33*
15-19	115	78.74	127.28	200.00	242	81.65	130.44	200.00	312	74.54	131.25	208.33
20-24	76	69.34	130.00	200.00	220	70.71*	106.07*	190.53*	243	87.50*	143.11	208.33
25-29	122	89.44	137.36	173.21	296	89.44*	142.89*	219.39*	312	104.17	151.67	230.94
30-34	199	98.39*	130.44	186.34	360	98.39*	137.50	192.45	398	100.00	144.34	204.12
35-39	203	98.66*	149.07*	208.33	476	98.15*	149.07*	206.24*	459	100.00	150.00	229.17
40-44	158	95.00	149.54	210.00	404	100.00	149.07*	219.39*	426	100.00	150.00	235.70
45-49	169	69.40	122.47*	201.25	355	83.33	144.34	208.33	453	98.99*	150.00	250.00
50-54	157	60.00*	127.28	176.78	360	72.17*	127.28*	204.12*	417	80.00	141.42	229.17*
55-59	148	50.00	86.60	150.06	290	50.00	91.92*	153.21	301	70.71	134.72	212.13
60-64	120	35.11	68.18	138.04	296	38.00*	60.00*	116.67*	336	49.50*	84.85*	144.34
65-69	156	24.06	42.43	83.33	329	25.98*	44.72*	88.39	340	35.00*	56.57*	105.83*
70-74	129	18.33*	33.68*	74.54*	255	21.21	35.36	93.10*	301	30.00	44.72	80.83
75+	126	20.00	40.00	85.00	314	22.00	40.41*	106.07	351	29.70*	47.38	106.07
가구	1,605	46.20	100.00	170.00	3,570	49.50	106.07	176.78	3,928	57.74	115.47	192.45

제 2 장 조 사 표

Ⅰ. 건강설문조사
- Ⅰ-1. 성인용
- Ⅰ-2. 청소년용
- Ⅰ-3. 소아용

Ⅱ. 영양조사
- Ⅱ-1. 식품섭취조사표
- Ⅱ-2. 식생활조사표
- Ⅱ-3. 식품섭취빈도조사표

Ⅲ. 검진조사

Ⅰ. 건강설문조사

Ⅰ-1. 성인용

■

0 0 1

가구조사설문

가구공통설문

1~6번까지의 질문은 귀하의 가구에 대한 질문입니다.

1. 귀하의 세대에 동거하고 있는 사람은 몇 명입니까? (1-1)

□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. (1-2) 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	10 1인 가구	11 부부 (응답자+배우자)	12 부부+미혼 형제자매
	13 응답자+미혼 형제자매	14 부부+기타 친인척	15 응답자+기타 친인척
	19 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구		

2세대	21 부부+미혼자녀	22 편부+미혼자녀	23 편모+미혼자녀
	24 부부+양친	25 부부+편부/편모	26 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매
	27 조부모+미혼 손자녀	28 편조부/편조모+미혼 손자녀	29 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구

3세대	31 부부+미혼자녀+양친	32 부부+미혼자녀+편부/편모	39 기타 : 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구

3. (1-3) 귀 가구는 현재 기초생활 수급자 (구. 생활보호대상자 혹은 영세민)에 해당됩니까?

1 그렇다
2 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
3 아니다

4. (1-4) 귀 가구는 주택을 한 채 이상 소유하고 계십니까?

1 아니다
2 1채 있다
3 2채 이상 있다

■

■

0 0 2

5. (2-1) 지금 살고계신 집은 다음 중 어떤 형태에 해당합니까?

1 단독주택
2 아파트
3 연립주택
4 다세대주택
5 영업용 건물 내 주택
6 기타 (_____) (2-2)

6. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(2-3) (기준기간) 1 연 2 월

(2-4) (소득액) □□□□□□만원 (무응답인 경우 999999로 기재)

■

0 0 3

가구원설문

지금부터의 질문은 가구원 개개인에 대한 질문입니다.

7. 이름은 무엇입니까?

8. 성별은 무엇입니까? 1 남자 2 여자

9. 실제 생년월일은 언제입니까? 음력/양력을 구분해서 말씀해 주십시오.

1 양력 2 음력 □□□□ 년 □□ 월 □□ 일

10. OOO님은 결혼한 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

10-1. 있다면, 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까?
1 배우자가 있으며, 함께 살고 있음 (사실혼 상태 포함)
2 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음 (출장 등의 일시적 상태 제외)
3 배우자 사망으로 배우자가 없음
4 이혼으로 배우자가 없음
8 응답거부
9 모름

11. OOO님(가구원명)은 가구주와 어떤 관계입니까?

1 본인 2 배우자 3 자녀 4 자녀배우자
5 손자녀 6 부모 7 조부모 8 형제자매
9 기타친척 10 비혈연

12. OOO님은 어떤 건강보험에 가입되어 있습니까?

1 국민건강보험(지역)
2 국민건강보험(직장)
3 의료급여 1종
4 의료급여 2종
5 미가입
9 모름

13. OOO 님은 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고보장보험 등의 의료비를 보조해 주는 민간의료보험에 가입했습니까?

1 가입했다
2 가입하지 않았다
9 모름

■

0 0 4

가구조사 응답표

	응답자	가구원 1	가구원 2	가구원 3	가구원 4	가구원 5	가구원 6
이름	(4-1)	(4-12)	(4-23)	(4-34)	(4-45)	(4-56)	(4-67)
성별	(4-2) [1] 남자 [2] 여자	(4-13) [1] 남자 [2] 여자	(4-24) [1] 남자 [2] 여자	(4-35) [1] 남자 [2] 여자	(4-46) [1] 남자 [2] 여자	(4-57) [1] 남자 [2] 여자	(4-68) [1] 남자 [2] 여자
실제 생년 월일	(4-3) 년 (4-4) 월 (4-5) 일	(4-14) 년 (4-15) 월 (4-16) 일	(4-25) 년 (4-26) 월 (4-27) 일	(4-36) 년 (4-37) 월 (4-38) 일	(4-47) 년 (4-48) 월 (4-49) 일	(4-58) 년 (4-59) 월 (4-60) 일	(4-69) 년 (4-70) 월 (4-71) 일
	(4-6) [1] 양력 [2] 음력	(4-17) [1] 양력 [2] 음력	(4-28) [1] 양력 [2] 음력	(4-39) [1] 양력 [2] 음력	(4-50) [1] 양력 [2] 음력	(4-61) [1] 양력 [2] 음력	(4-72) [1] 양력 [2] 음력
결혼 여부	(4-7) [1] 예 [2] 아니오	(4-18) [1] 예 [2] 아니오	(4-29) [1] 예 [2] 아니오	(4-40) [1] 예 [2] 아니오	(4-51) [1] 예 [2] 아니오	(4-62) [1] 예 [2] 아니오	(4-73) [1] 예 [2] 아니오
결혼 상태	(4-8) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-19) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-30) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-41) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-52) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-63) [1] [2] [3] [4] [8] [9]	(4-74) [1] [2] [3] [4] [8] [9]
가구주와의 관계	(4-9) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-20) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-31) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-42) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-53) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-64) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]	(4-75) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
건강 보험	(4-10) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-21) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-32) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-43) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-54) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-65) [1] [2] [3] [4] [5] [9]	(4-76) [1] [2] [3] [4] [5] [9]
민간 보험 가입 여부	(4-11) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-22) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-33) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-44) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-55) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-66) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름	(4-77) [1] 가 입 [2] 비가입 [9] 모 름

■

005

이환

지금부터 건강과 관련된 사항에 대한 질문을 하도록 하겠습니다.
제가 하는 질문을 잘 듣고 해당되는 보기에 응답해주십시오.

(5-1) 1. 평소에 OOO님의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

1 매우 좋음
2 좋음
3 보통
4 나쁨
5 매우 나쁨

(5-2) 2. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨⇨ 2-1. 있었다면 며칠입니까? □□ (5-3) 일
2 아니오

(5-4) 3. 최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

(5-5) 4. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

0 0 6

이제부터 우리나라 국민들이 많이 앓고 있는 질병들에 대해서 물어보도록 하겠습니다.
제가 하는 질문을 잘 들으시고, 본인에게 해당되는 내용을 응답해주시기 바랍니다.

A. 순환기계에 대한 질문입니다.

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
5. 고혈압	(6-1) Y N	(6-2) □	(6-3) 만 세	(6-4) □	(6-5) □
6. 이상지혈증	(6-6) Y N	(6-7) □	(6-8) 만 세	(6-9) □	(6-10) □
7. 뇌졸중(중풍)	(6-11) Y N	(6-12) □	(6-13) 만 세	(6-14) □	(6-15) □
8. 심근경색증	(6-16) Y N	(6-17) □	(6-18) 만 세	(6-19) □	(6-20) □
9. 협심증	(6-21) Y N	(6-22) □	(6-23) 만 세	(6-24) □	(6-25) □

고혈압

5-6. (6-26) 혈압조절을 위해 현재 혈압약을 복용하십니까?

1 매일 복용함
2 한달에 20일 이상 복용함
3 한달에 15일 이상 복용함
4 한달에 15일 미만 복용함
5 복용하지 않음

이상지혈증

6-6. (6-27) 혈중 콜레스테롤을 낮추기 위해 현재 약을 복용하고 있습니까?

1 매일 복용함
2 한달에 20일 이상 복용함
3 한달에 15일 이상 복용함
4 한달에 15일 미만 복용함
5 복용하지 않음

뇌졸중

7-6. (6-28) 뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있습니까?

1 후유증을 앓고 있다
2 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다
3 특별한 후유증이 없었다

■

0 0 7

B. 근골격계에 대한 질문입니다.					
	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
10. 골관절염	(7-1) Y N	(7-2) □	(7-3) 만 세	(7-4) □	(7-5) □
11. 류마티스성 관절염	(7-6) Y N	(7-7) □	(7-8) 만 세	(7-9) □	(7-10) □

C. 호흡기계에 대한 질문입니다.					
	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
12. 폐결핵	(7-11) Y N	(7-12) □	(7-13) 만 세	(7-14) □	(7-15) □
13. 천식	(7-16) Y N	(7-17) □	(7-18) 만 세	(7-19) □	(7-20) □

폐결핵

(7-21)
12-6. 폐결핵을 치료하기 위해 주로 이용하거나 과거에 이용했던 의료기관은 어디입니까?

1 보건소

2 병의원

3 기타 (_____) (7-22)

천식

(7-23)
13-6. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서, 약을 복용하거나 흡입했습니까?

1 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음

2 증상이 있을 때만 치료를 받음

3 치료받지 않음

■

0 0 8

D. 내분비 대사성 질환에 대한 질문입니다.

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
14. 당뇨병	(8-1) Y N	(8-2) □	(8-3) 만 세	(8-4) □	(8-5) □
15. 갑상샘 질환	(8-6) Y N	(8-7) □	(8-8) 만 세	(8-9) □	(8-10) □

당뇨병

14-6. (8-11) 혈당을 관리하기 위해 치료를 받고 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

14-6-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

(8-12) 1 인슐린 주사
(8-13) 2 당뇨병약 (경구 혈당강하제)
(8-14) 3 비약물요법 (운동, 식사요법)
(8-15) 4 기타 (_____ (8-16))

E. 암에 대한 질문입니다.

		지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
16. 암1	(8-18) ( ) (8-17) 1 2 3 4 5 6 7 8	(8-19) Y N	(8-20) □	(8-21) 만 세	(8-22) □	(8-23) □
17. 암2	(8-25) ( ) (8-24) 1 2 3 4 5 6 7 8	(8-26) Y N	(8-27) □	(8-28) 만 세	(8-29) □	(8-30) □
18. 암3	(8-32) ( ) (8-31) 1 2 3 4 5 6 7 8	(8-33) Y N	(8-34) □	(8-35) 만 세	(8-36) □	(8-37) □

보기 1위암 2간암 3대장암 4유방암 5자궁경부암 6폐암 7갑상샘암 8기타( )

0 0 9

F. 기타질환에 대한 질문입니다.

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
19. 우울증	(9-1) Y N	(9-2) □	(9-3) 만 세	(9-4) □	(9-5) □
20. 아토피 피부염	(9-6) Y N	(9-7) □	(9-8) 만 세	(9-9) □	(9-10) □
21. 신부전	(9-11) Y N	(9-12) □	(9-13) 만 세	(9-14) □	(9-15) □
22. B형간염	(9-16) Y N	(9-17) □	(9-18) 만 세	(9-19) □	(9-20) □
23. C형간염	(9-21) Y N	(9-22) □	(9-23) 만 세	(9-24) □	(9-25) □
24. 간경변증	(9-26) Y N	(9-27) □	(9-28) 만 세	(9-29) □	(9-30) □

다음은 만성질환을 예방하고 관리하는 방법의 교육여부에 대한 질문입니다.
진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외합니다.

- ○○질환의 예방 및 관리방법을 교육받은 적이 있습니까?
- 이 질환의 예방 및 관리교육은 어디에서 받았는지 모두 응답해 주세요

	25. 고혈압	26. 당뇨병	27. 관절염	28. 천식
교육여부	(9-31) 1 예 2 아니오	(9-38) 1 예 2 아니오	(9-45) 1 예 2 아니오	(9-52) 1 예 2 아니오
교육장소	(9-32) 1 병의원 (9-33) 2 보건소 (9-34) 3 한방병원 (9-35) 4 공개강좌등 (9-36) 5 기타( ) (9-37)	(9-39) 1 병의원 (9-40) 2 보건소 (9-41) 3 한방병원 (9-42) 4 공개강좌등 (9-43) 5 기타( ) (9-44)	(9-46) 1 병의원 (9-47) 2 보건소 (9-48) 3 한방병원 (9-49) 4 공개강좌등 (9-50) 5 기타( ) (9-51)	(9-53) 1 병의원 (9-54) 2 보건소 (9-55) 3 한방병원 (9-56) 4 공개강좌등 (9-57) 5 기타( ) (9-58)

0 1 0

29~32번 문항은 <u>만 40세 이상</u> 성인만 해당되며 최근 3개월 동안 30일 이상 증상이 있었던 항목에 응답해주십시오.

(10-1)
8 비해당(만 40세미만)

29. (10-2) 최근 3개월동안 30일 이상 무릎관절통이 있었습니까?

1 있다 ⇨
2 없다

29-1. 약물복용과 상관없이 무릎관절 통증의 정도는 평균적으로 얼마입니까?
0~10점으로 표시해주세요.

□□ 점

(10-3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

30. (10-4) 최근 3개월동안 30일 이상 아침에 일어난 후 무릎강직이 있었습니까?

1 있다 ⇨
2 없다

30-1. (10-5) 무릎강직의 지속시간은 얼마나 되었습니까?

1 30분 미만 2 30분~1시간 3 1시간 이상

31. (10-6) 최근 3개월동안 30일 이상 엉덩관절통이 있었습니까?

1 있다 ⇨
2 없다

31-1. 약물복용과 상관없이 엉덩관절 통증의 정도는 평균적으로 얼마입니까?
0~10점으로 표시해주세요.

□□ 점

(10-7) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

32. (10-8) 최근 3개월동안 30일 이상 요통이 있었습니까?

1 있다
2 없다

0 1 1

의료이용

(11-1)
1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨ (11-2) 1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

2 아니오

1 경제적인 이유로
2 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
3 교통편이 불편해서
4 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서
5 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서
6 증상이 가벼워서
7 기타 (_____) (11-3)

건강검진 및 예방접종

1. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

(11-4)
1-1. 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

(11-5)
1-2. 최근 1년 동안 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

0 1 2

(12-1)
2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

2-1. 최근 2년 동안 받아보신 건강검진에 모두 표시해 주십시오.

(12-2) 1 본인부담 종합건강검진
(12-3) 2 산업장 특수건강검진(유해물질 폭로 직종 종사자를 대상으로 함)
(12-4) 3 국민건강보험공단 일반건강검진(지역가입자, 직장가입자)
(12-5) 4 무료건강검진(국민건강보험공단 이외의 국가건강검진 등)
(12-6) 5 기타 (_____) (12-7)

다음은 암검진에 대한 질문입니다. 가장 최근에 받은 암검진을 받은 때를 응답해 주시기 바랍니다. 암검사는 암으로 인한 증상을 느끼기 전에, 검사를 하는 것을 의미합니다.

(12-8)
3. 위암검사(위내시경 또는 위장조영술)를 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

(12-9)
3-1. 가장 최근에 받아보신 위암검사는 언제입니까?

1 1년 이내에 받았음
2 1년 이상 2년 이내에 받았음
3 2년 이상 되었음

(12-10)
4. 대장암검사(분변잠혈반응검사, 대장내시경 등)를 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

(12-11)
4-1. 가장 최근에 받아보신 대장암검사는 언제입니까?

1 1년 이내에 받았음
2 1년 이상 2년 이내에 받았음
3 2년 이상 5년 이내에 받았음
4 5년 이상 10년 이내에 받았음
5 10년 이상 되었음

0 1 3

5. (12-12) 간암 검사(복부초음파, 혈청알파태아단백검사)를 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

5-1. (12-13) 가장 최근에 받아보신 간암검사는 언제입니까?
1 6개월 이내에 받았음
2 6개월 이상 1년 이내에 받았음
3 1년 이상 2년 이내에 받았음
4 2년 이상 되었음

6. (13-1) (여성분만 응답) 유방암검사(유방단순촬영)를 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

6-1. (13-2) 가장 최근에 받아보신 유방암검사는 언제입니까?
1 1년 이내에 받았음
2 1년 이상 2년 이내에 받았음
3 2년 이상 되었음

7. (13-3) (여성분만 응답)자궁경부암검사(자궁경부도말세포검사)를 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

7-1. (13-4) 가장 최근에 받아보신 자궁경부암검사는 언제입니까?
1 1년 이내에 받았음
2 1년 이상 2년 이내에 받았음
3 2년 이상 되었음

8. (13-5) 최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

8-1. 최근 2년 동안 받아보신 암검진에 모두 표시해 주십시오.
(13-6) 1 본인부담 암검진(종합건강검진 및 병의원, 종합건강검진센터 암검진)
(13-7) 2 본인부담 특정 암검진 (국민건강보험공단 암검진)
(13-8) 3 국민건강보험공단 무료 암검진
(13-9) 4 무료암검진(보건소 및 모자보건센터 등)
(13-10) 5 기타 (_____ (13-11))

0 1 4

활동제한 및 삶의 질

지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고, 제가 묻는 질문에 응답해 주십시오.

1. (14-1) 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨

[2] 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

[1] (14-2) 골절, 관절부상 [2] (14-3) 기타 손상 [3] (14-4) 관절염, 류마티즘

[4] (14-5) 심장질환 [5] (14-6) 호흡문제, 폐질환, 천식 [6] (14-7) 뇌졸중

[7] (14-8) 당뇨병 [8] (14-9) 고혈압 [9] (14-10) 등, 목의 문제

[10] (14-11) 암 [11] (14-12) 치아 및 구강질환 [12] (14-13) 시력문제

[13] (14-14) 청각문제 [14] (14-15) 치매 [15] (14-16) 우울/불안/정서상 문제

[16] (14-17) 정신지체 [17] (14-18) 비만 [18] (14-19) 노령

[19] (14-20) 기타 (_____ (14-21))

2. (14-22) 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (14-23) 일

[2] 아니오

3. (14-24) 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 3-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (14-25) 일

[2] 아니오

[8] 직장 또는 학교에 다니지 않음

0 1 5

아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

(15-1)
4-1. **운동능력**

1 나는 걷는데 지장이 없다

2 나는 걷는데 다소 지장이 있다

3 나는 종일 누워 있어야 한다

(15-2)
4-2. **자기관리**

1 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다

2 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다

3 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

(15-3)
4-3. **일상활동 (예. 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)**

1 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다

2 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다

3 나는 일상 활동을 할 수가 없다

(15-4)
4-4. **통증/불편**

1 나는 통증이나 불편감이 없다

2 나는 다소 통증이나 불편감이 있다

3 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

(15-5)
4-5. **불안/우울**

1 나는 불안하거나 우울하지 않다


2 나는 다소 불안하거나 우울하다

3 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

0 1 6

5. 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 표현하는 것을 돕고자, 당신이 상상할 수 있는 최고의 상태를 100으로, 당신이 상상할 수 있는 최저의 상태를 0으로 표시한 눈금자 (온도계와 비슷함)를 그려 놓았습니다.

당신의 생각에 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를, 아래의 상자로부터, 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 나타낸 눈금자위의 한곳으로 선을 그어서 표시해 주십시오.



오늘
당신의
건강상태

(16-1)
조사원기입

□	0 1
□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 7

손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

□□□□ 년 □□ 월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

[1] 운수사고 [2] 추락/미끄러짐 [3] 부딪힘

[4] 열상/자상/절단/관통상 [5] 화상 [6] 질식

[7] 익수 [8] 중독 [9] 기타 (_____)

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

[1] 응급실

[2] 병의원 외래만 이용

[3] 병의원 병실입원

[4] 기타 (_____)

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

[1] 불의의 사고 [2] 의도적 자해 [3] 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 6-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

[2] 아니오

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 7-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

[2] 아니오

[8] 직장이나 학교에 다니고 있지 않음

0 1 8

손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
(18-1) 1 예 2 아니오	□	(18-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기		(18-3) □□□□ 년 (18-4) □□ 월	(18-14) □□□□ 년 (18-15) □□ 월	(18-25) □□□□ 년 (18-26) □□ 월	(18-36) □□□□ 년 (18-37) □□ 월	(18-47) □□□□ 년 (18-48) □□ 월
3.	발생이유	(18-5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(18-16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(18-27) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(18-38) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(18-49) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	발생이유 기타	(18-6)	(18-17)	(18-28)	(18-39)	(18-50)
4.	치료기관	(18-7) 1 2 3 4	(18-18) 1 2 3 4	(18-29) 1 2 3 4	(18-40) 1 2 3 4	(18-51) 1 2 3 4
	치료기관 기타	(18-8)	(18-19)	(18-30)	(18-41)	(18-52)
5. 의도성		(18-9) 1 2 3	(18-20) 1 2 3	(18-31) 1 2 3	(18-42) 1 2 3	(18-53) 1 2 3
6. 와병여부		(18-10) 1 2	(18-21) 1 2	(18-32) 1 2	(18-43) 1 2	(18-54) 1 2
6-1. 와병일수		(18-11) 일	(18-22) 일	(18-33) 일	(18-44) 일	(18-55) 일
7. 결근·결석 여부		(18-12) 1 2 8	(18-23) 1 2 8	(18-34) 1 2 8	(18-45) 1 2 8	(18-56) 1 2 8
7-1. 결근·결석 일수		(18-13) 일	(18-24) 일	(18-35) 일	(18-46) 일	(18-57) 일

0 1 9

입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까? [ ][ ] 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 병의원의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

[ ] 특광역시/도 [1] 시 _____ [2] 군 _____ [3] 구 _____

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원

[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원

[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 ○○○(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)

[2] 사고 중독

[3] 기타 _____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. ○○○(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니까? [ ][ ] 개월 [ ][ ] 일

5. ○○○(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여

[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

6. ○○○(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

[ ][ ],[ ][ ][ ],[ ][ ][ ] 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

7. ○○○(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 2 0

입원이용 응답표

1. 입원이용 경험	1-1. 입원이용 횟수	
(20-1)		(20-2)
1 예	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

입원이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(20-3)	(20-29)	(20-55)	(20-81)	(20-107)
2-1. 의료기관 소재지		(20-4) 1 (20-5) 시	(20-30) 1 (20-31) 시	(20-56) 1 (20-57) 시	(20-82) 1 (20-83) 시	(20-108) 1 (20-109) 시
		(20-6) 2 (20-7) 군	(20-32) 2 (20-33) 군	(20-58) 2 (20-59) 군	(20-84) 2 (20-85) 군	(20-110) 2 (20-111) 군
		(20-8) 3 (20-9) 구	(20-34) 3 (20-35) 구	(20-60) 3 (20-61) 구	(20-86) 3 (20-87) 구	(20-112) 3 (20-113) 구
		(20-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(20-36) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(20-62) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(20-88) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(20-114) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(20-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(20-37) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(20-63) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(20-89) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(20-115) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(20-12)	(20-38)	(20-64)	(20-90)	(20-116)
3.	입원이용 사유	(20-13) 1 2 3	(20-39) 1 2 3	(20-65) 1 2 3	(20-91) 1 2 3	(20-117) 1 2 3
	질병명	(20-14)	(20-40)	(20-66)	(20-92)	(20-118)
	기타사유	(20-15)	(20-41)	(20-67)	(20-93)	(20-119)
3-1.	질병코드	(20-16)	(20-42)	(20-68)	(20-94)	(20-120)
4. 입원일수		(20-17) □□ 개월 (20-18) □□ 일	(20-43) □□ 개월 (20-44) □□ 일	(20-69) □□ 개월 (20-70) □□ 일	(20-95) □□ 개월 (20-96) □□ 일	(20-121) □□ 개월 (20-122) □□ 일
5.	입원이용 보험 (복수응답)	(20-19) (20-20) (20-21) (20-22) 1 2 3 4 (20-23) (20-24) (20-25) 5 6 7	(20-45) (20-46) (20-47) (20-48) 1 2 3 4 (20-49) (20-50) (20-51) 5 6 7	(20-71) (20-72) (20-73) (20-74) 1 2 3 4 (20-75) (20-76) (20-77) 5 6 7	(20-97) (20-98) (20-99) (20-100) 1 2 3 4 (20-101) (20-102) (20-103) 5 6 7	(20-123) (20-124) (20-125) (20-126) 1 2 3 4 (20-127) (20-128) (20-129) 5 6 7
	입원이용 보험 기타	(20-26)	(20-52)	(20-78)	(20-104)	(20-130)
6. 입원이용 비용		(20-27) 원	(20-53) 원	(20-79) 원	(20-105) 원	(20-131) 원
7. 입원이용 서비스 만족도		(20-28) 1 2 3 4 5	(20-54) 1 2 3 4 5	(20-80) 1 2 3 4 5	(20-106) 1 2 3 4 5	(20-132) 1 2 3 4 5

0 2 1

외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

□ 특광역시/도 [1] _____ 시 [2] _____ 군 [3] _____ 구

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원

[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원

[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 OOO(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)

[2] 사고 중독

[3] 기타_____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. OOO(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여

[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

5. OOO(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

□□,□□□,□□□ 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

6. OOO(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 2 2

외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부	1-1. 외래이용 횟수	
(22-1) 1 예		(22-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

외래이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(22-3)	(22-27)	(22-51)	(22-75)	(22-99)
2-1. 의료기관 소재지		(22-4) 1 / (22-5) 시	(22-28) 1 / (22-29) 시	(22-52) 1 / (22-53) 시	(22-76) 1 / (22-77) 시	(22-100) 1 / (22-101) 시
		(22-6) 2 / (22-7) 군	(22-30) 2 / (22-31) 군	(22-54) 2 / (22-55) 군	(22-78) 2 / (22-79) 군	(22-102) 2 / (22-103) 군
		(22-8) 3 / (22-9) 구	(22-32) 3 / (22-33) 구	(22-56) 3 / (22-57) 구	(22-80) 3 / (22-81) 구	(22-104) 3 / (22-105) 구
		(22-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(22-34) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(22-58) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(22-82) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(22-106) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(22-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(22-35) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(22-59) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(22-83) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(22-107) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(22-12)	(22-36)	(22-60)	(22-84)	(22-108)
3.	외래이용 사유	(22-13) 1 2 3	(22-37) 1 2 3	(22-61) 1 2 3	(22-85) 1 2 3	(22-109) 1 2 3
	질병명	(22-14)	(22-38)	(22-62)	(22-86)	(22-110)
	기타사유	(22-15)	(22-39)	(22-63)	(22-87)	(22-111)
3-1.	질병코드	(22-16)	(22-40)	(22-64)	(22-88)	(22-112)
4.	외래이용 보험 (복수응답)	(22-17) (22-18) (22-19) (22-20) 1 2 3 4 (22-21) (22-22) (22-23) 5 6 7	(22-41) (22-42) (22-43) (22-44) 1 2 3 4 (22-45) (22-46) (22-47) 5 6 7	(22-65) (22-66) (22-67) (22-68) 1 2 3 4 (22-69) (22-70) (22-71) 5 6 7	(22-89) (22-90) (22-91) (22-92) 1 2 3 4 (22-93) (22-94) (22-95) 5 6 7	(22-113) (22-114) (22-115) (22-116) 1 2 3 4 (22-117) (22-118) (22-119) 5 6 7
	외래이용 보험 기타	(22-24)	(22-48)	(22-72)	(22-96)	(22-120)
5. 외래이용 비용		(22-25) 원	(22-49) 원	(22-73) 원	(22-97) 원	(22-121) 원
6. 외래이용 서비스 만족도		(22-26) 1 2 3 4 5	(22-50) 1 2 3 4 5	(22-74) 1 2 3 4 5	(22-98) 1 2 3 4 5	(22-122) 1 2 3 4 5

0 2 3

약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

[1] 처방약 구입

[2] 처방되지 않은 일반의약품 구입

[3] 의약외품 구입

[4] 기타 (_____)

약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수	
(23-1) [1] 예	□	(23-2) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[2] 아니오	□	[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	(23-3) [1] (23-4) [2] (23-5) [3] (23-6) [4]	(23-7)
2회	(23-8) [1] (23-9) [2] (23-10) [3] (23-11) [4]	(23-12)
3회	(23-13) [1] (23-14) [2] (23-15) [3] (23-16) [4]	(23-17)
4회	(23-18) [1] (23-19) [2] (23-20) [3] (23-21) [4]	(23-22)
5회	(23-23) [1] (23-24) [2] (23-25) [3] (23-26) [4]	(23-27)
6회	(23-28) [1] (23-29) [2] (23-30) [3] (23-31) [4]	(23-32)
7회	(23-33) [1] (23-34) [2] (23-35) [3] (23-36) [4]	(23-37)
8회	(23-38) [1] (23-39) [2] (23-40) [3] (23-41) [4]	(23-42)
9회	(23-43) [1] (23-44) [2] (23-45) [3] (23-46) [4]	(23-47)
10회	(23-48) [1] (23-49) [2] (23-50) [3] (23-51) [4]	(23-52)

0 2 4

교육 및 경제활동

다음은 교육 이수에 대한 질문입니다.

(24-1)
1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

[1] 서당/한학 [2] 무학 [3] 초등학교 [4] 중학교
[5] 고등학교 [6] 2년/3년제 대학 [7] 4년제 대학 [8] 대학원

(24-2)
1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

[1] 졸업 [2] 수료 [3] 중퇴
[4] 재학/휴학 중 [8] 비해당(서당/한학, 무학)

다음은 경제활동에 대한 질문입니다.

(24-3)
2. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1 시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

[1] 예
[2] 아니오 ⇨

(24-4)
2-1. 일을 하지 않는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

[1] 필요를 느끼지 못해서
[2] 학교/학원에 재학/재원 중임
[3] 정년 혹은 퇴직 상태임
[4] 건강상의 이유
[5] 실업 혹은 구직 중임
[6] 육아, 간병 등의 이유
[7] 기타 (_____) (24-5)

현재 취업자(2번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 3번 문항부터 대답해 주십시오.
현재 취업자가 아닌 분(2번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 9번 문항부터 대답해 주십시오.

(24-6)
3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

[1] 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다 (임금근로자)
[2] 내 사업을 한다 (자영업자와 고용주)
[3] 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다 (무급가족 종사자)

(24-7)
3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?

[1] 상용직 [2] 임시직 [3] 일용직

(24-8)
3-2. 근로 시간은 어떤 형태입니까?

[1] 전일제 [2] 시간제

0 2 5

4. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보모, 학원 강사, 조리 보조원 등)

(25-1) 0 1 □ □ □ □ □ 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(25-2)

4-1. 직장에서 직위를 가지고 있다면, 이를 말씀해 주십시오(예, 팀장, 대리, 과장, 부장 등)

(25-3)

5~8번 문항은 3번 문항에 '타인 또는 회사에 고용되어 돈을 받고 일한다'에 응답해 주신 분 (임금 근로자)만 대답해 주십시오.

(25-4) 5. 귀하는 일자리에서 (최소한 1인 이상의) 다른 사람을 감독하는 위치에 있습니까?

1 예 ⇨
2 아니오

5-1. (25-5) 그렇다면 얼마나 많은 사람들을 직접 감독하십니까?
1 □□□ (25-6) 명 2 1000명 이상 9 모름/응답거부

(25-7) 6. 현재 이 일자리에서 일하기로 약속한 기간 (근로계약기간) 혹은 일을 계속할 수 있는 기간이 정해져 있습니까?

1 정해져 있다
2 정해져 있지 않다 ⇨
3 모른다 ⇨ ⇨

6-1. (25-8) 일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태입니까?
(예: 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등)
1 예 2 아니오

(25-9) 7. 임금(급여)을 근무하는 사업장에서 받았습니까? 아니면 소속된 파견업체나 용역업체로부터 받았습니까?

1 파견업체
2 용역업체
3 근무한 사업장 ⇨

7-1. (25-10) 개인적으로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 제공하고 전적으로 실적에 따라 소득을 얻는 형태에 해당합니까? (보험설계사, 학습지교사, 퀵서비스 배달기사, 골프장 캐디, 입시학원 강사, 레미콘 자가 운전자 등)
1 예 2 아니오

(25-11) 8. 평소에 주로 일하는 장소는 어디입니까?

1 응답자의 가정이나 이웃집 또는 인근 남의 집에 모여서 작업 (재택근무 등)
2 사업장 내 또는 사무실이외의 지정된 장소 (파출부, 입주 보모, 입주 가정교사 등도 포함)

0 2 6

다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.
현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

9. (26-1) 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

1 1주 □□□ (26-2) 시간

8 해당없음(최근 1년 동안 일을 하지 않음) (11번으로)

10. (26-3) 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까?

1 주로 주간에 일한다
2 저녁 근무 (오후 2시~자정 사이)
3 밤 근무 (저녁 9시~다음날 오전 8시 사이)
4 주야간 규칙적 교대 근무
5 24시간 교대 근무
6 분할 근무 (하루에 일하는 시간대 2개 이상)
7 불규칙 교대 근무
8 기타(_____) (26-4)

11~14번 문항까지는 현재 경제활동 여부에 상관없이 모든 응답자가 대답해 주십시오.

11. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 직업은 무엇이었습니까? (만일, 현재의 일자리와 같다면 다음 13번 문항으로 넘어가 주십시오)

0 1 □ □ □ □ □ 7 8 9 (26-5)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(26-6)

(26-7) □ 현재와 동일(13번으로)

12. (26-8) 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

1 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일했다(일하고 있다) ⇨ 12-1. (26-9) 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?
   1 상용직
   2 임시직
   3 일용직
2 내 사업을 했다(하고 있다)
3 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 도왔다(돕고 있다)

13. (26-10) 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

1 무학
2 서당/한학
3 초등학교 졸업 이하
4 중학교 졸업 이하
5 고등학교 졸업 이하
6 2/3년제 대학 졸업 이하
7 4년제 대학 졸업 이하
8 대학원 수료 이상
9 모름

14. (26-11) 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

1 무학
2 서당/한학
3 초등학교 졸업 이하
4 중학교 졸업 이하
5 고등학교 졸업 이하
6 2/3년제 대학 졸업 이하
7 4년제 대학 졸업 이하
8 대학원 수료 이상
9 모름

0 2 7

비만 및 체중조절

다음은 비만 및 체중조절에 대한 질문입니다.

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? 1 (27-1)

1 매우 마른 편이다
2 약간 마른 편이다
3 보통이다
4 약간 비만이다
5 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? 몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 ☑표시해 주십시오. 2 (27-2)

1 변화가 없었다 (0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)
2 몸무게가 줄었다 ⇨

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까? 2-1 (27-3)
1 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
2 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
3 10kg 이상 감소

3 몸무게가 늘었다 ⇨

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까? 2-2 (27-4)
1 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
2 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
3 10kg 이상 증가

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? 3 (27-5)

1 몸무게를 줄이려고 노력했다 (3-1번으로)
2 몸무게를 유지하려고 노력했다 (3-1번으로)
3 몸무게를 늘리려고 노력했다 (4번으로)
4 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 (4번으로)

0 2 8

3-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☑표시해 주십시오. (3-1)

- [1] 운동 (28-1)
- [2] 단식(24시간 이상) (28-2)
- [3] 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임) (28-3)
- [4] 결식(식사를 거름) (28-4)
- [5] 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용 (28-5)
- [6] 의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용 (28-6)
- [7] 한약 복용 (28-7)
- [8] 건강기능식품 (28-8)
- [9] 원 푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법) (28-9)
- [10] 기타 (_____) (28-10) (28-11)

음주

다음은 음주[술]에 대한 질문입니다.

4. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? (4)

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- [1] 술을 마셔 본 적 없음 (7번으로) (28-12)
- [2] 있음 ⇨⇨⇨ (28-12)

4-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 □□ (28-13) 세

5. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

5-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? (5-1)

- [1] 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (5-10번으로) (28-14)
- [2] 한달에 1번 미만
- [3] 한달에 1번 정도
- [4] 한달에 2-4번
- [5] 일주일에 2-3번 정도
- [6] 일주일에 4번 이상

0 2 9

5-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

1 1-2잔
2 3-4잔
3 5-6잔
4 7-9잔
5 10잔 이상

5-2 (29-1) [1] [2] [3] [4] [5]

5-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔 (또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

1 전혀 없다
2 한달에 1번 미만
3 한달에 1번 정도
4 일주일에 1번 정도
5 거의 매일

5-3 (29-2) [1] [2] [3] [4] [5]

5-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔 (또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

1 전혀 없다
2 한달에 1번 미만
3 한달에 1번 정도
4 일주일에 1번 정도
5 거의 매일

5-4 (29-3) [1] [2] [3] [4] [5]

5-5. 최근 1년 동안, 일단 술을 마시기 시작하면 자제가 안 된 적이 있습니까?

1 전혀 없다
2 한달에 1번 미만
3 한달에 1번 정도
4 일주일에 1번 정도
5 거의 매일

5-5 (29-4) [1] [2] [3] [4] [5]

5-6. 최근 1년 동안, 음주 때문에 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

1 전혀 없다
2 한달에 1번 미만
3 한달에 1번 정도
4 일주일에 1번 정도
5 거의 매일

5-6 (29-5) [1] [2] [3] [4] [5]

■

0 3 0

5-7. 최근 1년 동안, 과음 후 다음날 아침 정신을 차리기 위해 해장술을 마신 적이 있습니까?

[1] 전혀 없다
[2] 한달에 1번 미만
[3] 한달에 1번 정도
[4] 일주일에 1번 정도
[5] 거의 매일

5-7 (30-1) [1] [2] [3] [4] [5]

5-8. 최근 1년 동안, 술을 마신 후 다음날 술을 마신 것에 대해 후회한 적이 있습니까?

[1] 전혀 없다
[2] 한달에 1번 미만
[3] 한달에 1번 정도
[4] 일주일에 1번 정도
[5] 거의 매일

5-8 (30-2) [1] [2] [3] [4] [5]

5-9. 최근 1년 동안, 술이 깬 후에 술 취했을 때의 일을 기억할 수 없었던 적이 있습니까?

[1] 전혀 없다
[2] 한달에 1번 미만
[3] 한달에 1번 정도
[4] 일주일에 1번 정도
[5] 거의 매일

5-9 (30-3) [1] [2] [3] [4] [5]

5-10. 본인의 음주로 인해 자신이 다치거나, 가족이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있습니까?

[1] 없었다
[2] 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
[3] 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

5-10 (30-4) [1] [2] [3]

5-11. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

[1] 없었다
[2] 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
[3] 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

5-11 (30-5) [1] [2] [3]

6. 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

6 (30-6) [1] [2]

■

0 3 1

안전의식

다음은 안전의식[사고예방]에 대한 질문입니다.

7. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

1 전혀 매지 않는다	7	(31-1) 1
2 거의 매지 않는 편이다		2
3 가끔 매는 편이다		3
4 대체로 매는 편이다		4
5 항상 맨다		5
8 운전을 하지 않는다		8

8. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

1 전혀 매지 않는다	8	(31-2) 1
2 거의 매지 않는 편이다		2
3 가끔 매는 편이다		3
4 대체로 매는 편이다		4
5 항상 맨다		5
8 자동차의 앞좌석에 앉은 적이 없다		8

9. 최근 1년 동안 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

1 항상 착용 한다	9	(31-3) 1
2 자주 착용 한다		2
3 가끔 착용 한다		3
4 거의 착용하지 않는다		4
5 전혀 착용하지 않는다		5
8 자전거를 타지 않는다		8

0 3 2

10. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

10-1 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□ (32-2) 회

2 아니오

8 자전거를 운전하지 않는다

10-1 (32-1) 1 / 2 / 8

10-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□ (32-4) 회

2 아니오

8 오토바이를 운전하지 않는다

10-2 (32-3) 1 / 2 / 8

10-3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□ (32-6) 회

2 아니오

8 자동차를 운전하지 않는다

10-3 (32-5) 1 / 2 / 8

11. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

1 없다

2 1번

3 2-3번

4 4-5번

5 6번 이상

11 (32-7) 1 / 2 / 3 / 4 / 5

0 3 3

정신건강

다음은 정신건강에 대한 질문입니다.

12. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? □□ (33-1) 시간

13. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

[1] 대단히 많이 느낀다
[2] 많이 느끼는 편이다
[3] 조금 느끼는 편이다
[4] 거의 느끼지 않는다

13 (33-2) [1] [2] [3] [4]

14. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

14 (33-3) [1] [2]

15. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ 15-1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?
  [1] 예
  [2] 아니오
[2] 아니오

15 (33-4) [1] [2]

15-1 (33-5) [1] [2]

16. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

16 (33-6) [1] [2]

0 3 4

흡연

다음은 흡연[담배]에 대한 질문입니다.

17. 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

[1] 5갑(100개비) 미만
[2] 5갑(100개비) 이상
[8] 피운 적 없음 (23번으로)

17 (34-1) [1] [2] [8]

18. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까? 만 □□ (34-2) 세

19. 현재 담배를 피우십니까?

[1] 매일피움 ⇨ 19-1. 하루 평균 흡연량 □□□ (34-4) 개비 (20번으로)
[2] 가끔피움 ⇨ 19-2. 최근 1달 간 흡연일수 □□ (34-5) 일
19-3. 흡연한 날 하루 평균 흡연량 □□□ (34-6) 개비 (20번으로)
[3] 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음
19-4. 과거흡연 기간 □□ (34-7) 년 □□ (34-8) 개월
19-5. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□ (34-9) 개비 (22번으로)

19 (34-3) [1] [2] [3]

20. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

20 (34-10) [1] [2]

21. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

[1] 1개월 안에 금연할 계획이 있다
[2] 6개월 안에 금연할 계획이 있다
[3] 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
[4] 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

21 (34-11) [1] [2] [3] [4]

0 3 5

22. 다음은 금연을 위해 자주 사용되는 방법들입니다. 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법들에 모두 ☑ 표시해 주십시오.

22
(35-1) [1] 1 특별한 방법 없이 자신의 의지로
(35-2) [2] 2 니코틴 대체용품 (금연패치, 금연껌, 로젠즈)
(35-3) [3] 3 의사처방에 의한 약물치료 (복용약)
(35-4) [4] 4 보건소 금연클리닉 (금연교육 또는 금연상담)
(35-5) [5] 5 금연상담전화 (금연 콜센터)
(35-6) [6] 6 금연초
(35-7) [7] 7 금연침
(35-8) [8] 8 기타 (_____ (35-10))
(35-9) [88] 88 금연을 시도한 적 없음

23번~24번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

23. 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?

23
(35-11) [1] 1 0시간
[2] 2 1시간 미만
[3] 3 1시간 이상 ⇨ □□ (35-12) 시간
[8] 8 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

24. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

24
(35-13) [1] 1 예 ⇨ 24-1. 몇 명입니까? □□ (35-14) 명
[2] 2 아니오

24-2. 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?

24-2
(35-15) [1] 1 0시간
[2] 2 1시간 미만
[3] 3 1시간 이상 ⇨ □□ (35-16) 시간

25. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

25
(35-17) [1] 1 예
[2] 2 아니오

0 3 6

신체활동

다음은 신체활동 및 운동에 대한 질문입니다.

26. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까?

※ 격렬한 신체활동
달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동

1 전혀 하지 않음 (27번으로)
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일
7 6일
8 7일(매일)

26-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□ (36-2) 시간 □□ (36-3) 분

26 (36-1) □

27. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까?

※ 중등도 신체활동
천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외

1 전혀 하지 않음 (28번으로)
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일
7 6일
8 7일(매일)

27-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□ (36-5) 시간 □□ (36-6) 분

27 (36-4) □

0 3 7

28. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까?
※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

1 전혀 하지 않음 (29번으로)
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일
7 6일
8 7일(매일)

28-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?
하루에 □□ (37-2) 시간 □□ (37-3) 분

28 (37-1) [1 2 3 4 5 6 7 8]

29. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

1 전혀 하지 않음
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일 이상

29 (37-4) [1 2 3 4 5 6]

30. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까?

1 전혀 하지 않음
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일 이상

30 (37-5) [1 2 3 4 5 6]

31. 귀하의 일상생활 활동은 다음 중 어느 것에 가깝습니까?

1 안정 상태 (거의 누워 있거나 앉아서 지냄)
2 가벼운 활동 (사무관리·기술직종사자, 가사 노동시간이 적은주부, 이와 유사한 내용의 직종)
3 보통활동 (가사작업량이 많은 주부, 제조업·가공업·판매업종사자, 교사등)
4 심한 활동 (농업·어업·토목업·건축업종사자, 이와 유사한 내용의 직종)
5 격심한 활동 (운동선수, 목재운반, 농번기 농업종사자 등과 유사한 힘쓰는 육체 노동직종)

31 (37-6) [1 2 3 4 5]

0 3 8

구강건강

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

32. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

32 (38-1) [1] 1 [2] 2

[1] 예 ⇨ 32-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? 32-1 (38-2)

[2] 아니오

[1] 경제적인 이유로 (38-3) [2]
[2] 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서 (38-4) [3]
[3] 직장이나 학교를 비울 수 없어서 (38-5) [4]
[4] 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에 (38-6) [5]
[5] 아이를 봐줄 사람이 없어서 (38-7) [6]
[6] 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서 (38-8) [7]
[7] 치과진료를 받기가 무서워서 (38-9) [8]
[8] 기타(_____) (38-10)

여성건강

다음은 여성건강에 대한 질문입니다. 여성분만 응답하여 주십시오.

33. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

33 (38-11)

[1] 초경하기 전 **(설문종료)** 1
[2] 예 2
[3] 아니오 ⇨ 3

33-1. 현재 월경을 하지 않는(무월경) 이유는 무엇입니까? 33-1 (38-12)

[1] 임신 중 1
[2] 출산후 수유 중 2
[3] 자연폐경 ⇨ 만 □□ 세 (38-13) 3
[4] 인공폐경 ⇨ 만 □□ 세 (38-14) 4
[5] 기타(_____) (38-15) 5

0 3 9

34. 초경한 시기는 언제였습니까? 만 □□ (39-1) 세

35. 현재 월경(생리, 달거리)은 규칙적입니까?

[1] 규칙적(일정한주기를 가지고 한번씩함)

[2] 불규칙적 ⇨ 35-1. 얼마나 불규칙적입니까?

[1] 3달에 1번이상은 한다.

[2] 3달이상씩 건너뛴다.

35 (39-2) [1] [2]

35-1 (39-3) [1] [2]

36. 임신경험(현재 임신중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까?

[1] 예 ⇨

36-1. 총 임신 경험 □□ (39-5) 회

36-2. 자연유산 경험 □□ (39-6) 회

36-3. 인공유산 경험 □□ (39-7) 회

[2] 아니오

36 (39-4) [1] [2]

37. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

[1] 예 ⇨

37-1. 첫출산과 마지막 출산은 언제였습니까?

[1] 첫 출산 연령 ⇨ 만 □□ (39-9) 세

[2] 마지막 출산 연령 ⇨ 만 □□ (39-10) 세

37-2. 출산은 어떤 방법으로 하였습니까?

[1] 자연분만 ⇨ □□ (39-11) 회

[2] 제왕절개분만 ⇨ □□ (39-12) 회

[3] 조산분만 ⇨ □□ (39-13) 회

[2] 아니오

37 (39-8) [1] [2]

0 4 0

38. 최소 한달 이상 모유수유 한 경험이 있습니까?

1 예 ⇨ 38-1. 모유수유 한 총 자녀 수 (40-2) 명
38-2. 총 모유수유 한 기간 (40-3) 년 (40-4) 개월

2 아니오

38 (40-1) 1 / 2

39. 최소한 한달 이상 경구피임약을 복용한 경험이 있습니까?

1 예 ⇨ 39-1. 총 복용기간 (40-6) 년 (40-7) 개월

2 아니오

39 (40-5) 1 / 2

40. 최소한 한달 이상 여성호르몬제를 복용한 경험이 있습니까?(피임을 목적으로 복용한 경우는 제외)

1 예 ⇨ 40-1. 처음으로 여성호르몬제를 복용한 시기
만 (40-9) 세
40-2. 총 복용기간 (40-10) 년 (40-11) 개월

2 아니오

40 (40-8) 1 / 2

41. 여성질환 수술력에 대한 질문으로 양측난소절제술을 받으셨습니까?

1 예 ⇨ 41-1. 양측난소절제술을 받은 시기는 언제 입니까?
만 (40-13) 세

2 아니오

41-1 (40-12) 1 / 2

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

여성건강 추가 응답표

(1)

여성건강 추가응답표
바코드를 붙여주세요

응답자성명	(1)	응답자와의 관계	☞ 응답자는 조사대상자의 □□□이다.
			관 계 (2) / 코 드 (3)

구분	조사대상 소아·청소년 1	조사대상 소아·청소년 2	조사대상 소아·청소년 3	조사대상 소아·청소년 4	조사대상 소아·청소년 5
성명	(4)	(12)	(20)	(28)	(36)
가구원 번호	(5)	(13)	(21)	(29)	(37)
출산 연령	(6) 만 세	(14) 만 세	(22) 만 세	(30) 만 세	(38) 만 세
출산 주수	(7) □□ 주	(15) □□ 주	(23) □□ 주	(31) □□ 주	(39) □□ 주
출생시 체중	(8) □.□□ Kg	(16) □.□□ Kg	(24) □.□□ Kg	(32) □.□□ Kg	(40) □.□□ Kg
출산 방법	(9) 1 자연분만 2 제왕절개	(17) 1 자연분만 2 제왕절개	(25) 1 자연분만 2 제왕절개	(33) 1 자연분만 2 제왕절개	(41) 1 자연분만 2 제왕절개
모유 수유	(10) 1 예 2 아니오	(18) 1 예 2 아니오	(26) 1 예 2 아니오	(34) 1 예 2 아니오	(42) 1 예 2 아니오
모유 수유 기간	(11) □□ 개월	(19) □□ 개월	(27) □□ 개월	(35) □□ 개월	(43) □□ 개월

I-2. 청소년용

■

0 0 0

승인(협의)번호
제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 건강설문 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

(0-1) 청소년 바코드를 붙여주세요

(0-2) [1] ■ [3] 2 청소년 만 12세이상 만 19세미만

(0-3) 건강면접	(0-4) 건강행태	(0-5) 손상	(0-6) 입원이용	(0-7) 외래이용
□	□	□	□	□

조사대상자	성 명 (0-8)	(만 세)	응답자 연락처
	성 별 (0-9)	[1] 남자 [2] 여자	전화번호 (0-19) – –
응답자 성명 (0-10)			휴대폰번호 (0-20) – –
응답자와의 관계	☞응답자는 조사대상자의 □□□ 이다.		
	관 계 (0-11)	코 드 (0-12)	
설문 소요 시간	시작	(0-13) 시 (0-14) 분	
	종료	(0-15) 시 (0-16) 분	
완료여부	[1] 완료 (0-17)		
	[2] 미완료 (이유: _____) (0-18)		
조사원	(0-24) (서명)	조사완료일	(0-25) 년 (0-26) 월 (0-27) 일

조사일

(0-21) 2010년	(0-22) 월		(0-23) 일	
■ 2010	[0]	[0]	[0]	[0]
	[1]	[1]	[1]	[1]
[2] 2011		[2]	[2]	[2]
		[3]	[3]	[3]
		[4]		[4]
		[5]		[5]
[3] 2012		[6]		[6]
		[7]		[7]
		[8]		[8]
		[9]		[9]

보건복지부 MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

질병관리본부 KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

■

■

001

1. (1-1) 평소에 OO의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

[1] 매우 좋음
[2] 좋음
[3] 보통
[4] 나쁨
[5] 매우 나쁨

2. (1-2) 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (1-3) 일
[2] 아니오

3. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

3-1. (1-4) 최근 1년 동안 OO가 인플루엔자(계절독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

3-2. (1-5) 최근 1년 동안 OO가 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

4. (1-6) 최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

5. (1-7) 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

■

0 0 2

지금부터 물어보는 질문은 여러 가지 질환에 대한 내용입니다.

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령	질환명	의사진단여부	진단시 연령
6. 선천성 심장질환	□ (2-1)	만 □□ (2-2) 세	12. 요로감염	□ (2-13)	만 □□ (2-14) 세
7. 간질	□ (2-3)	만 □□ (2-4) 세	13. 폐렴	□ (2-15)	만 □□ (2-16) 세
8. 당뇨병	□ (2-5)	만 □□ (2-6) 세	14.기타	□ (2-17)	만 □□ (2-18) 세
9. 천식	□ (2-7)	만 □□ (2-8) 세	(기타 질환명 _____ (2-19))		
10. 주의력 결핍장애	□ (2-9)	만 □□ (2-10) 세			
11. 아토피 피부염	□ (2-11)	만 □□ (2-12) 세	15. 질환없음	□ (2-20)	

다음 9-3번 문항은 천식으로 진단을 받은 청소년에게 물어보는 질문입니다.

9-3. (2-21) 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서 약을 복용하거나 흡입했습니까?

1 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음

2 증상이 있을 때만 치료를 받음

3 치료받지 않음

0 0 3

의료이용

1. (3-1) 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨

[2] 아니오

1-1. (3-2) 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

[1] 경제적인 이유로

[2] 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

[3] 교통편이 불편해서

[4] 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

[5] 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

[6] 증상이 가벼워서

[7] 기타 (_____(3-3)_____)

0 0 4

활동제한

지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고, 제가 묻는 질문에 응답해 주십시오.

1. (4-1) 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨

[2] 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

[1] (4-2) 골절, 관절부상
[2] (4-3) 기타 손상
[3] (4-4) 심장질환
[4] (4-5) 호흡문제, 폐질환, 천식
[5] (4-6) 치아 및 구강질환
[6] (4-7) 시력문제
[7] (4-8) 청각문제
[8] (4-9) 언어문제
[9] (4-10) 정신지체
[10] (4-11) 우울/불안/정서상 문제
[11] (4-12) 경련/간질
[12] (4-13) 기타발달장애
[13] (4-14) 주의력결핍 및 과잉행동
[14] (4-15) 기타 (_____) (4-16)

2. (4-17) 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨

2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (4-18) 일

[2] 아니오

3. (4-19) 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨

3-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (4-20) 일

[2] 아니오

[8] 직장 또는 학교에 다니지 않음

005

손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

   1 예 ⇨ ⇨ ⇨ 1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까? □□ 번

   2 아니오

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

   □□□□ 년 □□ 월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

   1 운수사고　2 추락/미끄러짐　3 부딪힘

   4 열상/자상/절단/관통상　5 화상　6 질식

   7 익수　8 중독　9 기타 (_____)

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

   1 응급실

   2 병의원 외래만 이용

   3 병의원 병실입원

   4 기타 (_____)

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

   1 불의의 사고　2 의도적 자해　3 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

   1 예 ⇨ ⇨ ⇨ 6-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

   2 아니오

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

   1 예 ⇨ ⇨ ⇨ 7-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

   2 아니오

   8 직장 또는 학교에 다니지 않음

0 0 6

손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
(6-1)		(6-2)
1 예	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기		(6-3) □□□□년 (6-4) □□월	(6-14) □□□□년 (6-15) □□월	(6-25) □□□□년 (6-26) □□월	(6-36) □□□□년 (6-37) □□월	(6-47) □□□□년 (6-48) □□월
3.	발생이유	(6-5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-27) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-38) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-49) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	발생이유 기타	(6-6)	(6-17)	(6-28)	(6-39)	(6-50)
4.	치료기관	(6-7) 1 2 3 4	(6-18) 1 2 3 4	(6-29) 1 2 3 4	(6-40) 1 2 3 4	(6-51) 1 2 3 4
	치료기관 기타	(6-8)	(6-19)	(6-30)	(6-41)	(6-52)
5. 의도성		(6-9) 1 2 3	(6-20) 1 2 3	(6-31) 1 2 3	(6-42) 1 2 3	(6-53) 1 2 3
6. 와병여부		(6-10) 1 2	(6-21) 1 2	(6-32) 1 2	(6-43) 1 2	(6-54) 1 2
6-1. 와병일수		(6-11) 일	(6-22) 일	(6-33) 일	(6-44) 일	(6-55) 일
7. 결근·결석 여부		(6-12) 1 2 8	(6-23) 1 2 8	(6-34) 1 2 8	(6-45) 1 2 8	(6-56) 1 2 8
7-1. 결근·결석 일수		(6-13) 일	(6-24) 일	(6-35) 일	(6-46) 일	(6-57) 일

0 0 7

입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 병의원의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

□ 특광역시/도 [1] 시 _____ [2] 군 _____ [3] 구 _____

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원
[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원
[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 OOO(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)
[2] 사고 중독
[3] 기타 _____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. OOO(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니까? □□ 개월 □□ 일

5. OOO(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여
[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

6. OOO(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

□□,□□□,□□□ 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

7. OOO(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 0 8

입원이용 응답표

1. 입원이용 경험	1-1. 입원이용 횟수	
(8-1) 1 예		(8-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

입원이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(8-3)	(8-29)	(8-55)	(8-81)	(8-107)
2-1. 의료기관 소재지		(8-4) 1 (8-5) 시	(8-30) 1 (8-31) 시	(8-56) 1 (8-57) 시	(8-82) 1 (8-83) 시	(8-108) 1 (8-109) 시
		(8-6) 2 (8-7) 군	(8-32) 2 (8-33) 군	(8-58) 2 (8-59) 군	(8-84) 2 (8-85) 군	(8-110) 2 (8-111) 군
		(8-8) 3 (8-9) 구	(8-34) 3 (8-35) 구	(8-60) 3 (8-61) 구	(8-86) 3 (8-87) 구	(8-112) 3 (8-113) 구
		(8-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-36) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-62) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-88) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-114) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(8-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-37) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-63) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-89) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-115) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(8-12)	(8-38)	(8-64)	(8-90)	(8-116)
3.	입원이용 사유	(8-13) 1 2 3	(8-39) 1 2 3	(8-65) 1 2 3	(8-91) 1 2 3	(8-117) 1 2 3
	질병명	(8-14)	(8-40)	(8-66)	(8-92)	(8-118)
	기타사유	(8-15)	(8-41)	(8-67)	(8-93)	(8-119)
3-1.	질병코드	(8-16)	(8-42)	(8-68)	(8-94)	(8-120)
4. 입원일수		(8-17) (8-18) 개월 일	(8-43) (8-44) 개월 일	(8-69) (8-70) 개월 일	(8-95) (8-96) 개월 일	(8-121) (8-122) 개월 일
5.	입원이용 보험 (복수응답)	(8-19) (8-20) (8-21) (8-22) 1 2 3 4 (8-23) (8-24) (8-25) 5 6 7	(8-45) (8-46) (8-47) (8-48) 1 2 3 4 (8-49) (8-50) (8-51) 5 6 7	(8-71) (8-72) (8-73) (8-74) 1 2 3 4 (8-75) (8-76) (8-77) 5 6 7	(8-97) (8-98) (8-99) (8-100) 1 2 3 4 (8-101) (8-102) (8-103) 5 6 7	(8-123) (8-124) (8-125) (8-126) 1 2 3 4 (8-127) (8-128) (8-129) 5 6 7
	입원이용 보험 기타	(8-26)	(8-52)	(8-78)	(8-104)	(8-130)
6. 입원이용 비용		(8-27) 원	(8-53) 원	(8-79) 원	(8-105) 원	(8-131) 원
7. 입원이용 서비스 만족도		(8-28) 1 2 3 4 5	(8-54) 1 2 3 4 5	(8-80) 1 2 3 4 5	(8-106) 1 2 3 4 5	(8-132) 1 2 3 4 5

0 0 9

외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까? [ ][ ] 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

[ ] 특광역시/도 [1] 시 _____ [2] 군 _____ [3] 구 _____

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원

[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원

[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 OOO(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)

[2] 사고 중독

[3] 기타_____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. OOO(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까?
해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여

[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

5. OOO(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

[ ][ ],[ ][ ][ ],[ ][ ][ ] 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

6. OOO(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 1 0

외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부	1-1. 외래이용 횟수	
(10-1)		(10-2)
1 예		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

외래이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(10-3)	(10-27)	(10-51)	(10-75)	(10-99)
2-1. 의료기관 소재지		(10-4) 1 (10-5) 시	(10-28) 1 (10-29) 시	(10-52) 1 (10-53) 시	(10-76) 1 (10-77) 시	(10-100) 1 (10-101) 시
		(10-6) 2 (10-7) 군	(10-30) 2 (10-31) 군	(10-54) 2 (10-55) 군	(10-78) 2 (10-79) 군	(10-102) 2 (10-103) 군
		(10-8) 3 (10-9) 구	(10-32) 3 (10-33) 구	(10-56) 3 (10-57) 구	(10-80) 3 (10-81) 구	(10-104) 3 (10-105) 구
		(10-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-34) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-58) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-82) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-106) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(10-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-35) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-59) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-83) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-107) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(10-12)	(10-36)	(10-60)	(10-84)	(10-108)
3.	외래이용 사유	(10-13) 1 2 3	(10-37) 1 2 3	(10-61) 1 2 3	(10-85) 1 2 3	(10-109) 1 2 3
	질병명	(10-14)	(10-38)	(10-62)	(10-86)	(10-110)
	기타사유	(10-15)	(10-39)	(10-63)	(10-87)	(10-111)
3-1.	질병코드	(10-16)	(10-40)	(10-64)	(10-88)	(10-112)
4.	외래이용 보험 (복수응답)	(10-17) (10-18) (10-19) (10-20) 1 2 3 4 (10-21) (10-22) (10-23) 5 6 7	(10-41) (10-42) (10-43) (10-44) 1 2 3 4 (10-45) (10-46) (10-47) 5 6 7	(10-65) (10-66) (10-67) (10-68) 1 2 3 4 (10-69) (10-70) (10-71) 5 6 7	(10-89) (10-90) (10-91) (10-92) 1 2 3 4 (10-93) (10-94) (10-95) 5 6 7	(10-113) (10-114) (10-115) (10-116) 1 2 3 4 (10-117) (10-118) (10-119) 5 6 7
	외래이용 보험 기타	(10-24)	(10-48)	(10-72)	(10-96)	(10-120)
5. 외래이용 비용		(10-25) 원	(10-49) 원	(10-73) 원	(10-97) 원	(10-121) 원
6. 외래이용 서비스 만족도		(10-26) 1 2 3 4 5	(10-50) 1 2 3 4 5	(10-74) 1 2 3 4 5	(10-98) 1 2 3 4 5	(10-122) 1 2 3 4 5

0 1 1

약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

[1] 처방약 구입

[2] 처방되지 않은 일반의약품 구입

[3] 의약외품 구입

[4] 기타 (_____)

약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수	
(11-1) [1] 예	□	(11-2) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[2] 아니오	□	[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	(11-3) (11-4) (11-5) (11-6) [1] [2] [3] [4]	(11-7)
2회	(11-8) (11-9) (11-10) (11-11) [1] [2] [3] [4]	(11-12)
3회	(11-13) (11-14) (11-15) (11-16) [1] [2] [3] [4]	(11-17)
4회	(11-18) (11-19) (11-20) (11-21) [1] [2] [3] [4]	(11-22)
5회	(11-23) (11-24) (11-25) (11-26) [1] [2] [3] [4]	(11-27)
6회	(11-28) (11-29) (11-30) (11-31) [1] [2] [3] [4]	(11-32)
7회	(11-33) (11-34) (11-35) (11-36) [1] [2] [3] [4]	(11-37)
8회	(11-38) (11-39) (11-40) (11-41) [1] [2] [3] [4]	(11-42)
9회	(11-43) (11-44) (11-45) (11-46) [1] [2] [3] [4]	(11-47)
10회	(11-48) (11-49) (11-50) (11-51) [1] [2] [3] [4]	(11-52)

0 1 2

교육 및 경제활동

다음은 교육 이수에 대한 질문입니다.

(12-1)
1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

[1] 서당/한학 [2] 무학 [3] 초등학교 [4] 중학교

[5] 고등학교 [6] 2년/3년제 대학 [7] 4년제 대학 [8] 대학원

(12-2)
1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

[1] 졸업 [2] 수료 [3] 중퇴

[4] 재학/휴학 중 [8] 비해당(서당/한학, 무학)

다음은 경제활동에 대한 질문입니다.

(12-3)
2. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1 시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

[1] 예

[2] 아니오 ⇨ ⇨ ⇨

[8] 만15세 미만
(설문종료)

(12-4)
2-1. 일을 하지 않는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

[1] 필요를 느끼지 못해서
[2] 학교/학원에 재학/재원 중임
[3] 정년 혹은 퇴직 상태임
[4] 건강상의 이유
[5] 실업 혹은 구직 중임
[6] 육아, 간병 등의 이유
[7] 기타 (_____) (12-5)

0 1 3

현재 취업자(2번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 3번 문항부터 대답해 주십시오.
현재 취업자가 아닌 분(2번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 9번 문항부터 대답해 주십시오.

(13-1)
3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

[1] 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다 (임금근로자)
[2] 내 사업을 한다 (자영업자와 고용주)
[3] 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다 (무급가족 종사자)

(13-2)
3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?
[1] 상용직 [2] 임시직 [3] 일용직

(13-3)
3-2. 근로 시간은 어떤 형태입니까?
[1] 전일제 [2] 시간제

4. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오. (예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보모, 학원 강사, 조리 보조원 등)

(13-4)
[0] [1] □ □ □ □ □ [7] [8] [9]
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

(13-5)

4-1. 직장에서 직위를 가지고 있다면, 이를 말씀해 주십시오. (예, 팀장, 대리, 과장 등)

(13-6)

0 1 4

5~8번 문항은 3번 문항에 '타인 또는 회사에 고용되어 돈을 받고 일한다'에 응답해 주신 분(임금 근로자)만 대답해 주십시오.

(14-1)
5. 귀하는 일자리에서 (최소한 1인 이상의) 다른 사람을 감독하는 위치에 있습니까?

[1] 예 ⇨
[2] 아니오

(14-2)
5-1. 그렇다면 얼마나 많은 사람들을 직접 감독하십니까?

[1] □□□ (14-3) 명 [2] 1000명 이상 [8] 모름/응답거부

(14-4)
6. 현재 이 일자리에서 일하기로 약속한 기간 (근로계약기간) 혹은 일을 계속할 수 있는 기간이 정해져 있습니까?

[1] 정해져 있다
[2] 정해져 있지 않다 ⇨
[3] 모른다 ⇨ ⇨

(14-5)
6-1. 일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태입니까?
(예: 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등)

[1] 예 [2] 아니오

(14-6)
7. 임금(급여)을 근무하는 사업장에서 받았습니까? 아니면 소속된 파견업체나 용역업체로부터 받았습니까?

[1] 파견업체
[2] 용역업체
[3] 근무한 사업장 ⇨

(14-7)
7-1. 개인적으로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 제공하고 전적으로 실적에 따라 소득을 얻는 형태에 해당합니까? (보험설계사, 학습지교사, 퀵서비스 배달기사, 골프장 캐디, 입시학원 강사, 레미콘 자가 운전자 등)

[1] 예 [2] 아니오

(14-8)
8. 평소에 주로 일하는 장소는 어디입니까?

[1] 응답자의 가정이나 이웃집 또는 인근 남의 집에 모여서 작업 (재택근무 등)

[2] 사업장 내 또는 사무실이외의 지정된 장소 (파출부, 입주 보모, 입주 가정교사 등도 포함)

0 1 5

다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.
현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

9. (15-1) 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

1 1주 □□ (15-2) 시간

8 최근 1년 동안 일을 하지 않음 **(설문종료)**

10. (15-3) 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까?

1 주로 주간에 일한다
2 저녁 근무 (오후 2시~자정 사이)
3 밤 근무 (저녁 9시~다음날 오전 8시 사이)
4 주야간 규칙적 교대 근무
5 24시간 교대 근무
6 분할 근무 (하루에 일하는 시간대 2개 이상)
7 불규칙 교대 근무
8 (15-4) 기타 (_____)

0 1 6

비만 및 체중조절

다음은 비만 및 체중조절에 대한 질문입니다.

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? 1 (16-1)

[1] 매우 마른 편이다
[2] 약간 마른 편이다
[3] 보통이다
[4] 약간 비만이다
[5] 매우 비만이다

2. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? 2 (16-2)

[1] 몸무게를 줄이려고 노력했다 **(2-1번으로)**
[2] 몸무게를 유지하려고 노력했다 **(2-1번으로)**
[3] 몸무게를 늘리려고 노력했다 **(3번으로)**
[4] 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 **(3번으로)**

2-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☑표시해 주십시오. 2-1

[1] 운동 (16-3)
[2] 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임) (16-4)
[3] 결식(식사를 거름) (16-5)
[4] 건강기능식품 (16-6)
[5] 원 푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법) (16-7)
[6] 기타 (16-9) (_____) (16-8)

0 1 7

신체활동

3. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까?

※ 격렬한 신체활동
달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동

3 (17-1)
1 전혀 하지 않음 (4번으로)
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일
7 6일
8 7일(매일)

3-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 (17-2) □□ 시간 (17-3) □□ 분

4. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까?

※ 중등도 신체활동
천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외

4 (17-4)
1 전혀 하지 않음 (5번으로)
2 1일
3 2일
4 3일
5 4일
6 5일
7 6일
8 7일(매일)

4-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 (17-5) □□ 시간 (17-6) □□ 분

0 1 8

5. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까?

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

[1] 전혀 하지 않음 **(6번으로)**
[2] 1일
[3] 2일
[4] 3일
[5] 4일
[6] 6일
[7] 6일
[8] 7일(매일)

5-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 (18-2) □□ 시간 (18-3) □□ 분

5 (18-1) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

6. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

[1] 전혀 하지 않음
[2] 1일
[3] 2일
[4] 3일
[5] 4일
[6] 5일

6 (18-4) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

7. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까?

[1] 전혀 하지 않음
[2] 1일
[3] 2일
[4] 3일
[5] 4일
[6] 5일

7 (18-5) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

8. 귀하의 일상생활 활동은 다음 중 어느 것에 가깝습니까?

[1] 안정 상태 (거의 누워 있거나 앉아서 지냄)
[2] 가벼운 활동 (학생·사무관리·기술직종사자, 가사 노동시간이 적은주부, 이와 유사한 내용의 직종)
[3] 보통활동 (가사작업량이 많은 주부, 제조업·가공업·판매업종사자, 교사등)
[4] 심한 활동 (농업·어업·토목업·건축업종사자, 이와 유사한 내용의 직종)
[5] 격심한 활동 (운동선수, 목재운반, 농번기 농업종사자 등과 유사한 힘쓰는 육체 노동직종)

8 (18-6) [1] [2] [3] [4] [5]

0 1 9

안전의식

다음은 안전의식[사고예방]에 대한 질문입니다.

9. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

1 전혀 매지 않는다	9	(19-1) 1
2 거의 매지 않는 편이다		2
3 가끔 매는 편이다		3
4 대체로 매는 편이다		4
5 항상 맨다		5
8 자동차 앞좌석에 앉은 적이 없다		8

10. 최근 1년 동안 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

1 항상 착용 한다	10	(19-2) 1
2 자주 착용 한다		2
3 가끔 착용 한다		3
4 거의 착용하지 않는다		4
5 전혀 착용하지 않는다		5
8 자전거를 타지 않는다		8

정신건강

다음은 정신건강에 대한 질문입니다.

11. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? □□ (19-3) 시간

12. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

1 대단히 많이 느낀다	12	(19-4) 1
2 많이 느끼는 편이다		2
3 조금 느끼는 편이다		3
4 거의 느끼지 않는다		4

13. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

1 예	13	(19-5) 1
2 아니오		2

0 2 0

14. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨
[2] 아니오

14-1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?
[1] 예
[2] 아니오

14 (20-1) [1] [2]

14-1 (20-2) [1] [2]

15. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

[1] 예
[2] 아니오

15 (20-3) [1] [2]

음주

다음은 음주[술]에 대한 질문입니다.

16. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?
※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

[1] 술을 마셔 본 적 없음 (19번 문항으로)
[2] 있음 ⇨ ⇨ ⇨

16-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?
※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.
만 [ ][ ] (20-5) 세

16 (20-4) [1] [2]

17. 술을 얼마나 자주 마십니까?

[1] 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (19번으로)
[2] 한달에 1번 미만
[3] 한달에 1번 정도
[4] 한달에 2-4번
[5] 일주일에 2-3번 정도
[6] 일주일에 4번 이상

17 (20-6) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

18. 한번에 술을 얼마나 마십니까?
※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

[1] 1-2잔
[2] 3-4잔
[3] 5-6잔
[4] 7-9잔
[5] 10잔 이상

18 (20-7) [1] [2] [3] [4] [5]

0 2 1

흡연

다음은 흡연[담배]에 대한 질문입니다.

19. 지금까지 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까?

1 지금까지 없음 (설문종료, 22번으로)

2 있음 ⇨ 19-1. 처음으로 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까?

만 □□ (21-2) 세

19 (21-1) 1 / 2

20. 최근 1달 동안 담배를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까?

□□ (21-3) 일

(21-4) 88 최근 1달 동안 담배를 피운 적이 없음

21. 최근 1달 동안 담배를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까?

□□□ (21-5) 개비

구강건강

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

22. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

1 예 ⇨ 22-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

2 아니오

1 경제적인 이유로
2 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
3 직장이나 학교를 비울 수 없어서
4 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
5 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
6 치과진료를 받기가 무서워서
7 기타(_____) (21-8)

22 (21-6) 1 / 2

22-1 (21-7) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

0 2 2

여성건강

다음은 여성건강에 대한 질문입니다.

23. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

1 초경하기 전 (설문종료)

2 예

3 아니오 ⇨

23-1. 현재 월경을 하지 않는(무월경) 이유는 무엇입니까?

1 임신중

2 출산후 수유중

3 기타 (_____) (22-3)

23 (22-1) 1 2 3

23-1 (22-2) 1 2 3

24. 초경한 시기는 언제였습니까? 만 □□ (22-4) 세

25. 현재 월경(생리, 달거리)은 규칙적입니까?

1 규칙적(일정한주기를 가지고 한번씩함)

2 불규칙적 ⇨

25-1. 얼마나 불규칙적입니까?

1 3달에 1번이상은 한다.

2 3달이상씩 건너뛴다.

3 기타 (_____) (22-6)

25 (22-5) 1 2 3

25-1 (22-7) 1 2

다음 문항은 <u>만 15세 이상 청소년</u>만 대답해 주십시오.

26. 임신경험(현재 임신중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까?

1 예 ⇨

26-1. 총 임신 경험 □□ (22-9) 회

26-2. 자연유산 경험 □□ (22-11) 회

26-3. 인공유산 경험 □□ (22-13) 회

2 아니오

8 비해당(만 15세 미만으로 설문종료)

26 (22-8) 1 (22-10) 2 (22-12) 9

0 2 3

27. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

1 예 ⇨

27-1. 첫출산과 마지막 출산은 언제였습니까?

1 첫 출산 연령 만 □□ (23-2) 세

2 마지막 출산 연령 만 □□ (23-3) 세

27-2. 출산은 어떤 방법으로 하였습니까?

1 자연분만 □□ (23-4) 회

2 제왕절개분만 □□ (23-5) 회

3 조산분만 □□ (23-6) 회

27 (23-1) 1 / 2

2 아니오

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

I-3. 소아용

■

0 0 0

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기 – 건강설문 조사표 –

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

(0-1) 소아 바코드를 붙여주세요

(0-2) [1] [2] ■ 3 소아 만 1세이상 만 12세미만

(0-3) 건강면접	(0-4) 건강행태	(0-5) 손상	(0-6) 입원이용	(0-7) 외래이용
□	□	□	□	□

조사대상자	성 명	(0-8) (만 세)	응답자 연락처	전화번호 (0-19) – –
	성 별	(0-9) [1] 남자 [2] 여자		휴대폰번호 (0-20) – –
응답자 성명		(0-10)	조사일	(0-21) 2010년 (0-22) 월 (0-23) 일
응답자와의 관계		☞응답자는 조사대상자의 □□□ 이다.		■ 2010 [0][1] [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9] [0][1][2][3] [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]
		관 계 (0-11) / 코 드 (0-12)		[2] 2011
설문 소요 시간	시작	(0-13) 시 (0-14) 분		[3] 2012
	종료	(0-15) 시 (0-16) 분		
완료여부		(0-17) [1] 완료 (0-18) [2] 미완료 (이유: _____)		
조사원		(0-24) (서명)	조사완료일	(0-25) 년 (0-26) 월 (0-27) 일

보건복지부 MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

질병관리본부 KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

■

0 0 1

(1-1)
1. 평소에 OO의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

1 매우 좋음
2 좋음
3 보통
4 나쁨
5 매우 나쁨

(1-2)
2. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (1-3) 일
2 아니오

3. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

(1-4)
3-1. 최근 1년 동안 OO가 인플루엔자(계절독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

(1-5)
3-2. 최근 1년 동안 OO가 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

(1-6)
4. 최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

(1-7)
5. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까?

1 예
2 아니오

0 0 2

6. (2-1) ○○는 신생아(선천성) 대사이상 검사를 받은 적이 있습니까?

1 예

2 아니요

9 모름

지금부터 물어보는 질문은 여러 가지 질환에 대한 내용입니다.

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령	질환명	의사진단여부	진단시 연령
7. 선천성 심장질환	□ (2-2)	만 □□ (2-3) 세	13. 요로감염	□ (2-14)	만 □□ (2-15) 세
8. 간질	□ (2-4)	만 □□ (2-5) 세	14. 폐렴	□ (2-16)	만 □□ (2-17) 세
9. 당뇨병	□ (2-6)	만 □□ (2-7) 세	15. 기타	□ (2-18)	만 □□ (2-19) 세
10. 천식	□ (2-8)	만 □□ (2-9) 세	(기타 질환명 _____ (2-20))		
11. 주의력 결핍장애	□ (2-10)	만 □□ (2-11) 세			
12. 아토피 피부염	□ (2-12)	만 □□ (2-13) 세	16. 질환없음	□ (2-21)	

다음 10-3번 문항은 천식으로 진단을 받은 소아에게 물어보는 질문입니다.

10-3. (2-22) 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서 약을 복용하거나 흡입했습니까?

1 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음

2 증상이 있을 때만 치료를 받음

3 치료받지 않음

0 0 3

의료이용

(3-1)
1. 최근 1년 동안 ○○이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

1 예 ⇨⇨⇨
2 아니오

(3-2)
1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

1 경제적인 이유로
2 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
3 교통편이 불편해서
4 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서
5 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서
6 증상이 가벼워서
7 기타 (_____)
(3-3)

0 0 4

활동제한

지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고, 제가 묻는 질문에 응답해 주십시오.

(4-1)
1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

(4-2) [1] 골절, 관절부상
(4-3) [2] 기타 손상
(4-4) [3] 심장질환
(4-5) [4] 호흡문제, 폐질환, 천식
(4-6) [5] 치아 및 구강질환
(4-7) [6] 시력문제
(4-8) [7] 청각문제
(4-9) [8] 언어문제
(4-10) [9] 정신지체
(4-11) [10] 우울/불안/정서상 문제
(4-12) [11] 경련/간질
(4-13) [12] 기타발달장애
(4-14) [13] 주의력결핍 및 과잉행동
(4-15) [14] 기타 (_____) (4-16)

[2] 아니오

(4-17)
2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (4-18) 일

[2] 아니오

(4-19)
3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨ 3-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ (4-20) 일

[2] 아니오

[8] 직장 또는 학교에 다니지 않음

0 0 5

손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨ 1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

□□□□ 년 □□ 월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

[1] 운수사고 [2] 추락/미끄러짐 [3] 부딪힘

[4] 열상/자상/절단/관통상 [5] 화상 [6] 질식

[7] 익수 [8] 중독 [9] 기타 (_____)

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

[1] 응급실

[2] 병의원 외래만 이용

[3] 병의원 병실입원

[4] 기타 (_____)

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

[1] 불의의 사고 [2] 의도적 자해 [3] 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨ 6-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

[2] 아니오

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨ ⇨ ⇨ 7-1. 있었다면, 며칠입니까? □□ 일

[2] 아니오

[8] 직장 또는 학교에 다니지 않음

0 0 6

손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
(6-1)		(6-2)
1 예	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기		(6-3) □□□□년 (6-4) □□월	(6-14) □□□□년 (6-15) □□월	(6-25) □□□□년 (6-26) □□월	(6-36) □□□□년 (6-37) □□월	(6-47) □□□□년 (6-48) □□월
3.	발생이유	(6-5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-27) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-38) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(6-49) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	발생이유 기타	(6-6)	(6-17)	(6-28)	(6-39)	(6-50)
4.	치료기관	(6-7) 1 2 3 4	(6-18) 1 2 3 4	(6-29) 1 2 3 4	(6-40) 1 2 3 4	(6-51) 1 2 3 4
	치료기관 기타	(6-8)	(6-19)	(6-30)	(6-41)	(6-52)
5. 의도성		(6-9) 1 2 3	(6-20) 1 2 3	(6-31) 1 2 3	(6-42) 1 2 3	(6-53) 1 2 3
6. 와병여부		(6-10) 1 2	(6-21) 1 2	(6-32) 1 2	(6-43) 1 2	(6-54) 1 2
6-1. 와병일수		(6-11) 일	(6-22) 일	(6-33) 일	(6-44) 일	(6-55) 일
7. 결근·결석 여부		(6-12) 1 2 8	(6-23) 1 2 8	(6-34) 1 2 8	(6-45) 1 2 8	(6-56) 1 2 8
7-1. 결근·결석 일수		(6-13) 일	(6-24) 일	(6-35) 일	(6-46) 일	(6-57) 일

0 0 7

입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 병의원의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

□ 특광역시/도 [1] 시 _____ [2] 군 _____ [3] 구 _____

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원
[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원
[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 OOO(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)
[2] 사고 중독
[3] 기타 _____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. OOO(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니까? □□ 개월 □□ 일

5. OOO(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여
[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

6. OOO(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

□□,□□□,□□□ 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

7. OOO(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 0 8

입원이용 응답표

1. 입원이용 경험	1-1. 입원이용 횟수	
(8-1) 1 예	(8-2)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

입원이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(8-3)	(8-29)	(8-55)	(8-81)	(8-107)
2-1. 의료기관 소재지		(8-4) 1 (8-5) 시	(8-30) 1 (8-31) 시	(8-56) 1 (8-57) 시	(8-82) 1 (8-83) 시	(8-108) 1 (8-109) 시
		(8-6) 2 (8-7) 군	(8-32) 2 (8-33) 군	(8-58) 2 (8-59) 군	(8-84) 2 (8-85) 군	(8-110) 2 (8-111) 군
		(8-8) 3 (8-9) 구	(8-34) 3 (8-35) 구	(8-60) 3 (8-61) 구	(8-86) 3 (8-87) 구	(8-112) 3 (8-113) 구
		(8-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-36) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-62) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-88) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(8-114) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(8-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-37) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-63) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-89) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(8-115) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(8-12)	(8-38)	(8-64)	(8-90)	(8-116)
3.	입원이용 사유	(8-13) 1 2 3	(8-39) 1 2 3	(8-65) 1 2 3	(8-91) 1 2 3	(8-117) 1 2 3
	질병명	(8-14)	(8-40)	(8-66)	(8-92)	(8-118)
	기타사유	(8-15)	(8-41)	(8-67)	(8-93)	(8-119)
3-1.	질병코드	(8-16)	(8-42)	(8-68)	(8-94)	(8-120)
4. 입원일수		(8-17) (8-18) 개월 일	(8-43) (8-44) 개월 일	(8-69) (8-70) 개월 일	(8-95) (8-96) 개월 일	(8-121) (8-122) 개월 일
5.	입원이용 보험 (복수응답)	(8-19) (8-20) (8-21) (8-22) 1 2 3 4 (8-23) (8-24) (8-25) 5 6 7	(8-45) (8-46) (8-47) (8-48) 1 2 3 4 (8-49) (8-50) (8-51) 5 6 7	(8-71) (8-72) (8-73) (8-74) 1 2 3 4 (8-75) (8-76) (8-77) 5 6 7	(8-97) (8-98) (8-99) (8-100) 1 2 3 4 (8-101) (8-102) (8-103) 5 6 7	(8-123) (8-124) (8-125) (8-126) 1 2 3 4 (8-127) (8-128) (8-129) 5 6 7
	입원이용 보험 기타	(8-26)	(8-52)	(8-78)	(8-104)	(8-130)
6. 입원이용 비용		(8-27) 원	(8-53) 원	(8-79) 원	(8-105) 원	(8-131) 원
7. 입원이용 서비스 만족도		(8-28) 1 2 3 4 5	(8-54) 1 2 3 4 5	(8-80) 1 2 3 4 5	(8-106) 1 2 3 4 5	(8-132) 1 2 3 4 5

0 0 9

외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까? [ ][ ] 번

[2] 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? _____

2-1. OOO병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

[ ] 특광역시/도 [1] 시 _____ [2] 군 _____ [3] 구 _____

※ 특광역시/도 행정코드

[11] 서울	[21] 부산	[22] 대구	[23] 인천
[24] 광주	[25] 대전	[26] 울산	[31] 경기
[32] 강원	[33] 충북	[34] 충남	[35] 전북
[36] 전남	[37] 경북	[38] 경남	[39] 제주

2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

[1] 종합병원 [2] 병원 [3] 의원 [4] 치과병원

[5] 치과의원 [6] 한방병원 [7] 한의원 [8] 보건의료원

[9] 보건(지)소, 보건진료소 [10] 기타 (_____) [99] 모름

3. 주로 어떤 이유로 OOO(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

[1] 질병 _____ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)

[2] 사고 중독

[3] 기타 _____

3-1. 질병코드

질병코드			

4. OOO(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하였습니까?
해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

[1] 국민건강보험 [2] 자동차보험 [3] 산재보험 [4] 의료급여

[5] 민간의료보험 [6] 전액자비 [7] 기타 (_____)

5. OOO(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

[ ][ ],[ ][ ][ ],[ ][ ][ ] 원 (응답자가 모르는 경우 '99999999'으로 기재)

6. OOO(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

[1] 매우 만족했음 [2] 만족했음 [3] 보통임 [4] 만족하지 않았음 [5] 전혀 만족하지 않았음

0 1 0

외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부	1-1. 외래이용 횟수	
(10-1) 1 예	(10-2)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 아니오		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

입원이용		1회	2회	3회	4회	5회
2. 의료기관명		(10-3)	(10-27)	(10-51)	(10-75)	(10-99)
2-1. 의료기관 소재지		(10-4) 1 (10-5) 시	(10-28) 1 (10-29) 시	(10-52) 1 (10-53) 시	(10-76) 1 (10-77) 시	(10-100) 1 (10-101) 시
		(10-6) 2 (10-7) 군	(10-30) 2 (10-31) 군	(10-54) 2 (10-55) 군	(10-78) 2 (10-79) 군	(10-102) 2 (10-103) 군
		(10-8) 3 (10-9) 구	(10-32) 3 (10-33) 구	(10-56) 3 (10-57) 구	(10-80) 3 (10-81) 구	(10-104) 3 (10-105) 구
		(10-10) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-34) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-58) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-82) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(10-106) 11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2-2.	의료기관 종류	(10-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-35) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-59) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-83) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	(10-107) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
	기타종류	(10-12)	(10-36)	(10-60)	(10-84)	(10-108)
3.	외래이용 사유	(10-13) 1 2 3	(10-37) 1 2 3	(10-61) 1 2 3	(10-85) 1 2 3	(10-109) 1 2 3
	질병명	(10-14)	(10-38)	(10-62)	(10-86)	(10-110)
	기타사유	(10-15)	(10-39)	(10-63)	(10-87)	(10-111)
3-1.	질병코드	(10-16)	(10-40)	(10-64)	(10-88)	(10-112)
4.	외래이용 보험 (복수응답)	(10-17) (10-18) (10-19) (10-20) 1 2 3 4 (10-21) (10-22) (10-23) 5 6 7	(10-41) (10-42) (10-43) (10-44) 1 2 3 4 (10-45) (10-46) (10-47) 5 6 7	(10-65) (10-66) (10-67) (10-68) 1 2 3 4 (10-69) (10-70) (10-71) 5 6 7	(10-89) (10-90) (10-91) (10-92) 1 2 3 4 (10-93) (10-94) (10-95) 5 6 7	(10-113) (10-114) (10-115) (10-116) 1 2 3 4 (10-117) (10-118) (10-119) 5 6 7
	외래이용 보험 기타	(10-24)	(10-48)	(10-72)	(10-96)	(10-120)
5. 외래이용 비용		(10-25) 원	(10-49) 원	(10-73) 원	(10-97) 원	(10-121) 원
6. 외래이용 서비스 만족도		(10-26) 1 2 3 4 5	(10-50) 1 2 3 4 5	(10-74) 1 2 3 4 5	(10-98) 1 2 3 4 5	(10-122) 1 2 3 4 5

0 1 1

약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

① 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까? □□ 번

② 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

① 처방약 구입

② 처방되지 않은 일반의약품 구입

③ 의약외품 구입

④ 기타 (_____)

약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수	
(11-1) ① 예	□	(11-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
② 아니오	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	(11-3) (11-4) (11-5) (11-6) ① ② ③ ④	(11-7)
2회	(11-8) (11-9) (11-10) (11-11) ① ② ③ ④	(11-12)
3회	(11-13) (11-14) (11-15) (11-16) ① ② ③ ④	(11-17)
4회	(11-18) (11-19) (11-20) (11-21) ① ② ③ ④	(11-22)
5회	(11-23) (11-24) (11-25) (11-26) ① ② ③ ④	(11-27)
6회	(11-28) (11-29) (11-30) (11-31) ① ② ③ ④	(11-32)
7회	(11-33) (11-34) (11-35) (11-36) ① ② ③ ④	(11-37)
8회	(11-38) (11-39) (11-40) (11-41) ① ② ③ ④	(11-42)
9회	(11-43) (11-44) (11-45) (11-46) ① ② ③ ④	(11-47)
10회	(11-48) (11-49) (11-50) (11-51) ① ② ③ ④	(11-52)

0 1 2

소아의 건강행태

1. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 자동차의 앞좌석에 얼마나 자주 앉습니까?

1 항상 앉는다	1	(12-1) 1
2 자주 앉는다		2
3 가끔 앉는다		3
4 거의 앉지 않는다		4
5 전혀 앉지 않는다		5
6 자동차에 타 본 적이 거의 없다		6
9 모름		9

2. 최근 1년 동안 귀 자녀는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

1 항상 착용 한다	2	(12-2) 1
2 자주 착용 한다		2
3 가끔 착용 한다		3
4 거의 착용하지 않는다		4
5 전혀 착용하지 않는다		5
8 자전거에 태우지 않는다		8
9 모름		9

다음 문항은 귀 자녀가 <u>만 6세 미만의 소아</u>일 때만 응답해 주십시오.

3. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까?

1 항상 사용 한다	3	(12-3) 1
2 자주 사용 한다		2
3 가끔 사용 한다		3
4 거의 사용하지 않는다		4
5 전혀 사용하지 않는다		5
6 자동차에 태우지 않는다		6
9 모름		9
8 만 6세 이상		8

0 1 3

다음 4~5번 문항은 귀 자녀가 <u>만 6세 이상의 소아</u>일 때만 응답해 주십시오.

4. 현재 귀자녀의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

4 (13-1)

1 매우 마른 편이다
2 약간 마른 편이다
3 보통이다
4 약간 비만이다
5 매우 비만이다
8 만 6세미만

5. 최근 1년 동안 의도적으로 귀자녀의 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

5 (13-2)

1 몸무게를 줄이려고 노력했다 **(5-1번으로)**
2 몸무게를 유지하려고 노력했다 **(5-1번으로)**
3 몸무게를 늘리려고 노력했다 **(6번으로)**
4 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 **(6번으로)**
8 만 6세미만

5-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☑표시해 주십시오.

5-1

1 운동 (13-3)
2 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임) (13-4)
3 결식(식사를 거름) (13-5)
4 건강기능식품 (13-6)
5 원 푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법) (13-7)
6 기타 (_____ (13-8))

0 1 4

다음은 소아의 기본정보에 대한 질문입니다.

6. ○○는 학교를 다니고 있습니까? 혹은 어디까지 다녔습니까?

[1] 유치원/보육원/어린이집
[2] 초등학교
[3] 중학교
[4] 무학/미취학

6 (14-1) [ ]

6-1. ○○는 그 학교를 마쳤습니까?

[1] 졸업
[2] 수료
[3] 중퇴
[4] 재학/휴학 중
[8] 무학/미취학

6-1 (14-2) [ ]

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

7. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨
[2] 아니오

7-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

[1] 경제적인 이유로
[2] 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
[3] 직장이나 학교를 비울 수 없어서
[4] 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
[5] 아이를 봐줄 사람이 없어서
[6] 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
[7] 치과진료를 받기가 무서워서
[8] 기타 (_____) (14-5)

7 (14-3) [ ]

7-1 (14-4) [ ]

0 1 5

다음은 여성건강에 대한 질문입니다.
귀 자녀가 **만 10세 이상 여아**인 경우만 응답하여 주십시오.

8. 현재 귀자녀는 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

1 초경하기 전 **(설문종료)**

2 예 ⇨ 8-1. 초경한 시기는 언제였습니까? 만 □□ (15-2) 세

8 (15-1) 1 / 2

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

Ⅱ. 영양조사

Ⅱ-1. 식품섭취조사표

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기

– 식품섭취조사표 Ⅰ (가구별 조리기록지) –

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

조사표 종류	조사연도
식품섭취조사표 Ⅰ	10 11 12
조사일	조사원
월 일 요일	

대상자	조사구	거처	가구	가구원	성명	성별	만나이	응답자	거처	가구	가구원	성명	비고

▪ 어제 하루 동안 조리하신 음식의 내용과 분량을 말씀해 주십시오.

식사구분	음식명	음식총량			식품재료명 [상품명]	가공여부	식품 상태	식품재료량			음식코드	식품코드	비고		
		눈대중분량	부피	중량				눈대중분량	부피	중량			참고사항	제품명	제조회사명

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 식품섭취조사표 II (개인별 24시간 회상법) -
(만 1세 이상)

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

조사표 종류	조사연도
식품섭취조사표 II	10 11 12
조사일	조사원
월 일 요일	

대상자	조사구	거처	가구	가구원	성명	성별	만나이	응답자	거처	가구	가구원	성명	비고

1. 어제 하루 동안 섭취하신 식사 내용과 분량을 말씀해 주십시오.

식사 구분	시간	식사 장소	매식 여부	음식명	조리음식			섭취음식			식품 재료명 및 식품상태	가공 여부	식품재료량			음식 코드	식품 코드	비고		
					눈대중량	부피	중량	눈대중량	부피	중량			눈대중량	부피	중량			참고사항	제품명	제조 회사명

2. 특별한 이유로 인해 식사 조절을 하고 계십니까? □① 예 □② 아니오

3. (2번 문항에 '①예' 로 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?

□① 질환이 있어서 (질환명 :) □② 체중을 조절하기 위해서 □③ 기타 ( )

4. 어제 섭취하신 식사 분량은 평소의 식사에 비해서 어떻습니까?

□① 평소에 비해서 많이 섭취하였다 □② 평소와 비슷하였다 □③ 평소에 비해 적게 섭취하였다

5. 하루에 물(생수, 보리차, 결명자차, 옥수수차 등)을 얼마나 섭취하십니까? ( )컵(200㎖)

6. (가임기 여성의 경우) 임신 또는 수유 중이십니까? □① 임신 중 □② 수유 중 □③ 비해당

7. (영유아의 경우) 모유를 수유하고 있습니까? □① 예 □② 아니오

보건복지부 MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

질병관리본부 KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

II-2. 식생활조사표

■ 식습관 조사

1. 지난 이틀 동안 매끼 식사를 하셨습니까?

1일전 (어제)	아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오
2일전 (그제)	아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오

2. 최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식(배달음식, 포장음식 포함), 급식, 종교단체 제공음식 등)을 얼마나 자주 하셨습니까?

① 하루 2회 이상	⑤ 주 1~2회
② 하루 1회	⑥ 월 1~3회
③ 주 5~6회	⑦ 거의 안한다(월 1회 미만)
④ 주 3~4회	

3. 최근 1년 동안 대체로 가족(가족 중 한사람 이상)과 함께 식사하셨습니까? 끼니별로 답해 주십시오.

아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오

■ 식이보충제

4. 식이보충제 복용 경험에 관한 조사입니다.

4-1. 최근 1년 동안 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?	① 예 ② 아니오
4-2. 최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?	① 예 ② 아니오

■ 영양지식(초등학생 이상만 응답하십시오.)

5. 최근 1년간 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 ③ 비해당

6. 다음은 '영양표시' 에 관한 내용입니다. '영양표시' 를 알고 계십니까?

① 예 (⇒ 6-1번 문항으로 이동) ② 아니오 (⇒ 7번 문항으로 이동) ③ 비해당

6-1. 6번 문항에서 '①예' 라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시' 를 읽으십니까?

① 예 (⇒ 6-1-1번 문항으로 이동) ② 아니오 (⇒ 7번 문항으로 이동)

6-1-1. 6-1번 문항에서 '①예' 라고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까?

① 열량	④ 단백질	⑦ 트랜스지방	⑩ 기타
② 탄수화물	⑤ 지방	⑧ 콜레스테롤	
③ 당류	⑥ 포화지방	⑨ 나트륨	

6-1-2. 6-1번 문항에서 '①예' 라고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까?

① 예 ② 아니오

■ 식품안정성 조사

7. 최근 1년간 식생활 지원 프로그램(영양플러스사업, 복지관 노인 급식, 방학 중 도시락 지원)을 받아본 경험이 있습니까?

① 예 ② 아니오

※8번 문항은 가구원 중에 한분만 답해주십시오.
8. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

① 우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다


■ 영유아기식생활조사(만 12개월 이상 48개월 미만만 응답하십시오.)

9. 출생 시 아기의 체중은 몇 kg이었습니까?	□.□□ kg

10. 아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.

10-1-1. 모유 수유 여부	10-1-2. 모유 수유 시작 시기	10-1-3. 모유 수유 기간
① 예	□□ 주	□□ 개월
② 아니오	□□ 주	□□ 개월

10-2-1. 조제분유 수유 여부	10-2-2. 조제분유 수유 시작 시기	10-2-3. 조제분유 수유 기간
① 예	□□ 주	□□ 개월
② 아니오	□□ 주	□□ 개월



11. 일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까?	□□ 개월

12. 모유나 조제분유 외의 이유보충식을 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까?	□□ 개월

13. 출생 이후 만 12개월 이전까지 영양제를 복용한 경험이 있습니까?

① 예 ② 아니오

13-1. 13번 물음에 '①예' 라고 답한 경우, 아기가 복용한 영양제의 종류는 무엇이었습니까? (복수응답가능)

① 비타민/무기질제(종합비타민 포함)	④ 초유영양제
② 키성장영양제(유청분말 등)	⑤ 프로폴리스
③ 유산균영양제/정장제 (프로바이오틱스,비피더스 등)	⑥ 클로렐라
	⑦ 기타_____

II-3. 식품섭취빈도조사표

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 식품섭취빈도조사표 -
(만 12세 이상)

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

대상자	조사구	거처	가구	가구원
성명				
성별	남 / 여			
만나이	만 세			

바코드 부착

응답자	조사구	거처	가구	가구원
성명	[대상자와 상이한 경우에만 기록]			
대상자와의 관계	[가구원이 아닌 경우에만 기록]			

바코드 부착

조사원 성명	(서명)	조사일	년
			월 일

보건복지부 MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

질병관리본부 KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

■ 다음 각 식품 혹은 각 식품을 주재료로 조리한 음식을 얼마나 자주 드시는지 응답해주십시오.

식품 및 음식명 \ 섭취빈도 (회)		1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4~6	2~3	1	2~3	1	6~11		
곡류	1.쌀	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	2.잡곡 (보리 등)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	3.라면 (인스턴트 자장면 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	4.국수 (냉면, 우동, 칼국수 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	5.빵류 (모든 빵 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	6.떡류 (떡볶이, 떡국 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	7.과자류	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
두류서류	8.두부 (국, 찌개, 부침, 조림, 순두부 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	9.콩류 (콩밥, 콩자반 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	10.두유	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	11.감자 (국, 볶음, 조림, 튀김, 찐감자 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	12.고구마 (군고구마, 찐고구마, 튀김, 맛탕 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
육류난류	13.쇠고기 (국, 탕, 찌개, 편육, 장조림, 구이, 볶음, 비프까스, 튀김, 찜 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	14.닭고기 (삼계탕, 백숙, 찜, 튀김, 조림, 볶음 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	15.돼지고기 (찌개, 구이, 볶음, 돈까스, 튀김 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	16.햄, 베이컨, 소시지 (핫도그 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	17.달걀	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	

식품 및 음식명 \ 섭취빈도 (회)		1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4~6	2~3	1	2~3	1	6~11		
생선류	18.고등어	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	19.참치	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	20.조기 (굴비 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	21.명태 (북어, 동태, 생태, 코다리 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	22.멸치	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	23.어묵류 (오뎅)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	24.오징어 (마른 오징어 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	25.조개류	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	26.젓갈류	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
채소류	27.배추 (국, 전, 김치 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	28.무 (국, 생채, 나물, 깍두기, 동치미, 단무지 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	29.무청	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	30.콩나물 (무침, 국 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	31.시금치 (국, 나물 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	32.오이 (생채, 오이소박이, 오이지 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	33.고추 (생것, 전, 볶음 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	34.당근 (생것, 튀김, 주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	35.호박 (나물, 전, 찌개 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	36.양배추 (김치, 국, 쌈, 볶음, 생것 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	37.토마토 (생것, 주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	
	38.버섯류 (볶음, 무침, 찌개, 전 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	⓪	

식품 및 음식명	섭취빈도 (회)	1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4~6	2~3	1	2~3	1	6~11		
해조류	39.미역 (국, 무침, 줄기볶음 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	40.김 (구이, 무침, 김밥 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
과일류	41.귤 (금귤, 주스, 통조림 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	42.감, 곶감	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	43.배	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	44.수박	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	45.참외	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	46.딸기	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	47.포도 (주스, 통조림 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	48.복숭아 (주스, 통조림 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	49.사과 (주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	50.바나나	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	51.오렌지 (주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
우유 및 유제품	52.우유 (저지방우유, 탈지우유, 가공우유, 분유 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	53.요구르트 (액상, 반고형 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	54.아이스크림	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	

식품 및 음식명 \ 섭취빈도 (회)		1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4~6	2~3	1	2~3	1	6~11		
음료	55.탄산음료 (콜라, 사이다, 환타 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	56.커피	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	57.녹차	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
주류	58.맥주	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	59.소주	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	60.막걸리	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
기타	61.햄버거	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	62.피자	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	
	63.튀긴 음식	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	ⓞ	

Ⅲ. 검진조사

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 검진 조사표 -
(만 1세 이상)

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

바코드부착		대상자 성명		주민번호	-		
		전 화 번 호		성 별	남 / 여	중금속	
주 소		실제생년월일	음 양	만 나 이		SM	

검진 전 확인 사항

1. 국민건강영양조사 동의 관련 사항입니다.

□① 참여동의(만10세 미만 또는 검진조사 일부동의)
□② 참여동의(만10세 이상 검진조사 전체동의)
□③ 건강설문조사 동의
□④ 검사 후 잔여 혈액 보관 동의(만10세 이상)
□⑤ 코호트 참여 동의
□⑥ 유전자 검사 동의(1,2,3항목 모두동의)
□⑦ 모두동의(해당되는 모든 검진조사참여 및 동의서작성)

2. 최근 한 달 이내 암 치료를 받았거나, 혈우병, 혈액응고장애가 있거나 항응고제 약을 복용한 적이 있습니까?
□① 예 □② 아니오

3. 현재 임신 중이십니까?(X-선, 골밀도검사자 참조)
□① 예 □② 아니오
3-1. 현재 임신 가능성이 있습니까?
□① 예 □② 아니오

4. 현재 폐경이십니까? □① 예 □② 아니오

의사 진단 유무		금일 약 복용 여부	
5. 고혈압	□① 예 □② 아니오	5-1. 고혈압 약	□① 예 □② 아니오
6. 당뇨병	□① 예 □② 아니오	6-1. 당뇨병 약	□① 예 □② 아니오
7. 고지혈증	□① 예 □② 아니오	7-1. 고지혈증 약	□① 예 □② 아니오
8. 총 공복시간 : _____시간			

현재시간				마지막섭취시간			
월	일	시	분	월	일	시	분

측정여부 및 측정치 기록

골 밀 도	□① 예	□② 아니오
채 뇨 컵	□① 예	□② 아니오
	생리여부 □① 예	□② 아니오
B S T	□① 예 □② 아니오	□□□mg/dL

신체계측

신 장	체 중	허리둘레
□□□.□cm	□□□.□kg	□□□.□cm

채혈튜브
□① All samples(②-⑤)
□② SST(일반화학) □③ NaF
□④ EDTA(CBC) □⑤ EDTA(유전자검사)
□⑥ 중금속 □⑦ SST

맥 박
□① 규칙적 _____회/15초
□② 규칙적 _____회/60초
□③ 불규칙적 _____회/60초

폐 기 능	□① 예	□② 아니오
	만족도 □① PC	□② C
구 강	□① 예	□② 아니오
안	□① 예	□② 아니오
	산 동 □① 예	□② 아니오
이비인후	□① 예	□② 아니오
흉 부 X - 선	□① 예	□② 아니오

혈압

측정팔	□① 오른쪽 □② 왼쪽		
측정치 (mmHg)	수축기	이완기	압박대 사이즈
1차			□①Child/Small Adult
2차			□②Adult
3차			□③Large arm

골관절염 □① 예 □무릎 □고관절 □척추관절 □② 아니오

건 강 설 문	□ 가구조사	□ 면접조사	□ 자기기입	□ 답례품	코디네이터 _____ (서명)

보건복지부 질병관리본부 KOREA CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

숙인(협의)번호 제 11702 호


국민건강영양조사 제5기
- 구강검사 조사표 -
(만 1세 이상)

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

바코드를 붙여주세요

○최근 1년간, 증상경험유무
치 통(만1세+) : □Y □N
악관절증상(만12+) : □Y □N
○교정치료 경험 : □Y □N

· Br.존재 시, 반드시 (괄호) 표기



치아 상태			치료 필요		
	0 = 건전치면	X= 원인을 기억하지 못하는 상실치면		0 = 치료불필요	6 = 우식으로 인한 발거필요
	1 = 우식치면	6 = 전색치면		1 = 1치면 처치필요	7 = 치주병으로 인한 발거필요
	3 = 우식경험처치치면	7 = 우식비경험처치치면		2 = 2치면이상 처치필요	8 = 기타 원인으로 인한 발거필요
	4 = 우식경험상실치면	8 = 미맹출치면		3 = 인조치관 수복필요	9 = 기타 치료필요
	5 = 우식비경험상실치면	9 = 기록불가치면		5 = 치수치료 및 수복필요	

※증상정의 · 치통: 치아가 쑤시고 욱신거리고 아픔, 차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔
· 악관절 증상: 관절잡음, 악관절통증, 개구장애 및 개구제한 등

보철물 상태 / 임플란트경험

보철물 상태 (상악 하악)
0 = 보철물 없음
1 = 고정성가공의치 한 개
2 = 고정성가공의치 두 개 이상
3 = 국소의치만 있음
4 = 고정성가공의치와 국소의치 공존
5 = 총의치
9 = 기록불가

임플란트 존재 (상악 하악)
0 = 없음
1 = 1개 이상 존재함

보철물 필요

고정성가공의치 필요단위 수 (상악 하악)
지대치와 인공치아를 합쳐 필요한 총 단위수를 기록

국소의치 및 총의치 (상악 하악)
0 = 필요없음
1 = 국소의치 필요
2 = 총의치 필요

종합 판정

□ 정상
□ 충치치료 필요
※ 치수치료 및 수복치료 포함
□ 보철치료 필요
※ 고정성가공의치 필요 포함
□ 스켈링 필요
□ 잇몸치료 필요
□ 발치 필요
□ 틀니 필요
※ 틀니 수리 포함
□ 악관절 이상 증상
□ 치경부 마모증
□ 기타 _____

치아반점도*
*만 11세만 해당
0 = 정상치아
1 = 반점의문치아
2 = 경미도 반점치아
3 = 경도 반점치아
4 = 중등도 반점치아
5 = 고도 반점치아
7 = 불소이외의 원인으로 인한 이상
9 = 기록불가

치주조직검사*

#18-14	#13-23	#24-28
#48-44	#43-33	#34-38

*만 12세 이상만 해당
0 = 건전치주조직
1 = 출혈치주조직
2 = 치석형성치주조직
3 = 천치주낭형성치주조직 (4~5mm)
4 = 심치주낭형성치주조직 (6mm이상)
X = 제외 (※ 입력코드 = 8)

보건복지부 질병관리본부

000

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 구강면접 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. (0-2) **[만 1세 이상]**
스스로 생각할 때, 치아와 잇몸 등 본인의 구강건강이 어떻다고 생각하십니까?

[1] 매우 좋음 [2] 좋음 [3] 보통 [4] 나쁨 [5] 매우 나쁨

2. **[만 19세 이상]**
현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 다음과 같은 불편감을 느끼십니까?
(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오)

(0-3)
2-1. 음식 씹는 데 불편감

[1] 매우 불편함
[2] 불편함
[3] 그저그러함
[4] 불편하지 않음
[5] 전혀불편하지 않음

(0-4)
2-2. 명확히 발음을 하는데 어려움이나 불편감

[1] 매우 불편함
[2] 불편함
[3] 그저그러함
[4] 불편하지 않음
[5] 전혀불편하지 않음

3. (0-5) **[만 1세 이상]**
최근 1년 동안, 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

[1] 예 ⇨
3-1. 그 이유는 무엇이었습니까?
(0-6) [1] 운동 (0-7) [2] 폭력 (0-8) [3] 교통사고
(0-9) [4] 교통사고이외의 안전사고 (추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
(0-10) [5] 기타 (응답내용 그대로 기입:)

[2] 아니오

4. (0-11) **[만 1세 이상]**
최근 1년 동안, 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

[1] 예 [2] 아니오

001

5. (1-1) **[만 1세 이상]**
어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니까?

1 예 ⇨
2 아니오

5-1. 언제 칫솔질(잇솔질) 하였습니까? (복수응답)

(1-2) 1 아침식사 전에
(1-3) 2 아침식사 후에
(1-4) 3 점심식사 전에
(1-5) 4 점심식사 후에
(1-6) 5 저녁식사 전에
(1-7) 6 저녁식사 후에
(1-8) 7 간식 후에
(1-9) 8 잠자기 직전에

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에' 에 표시

6. (1-10) **[만 12세 이상]**
치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?

1 예 ⇨
2 아니오

6-1. 어떤 용품을 사용하십니까? (복수응답)

(1-11) 1 치실(Floss)
(1-12) 2 치간칫솔
(1-13) 3 양치용액(구강세정액)
(1-14) 4 전동칫솔
(1-15) 5 기타 (워터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품의 경우에만 해당)
※ 소금(죽염), 의약품(잇몸병관련) 등은 해당 없음

7. (1-16) **[만 1세 이상]**
지난 2주 동안 치과병의원을 이용하였습니까?

1 예 ⇨
2 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

(1-17) 1 구강검사(시진 X-ray 촬영 등)
(1-18) 2 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
(1-19) 3 단순 충치치료(치아충전)
(1-20) 4 치아신경치료
(1-21) 5 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)
(1-22) 6 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빼는 것은 제외)
(1-23) 7 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
(1-24) 8 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
(1-25) 9 기타(교정치료, 심미치료 등)

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 안검사 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

■ 나 이 : 만 _____ 세
■ 간이혈당검사치 : □ 200mg/dL 이상 □ 200mg/dL 미만
■ 당뇨병 과거력 : □ 있다 □ 없거나 모른다

■ 설문

만 19세 이상

1. 과거에 안과 수술을 받은 적이 있습니까?	□①예 □②아니오

※해당사항에 모두 응답해 주세요.
□①녹내장 □②백내장 □③사시 □④안검하수 □⑤망막 □⑥굴절수술(라식, 라섹, 엑시머 등) □⑦기타

2. 건 성 안 (안구건조증)	의사에게 진단을 받았음	증상 경험(건조함 또는 자극감) 여부 ※가끔 또는 때때로 증상이 있는 경우는 제외
	□①예 □②아니오	□①예 □②아니오

만 40세 이상

구 분	의사에게 진단을 받았음	현재치료 여부(약물, 수술 등)
3. 백 내 장	□①예 □②아니오	-
4. 나이관련황반변성	□①예 □②아니오	-
5. 녹 내 장	□①예 □②아니오	□①예 □②아니오

1. 시력 (만 5세 이상)

시력검사 불가능	□ 양 안	□ 우 안	□ 좌 안
시력검사 불가능 원인	□ 검사거부	□ 숫자모름	□ 무안구증 혹은 안구적출술후 상태

구 분	우 안	좌 안
1.시력	측정방법 □나안시력 □평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 □굴절수술후의 교정시력 □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무	측정방법 □나안시력 □평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 □굴절수술후의 교정시력 □1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무
2.자동굴절검사치	( ) Dsph -( ) Dcyl x ( ) A°	( ) Dsph -( ) Dcyl x ( ) A°
3.자동굴절검사값에 의한 교정시력(1.의 시력이 0.8 미만인 경우)	□1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무	□1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무
4.(자동굴절검사값+핀홀)에 의한 교정시력(3.의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	□1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무	□1.0 □0.8 □0.63 □0.5 □0.4 □0.32 □0.25 □0.2 □0.16 □0.125 □0.1 □0.025 □안전수지 □안전수동 □광각유 □광각무

2. 사시검사 (만 3세 이상)

☐ 미검진 ( )

구 분	1개만 CHECK
1. 수평사시	☐ 10 PD 이상 내편위 ☐ 10 PD 미만 내편위 ☐ 없음 ☐ 15 PD 미만 외편위 ☐ 15 PD 이상 외편위
2. 수직사시	☐ 없음 ☐ 있음
3. 기타사시	☐ 없음 ☐ 있음( )
4. 안진 (육안으로 확인 가능한 경우)	☐ 없음 ☐ 있음

3. 안검하수 검사 (만 3세 이상)

☐ 미검진 ( )

MRD 1			Levator function		
정 도	우안	좌안	정 도	우안	좌안
4.0 mm 이상	☐	☐	12mm 이상(excellent)	☐	☐
3-3.9 mm	☐	☐	8-11 mm(good)	☐	☐
2-2.9 mm	☐	☐	5-7mm(fair)	☐	☐
1-1.9 mm	☐	☐	4 mm 이하(poor)	☐	☐
1.0 mm 미만	☐	☐			

4. 세극등 검사 (만 19세 이상)

■ 4.1. 백내장 검사

☐ 미검진( )

구 분	우 안	좌 안
인공수정체안	☐	☐
무수정체안	☐	☐
백내장이 없다(유수정체안)	☐	☐
백내장이 있다(유수정체안)	☐	☐
백내장이 있는 경우 분류		
1. Cortical type	☐	☐
2. Nuclear type	☐	☐
3 .Anterior (sub)capsular type	☐	☐
4. Posterior subcapsular type	☐	☐
5. Mixed type	☐	☐

■ 4.3. 녹내장 검사

☐ 미검진( )

구 분	우 안	좌 안
안 압 (골드만 압평안압계)	( )mmHg	( )mmHg
각막후면 침착물	☐	☐
동공연의 거짓비늘	☐	☐
홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	☐	☐
주변전방깊이(각막두께의)	☐1/4이하	☐1/4이하
	☐1/4초과 1/2이하	☐1/4초과 1/2이하
	☐1/2초과	☐1/2초과

■ 4.2. 군날개 검사

☐ 미검진( )

우 안	좌 안
☐ 있음 ☐ 없음	☐ 있음 ☐ 없음
- 투명도에 따른 분류 T ( ) - 위치에 따른 분류 ☐ nasal ☐ temporal ☐ both - 익상편의 길이 (.) mm - 재발유무 ☐ 재발없음 ☐ 1회 재발 ☐ 2회이상 재발	- 투명도에 따른 분류 T ( ) - 위치에 따른 분류 ☐ nasal ☐ temporal ☐ both - 익상편의 길이 (.) mm - 재발유무 ☐ 재발없음 ☐ 1회 재발 ☐ 2회이상 재발

5. 무산동 안저촬영 (만 19세 이상) 1 standard photograph

■ 망막이상 소견	☐ 있음	☐ 발견 못함

■ 무산동안저사진 촬영이 불가능한 경우 - 원인 기록	우안	좌안
	☐ 백내장 ☐ 각막혼탁 ☐ 동공작음 ☐ 거부 ☐ 협조부족 ☐ 기타 ( ) } 산동후안저촬영	☐ 백내장 ☐ 각막혼탁 ☐ 동공작음 ☐ 거부 ☐ 협조부족 ☐ 기타 ( ) } 산동후안저촬영

■ 나이관련황반변성(AMD)

☐ 없음 ☐ 있음

AMD 있음인 경우 해당사항에 표시	우 안	좌 안
Drusen - Soft drusen	☐	☐
Hard drusen	☐	☐
RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation	☐	☐
RPE depigmentation	☐	☐
Exudative AMD-RPE detachment	☐	☐
Serous detachment of sensory retina	☐	☐
Subretinal or sub-RPE hemorrhage	☐	☐
Subretinal fibrous scar	☐	☐
Geographic atrophy	☐	☐
Disciform scar	☐	☐
Other comment	( )	( )

■ 5.1. 당뇨망막병증 혹은 기타 소견

구 분	우 안	좌 안
당뇨망막병증 혹은 유사소견	☐ N ☐ Y	☐ N ☐ Y
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	( )	( )



■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)

구 분		우 안	좌 안
시신경유두함몰비 수직방향		(.)	(.)
시신경유두함몰비 수평방향		(.)	(.)
ISNT rule 만족여부		☐ 만족 ☐ 불만족	☐ 만족 ☐ 불만족
시신경유두출혈		☐	☐
망막신경섬유층결손	상이측	☐	☐
	하이측	☐	☐

6. 녹내장 (시야검사 - 만19세이상)

1)IOP≥22mmHg 2)시신경유두함몰비(수직 혹은 수평방향) 0.5 이상
3)ISNT rule 불만족 4)시신경유두출혈 5)망막신경섬유층결손이 있을 경우
➡ 시야검사 실시 후 결과 입력

☐ 미검진( )

구 분	우 안	좌 안
시야검사 이상을 네모칸 안에 직접 아래의 숫자로 기입 ⓞ p>=1% ① p<1% ② p<0.5% ③ Not seen at maximum ➡		
Test duration (예0:32=32초임)	____초	____초
FIXATION ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐/3 (%)	☐/3 (%)
FALSE POS ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	☐/3 (%)	☐/3 (%)

※ FIXATION ERRS, FALSE POS ERRS가 2개 이상 있을 때 재검사(1개는 괜찮음)

7. 산동 후 안저촬영 (만 19세 이상)

대 상 자	
1) 당뇨병력이 있거나, Random blood sugar ≥200mg/dL 2) 무산동 안저촬영에서 당뇨망막병증이 의심되는 경우 3) 심한 매체혼탁으로(기준참조) 무산동 안저촬영이 어려운 경우 ※시야검사와 산동 후 안저촬영을 모두 시행해야 하는 경우에는 시야검사를 먼저시행 ※1) 또는 2)인 경우 ⇨ 7 standard photograph 필요	☐ 미검진( )
산동 동의 여부	
☐ Yes ☐ No	

당뇨망막병증 검사	우 안	좌 안
당뇨망막병증 유무(Y인 경우 다음 해당사항에 표시)	☐ N ☐ Y	☐ N ☐ Y
Microaneurysm	☐	☐
Dot hemorrhage	☐	☐
Hard Exudate	☐	☐
CWS	☐	☐
Venous loop or beading	☐	☐
IRMA	☐	☐
CSME	☐	☐
NVD	☐	☐
NVE	☐	☐
vitreous or preretinal hemorrhage	☐	☐
Fibrous proliferation	☐	☐
TRD	☐	☐
Previous PRP or any laser therapy	☐	☐
Phthisis bulbi or enucleation due to DR	☐	☐
Other comment	( )	( )

기타 산동 후 안저촬영 소견	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	( )	( )
산동 안저사진 촬영이 불가능한 경우 원인 기록	( )	( )

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 검진 기본설문지 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

가족력 (만10세이상)

1. 귀 가족 중에서 의사로부터 다음의 질병을 진단받으신 적이 있으십니까? □①예 □②아니오

※ 결혼한 여자 분의 경우는 친정가족이 해당됩니다.

구분	부	모	형제자매
고혈압	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
고지혈증	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
허혈성심질환 (심근경색증, 협심증)	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
뇌졸중(중풍)	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
당뇨	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
암	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름	□①예 □②아니오 □③모름
	암종류 ( )	암종류 ( )	암종류 ( )

안검사 설문

1. [만 12세 이상] 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제이십니까?
   □①한달이내에 받았음
   □②한달이상 1년 이내에 받았음
   □③1년 이상 3년 이내에 받았음
   □④3년 이상 되었음
   □⑤한번도 검사 받은 적이 없음

2. [만 19세 이상] 만19세이후부터 하루 일과 중 선글라스나 모자를 착용하지 않고 햇볕(뙤약볕)에 직접 노출되는 시간은 평균 어느 정도입니까?
   □①2시간 미만 □②2-5시간 □③5시간 이상

3. [만 12세 이상] 귀하의 직계가족(부모, 또는 조부모, 형제 자매, 자녀) 중 안과 질환을 앓은 사람이 있습니까? 해당사항에 모두 응답해 주세요.
   □①예 ⇨ □①녹내장 □②백내장 □③사시 □④안검하수 □⑤망막 □⑥기타 안과질환
   □②아니오

4. [만 12세 이상] 수족냉증(손발이 찬 증상)이나 편두통(한쪽 머리가 욱신거리는 아픈 증상)을 앓고 있거나 앓은 적이 있습니까?
   □①수족냉증 □②편두통 □③수족냉증과 편두통 □④없음

5. [만 12세 미만] 지난 1년 동안 안과검사(시력검사)를 받은 적이 있습니까? 받은 곳은 어디입니까?
   □①예 ⇨ □①건강보험공단 신체검사로 소아과에서 □②건강보험공단 신체검사로 안과에서 □③안경점 □④안과 □⑤학교 □⑥기타
   □②아니오

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 이비인후검사 설문지 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. [만 4세 이상] 이비인후질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음(평생)	최근 2주간 치료여부(수술, 약물)
부비동염	□ 예 □ 아니오	□ 예 □ 아니오
알레르기비염	□ 예 □ 아니오	□ 예 □ 아니오
중이염	□ 예 □ 아니오	□ 예 □ 아니오

2. [만 40세 이상] 최근 1년 이내, 어지럼증이나 균형감의 이상을 경험하신 적이 있습니까?

□ 예 ➪
- 2-1. 최근 1년 이내에 누워서 몸을 돌리거나 아침에 잠자리에서 일어날 때 심한 어지러움이 있었습니까?
  - □ 지금 현재 그렇다
  - □ 현재는 괜찮지만, 1년 이내 그런 적이 있다
  - □ 없다
- 2-2. 최근 1년 이내에 별다른 외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러지신 적이 있었습니까?
  - □ 예 □ 아니오

□ 아니오

3. [만 19세 이상] 현재 본인의 목소리에 이상이 있다고 생각하십니까?

□ 예 ➪
- 3-1. 목소리 이상이 생긴 지 얼마나 되셨습니까?
  - □ 3주 이내 □ 3주 이상

□ 아니오

4. [만 12세 이상] 다음 중 (보청기를 사용하지 않은 상태에서) 본인의 청력을 가장 잘 표현한 문장을 선택 하십시오.

□ 불편하지 않다

□ 약간 불편하다
□ 많이 불편하다
□ 전혀 들리지 않는다 ➪
- 4-1. 현재 보청기나 인공와우를 사용하고 계십니까?
  - □ 예
  - □ 있지만 거의 사용 안 한다
  - □ 아니오

5. [만 12세 이상] 최근 1년 이내, 귀에서 소리가 난적이 있습니까?(지지직, 삐, 웅웅, 기계소리 등)

☐ 예 ➪

5-1. 귀에서 나는 소리가 생활에 얼마나 불편하신지요?
- ☐ 불편하지 않다
- ☐ 성가시고 신경이 쓰인다
- ☐ 잠을 이루기가 힘들 정도이다

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

6. [만 6세 이상] 최근 1년 이내, 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움증 등의 비염증상을 경험한 적이 있습니까?

☐ 예 ➪

6-1. 상기증상은 어느 계절에 나타납니까?
- ☐ 특정계절에만 나타난다
- ☐ 일년 내내 나타난다

6-2. 일주일에 상기증상이 얼마나 오래 지속됩니까?
- ☐ 4일미만 ☐ 4일이상

6-3. 상기증상이 길게는 얼마나 지속됩니까?
- ☐ 1달미만 ☐ 1달이상

6-4. 위의 증상 때문에 공부/일/수면에 방해가 됩니까?
- ☐ 예 ☐ 아니오

☐ 아니오

7. [만 6세 이상] 아래 증상 중 **3개월 이상 지속**되고 있는 항목에 모두 표시 해 주세요.

증 상	없 다	있 다
6-1. 비루 혹은 후비루 (anterior/posterior nasal drip)	☐	☐
6-2. 코막힘	☐	☐
6-3. 안면부 동통(pain)이나 압박감	☐	☐
6-4. 후각장애(anosmia or hyposmia)	☐	☐

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기 이비인후검사 - 소음노출 설문지(만12세이상) -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악을 들은 적이 있습니까?

☐ 예 ➪ 1-1. 하루 중 위와 같은 장소에서 이어폰으로 음악을 듣는 시간은 평균 얼마나 됩니까?
평균 ☐☐☐분/하루

☐ 아니오
☐ 기억이 나지 않는다

2. 지금까지 기계음이나 발전기와 같은 소음이 큰 장소에서 3개월 이상 근무한 적이 있습니까?
※소음이 크다는 것은 대화를 위해 말소리를 높여야 될 정도를 의미합니다.

☐ 예 ➪ 2-1. 근무한 기간은 총 얼마나 됩니까?
☐☐☐개월

2-2. 청력을 보호하기 위한 장비(귀마개,귀덮개)를 착용하였습니까?
☐ 예 ☐ 아니오

☐ 아니오

3. 지금까지 직업적 노출 외 한 주에 5시간 이상 큰 소음에 노출된 적이 있습니까?
※소음이 크다는 것은 대화를 위해 말소리를 높여야 될 정도를 의미하며 차, 트럭, 오토바이, 기계소리 혹은 큰 음악소리(예: 노래방, 공연장)를 말합니다.

☐ 예 ➪ 3-1. 하루 중 소음에 노출되는 시간은 평균 얼마나 됩니까?
평균 ☐☐☐분/하루

☐ 아니오
☐ 기억이 나지 않는다

4. 지금까지 총소리나 폭발음과 같이 순간적인 큰 소음에 노출된 적이 있습니까?

☐ 예 ➪ 4-1. 청력을 보호하기 위한 장비(귀마개,귀덮개)를 착용하였습니까?
☐ 예 ☐ 아니오

☐ 아니오
☐ 기억이 나지 않는다

○ 조사표 뒷장 기타소견란에는 검진 시 기타사항과 반드시 기록해야 할 사항에 대해 직접 기입하여 주세요.

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 이비인후검사조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

Ⅰ. 이과시진(1세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

안면신경마비	Ⅰ~Ⅱ	Ⅲ ~ Ⅵ	
		우	좌
H-B grade	□	□	□

외이이상확인			
우	□정상/Gr1	□Marx Gr2	□Marx Gr3
좌	□정상/Gr1	□Marx Gr2	□Marx Gr3

전이개누공	우	좌
Preauricular sinus	□Y □N	□Y □N

Ⅱ. 비 과 - 수축전(6세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

비강검사		
창백한 점막	□Y	□N
수양성비루	□Y	□N
점액성 혹은 농성비루	□Y	□N

Ⅲ. 이 과- 0도 내시경(4세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

외이도 협착유무			
우	□정상/Gr1	□Incomplete	□Complete
좌	□정상/Gr1	□Incomplete	□Complete

고 막 검 사			
우	□정상	□비정상	□판정불가(사유기입:)
좌	□정상	□비정상	□판정불가(사유기입:)

비정상 소견시	
천 공	
우	□Y
좌	□Y
진주종	
우	□Retraction Pocket □Cholesteatoma □선천성진주종
좌	□Retraction Pocket □Cholesteatoma □선천성진주종
삼출성중이염	
우	□중이삼출액 □환기관 삽입상태
좌	□중이삼출액 □환기관 삽입상태

Ⅳ. 두경부 - 70도 내시경(19세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

후두 내시경	□정 상 □비정상 □판정불가(사유기입:)
비정상 소견시	
①성대결절	□N □Rt □Lt □Both
②성대폴립	□N □Rt □Lt □Both
③성대낭종	□N □Rt □Lt □Both
④라인케부종	□N □Rt □Lt □Both
⑤성대마비	□N □Rt □Lt □Both
⑥접촉성육아종	□N □Rt □Lt □Both
⑦성대구증	□N □Rt □Lt □Both
⑧성대각화증	□N □Rt □Lt □Both
⑨후두개낭종	□N □Present
⑩후두염	□N □Present
⑪후두유두종	□N □Present
⑫후두유두종 부위	□TVC □FVC □Epiglottis □AE fold □Arytenoid
⑬후두악성종양의증	□N □Present
⑭후두악성종양 의증부위	□TVC □FVC □Epiglottis □AE fold □Arytenoid

Ⅴ. 비 과 - 수축후(12세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

비중격만곡증	우	좌
	□Y □N	□Y □N

✓ 비중격의 좌우 대칭이 존재하면 C형 만곡인 경우 더 좁은 쪽의 □Y에 기입하고, S형인 경우 우, 좌 모두 □Y에 기입

비 강		
중비도농성비루	□Y	□N
비용종	□Y	□N
비용종외 종물	□Y	□N

Ⅵ. 이 과- 어지럼증검사(40세 이상)

□미검진(사유: 아래 번호기입)

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

	조건1	조건2	조건3	조건4
1차	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초
2차	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초	□PASS □DNP/ 초

♂ 미검진사유

①거 부
②도움없이 서있기 불가능
③하체보조기 장착
④체중 120kg초과
⑤현재 심한 어지럼증 있음
⑥기 타

♂ 주의사항

* PASS : 조건1, 2는 15초
  조건3, 4는 20초
* DNP(DO NOT PASS)는 직접 초 기입

Ⅶ. 이 과- 청력검사(12세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

Hz	우 측	좌 측
500		
1000		
2000		
3000		
4000		
6000		

♂ 청력검사결과는 정수로 기입(반올림없이 소수점 이하 버림
<예>17.67시→17만 입력)

✎기타소견

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 호흡기계검사 설문지-

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

흉부 X-선검사 설문(만15세이상)

증상 구분	발현 여부(발현일수)	증상 구분	발현 여부(발현일수)
기 침	□① 예(_____) □⓪ 아니오	체중감소	□① 예(_____) □⓪ 아니오
가 래	□① 예(_____) □⓪ 아니오	피 로 감	□① 예(_____) □⓪ 아니오
혈 담	□① 예(_____) □⓪ 아니오	발 열	□① 예(_____) □⓪ 아니오
흉 통	□① 예(_____) □⓪ 아니오	야간발열	□① 예(_____) □⓪ 아니오
호흡곤란	□① 예(_____) □⓪ 아니오	기 타	□① 예(_____) □⓪ 아니오

※ 현증상 : □① 예 □⓪ 아니오 란에 check. 발현일수 : 예인 경우 직접기입, 없는 경우는 기입하지 않음

폐기능검사 설문(만40세이상)

1. 다음의 증상을 경험한 적이 있습니까?(폐기능 대상자 선별 질문)

1-1.통증이 있는 귀감염이 있는지	□ ①예	□ ②아니오
1-2.동맥류, 망막박리, 뇌졸중, 심장마비, 기흉 진단 경험	□ ①예	□ ②아니오
1-3.지난 3개월 동안 안과 수술 받은 경험	□ ①예	□ ②아니오
1-4.지난 3개월 동안 개심술이나 개복술을 받은 경험	□ ①예	□ ②아니오
1-5.지난 3개월 동안 뇌졸중 혹은 심장마비가 있었던 경험	□ ①예	□ ②아니오
1-6.현재 본인이 결핵으로 진단	□ ①예	□ ②아니오
1-7.지난 한달 동안 기침에서 피가 섞여 나온 경험	□ ①예	□ ②아니오

2. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 기침을 한 적이 있습니까?

□예 ➪ 2-1. 기침을 몇 년간 하셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
□□년

□아니오

3. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 가래가 나온 적이 있습니까?

□예 ➪ 3-1. 가래가 몇 년간 나오셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
□□년

□아니오

4. 폐질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음	의사에게 처음 진단받은 시기	치료여부	최근 1년간 입원여부
만성폐쇄성폐질환 (만성기관지염,폐기종)	□예 □아니오	만____세	□현재 치료 중임 □과거 치료 받음 (현재 치료받지 않음) □치료받은 적 없음	□예 □아니오

바코드를 붙여주세요

승인(협의)번호 제 11702 호

국민건강영양조사 제5기
- 골밀도검사 설문지-

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

만10세이상

1. 최근 일주일동안 조영제 및 핵의학 검사를 받은 적이 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

2. 부모 중 골다공증 진단 또는 허리가 휘었거나, 경미한 외상에 뼈가 부러진 분이 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

만50세이상

1. 골다공증으로 의사에게 진단받은 적이 있습니까?

☐ 예 ⇨ 1-1. 현재 치료중이십니까?

☐ 예 ☐ 아니오

☐ 아니오

2. 의사로부터 척주, 고관절, 손목 등이 골절되었다고 들어본 적이 있습니까?

☐ 예 ⇨ 2-1 골절된 부위는 어디입니까?

☐척추 ☐고관절(골반뼈) ☐손목 ☐기타_____

※ 중복 체크 가능

☐ 아니오

3. 젊은 시절 가장 큰 키는 얼마입니까? ☐☐☐.☐cm

※소수점 첫째자리까지 기입

제 3 장 참 여 진

Ⅰ. 국민건강영양조사 수행

○ 보건복지부 건강정책과 : 과장 류근혁

박창규(사무관)	전은희(주무관)

○ 질병관리본부 건강영양조사과 : 과장 오경원

통계팀		장명진 팀장(책임연구원) 이나연(선임연구원)	조유미(선임연구원) 박선민(기술연구원)	양지은(기술연구원) 한만규(기술연구원)
검진팀		김윤아 팀장(연구관) 전채민(보건연구사) 임진영(구강역학조사관) 황동현(구강역학조사관)	노선진(선임연구원) 이연경(선임연구원) 조은실(선임연구원) 표은영(선임연구원)	박혜진(기술연구원) 신보미(기술연구원) 이아리(기술연구원)
건강설문팀		김윤정 팀장(책임연구원) 최선혜(보건연구사) 김소연(선임연구원)	서주희(선임연구원) 도승연(기술연구원) 지유나(기술연구원)	손지훈(학사연구원) 한정민(학사연구원)
영양팀		권상희 팀장(연구관) 김기랑 팀장(책임연구원) 김양하(선임연구원)	박진경(선임연구원) 윤성하(선임연구원) 정명주(선임연구원)	박진영(기술연구원) 양연주(기술연구원) 임아영(기술연구원)
전문조사수행팀	1권역	한세현 팀장(선임연구원) 이영옥(선임연구원)	김소현(기술연구원) 전경자(기술연구원)	홍정희(기술연구원) 황지원(기술연구원)
	2권역	이여진 팀장(선임연구원) 금성현(기술연구원)	김혜숙(기술연구원) 김태연(기술연구원)	최선미(기술연구원) 유승남(일반연구원)
	3권역	송민선 팀장(선임연구원) 김은숙(기술연구원)	김태린(기술연구원) 이상희(기술연구원)	정주희(기술연구원) 최성희(기술연구원)
	4권역	최경희 팀장(선임연구원) 정민영(선임연구원)	김소영(기술연구원) 남후남(기술연구원)	배수연(기술연구원) 진청희(일반연구원)
	영양팀	양경아(선임연구원) 이정현(선임연구원) 김미정(기술연구원) 김소정(기술연구원)	정명재(기술연구원) 박영숙(기술연구원) 신서윤(기술연구원) 김아라(기술연구원)	윤기옥(기술연구원) 이아름(기술연구원)

○ 공중보건치과의

김현석(구강보건사업지원단)
권인환(부산 기장군보건소)
정기태(대구 달성군보건소)
송찬호(대구 달성군보건소)
이승훈(인천 강화군보건소)
채민석(인천 강화군보건소)
김민구(대전 서구보건소)
이영기(대전 보건정책과)
문상원(울산 울주군보건소)
이수연(경기 김포시보건소)
유명상(경기 이천시보건소)
조 훈(경기 이천시보건소)
김동현(경기 파주시보건소)
김재원(경기 가평군보건소)
김석호(경기 가평군보건소)
고경우(강원 동해시보건소)
권 철(강원 철원군보건소)
김재기(충북 충주시보건소)
김민석(충북 충주시보건소)
구열회(충남 논산시보건소)
전용섭(충남 보령시보건소)
김준규(충남 아산시보건소)
양국일(충남 천안시보건소)
김진호(충남 당진군보건소)
서영근(전북 고창군보건소)
오형석(전북 고창군보건소)
강승원(전남 여수시보건소)
하태민(전남 무안군보건소)
최영준(전남 신안군보건소)
심민보(전남 함평군보건소)
류상호(경북 칠곡군보건소)
서성훈(경북 포항시보건소)
방경환(경남 도청보건위생과)
성동재(경남 진주시보건소)
박현창(경남 창원시보건소)
김준우(제주 제주서부보건소)

○ 대한결핵 및 호흡기학회, 대한골다공증학회

강창수(대한결핵협회 제주지부)
김관기(대한결핵협회 경기지부)
김영진(대한결핵협회 대전지부)
김영환(대한결핵협회 인천지부)
김윤수(대한결핵협회 부산지부)
김진수(대한결핵협회 경남지부)
김형우(대한결핵협회 서울지부)
류기현(대한결핵협회 전북지부)
박성권(대한결핵협회 경기지부)
박정환(대한결핵협회 대구경북지부)
오근영(대한결핵협회 대전지부)
오승철(대한결핵협회 경기지부)
오환욱(대한결핵협회 전남지부)
이명희(대한결핵협회 충북지부)
이윤재(대한결핵협회 울산경남지부)
장진욱(대한결핵협회 서울지부)
정현성(대한결핵협회 서울지부)
조원중(대한결핵협회 강원지부)
최만호(대한결핵협회 경기지부)
최선규(대한결핵협회 대구경북지부)
최승호(대한결핵협회 서울지부)
황현욱(대한결핵협회 대구경북지부)
김세미(대한골다공증학회)
박문수(대한골다공증학회)
손은희(대한골다공증학회)
유창수(대한골다공증학회)

○ 대한안과학회

강명수(단국대학교병원)
강병완(전남대학교병원)
강용석(인제대학교 상계백병원)
강효정(건양대학교병원)
고병욱(동아대학교병원)
고상준(원광대학교병원)
고태혁(김안과학교병원)
공석준(가톨릭대학교 성빈센트병원)
곽주영(충남대학교병원)
구 현(중앙대학교 용산병원)
구병영(영남대학교병원)
권준기(고려대학교 구로병원)
김경진(인하대학교병원)
김나미(부산대학교 병원)
김동욱(한림대학교 강남병원)
김명준(경북대학교병원)
김미정(서울대학교병원)
김보윤(가톨릭대학교 강남병원)
김부기(전북대학교병원)
김성일(가톨릭대학교 의정부병원)
김세경(연세대학교 영동병원)
김소윤(가톨릭대학교 의정부병원)
김시정(동강병원)
김영국(을지대학교병원)
김영욱(한림대학교 평촌병원)
김영호(고려대학교 구로병원)
김오제(건양대학교병원)
김윤택(삼성서울병원)
김인근(메리놀병원)
김재우(가톨릭대학교 강남병원)
김종호(경북대학교병원)
김주연(김안과병원)
김주현(한림대학교 강남병원)
김준용(가톨릭대학교 강남병원)
김지욱(순천향대학교 부천병원)
김진선(영남대학교병원)
김진우(연세대학교 원주병원)
김찬영(가톨릭대학교 여의도병원)
김체론(경상대학교병원)
김태형(중앙대학교병원)
김형준(건국대학교병원)
김혜선(연세대학교 신촌병원)

김호숭(성모안과병원)
노시진(연세대학교 신촌병원)
류수정(한림대학교 춘천병원)
류진영(이화여자대학교 목동병원)
문성운(경희대학교병원)
문호석(가천의과대학교 길병원)
박가희(순천향대학교 부천병원)
박대영(영남대학교병원)
박새미(순천향학교병원)
박선영(연세대학교 신촌병원)
박성욱(분당서울대학교병원)
박수연(아주대학교병원)
박정원(전남대학교병원)
박종훈(서울아산병원)
박준호(경북대학교병원)
박진구(단국대학교병원)
박진형(경희대학교병원)
박진환(고려대학교 구로병원)
박채린(분당서울대학교병원)
배신우(충북대학교병원)
서지원(가천의과대학교 길병원)
석수지(동국대학교병원)
손성완(서울위생병원)
송낭희(조선대학교병원)
송인제(인제대학교 부산백병원)
송해윤(왈레스침례병원)
신경섭(충남대학교병원)
신용일(충남대학교병원)
신용태(경북대학교병원)
신주연(연세대학교 신촌병원)
신중원(한양대학교병원)
신혜영(가톨릭대학교 여의도병원)
심종우(연세대학교 영동병원)
안성민(동국대학교병원)
양종윤(연세대학교 신촌병원)
양현승(서울보훈병원)
엄태웅(서울아산병원)
염동주(인제대학교 서울백병원)
염정훈(삼성서울병원)
우영준(연세대학교 원주병원)
유나경(서울대학교병원)
유성광(전북대학교병원)
유자영(건국대학교병원)
유재호(고신대학교병원)
유준호(고려대학교 안암병원)
윤철민(고려대학교 구로병원)
이가현(건강보험공단 일산병원)
이강훈(인하대학교병원)
이대웅(강북삼성병원)
이동민(연세대학교 신촌병원)
이동철(계명대학교병원)
이병희(제일안과병원)
이상문(분당서울대병원)
이상준(부산대학교병원)
이성민(관동대학교 명지병원)
이수환(서울아산병원)
이승희(대구가톨릭대학교병원)
이영섭(경희대학교병원)
이원석(연세대학교 영동병원)
이은경(서울대학교병원)
이재연(포천중문의과대학교 분당차병원)
이정민(삼성서울병원)
이종민(대구가톨릭대학교병원)
이주향(한양대학교병원)
이창목(한림대학교강동병원)
이창민(파티마병원)
임경오(인제대학교 서울백병원)
임수호(영남대학교병원)
임은혜(김안과병원)
장동진(가톨릭대학교 여의도병원)
장윤수(김안과병원)
장정현(메리놀병원)
장현덕(메리놀병원)
전찬양(건양대학교병원)
정무오(조선대학교병원)
정병주(가톨릭대학교 여의도병원)
정상문(왈레스기념침례병원)
정세형(전남대학교병원)
정윤혜(가톨릭대학교 여의도병원)
정재훈(고려대학교 안암병원)
정종현(계명대학교병원)
정지원(인하대학교병원)
조동현(서울대학교병원)
조두영(한림대학교 강남병원)
조수창(분당서울대학교병원)
조순영(가톨릭대학교 강남병원)
조아란(순천향학교병원)
조은형(아주대학교병원)
조효종(인제대학교 상계병원)
주광식(중앙대학교병원)
주원경(삼성서울병원)
진상욱(동아대학교병원)
진현철(계명대학교병원)
최 원(전남대학교병원)
최덕규(충북대학교병원)
최아영(아주대학교병원)
최연주(순천향대학교병원)
최영준(연세대학교 신촌병원)
최윤정(이화여자대학교 목동병원)
최재원(인제대학교 부산백병원)
최재원(인제대학교 부산백병원)
최정열(인제대학교 일산병원)
하만묵(강북삼성병원)
하상원(경북대학교병원)
한소영(강북삼성병원)
한정모(서울대학교병원)
허동원(충남대학교병원)
홍정석(영남대학교병원)
황규연(가톨릭대학교 강남병원)

○ 대한이비인후과학회

강민영(동아대학교병원)
고영길(한림대학교 춘천병원)
고주석(경상대학교병원)
구용철(연세대학교 세브란스병원)
권민한(왈레스침례병원)
김건우(단국대학교병원)
김기용(한양대학교병원)
김남균(가톨릭대학교병원)
김동활(충북대학교병원)
김범준(인하대학교병원)
김병하(조선대학교병원)
김세헌(가톨릭대학교 서울성모병원)
김연수(강남성심병원)
김연수(고려대학교 구로병원)
김용현(한림대학교 성심병원)
김은성(연세대학교 세브란스병원)
김은혜(가톨릭대학교 성빈센트병원)
김이석(순천향대학교병원)
김재은(인하대학교병원)
김종민(한양대학교병원)
김학준(충남대학교병원)
김현지(이화여자대학교 목동병원)
남상원(한림대학교병원)
김윤호(단국대학교병원)
두형탁(서울아산병원)
류은웅(경희대학교병원)
문미진(부산대학교병원)
문태현(단국대학교병원)
민한기(광주기독병원)
박도양(연세대학교 세브란스병원)
박동욱(가천의과대학교 길병원)
박재홍(분당재생병원)
박진영(이화여자대학교 목동병원)
박창묵(경북대학교병원)
백삼현(대구파티마병원)
심병수(강릉아산병원)
안재철(서울대학교병원)
양병욱(계명대학교 동산병원)
우창기(부산대학교병원)
원호륜(중앙대학교병원)
유순호(전북대학교병원)
유승우(조선대학교병원)
유준혁(고려대학교 안산병원)
윤삼필(대구파티마병원)
이강규(삼성서울병원)
이도준(단국대학교병원)
이동근(동아대학교병원)
이동원(연대세브란스병원)
이범준(가톨릭대학교 서울성모병원)
이상민(울산대학교병원)
이선욱(강북삼성병원)
이원용(서울삼성병원)
이재훈(고신대학교병원)
이정호(가천의과대학교 길병원)
이진우(충남대학교병원)
이하나(서울아산병원)
이한빈(아주대학교병원)
이현민(부산대학교병원)
이현진(중앙대학교병원)
이호준(서울아산병원)
임동욱(인하대학교병원)
장문영(서울대학교병원)
장원익(순천향대학교병원)
정기홍(전남대학교병원)
정기화(인하대학교병원)
정상환(왈레스침례병원)
정성원(단국대학교병원)
정수연(이화여자대학교 목동병원)
정수영(경희대학교병원)
정주환(한양대학교병원)
정한진(서울대학교병원)
정효진(연세대학교 세브란스병원)
조민호(원광대학교병원)
조일권(단국대학교병원)
주연희(가천의과대학교 길병원)
진선영(가톨릭대학교 의정부병원)
진희성(순천향대학교 부천병원)
채수량(가톨릭대학교 서울성모병원)
최성웅(고려대학교 구로병원)
최성원(부산대학교병원)
최승재(영남대학교병원)
최정석(건국대학교 충주병원)
하민수(강릉아산병원)
하승용(마산삼성병원)
한바다(대구가톨릭대학교병원)
한순용(계명대학교 동산병원)
한창덕(인하대학교병원)
홍성문(고려대학교 구로병원)
홍재민(연세대학교 세브란스병원)
황치상(연세대학교 세브란스병원)

II. 국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 조정 및 분과별 자문위원회

조정자문위원		강영호(울산대학교 의과대학) 강은정(순천향대학교) 김초일(한국보건산업진흥원) 남정모(연세대학교 의과대학) 문현경(단국대학교 식품영양학과)	박진우(수원대학교 통계정보학과) 백현욱(분당제생병원) 송정한(서울대학교 의과대학) 오경재(원광대학교 의과대학) 오한진(관동대학교 의과대학)	이순영(아주대학교 의과대학) 전진호(인제대학교 의과대학) 정해관(성균관대학교 의과대학) 조성일(서울대학교 보건대학원) 최보율(한양대학교 의과대학)
분과별 자문위원	간염	조용균(성균관대학교 의과대학)	한준열(가톨릭대학교 의과대학)	
	건강 형평성	강영호(울산대학교 의과대학)	김명희(시민건강증진연구소)	변용찬(한국보건사회연구원)
	결핵	권오정(성균관대학교 의과대학)	김희진(결핵연구원)	심태선(울산대학교 의과대학)
	고혈압	김순길(한양대학교 의과대학)	김종진(경희대학교 의과대학)	김철호(서울대학교 의과대학)
	골관절염	김문종(차의과대학) 김병성(경희대학교 의과대학)	이상현(의료보험관리공단 일산병원) 장종범(서울대학교 의과대학)	최남홍(노원을지병원)
	골다공증	문성환(연세대학교 의과대학) 양승오(을지대학교 의과대학)	오한진(관동대학교 의과대학) 이동옥(국립암센터)	정윤석(아주대학교 의과대학)
	구강질환	박덕영(강릉원주대학교 치과대학) 배광학(서울대학교 치의학전문대학원)	정세환(강릉원주대학교 치과대학) 최연희(경북대학교 치의학전문대학원)	
	당뇨	김인주(부산대학교 병원)	김재현(성균관대학교 의과대학)	최경묵(고려대학교 의과대학)
	비만	강재헌(인제대학교 의과대학) 박혜순(울산대학교 의과대학)	유순집(가톨릭대학교 의과대학) 최경묵(고려대학교 의과대학)	
	빈혈	김순기(인하대학교 의과대학) 문영철(이화여자대학교 의과대학)	방수미(서울대학교 의과대학) 장준호(성균관대학교 의과대학)	
	소아청소년	고재성(서울대학교병원 어린이병원) 문진수(인제대학교 의과대학)	서정완(이화여자대학교 의과대학) 염혜원(시립동부병원)	
	손상 및 안전의식	신상도(서울대학교 의과대학)	정구영(이화여자대학교 의과대학)	
	신장	박형천(연세대학교 의과대학) 오동진(중앙대학교 의과대학)	최범순(가톨릭대학교 의과대학) 한상웅(한양대학교 의과대학)	
	신체활동	고광욱(고신대학교 보건대학원)	권순석(전남대학교 의과대학)	양윤준(인제대학교 의과대학)
	안질환	강세웅(성균관대학교 의과대학) 신재필(경북대학교 의과대학)	윤경철(전남대학교 의과대학) 임기환(이화여자대학교 의과대학)	
	여성질환	박중신(서울대학교 의과대학)	이동옥(국립암센터)	전나미(성신여자대학교)
	영양	김초일(한국보건산업진흥원) 문현경(단국대학교 식품영양학과)	박혜련(명지대학교 식품영양학과) 정효지(서울대학교 보건대학원)	최영선(대구대학교 식품영양학과)
	음주	김광기(인제대학교대학원)	이강숙(가톨릭대학교 의과대학)	이명선(이화여자대학교 보건관리학과)
	의료이용	유근춘(한국보건사회연구원)	이상일(울산대학교 의과대학)	정영호(한국보건사회연구원)
	이비인후 질환	김창훈(연세대학교 의과대학) 조양선(성균관대학교 의과대학)	조창현(가천대학교 의과대학) 최승호(울산대학교 의과대학)	
	이상지혈증	김상현(서울대학교 의과대학)	우정택(경희대학교 의과대학)	이건주(인제대학교 의과대학)
	이환	김현창(연세대학교 의과대학)	이기형(고려대학교 의과대학)	이순영(아주대학교 의과대학)
	임상검사	김용구(가톨릭대학교 의과대학) 송정한(서울대학교 의과대학)	윤여민(건국대학교 의과대학) 차영주(중앙대학교 의과대학)	
	정신보건	신호철(성균관대학교 의과대학)	이언숙(인제대학교 일산백병원)	조정진(한림대학교 성심병원)
	중금속	박정덕(중앙대학교 의과대학) 이성수(순천향대학교 의과대학)	이종화(순천향대학교) 이진헌(공주대학교)	정해관(성균관대학교 의과대학)
	천식 알레르기	강일규(가천대학교 의과대학) 김효열(성균관대학교 의과대학)	나영호(경희대학교 의과대학) 윤호주(한양대학교 의과대학)	한만용(서울대학교 의과대학)
	폐기능	김영균(가톨릭대학교 의과대학) 박명재(경희대학교 의과대학)	오연목(울산대학교 의과대학) 이상도(울산대학교 의과대학)	
	통계	김영원(숙명여자대학교 수학통계학부) 박용문(가톨릭대학교 의과대학)	변종석(한신대학교 정보통계학과) 신기일(한국외국어대학교 통계학과)	
	활동제한 및 삶의질	배상철(한양대학교 의과대학)	윤영호(국립암센터)	조민우(울산대학교 의과대학)
	흡연	이태용(충남대학교 의과대학)	조성일(서울대학교 보건대학원)	지선하(연세대학교 보건대학원)

Ⅲ. 국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 관련 학술연구용역

국민건강영양조사 스트레스 측정도구 개발 및 타당도 조사(이언숙, 인제대학교)

국민건강영양조사 식품안정성 측정도구 개발 및 타당도 조사(오세영, 경희대학교)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 가구원확인조사(안태숙, (주)메가리서치)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 골관절염검사 전문조사원(방사선사) 질관리 및 산출지표 표준화(김병성, 경희대학교)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 골밀도검사 전문조사원(방사선사) 질관리 및 산출지표 표준화(오한진, 관동대학교)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 구강검사 전문조사원(공중보건치과의) 교육 및 질관리(박덕영, 강릉원주대학교)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 안(눈)검사 전문조사원(안과전공의) 질관리 및 산출지표 표준화 (강세웅, 대한안과학회)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 영양조사 전문조사원(영양사) 교육 및 질관리(김초일, 한국보건산업진흥원)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 이비인후(귀,코,목)검사 전문조사원(이비인후과전공의) 교육 및 질관리 (조양선, 대한이비인후과학회)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 진단의학검사 수행기관 질 관리 및 주요항목 측정 소급성 조사(김정호, 연세대학교)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 진단의학검사(임상검사) (황유성, 네오딘의학연구소)

국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010) 호흡기계검사 전문조사원(간호사, 방사선사)교육 및 질관리(오연목, 호흡기학회)

2010 국민건강통계 국민건강영양조사 제5기 1차년도(2010)

발 행 : 2011. 12.

발 행 인 : 임 채 민(보건복지부장관)

발행기관 : 보건복지부 건강정책과

편 집 인 : 전 병 율(질병관리본부장)

편집기관 : 질병관리본부 건강영양조사과

이 책은 보건복지부 및 질병관리본부에 소유권이 있습니다. 보건복지부 및 질병관리본부의 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.